





. Ex Bibliotheca  
majori Coll. Rom.  
Societ. Jesu

12-14-17



I

CHURCH  
of the  
Anglican  
Episcopate  
in the  
Province of  
New York  
and  
New Jersey  
The  
Bishop  
of the  
Province  
of New York  
and New Jersey  
The  
Bishop  
of the  
Province  
of New York  
and New Jersey  
The  
Bishop  
of the  
Province  
of New York  
and New Jersey





# CHIRVURGIA

VNI VERSALIS

Opus absolutum.

IOANNIS ANDREAE  
A CRUCE VENETI

Medici præstantissimi.

*exlegante Jan. D. Anib.*

IN QVO QVORVMCVNQUE AFFECTVVM VNIVERSO

corpori humano obuientium, & ad Chirurgi curam spectantium, Notio, prædictio,  
atque curatio perspicua methodo narrantur, & tam medicorum insignium auctoritate,  
quam experientorum approbatione confirmantur.

ADDITA INSVPER EST OFFICINA CHIRVRGICA,

in qua nempe instrumenta omnia aliq̃ Chirurgico conuenientia suis figuris  
delineata expressaque cernuntur.

CVM PRIVILEGIO.



*lib. 676c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*  
VENETIIS. Apud Robertum Meietum. 1596.

# CHIRURGIA

VNI VERSALIS

Opus absolutum.

IOANNIS ANDREAE  
A CRVCE VENETI


Medici praestantissimi.

*et aliorum*

IN QVO QVORVNDAM AFFECTVVM VNIVERSI  
corpori humano obsecratur; & ad Chirurgiam curam spectantem Notio praedictis  
adque curatio praedicta methodo naturae & tam medicorum insignium auctoritate  
quam experientiarum abopore conueniunt.

ADITA INSUPER EST OFFICINA CHIRURGICA,  
in qua nempe instrumenta omnia ad Chirurgiae conuenientiam sunt selecta  
delicatae expressaeque curantur.

CVM PRIVILEGIO.



VENETIS. Apud R. Iohannem M. de ... 1728.



# EXCELLENTISSIMO

V I R O

## HIERONYMO FABRICIO

AB AQVAPENDENTE

Chirurgices, atque Anatomices in Schola  
Pataulna Doctori

PAVLVS MEIETVS BIBLIOPOLA S. D.



**T** O ANNIS *Andrea a Cruce* libri de re Chirurgica quanto sint olim applausu excepti, nec tu ignoras, Vir Clarissime, & in exemplarium penuria assidua studioforum efflagitationes testantur. Cum igitur instrumentorum, quibus utiliter illi referti sunt, typos essem nactus, nihil habui antiquius, quam ut praelo subiecti quam accuratissime recuderentur. Ut autem honorificentissimo nomini tuo inscriberem, non leues me causa adduxerunt. neque enim absurde facere mihi visus sum, si Excellentissimi Chirurgi monimenta viro cum reliquis Medicina partibus praestantissimo, tum Chirurgorum nostri temporis Coryphaeo nuncuparem. Illud etiam in primis monuit, quod hos tamquam monitores esse cupio, qui non tam Te hortentur, quam flagitent, ut interpretationes tuas Chirurgicas, quas Germani typographi inscio te omnino, atque inuito edere praestinarunt, sub incudem reuocatas recognoscas, augeas, itaque perficias, ut quae caeteris sunt haecenus valde illa quidem commendata, tuo etiam ipsius politissimo iudicio comprobentur. Nihil dico in praesentia de eximio illo Anatomico opere, quod iamdiu moliris: id enim, ut audio, & maiorum est vigiliarum, & otij diuturnioris, quam ut, per infinitas in medicina tum faci-

cienda, tum etiam docenda occupationes tuas, adeo breui temporis spatio liceat  
ad umbilicum perducere, expectatum tamen est ipsum aliquando, et nomen  
tui gloriam illustraturum. Ita praterea de me, totaque familia mea promeritue  
es, quotidieque pro tua humanitate promereris, ut, cum beneficijs tuis respon-  
dere tenuitatis mea non sit, voluerim certe hac grati animi significatione, quasi  
publico chirographo, egregiam meam voluntatem, singularemque in Te observan-  
tiam testificari. Vale.

Patavij, die XV. Iunij, M. D. XCVI.

HIERONYMO FABRICIO  
ARAVAPENDENTE

Chirurgicus, acque Anatomicus in Schola  
Patavina Doctor

PAVLVS MEIETVS BIBLIOPOLVS D.



*[The following text is mirrored bleed-through from the reverse side of the page and is largely illegible due to the quality of the reproduction.]*



# IOANNIS ANDREAE

## A CRUCE, VENETI

### MEDICI,

### Libri Primi Tractatus I.

In qua quicquid in materia Tumorum præter naturam perpendi solet, tum vniuersali, tum particulari disputatione tractatur.

De natura, & diffinitione Tumoris, seu Apostematis.

#### DIGRESSIO PRIMA.



**V**NIVERSI ferè, tum medici, tum qui non sunt medici, cum in aliqua corporis humani parte tumorem aliquem apparere vident, statim enunciant, ibi aggritudine[m] quandam generari, quod apostema nuncupant, quod quidem nomen videtur omnium tumorum præter naturam genus exprimere, siue magni sint, siue parui, siue frigidi, siue calidi; siue in principio homini accidant, siue in incremento, vel in statu, vel in declinatione. Quamobrem nos vniuersam de tumoribus præter naturam doctrinam pertractaturi, videamus, num aliqua iuxta hæc nomina (apostema scilicet, & tumor præter naturam) sit differentia: verum prius, quid sit apostema, dicamus, tanquam omnium tumorum

commune nomen diffinientes. nam (ut docuit Philosophus) in quolibet genere rerum, necesse est prius considerare communia, & postea propria vnicuique illius generis; Deinceps causas apostematũ, quot eę sint, demonstrabo, quocumque modis generentur; tempora quoque eorum, terminationes, & pronostica declarabo.

Lib. 1. de animal. 1. metaph.

Duas assignarunt diffinitiones antiqui ipsorum apostematum, vna quarum fuit sensata, à Galeno allata multis in locis, quæ est huiusmodi; Apostema est tumor præter naturam, impediens operationes membri, in quo gignitur; quæ diffinitio manifesta est, & perfecta; nam, dum membrum aliquod attollitur in tumorem, & à suo naturali statu recedit secundum aliquam dimensionem, Medicus, qui artifex sensatus est, cognoscit ibi generari tumorem non naturalem. Quamobrem Gal. 13. Meth. dicebat. De tumoribus præter naturam incipiam agere, in quibus manifestum est, quod secundum magnitudinem attolluntur membra ab eo, quod est secundum naturam. Et Avicenna dixit. Apparentia quidam apostemata declarantur sensu, & præsentia. Et quoniam dictum est impedire actiones naturales, hinc differt ab alijs tumoribus, qui id non efficiunt in membris. siunt enim in hominibus tumores, qui operationem haud impediunt, & si formam corrumpant, quod in cibis conspicitur, & in ijs, qui retento in ore spiritu, maxillas inflant, nec tamen apostema est, neque actiones naturales impedit membrorum, ut verum apostemam impedire dicitur. Hanc diffinitionem laudauit Conciliator, Haliabas, Auenzoar, Auerroes, & alij; & omnes antiqui apostema per tumorem diffinierunt, quemadmodum Galenus asserit. Hoc etiam habetur ab Hippocrate in libris Aphorismorum. Confirmat eandem diffinitionem item Galenus, cum inquit; Fit Apostema, quando primò fit tumor constrictus cū duritie, & rubore. nihil igitur aliud erit apostema, quam tumor, vel eleuatio, quæ à diuersa materia efficitur in omnes particule dimensiones; quod idem Galenus annuit, dicens; Tumor est dimensio in

cap. 1.

Lib. de tumoribus c. 1.

longitudine, latitudine, & profunditate. Alterum diffinitionis genus nobis rem diffinitam ostendit, cuiusque naturam, ac valde copiosa est; eaque huiusmodi apud Auicennam extat. Apostema morbus est, ex tribus morborum generibus compositus, ex mala complexionione, ex mala compositione, & ex contiguâ solutione, quibus tribus in vnum congeffis, nascitur aggritudo, quod apostema appellatur. Hanc damnant aliqui diffinitionem, vt tediosam, & vulgarem; nec cogitant sic necessarium Auicennae fuisse, vt diceret, cum exponere vellet, quod breuibz verbis in sua diffinitione colligit Galenus. Cum enim se Galeni interpretem fateatur Auicenna, cogeatur pluribz verbis id explicare, quod comprefius erat apud ipsum Galenum scriptum. nec tamen imminuitur dicendum Galenus; in eius in diffinitione virtute continetur, quicquid in optima diffinitione requiritur. Hoc idè placuit etiam Galeno, qui idem breuius complexus est. Ratio verò huius ea est; Nullus gignitur in homine tumor præter naturam, nisi ex materia quadam diuersa, ex qua statim inducitur in membrum ipsum tunc factum, mala quadam intemperies, quæ extranea qualitas appellatur. Corruptitur item ipsius membri forma, efficiturque in eo excessus quidam, quæ mala compositio dicitur, ac denique continuum separatur; quomobrem rectè dictum est, in tumore hos tres affectus reperi. Quod autem tumor sit præter naturam malam in membro temperiem efficiat, id Galenus asserit, iniquens. Mala temperies diuersa erit in membro, quodcunque membrum fuerit, quando in eo oritur tumor præter naturam, quæ de re dicebat Auicenna. Nullum accidit apostema, nisi ex complexionis malitia cum materia. Quod autem formam corrumpat, & compositionè membri, idem Galenus docet, inquit; Composita membra ab eorum natura deficiunt, vel in forma, vel in quantitate, vel in numero, vel in situ; manifestum autem est in forma deficere, cum in ipsis tumor aliquis præter naturam aggeneratur, & Auic. inquit; Non fit Apostema, nisi ab ipso fiat nocumentum in figura, in magnitudine, & situ. Separari vero continuum in apostematibus Gal. ostendit his verbis; Necessario in tumorebus præter naturam separantur ab extranea causa partes tumefacti loci. Hinc dicebat Auicenna; Non accidit apostema, quin continuas soluantur. His igitur de causis satis Gal. fuit breuissimè dicere, apostema esse tumorem præter naturam, ex quo diuersi morbi proficiuntur, actiones naturales impediunt. Nec Auicennæ visum est, aliud esse apostema, quam tumor, cum ipse dicat; Eminentie in cute fons de genere apostematris, & sunt apostemata parua, sicut apostemata sunt eminentie magnæ. eminentia autem, & tumor idem sunt. Quomobrem cum apostema aliquod generatur, licet nihil aliud, quam tumor, appareat, reperiuntur tamen in ipso omnes aggritudinum species; eius verò præcipuum peccatum, & diuersa complexio, atque eius forma est tumor; estque semper morbus organicus, & compositus; licet aliqui dixerint, eum esse simplicem, cum vna tantum indigeat cura, nempe contentarum in eo materierum extractione. Alij ab vnitæ materie coniunctæ, simplicitatem morbi arguunt; at non videntur, materiam ipsam, etiam si vna sit, efficeretamen morbum compositum, quemadmodum fuit Galenus. sententiam, cum inquit; quod cum sit triplex compositio huius morbi, apostema tamen est morbus compositus ex triplici compositione. & idè antiqui (inquit Hippocrates) appellabant morbum hunc *ἁμαρτία*, id est aggregarium; atque ex hoc oritur differentia inter hunc morbum, & simplices, ex latitudine inquam suæ naturæ. Ac forsan ideo rectè diceretur eum esse aggritudinem commixtam; sed vtro modo dicamus, siue Galeni, siue Auicennæ diffinitione assumentes, hoc non valde refert, modò cognoscantur causæ tum efficientes, tum materiales ex proprijs, & non ex communibus signis, ac indicationibus præterea curatijs percipiatis, topica medicameta idoneis et locis, & temporibus apponentes.

## ADDITIO.

Quoniam In antiquis Galeni translationibus aliqua verba leguntur, ex quibus dubitare quis possit, num idem significant hæc voces, apostema, & tumor præter naturam, an diuersa; idè meam hac de re sententiam aperire conlitiui. sunt autè Galeni verba. Nunc de collectionibus, & suppurationibus, breuiter narrao, quæ ex diuersis efficiuntur causis. nam sæpè phlegmones, & erysipelata phlegmonodes, ita male curentur, faciunt apostemata; quasi verò aliud quicquam sit tumor, quod phlegmon dicitur; & aliud apostema, ac tumor nihil aliud sit, quam extensio, excedens membri magnitudinem, in qua reperitur humor diuersus quidem, sed non putridus: apostema verò sit extensio, in qua reperitur materia diuisa, putrida, separans partes abinuicem, & petens exitum. Præterea alibi apud Galenū sic legitur. Mihi verò iam tēpus videtur de alijs tumoribus dicere, quorum primum est vocatum apostema; duplex est huiusmodi genus, vnum quidem, quando ex putrefacto phlegmone coaceruatum fuerit pus, veluti in sinu aliquo; alterum verò sine phlegmone, præcedente humido aliquo, ex quibz Gal. verbis elici posset, aliud esse apostema, aliud tumor, & aliud etiam phlegmon: ac muli credidere hanc fuisse ipsius Galeni sententiam; qui tamen valde decepti sunt. nam hæc duo nomina haudquaquam diuersa significant; nec in recentibus, & optimis translationibus aliqua habetur huius rei difficultas. Nec fortasse absurdum esset dicere (licet id apud Galenum non sit) si tumorem appellemus omne principium, & augmentum apostematatum, præcipue cum defluunt materie diuersæ, & præcipui tumor in aliquam partem, dimensionem efficiens in longum, latum, & profundum; status verò, cū causa cuncta est coniuncta, & morbus iam est in actu, apostema diceretur, cum nihil aliud hæc vox

s. par. c. 7. de aggritudinibus compositis.

t. c. cit. prim.

Lib. de iniquitate per. cap. 4.

s. par. c. 7. de morbo. Aggr. &amp; de act. med.

1. de morbo. diff. cap. 13. &amp; 13. meth.

s. t. 7. de aggritudinibus compositis.

1. de morbo. cap. 13.

s. ad Thales. diff. c. 1. cap. 1.

14. meth. c. 13.



10 *ἀνέπα* significet, quàm separat; & hoc quidem rationi consentaneum esset, quandoquidem statim tempore, materia iam recepta, separat ipsas membri particulas, & ibi sibi locum parat. At declinante morbo, cum materia vel concoquitur, vel putrescit, tunc morbus is appellaretur. vel, ut Galenus appellat, sinus, vel ut Auicenna, & Arabes, exitura, vel Latinorum more, abcessus, collectio, aut suppuratio. nec immerito omnia horum nominum significata huic morbi temporis accommodantur; siquidem sinus concauitatē significat: at tempore declinationis tota materia in vnum collecta locum, siue concocta, siue putrefacta fuerit, sinum, & cautatem sibi quandam efficit. iure etiam abcessus diceretur, tunc enim temporis partes diremptæ, & separatæ manent. eodem etiam pacto & exitura nomen conueniunt; tunc enim materia coniuncta, siue laudabilis sit, siue praua, exitum sibi querit. suppuratio item, cum nihil aliud significet, quàm coctum, seu maturum, seu putridum, rectè sic appellaretur. sicut etiam non malè collectionem diceremus, omnis materia, quæ fluere debebat; eo tempore fluxit; & in locum collecta est. Verùm nominibus non est adco attendendum; nam, ut nullies Galenus admonet, disputatio circa nomina non multum refert ipsi medico, modò rem ipsam cognatam, & perspectam habeat, & curationis morborum rectè ab ipsa indicationem sumat.

DUBITATIO.

11 Dixi, apostema esse tumorem præter naturam, neque fieri apostema, quin tumor non sit. dubitari igitur potest, num tumor sit de essentia apostematis; non esse autem, sic probari possit. Id, siue quo aliquid esse potest, non est de essentia illius; sed apostema potest esse sine tumore, ergo tumor non est de essentia eius. reliqua huius rationis manifesta sunt, minor autem proposito sic probatur. Ossa possunt apostemari, ut est medicorum sententia, & in eis non fit tumor, non erit ergo tumor de essentia apostematis. Præterea, Erysipelas est apostema, & tamen nullum efficit tumorem, ut docuit Auicenna in capite de erysipellate. Tertiò sic argui potest. si tumor esset de essentia apostematis, consentaneum esset, ut ubi esset tumor, ibi & apostema esset, hoc verò falsum est; falsum autem esse, hinc elicitur. Caro addita, quam medici morbi appellant, aut polypos, aut magna verruca, faciunt tumorem, & tamen ibi non est apostema, quia nec solutio continui, neque disticta illi reperitur. Quarto, si tumor esset de essentia apostematis, sequeretur, distinctionem Auicennæ non esse bonam, cum in ea non possum sit, tumor; at ea, quæ sunt de essentia aluiui, ponuntur in eius distinctione. Postrema ratio est. Apostema fit ex tribus morbis in vnum collectis; tumor verò ex vno tantum, igitur alter de essentia alterius non est. Cuius rationis manifestum est antecessè, etenim in apostemate peccatum est in intemperie, in mala compositione, & in soluta continuitate: ac in tumore mala tantum compositio est in vitro, quoniam in quantitate peccatur tantum. Pro huius rei explicatione, sciendum est, tumorem in apostemate aliquando quidem esse adco. magnum, ut sensu proprio comprehendatur, & in eo dimensiones omnes pateant, aliquando verò ita paruum, ut nulla in eo conspiciatur dimensionis species, ut in erysipellate, & in olium apostemate, licet quæ non verò apostementur. Notandum præterea est, tumorem apostematis esse, qui corrumpit temperiem, compositiorem; & vitiatem; & hoc modo vera semper hæc propositio erit; ubi est apostema, ibi est & tumor, & ubi tumor adest, ibi etiam & apostema. Tertiò sciendum est hoc est, quòd loca tumescunt, & distictas materialium causarum apostematum adducunt diuersitatem in dimensionibus, nam in ossibus; vel cartilaginibus, aut in ligamentis, cum à saua bile, vel pituita tumor gignitur, non conspiciatur manifesta in tumore eluctio, ut à sanguine, & atra bile, & in masculis, atque caruolis & molibus partibus. Quarto sciendum, quòd cum considerat tumor, tunc aut mala complexio, aut mala compositio, aut vitiatas solutio consideratur, prout ab humore diuerso causatur, qui præter naturam in loco non suo constitit; quòd ideo dico, ut fracturas, & luxationes excipiam, quæ afferunt quidem & ipsæ mala in compositionem, & solutionem continui, cum tamen ibi non adest apostema. Præterea quandoque facies ex aere in ore detento tumor, & tamen ibi non est apostema vitium, ne statuosum quidem, quambis ibi aer reperitur. Eodem modo vulnerum labra, dum conerantur, tumescunt, & vitiatem. Huius autem explicatis, facile est ad argumenta adducta respondere. & quòd ad primum, neganda est consequentia, & ad minoris propositionis probationem, dicendum, quòd & si os non eleuetur in tumorem secundum omnes dimensiones, sit nihilominus in eo aliquis tumor, siquidem si ponatur apostema, corrumpitur eius compositio. Quòd ad erysipelas verò, inquit Auicenna, si erysipelas fuerit purum, non impellit secundum omnem dimensionem; si autem multiplicatur sanguinis additio, aut succi alterius, impellit est magis apparens; raro enim dantur humores puri, & soli in apostematibus, ut medici docent, sicut neque in corpore humano.

12 Ad tertium verò argumentum respondetur, excrescentias inter apostemata numerari, & aliquando triplici vitio peccare; verum si hoc remissè efficiant, sunt tamen sub latitudine trium morborum, qui in vero apostemate reperiuntur. Ad quartum, neganda consequentia, & ad probationem dicendum, tum implicite, tum explicite tumorem poni in distinctione Auicennæ; implicite quidem, quia est morbus in complexione, compositione, & vitate; explicite vero quoniam inquit, ex quibus resultat ergitudo ipsa, hinc apostema, id est tumor præter naturam. De quinto verò & postremo argumento di-

cimus, quòd & si in apostemate tres reperiantur morbi, præcipuus tamen est deperdita compositio; 10  
quamobrem ex sui natura semper tumor erit de essentia apostematatis; & ideo semper possumus ipsum  
apostema denominare ex tumore non naturalis ex diuersa effectus materia, qui naturales operatio-  
nes tumentis membri, sicut ceteri morbi omnes impedit.

## De causis tumorum, præter naturam. Digressio II.



**A**POSTEMATVM causæ, vt medicis visum est, tres omnes sunt; quarum prima  
appellari consuevit primitiua, præpressa, euident, manifesta, extrinseca, & à Greg-  
cius procatartica dicitur, cuius ea conditio est (vt ait Galenus) vt post effectum, 20  
cum nulla ex parte cum corpore communicet, separaretur ab illo, illudque immu-  
tat, alterans subitaneo motu, vt lapis, vel quid huiusmodi durum, & obtusum,  
quod membrum aliquod percutiat, quumobrem ibi postea oritur apostema, vel ferrum,  
quod vel vulnus dolens, vel fracturam efficiat, aut denique aliqua alia exterior cau-  
sa. Inter has causas enumeratur etiam ea, quæ ab exteriori causa sit attractio, vt calor magnus à mo-  
tu superfluo generatur, vel à longa solis adione, vel à multo igne, vel ab acri, & calido medicamen-  
to excitatus, dicitur enim Galenus. Medicamentum, quod sit multæ caliditatis, humorem ex toto  
corpore attrahere ad eum locum, cui medicamentum ipsum adhaereat, non secus ac cucurbitula qua-  
dam, aut etiam alia causa veneni particeps. Inter causas procatarticas præterea connumeratur im-  
proba visus ratio in sex rebus non naturalibus appellatis, quæ sic nominantur, quòd ex se se nihil ad  
constitutionem humani corporis conferunt; verum illud alterant, & corrumpunt. Secundum causæ 30  
genus appellatur antecedens, internum, humorale, & à Græcis τὸν ἐνὶ τῷ σώματι. hæc causa valde ef-  
ficax est ad gignendum apostema, cum ab ea potentia non regitur, quæ totum corpus gubernat, quæ  
quidem antecedens causa diuiditur in efficientem, formalem, materiale, & huiusmodi: efficientes iterum  
dicitur quatuor modis, videlicet membri expellentis fortitudo, quod à se noxium humorem propel-  
lens, ad aliud debilius transmittit, vt Galenus docuit. Mittunt enim fortia membra, quando irrita-  
tus eius virtus excretiua, oppressa ex multa materia, vel quando pungitur ab acuta, & mordaci. Se-  
cundo recipientis membri imbecillitas, quod humorem aliunde expulsum admittit, hoc Galen. docet,  
inquit, inquit; sæpe membrorum imbecillitas causa est, vt in ipsis apostema generetur, & si membrum  
ipsum malis humoribus minime scateat. hoc autem inde proficiscitur, quòd ad membrum illud mul-  
ta transmittuntur excrementa aliunde: & debile existens, proprium nutrimentum administrare non  
potest. Et Auicenna dicebat; licet corpus non sit multarum superfluitatum, tamen quandoque adue-  
nit, quòd ipsum debilitat; quare attrahuntur ad ipsum materie corporis, licet non sint materie diuer-  
se superfluentes. Tertia est debilitas virtutis nutritiue, quæ cum proprium nutrimentum in nutriti-  
substantiam conuerti non possit, vel quia multum est, aut viscosum, aut durum, aut mala qualitate  
infectum, cum in concocum feruat; quare in ea particula apostema cleuari contingit. Quarta, debili-  
tas virtutis expulsiue; nam (vt inquit Gal.) sicut in qualibet corporis parte est potentia, vel facultas,  
quædam, quæ id, quod bonum est, nutrimenti causa retinet, sic alia facultas est, quæ id, quod noxium  
& superfluum est, expellit. hæc autem cum non semper suo officio munere fungi, seu tenacitate mate-  
riæ, seu viarum angustia, materiam illam retinet, quæ apostema tandem efficit.

Causa verò materialis duplex est, aut in qua, & est corpus animatum; unde tumor interdum dicitur 32  
agritudo communis communitate subiecti: aut ex qua, & hæc à Gal. in multis locis auctoritate Hypo-  
cristi declarata. Dicebat Auic. harum causarum, quasdam esse ex materia, & quasdam esse dispositio-  
ne membri: quæ verò sunt ex parte materie, sunt repletiones ex sex rebus prænomminatis, vt constat  
in capite de agritudinibus compositis. vbi dixit, quòd materie, vnde fiunt apostemata, sunt sex, sci-  
licet quatuor humores, vt sanguis, pituita, bilis flaua, & bilis atra, & præterea flatus, & aqua. Ab  
vnaquoque istarum materiarum tumor gigni potest, vt patet in lib. de tumoribus præter naturam, &  
33. & 14. metho. atq; 3. fen. 4. per totum.

Finalis verò causa dupliciter consideratur, aut ratione boni, vt principalia & nobilia membra, ex-  
pulsis, & abiectis malis superfluitatibus; à morbis tueantur, vt docet Galenus; & ideo natura, quæ nõ  
deficit in necessarijs, nec abundat in superfluis, vt 3. de anima habetur, constituit nonnullas in corpori-  
bus humanis regiones, quas primaria membra oppressa à malis succis, eos in his locis proiciendo, re-  
lucentur, & talia sunt loca adenosæ emunctiorum, glandosæ, declarata à Gal. & à Principe cap. de  
cura abscessuum. & cap. de membris in fine, cum ait; Membra autem fortia superfluitates suas ad me-  
bra debilia sibi vicina expellunt, sicut cor ad ascillas, & cerebrum ad loca, quæ sunt post aures, & he-  
par ad inguina; hæc dicuntur particularia emunctoria, quia particularibus deseruiunt membris in nõ  
naturalibus euacuationibus, sicut in naturalibus euacuationibus, superfluitates, quæ fiunt à digestio-  
ne stomachi, per intestina hepatis per vrinam dimittuntur, vt docet Auic. vbi agit de qualitate ge-  
nerationis humorum, quasi in fine, vbi etiam malorum humorum omnes euacuationes assignat. In-  
terdum sic tumor ratione mali, quia eius effectus est, vt lædantur operationes membri, in quo est.

ADDITIO.

10 Et quia dictum est à Galeno, Rasi, & Auicenna, quòd vna principalis causa tumorum est dolor, & nil magis affert apostematam, quam dolor, & hoc, quia attrahit, videndum est, quomodo hoc verum sit. Ex primo sciendum est, quòd dolor per accidens est causa attractionis. quod sic declaratur ab Auer. Dolor est (inquit) causa attractionis, aut propter malam complexionem, quæ generat ipsum dolorem; aut propter superfluitatem motus virtutis expulsiuæ, cum expellit superfluitates; aut propter ambas causas: cum enim dolor membrum, debilitatur, quia corrumpitur eius complexio, & natura nititur dolenti regioni succurrere; quare mittit ad locum & sanguinem, & spiritum copiosius, vt eis mediantibus causam doloris expellat. Præterea membrum dolens calefit propter sanguinem, & spiritus ad eum transfusus, vnde fit attractio; idèò dolor est attractionis causa per accidens, & mediantibus causis iam dictis, & non per se, cum non attrahat per aliquam virtutem sibi annexam, cum sit tale accidens. Provenit ergo tumor, etiam propter aliquam ex causis iam dictis, scilicet dolorem, calorem, & membrorum debilitatem, & similia: sed dolor, & calor sunt de causis fortibus: debilitas verò membri facit eum paratum ad recipiendum rheuma, aut propter sui naturam; quia sic eum creatur Deus, vt extraneos succos recipere, sicut est cutis: aut propter eorum raritatem, sicut caro laxa trium reflexionum, siue emunctoriorum, aut sicut carnes glandosæ, quæ hinc, indeque per loca corporis sunt expansæ, & suscipiunt superfluitates, quæ illis demandantur, vt 3. localium habetur, & in cap. de apostematibus, accidentibus in glandulis; quemadmodum ex attractione vicerum, aut aliorum apostematum super extrema, ad quæ currunt materiae, in viis quarum incedunt carnes istæ: Quare involuntur eum eis, vt accidit inguini, & subascellæ ex apostematione amborum, in eo, qui habet scabiem, aut vlcera super pedes, & manus; aut quia membrum est paruum respectu nutrimenti debentis nutrire: cum in membrum debile est, non resistit materię fluenti, neque contrariæ, & maxime si mittens fuerit repletum, & forte: & in eo conculcantur materię diuersę, & generatur tumor.

Et si quis diceret, quomodo dolor attrahit, cum attractio principaliter fiat à vacuo, à simili, à pro prietate seu forma specifica, aut à calido, vt declaratur ab Auerro. Nec dubitandum est, quòd & si vacuum nihil est, vt in physicis demonstratur, possit tamen attrahere, quia non attrahit, sicut existens, sed sic esse non potens; quoniam priuatur corpore: sic enim describitur, Vacuum est locus priuatus corpore: attrahit igitur, vt patet in dextro ventriculo cordis, & in ventosâ, quia cū aer cucurbitulæ ab igne resoluitur, remanet concuius ventosus absque corpore aeris, & idèò attrahit. A calido autem fit talis actio, vt patet in appositione alicuius medicinę vehementer calidę alicui membro; nam immediata 40 et attrahit, talisque attractio à Gal., & Principe reducitur ad eam, quæ à vacuo; calor enim euacuat humidum membri extenuans ipsum, humiditatem in vaporem ducendo, propter quod cogit aliquid recurre ad replendum: præterea aperit meatus, & liquat materias vicinas, vt patet de calore ignis accensi in ellychnio lampadis, qui euacuando substantiam ellychnij, tacit consequi oleum ad replendum. A simili, quia ignis attrahit ignem. A forma specifica fit attractio, vt patet in ferro, quod à magnete attrahitur, & cholera à scamonea: talis enim actio non fit neque à qualitate simplici, neque à composita perceptibili sensu, sed à forma adueniente ei, quæ resultat ex cõplexione primarum qualitarum, & talis forma est virtus actiua in passio determinato, vt magnetis in ferro; quia ferrum non attrahitur à quocunque, sed à magnete; & tales actiones sunt imperceptibiles, & inenarrabiles, non naturales, sed supernaturales, & virtuales. Attractio verò, quæ fit à dolore, aut soluendo continuum, aut introducendo caliditatem, reddit locum vacuum: præterea dico, quòd dolor attrahit rheuma, mediante mala 50 la complexionem, quæ fit de nouo in membro, quæ est causa commotionis humorum præter naturam. Secundo dico, quòd principium, per quod humores mouentur ad membrum, est forma ipsius humoris mobilis cum qualitate acquisita ab attrahente, aut sibi data ab aliquo alio, hæc tamen qualitas est principium instrumentale. Ex hisquis diceret, quòd per solam præsentiam actiui ad passiuum, nulla qualitate interueniente, fit talis motus attractionis: dico, quod hoc non est verum; quia omnis forma substantialis agens exigit instrumentum actuale, uel virtuale in producendo sui effectus. Ex his igitur dicendū est, quod dolor attrahit; quia in dolore fit aliqua mala complexio, & similiter solutio aut disgregatio calido, aut vnieme frigido: vnde, ne detur vacuum, fit humorum concursus, & sequitur eorum attractio.

DIGRESSIO.

60 Et quia non datur causa absque suo effectū, quoniam relatiua sunt, videndum est, verum in corpore humano possit generari tumor præter naturam: Ex videtur, quòd non; quia aut talis tumor esset simplex, aut compositus: non simplex, quia humores in venis sunt permixti, vt habetur cap. de humoribus. & pariter idem sunt, cum refundant, siue expelluntur. Secundo si talis tumor simplex posset generari, esset ex vno tantum humore, aliter esset permixtum, sed non ex sanguine; quia dum sanguis non regulatur à naturę regione, putrescit, & eius subtile ad choleram conuertitur, grossum autem ad bilem atram, vt docet Galenus, nec remanet sub forma sanguinis. Hoc etiam verificatur de alijs humoribus auctoritate Auicennæ in cap. de phlegmone dicit Princeps; scias, quòd raro datur humor purus, ergo non datur tumor à pura causa. Ceterum neque datur tumor compositus: quia aut esset ex omnibus humoribus, aut ex aliquibus: si ab omnibus, tumor esset absque mala complexionem, quod probatur,

quia humores sunt contrarii in qualitatibus suis, unde ordine refractio, cum coniunguntur, refultat 10  
quædam temperies propter eorum adinuenient admixtionem, vt docet Hypp. Nōt etiam vs aliquibus  
& ratio est, quia nunquam daretur tumor, qui ad saniem perduceretur: nam eius materia sua ef-  
fectu sic calida, quod facillimè transiret de loco ad locum, at quæ debet maturari, indiget quiete; nam  
maturatio est quædam digestio, & ad digestionem requiritur quies: aut sic frigida, quod nullo modo  
reciperet concoditionem, ergo &c. Pro ratione quartæ sciendum est, quod experientia est in contrariis;  
atque omnium Doctorum auctoritates: & ratio talis, vbi possunt esse aliqui alicuius effectus, ibi potest  
esse effectus: sed mala complexio, mala compositio, & ceterum sol. in aliquo membro reperi possunt,  
quæ sunt causa immediata tumoris, ergo & tumor. Ad rationes in oppositum respondendo, breuiter  
dico: Ad primum, quod verum potest generari: ad probationem, negatur consequentia, quia tametsi  
humores finem permixti, potest alicui humori tamen aliqua mala qualitas accidere, vnde natura illum 20  
expellit, & alios regular, vt declaratur secunda primi: Ad secundum dico, quod ex simplici succo  
produciatur tumor. Ad probationem, quod non ex sanguine, dico, quod talis permutatio non accidit  
linguis, nisi in termino putrefactionis: sed possibile est, quod ex sanguine, vt linguis, fiat tumor. Ad  
auctoritatē Auic. de alijs humoribus dico, quod verum est, quod raro datur humor purus, ex quo &  
tumor purus; non propter hoc negatur possibilitas, vt patet ex Gal. & Principe de cryspilare, & scy-  
rho. Ad argumenta de composito dico, contingens est vt unus possit generari. Ad primam improba-  
tionem dico, quod & si sit ipsum mixtum, non propter hoc temperies refultat, quæ fit pro corporis  
operatione. Et eo magis quando humores sunt in loco non suo: quia tunc quanto magis agitantur in  
ter se, tanti eo magis suarum qualitarum disproporatio refultat, & per consequens mala qualitas, eo quia  
ab agente ipso contemperate relinquantur. Ad secundam improbationem negatur sequela, & dico, 30  
quod non est necesse, vt omnis tumor ad saniem conuertatur.

## DE MODO GENERATIONIS TUMORVM.



ad aliquid, quidem veluti febriis est membri, et interdum humiditatis ibi concente putrefacit. Dicitur etiam fecundo ad Glau. he tumor, aut ex ipsius loco humore, in quo nascitur, corrupto; aut ex alijs corporis partibus illo in loco confluxibus; he etiam ex vapore, vel viciossitate corrupta: Hec tunc declarata Gal. in lib. de causis morborum, et a. de differentiis febrium cap. vltimo. Explicans autem primum modum generationis tumorum, qui fit per defluxum, dicitur Gal. Virtutem habet omnis particula, quemadmodum proprium attrahit, in alienorum excretionem; et quoniam duplex est, quod alienum exiit, alterum quidem peccans in quantitate, alterum vero in qualitate: hinc etiam si vique non grauetur aliqua particula ab eis humoribus, habet tamen aliqua

superfluitates secundum qualitatem præternaturalem ad quædam excretionem præsumpti ipsa natura p-  
eas, quæ in ipsa sunt, venas, quemadmodum per canales: sed siue sanguis fuerit, qui expellitur, siue  
alter humor, necesse est primum quidem ad aliquam proximam venire particulam, in illa aurem duo-  
rum alterum facit, vel digestus, vel transpiratus non adhuc ad aliam transiit tertiam, & ipsa foris ex-  
stente, ex ipsa ad aliam particulam transmittitur, & sic non cessat, donec ad aliquam perveniat, quæ  
non adhuc ad aliam expellere possit, & in hac abundat. Dicit quoniam Gal. faciunt tumores ve-  
ne, humores sanguini miscendo. quando in eas se effuderit: tunc plene, atque tunc in aliqua  
inbecilliorum parte, pondus graue, se extendo, atque purgando, deponunt, quæ sine dubio  
pars carens virtute, nolens necessario suscipit pondus. Dicit insuper: Ex fortioribus particulis im-

1115

10 tur etiam hac materia. 3. artis med. vnde Auic. dicebat. Omne apostema, quod causam manifestam non habet, & eius causa corporalis monstrat materiam de vno membro ad aliud, quod est sub eo, fuisse mutata, vocatur carbarrus. i. defluxus; membra autem debilia, quae tale pondus iniuri recipiunt, aut talia sunt, quae illi, dum formatur animal, noxam subire, aut postea laesa fuisse, aut suapte natura, ut cutis. Datur modus secundum tumorum generationis, scilicet per viam putrefactionis, siue coactionis, vel exacerbationis, qui declaratur à Gal. quando inquit; Dico magis aliquid calefieri propter calorem in eo augmentatum, augmentatur autem aut propter nimium motum, aut propter putrefactionem, vel quia corpus à corpore calidiori comprimitur, vel quia calor clauditur; A nimio motu supercalefactum membra, sicut videmus in exercitantibus se pila, si nimis se exercuerint; & in lapidibus, & lignis, si nimis inter se fricarentur. Propter putrefactionem vero, sicut fit in spermibus, & stercorebus putrefactis; & ibi dicit Gal. Quadam vice alexei columbinum stercore putrefieri, & per se ipsum nullo igne apposito comburi. In corpore compresso à calidiori corpore calor augmentatur, sicut contingit in balneo; vel à sole ardens: simili itaque ratione dicebat Gal. Naturalis infusus calor, qui vegetatur, atque mouetur supramodum incensus, & arefactus in loco, quem apprehendit, & in quo condescit, in illo phlegmones acres facit. At quoque Auer. Interdum fit tumor, quando membrum nutritum, quod est de modum, nec digerere, nec permutare potest, propter eius qualitatem, aut quantitatem, & augmentatur in membro taliter, quod dilatationem secundum omnes dimensiones recipit: & tunc eius calor eisdem mensuratur, id est naturalis, extinguitur, & in eo putredinalis generatur propter materiam extraneam congeffam: vnde sic quater necessest tumor preternaturalis.

D I G R E S S I O.

39 Verum est, vt declaratur. 13. metho, quod tumor per viam coactionis raro datur; & cum contingit, eius succi nec preparantur, nec ad perfectam coctionem deveniunt: sicut videtur in tumore per viam derivationis; nam, dicebat Gal. Phlegmon, qui per infuxionem sanguinis fit, propria causat accidenia, & hoc quia vix ex humoribus est: qui vero coactione, non nisi ex malo humore sunt: & verè vt plurimum tumores aut à causa intrinseca, vel forisfeca produciuntur per viam defluxus: illi vero, qui ex humoris coactione, sunt (vt dictum est) aut quia membrum suum non potest permutare humorem, vel quod superest de nutrimento, expellere non potest, vel humor coactione propter prohibita transpirationem, aut comburitur ab aliqua extranea caliditate: & si vinit talis humor, fit tumor: talis raro contingit; quia facillimè causae, quae apertissime sunt, evitari possunt. sed quia dubitari potest, nunquid in tumore primo concurrat aut mala qualitas, aut corrupta compositio, vel continuu solutio, ideo pro ratione quae sui sciendum est, vt diximus, quod causa tumorum, aut est intrinseca, aut forisfeca: si intrinseca, dico, quod in tali tumore primo occurrit mala complexio, quae postea soluit; & vltimo consequitur, cum facta est agnitudo materialis, mala compositio: sed in tumore à causa procathartica apparet primo sol. continui, secundo mala qualitas, quia à solura consistit inquirere fit arratio, ne detur vacuum, vt tenet Conciliator, deinde mala compositio. Cognoscenda sunt etiam signa horum tumorum: in tumore coactione semper praecessit aliqua causa membrum debilitans, & cum incipit, est parvus valde; & paulatim augmentando tendit ad statum; & non apparent vnde tumide in eius circuitu; paulatimque succedit dolor, nec apparent in corpore signa repletionis; neque cognoscitur causa manifesta, saltem de propinquo. Tumoris autem defluxi significatio, est manifesta corporis repletio, ac membri superioris; & aliquando cognita est causa primitiva; trahens materiam ad locum, saltem de propinquo: & cum incipit, velociter agendo procedit: & tument vnde in circuitu, quae prius non apparebant: & dolor fit crudelis &c. Ex qua hic noster sermo est de extrinsecis tumoribus, omnia signa non sunt declaranda, nisi propriis locis, & vt dicit Auenenna, signa tumorum declarantur sensu, & presentia.

DE TEMPORIBVS TUMORVM.



109 **I**tem preternaturalis, sicut & aliae passionis, habet quatuor tempora, scilicet principium, augmentum, statum, & declinationem. Fuit declarata haec propositio à Gal. primo de Crisi, à Scapione, à Principe. verum tamen est, quod iste in capite de phlegmone nihil dixit de principio, sed de incremento, quod cognoscitur additione magnitudinis, & tensionis: Mansio vero per finem eius, & quod ibi aggregata est materia, si debet aggregari. Declinatio autem, cum incipit tendere ad lenitatem, & debilitatem: sed secunda primi omnia tempora clare significauit, dicens: Apostema quidem habet principium, in quo tumor ad exteriora egreditur, & apparet, quod conuulsus augetur, deinde (i. in augmento) capacitas augetur, & extendatur: postea statum, cum à modo ad maiorem pervenit statum, in quo esse debet: demum incipit minui in declinatione, & maturatur pars. At Gal. in lib. de quatuor morbi temporibus, loquendo de phlegmone, incipit in illo tempore, secundum quod impletur per particula sanguinea substantia: quando vero magis descenditur particula

Et primo pro-  
gredi. com. 46.  
1. fin. primi  
cap. 3.

Libro de cau.  
morbi. cap. 2.

1. ad Glanc.  
cap. 1.

2. com.

Almo 2 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. sup. primi li-  
ber.

aymo Breuia  
13.  
Cap. 17.  
Prima quadri-  
cap. 1.  
1. primi tract.  
1. sum. 1. cap. 7  
1. fin. quatuor  
Cap. 1.

Cap. 3.



la, & caliditas quædam innascitur propter putredinem, secundū hoc est tempus augmentationis, quando autem ad pus mutatur, maximè vtiq; dolores tunc comprehendit, & febres vocatur status passionis hoc tale tempus ex auctoritate Hipp. quando verò suppuratur, vel diaforatur rheuma, & tumor vel ten-  
sio minoratur, morbus est in declinatione. Hæc etiam quatuor tempora opinè declarantur ab Actio.

## DIGRESSIO.

cap. 3.  
cap. 1.

Lib. de qua-  
morib. tñ. cap.  
vltimo, & pri.  
de Crisib. cap. 1.  
s. aphor. 30.  
pri. de Crisib.  
cap. 1.  
cap. 10.  
j. coll. cap. 9.

41. Causa.

5. Regulari.  
pri. de Crisib.  
cap. 1.

cap. 3.  
j. de Crisib. p.  
pri. de Crisib.  
cap. 3.

Debet medicus, vt dicitur secundo ad Gla. & 4. primi, diligenter cognoscere tempora ægritudi-  
num: quæ nisi opinè intellexerit, maxime lædè, ignorando quid in initio, quid in augmento, quid  
in statu, quid in declinatione ægrotanti adhibere, vel auferte debeat. Et notandum est, quòd accidentia  
in augmento, & statu sunt leuiora: sed in statu magis stant, in declinatione minuuntur, & hoc est,  
quòd dicebat Gal. ex auctoritate Hipp. Circa initia, & fines omnia imbecilliora, cum verò conflunt,  
fortiora. Vnde Gal. alibi dixit. Status ægritudinis est fortior horarum omnium, & vehementior: &  
infra adduxit vnam sententiam, quam declarauit Auer. quæ mediantè postsumus distinguere tempora  
tumorum penes digestionem materiæ, & postsumus appellare principium totum tempus, in quo nulla  
apparet digestio, & calor stat in membro sepultus: incrementum quando magnificatur membrum, &  
calor aliquater agit in materiam, & incipit putrescere, & apparet aliqua digestio, seu præparatio ad  
digestionem. Status verò est tempus, in quo materia tota est aut digesta, si debet digeri, aut corrupta,  
si debet corrumpi. Declinatio autem est, cum expurgata fuerit talis materia, & mēbrum deducitur ad di-  
solutionem, & formam naturalem, aut ex toto fuerit diaforata, vt dicit Rasis auctoritate Gal. Cum in  
aliquo membro aggregata fuerit sanies, & euacuatur, aut dispregitur absq; aggregatione, incipit mem-  
bru deumescere, & minuitur eius extensio. Secundo notandū est, vt dicit Serapion, & vt docet Gal.  
Apparet in salubribus passionibus huiusmodi quatuor tempora: nam sunt aliqua ægritudines, quæ  
propter sui malignitatem, aut propter virtutis debilitatem, in augmento aut statu eneant homines:  
sed quando expectant indutias, vt apparet in tumoribus extrinsecis, donec perueniant ad declinatio-  
nem, dicuntur esse salubres, & est tempus, in quo non moriatur æger, vt prima quartæ ex auctoritate Gal.  
habetur, etiam si quandoq; dubitauerit Gal. num hæc propositio esset vera. Sed redeundo ad termo-  
nem nostrum, dico, quòd perfectè cognoscuntur hæc tempora in calidis tumoribus, & magnis, à qui-  
bus leduntur operationes. Tertiò notandum est, quòd quantò magis materia tumoris fuerit calida,  
& benigna, tanto citius expectandus est status, à quo ferè omnes curatiue operationes dependunt. Sed  
ad hoc auxiliatur tempus calidum, mēbrum forte, & constans virtus, vt dictū est prima quartæ cap. 4.

## DE TERMINATIONE TVMORVM.

pro. 3. de a. cap. 1.  
j. 1. cap. 3.  
3. prius.  
cap. 2. de  
Lr. de morq.  
tempo.



REPLICITER terminantur tumores, vt docet Auic. vbi de pleuritide agit, & vbi  
de indicij sanici, & cap. de ægritudinibus compositis, & Rasis in lib. diuisionum.  
Nam aut resoluntur, aut collectionem faciunt, aut in duritiem conuertuntur.  
Idem voluit Gal. & horum effectuum rationem reddidit, quia impossibile est, quòd  
res ad vnum duorum modorum perueniat, aut vt vincat superfluas, quæ in mem-  
bro effunditur, & corrumpat membrum, in quo est, aut vincatur ab innato calore,  
& redeat membrum, & lacertus ad naturalem dispositionem. Et si vincat super-  
fluitas, manifestum est, quòd oportet ex dominio vitali complexioni, vt impediatur mēbrorum ope-  
ratio, & corrumpatur secundum temporis longitudinem: Vnde Auic. in cap. de phlegmone in sine, di-  
cit: Ex scias, quòd dum non submergit naturā materia, non prouenit apostema, & respirat per ignem  
eius, quòd respirat exterius. Similiter declarat Gal. quæ nam tumori si determinatio fit melior, &  
dabilior, & eam laudat, quæ per euaporationem, & resolutionem fit. & reddens rationem dicit, quia  
ad collectionem, & putrefactionem materiæ sequuntur duo, primum putrefactio, secundum eius colle-  
ctio: sed diaforeticis optabilissima sanatio est. Et notandum est, quòd tumor resoluitur, quando ma-  
teria fuerit benigna, & virtus potens, & corpus mundum, & membri porositas fuerint late. Dicit  
Rasis in lib. diuisionum, & Auic. cap. de phlegmone, quando resoluitur apostema, cognoscitur: quia sa-  
tis carum tumor, & pulsatio incipit minui, & sedari, & inflammatio incipit quiescere, & scis illud, quòd  
aggregatur per additionem pullationis, & caliditatis, & fixationem versusque, & scis illud, quòd putre-  
fit propter digestionis difficultatem, & loci tenebrositatem, & vehementi tensionis: putrefactio etiam  
aliquando causatur à magnitudine, interdum à malignitate tumoris, etiam quòd tumor sit parvus.  
Tumor induratur, quando materia fuerit viscosa, aut dura, & calor naturalis fortis, adeo quòd par-  
tes subiles resoluantur, & crasse indurentur. Dicit Gal. Cholera quidem facillime resoluitur, & ve-  
lociter ab omni, quod in ea agit: bilis atra verò laboriosè, & vniuersaliter omne, quòd est subtile, &  
tenue, est velocis resolutionis: & omne, quòd crassum, & spissum est, tardæ resolutionis. Induratur  
aliquando propter potius materię ingrossationem, aut maioris partis in eo contentæ, quando excludi-  
tur, aut resoluitur pars subtilis, & remanet grossa, quæ induratur, & lapidescit: vnde oritur longa, &  
difficilis cura: imò Rasis in diuisionibus dicebat, quòd interdum tumor fit ita durus, quòd non san-  
tur.

90 tur. Tale accidens sæpe ex malo medici tegimine contingit, & maxime in melancholicis tumoribus.

Fut frequenter scyrrhus ab indoctis medicis, qui non intelligendo, mox à principio vehementibus ea, quæ tali humore loca laborant, atque intumescunt, diaforeticis curant medicamentibus, sublarag; humo-  
ris tenuitate, spissiorum, quæ remanent scæculenta, quasi in lapidem concrefcit. pari modo in pituitosis  
propter symboleicatem sæpe etiam in sanguineis. Ideo princeps cap. de cura phlegmonis dicebat; Et  
cum timetur, vt declinet ad duritiem, administra mollificantia; nam quæ fortiter reperiuntur, aut re-  
soluunt, non conueniunt, vt diximus secunda primi. Notandum est etiam, vt docet Gal. quod interdum  
determinatio tumoris ad saniem fit laudabilis, & bona, scilicet per comparationem ad modos deterio-  
res; quia sæpe corruptitur membrum ex tumore, vt dicit Auic. quod fit propter oppilationem corpora-  
lem, sicut apostema calidum, malum, fixum, magnum, grossa materie, oppilans meatus, & prohibens vi-

Gal. 1. ad Glu.  
cap. 11.

De ingq. lenti

3. 4. cap. 15.

1. prognost.

6. Aphor. 26. 35

1. de morbis, R  
6. Aphor. 31.  
de com.

90 tam transire, aut suo veneno corrumpens. Notandum est etiam, vt docet Gal. quod tumorum resolu-  
tio duplex est, scilicet rationalis, & irrationalis; prima habet quattuor causas, quarum prima est paucitas,  
benignitas, & subtilitas materie. Secunda est membri raritas, & viarum largitas. Tertia fortitudo  
innate virtutis. Quarta est corporis mundificatio. Cum enim istæ omnes simul fuerint causæ, aut  
plures, tunc permutatio erit ad bonum, & resoluetur tumor, & materia permurabitur de nobili ad igno-  
bile membrum, & ab intra ad extra; quæ sunt laudabilissimæ determinationes, vt docet Gal. Secunda  
determinatio est irrationalis, quæ per causas irracionales fit, & tendit secundum plurimum ad malum  
& eius causæ sunt tres, quarum prima est multitudo materie, aut eius viscositas, seu grossities. Secunda  
est ipsa mala qualitas, acuta, corrosiua, pungitiua cum mordicatione, aut etiam venenosa. Tertia est im-  
potentia virtutis regitiuæ; & cum operantur istæ causæ, fit permutatio ad malum, etiam quod resolu-  
tur tumor, quia permuratur de ignobili membro ad nobile, & de circumferentia ad centrum, & tales  
evanescensz sunt malæ. Dicebat Hypp. Erisipelas ab exterioribus veri ad interiora non est bonum, & tales  
ab interioribus autem ad exteriora, bonum, sic ex Gal. dicendum est de omnibus tumoribus.

# DIGRESSIO.

Possumus dicere, quod tumor fit agritudo communis communitate subiecti, quia in omni parte po-  
test contingere, vt declarat Auic. & Auer. in consimilibus quidem vt ossæ, nervo, musculis &c. in  
organicis, vt pulmone, hepate, cerebro &c. & determinatur vno prædictorum modorum. Sed du-  
bium est, verum ossa apostementur, & videtur, quod non, argumentando à similitudine sicut tumor non  
fit in membris valde mollibus, propter eorum raritatem, & fluxibilitatem; cum materie facilius possit  
90 expandi propter eius poros, vt dicit Serapion, pari modo nec in ossæ, cum fit frigidum, siccum, & val-  
de durum; nec in eo accidit solutio continuæ, quia eius durities resistit, nec humores possunt subintrare  
eius porositates; unde non fit agritudo in cõspõsione. Secundo argumentatur sic; quæ patent ad sen-  
sum, nulla indigent probatione; nam dicebat Arist. Quod sensum dimittit propter raritatem, debili-  
ter est intellectus. sed clarum est, quod tumor semper generatur in membro, quod est medium inter  
duritiem, & lenitatem, ergo non in ossæ. Pro ratione quaestii sciendum est, quod tumor dupliciter in-  
telligitur: aut verè præternaturalis, compositus ex tribus agritudinibus, vel non verè præternaturalis,  
vt de tumoribus ossium dicendum est ex Auic. quando dicit; Apostema accidit membris mollibus, &  
cum accidia ossibus, accidit res, quæ apostematæ assimilatur, per quam eius ingreditur concutitur, &  
eius augmentatur humiditas; neque est mirum, dicebat ipse, vt fit illud, quia recipit augmentum nutri-

3. 1. cap. 56  
3. col. 19.

1. Brunius; cap  
de karab.

Lib. 2. physic.

3. 1. cap. 5.

2. 3. cap. 10.

Deut. 2. form. 3.  
cap. 19.  
1. 4. 2. 3. cap. 10.

90 menti, & superfluitatum. Præterea loquendo de ossibus dicit, quandoque accidia eis species apostema-  
tum, & illud quidem non est mirum; nam omne illud, quod recipit extensionem cum augmento nutri-  
menti, non elongatur, quin recipiat extensionem cum superfluitate; quia si non reciperet materias pe-  
netrantes in eos, augmentaret eos, non fierent virides, nec denigrarentur. Idem dicit Aue. cap. de  
veteritate sping. Nō enim verè apostementur, etiā quod eis accidia res, quæ apostematæ assimilatur apo-  
stemate omnino præternaturali. Serapion verò credebat, quod nullo modo ossa possint apostematari  
quem reprehendit Auic. cap. de karab; & dicit; Quidam medicorum existimauerunt, quod cere-  
brum non apostematatur, quia quod est lene, sicut cerebrum, & durum sicut ossa, non extenditur, &  
quod non extenditur, non apostematatur, qui sermo est erroneus; quia & quod lene est, extenditur, &  
quod etiam apostematatur. Et ibi dicit Auic. quod Gal. hoc confessus esse rationem huius rei declarat  
60 sub istis verbis. Omne, quod nutritur, extenditur, & augmentatur cum nutrimento; & propter hoc  
concedendum est, quod extendatur, augmenteturque cum superfluitate, & illud est apostema, quan-  
vis non secundum omnem dimensionem; ideo non verè & simpliciter apostematatur, sed secundum quid;  
sed verus tumor est, qui accidit in membris medijs inter dura, & lenia, quia recipiunt materiam su-  
perfluatam, & fit tumor, in quo omnia requisitæ ad esse tumoris reperiuntur, & eleuant secundum om-  
nem dimensionem. Et sic patet responsio ad primum argumentum. Ad secundum verò dico, quod ra-  
tio quidem accidia tumor in ossæ, non tamen propter hoc tollitur possibilitas, nam Hypp. dicebat, à cor-  
ruptione abscissus ossis. Et Gal. dicebat; verum verò ad ossis corruptionem ipsius ossis sequitur ab-  
scissus, vel carnis circumstantiæ, non manifestauit Hypp. verumque autem potest esse verum.

## DE MODO PRAEDICENDI IN TVMORIBVS.



**D**icitur Hypp. lib. primo prædictionum in principio; Videtur mihi, quod sit ex melioribus rebus, ut medicus utatur prognostico: hac de re nonnulla dicam, quæ ad illam partem in materia de tumoribus maxime pertinent, quibus medianibus poterit quis rectum prognosticum in medium asserre. Et cū medicus (dicebat Gal.) utitur prognostico, facile recipiunt infirmi ab eo, quod eis præcipit. Secundo, si cognoscit futura accidentia, præparat se ad obuiandum eis. Tertiò, si rectè prognosticauerit, non existimatur fuisse in causa mortis; labore igitur medicus in recta prognosticatione, quia iudicium difficile est. Dico igitur, quod via prædicendi in tumoribus sumitur à quinque medijs, scilicet à qualitate succi peccantis, à tumoris forma, à simplicitate, à regione, in qua contingit tumor, & à situ particulari.

In com. primi  
parag.  
Lib. de cõst. ar.  
aud. cap. 16.

a. Aphor. 1.

Lib. de nat. hom.  
1. & 2. de alim.

A qualitate materię, discendum est, ut docent Hypp. & Gal. quod humores nostri corporis sunt quatuor principales absq̃ secundis humiditatibus, scilicet sanguis, cholera, phlegma, & melancholia. Sanguis enim est calidus, & humidus complexionis; cholera (quæ & bilis sua dicitur) calidus & siccus, phlegma autem (quæ & pituita nuncupatur) est frigida & humida habitudinis melancholia (quæ bilis atra dicitur) frigida est, & siccus; Aliæ verò humiditates, sicut cambium, ros, gluten, & nomen non habens, non causant tumores, quemadmodum veri humores, qui aliquando sunt naturales, & puri interdum aduulsi, admisti, vel venenosi. Ab uno humore simplex tumor pignè potest dici: dico simplex simplicitate materię, vel simplex, quia cum eo non sunt aliæ ægritudines, nec aliud accidens, nec alia causa, nisi propria, & essentialia illius tumoris; & tales, ut refert Auer. benigni appellantur. Sed raro huiusmodi reperitur: nam, ut dicit Gal. ut plurimum tumor est composuit, & raro solus, & raro si ipse dicit de mente Hypp. non datur humor purus in corpore. Ideo Auic. cap. de phlegmone dicebat; parum quidem contingit, ut phlegmon sit simplex, sed ut plurimum ei associatur erysipelas, aut durities; sed quanto magis humor est solus, tanto minus cum eo apparent praua accidentia, & citò hi tumores, præcipue calidi, resoluntur, aut collectionem faciunt. Dicebat Auic. Exiturus quidem diuersificatur propter spatium maturacionis suæ saniei secundum substantiam humoris in subeitate, & grossitate, & complexionem, in calore, & frigore, & æqualitate; vnde quanto magis materia est sola, calida, & benigna, tanto magis aut resoluitur, aut putrescit. Verum est, quod debet esse calida radicaliter; ut sanguis, & cholera, & non per accideos, ut alij humores, dum putrescunt; quia coeunt tunc in alii quo sinu, ibi intranspirati permanentes: & à calore apprehenduntur extraneo putredinali, & calescunt.

3. eod.  
1. de diff. mens.  
cap. 11.  
a. prognost.  
com. 2.  
3. 1. 4.  
3. 4. cap. 16.

1. 1. 1. cap. 1.

3. 1. 4. cap. 1.

Ideo Princeps dicebat; Apostema aut est calidum, aut non calidum; neq̃ existimandum est, quod apostema calidum sit illud, quod ex cholera, aut sanguine generatur tantum, sed ex quacunque materia; siue sit calida per suam essentiam, aut accidat ei caliditas in termino putrefactionis. Ex his igitur discendum est, quod si tumor calidus per se non determinatur uno istorum duorum modorum, sit malum. Vnde Auic. dicebat circa finem capitis de apostematibus calidis; illa sunt mala, quæ non excitantur; vel non perueniunt ad declinationem, quam sequitur lenitas, & detumescit, neque ad aggregationem materię, imò ad membri corruptionem. Et cap. de phlegmone dicebat; Mala phlegmon est, quæ non tendit ad declinationem, neq̃ aggregat sanies, quia eius qualitas est mala: si quis enim humorum putrescit, est sanguis, propter eius aptas qualitates, sed non putrescit, aut quia admixtus cum frigido humore, aut quia membri calor debilis est. Rasis auctoritate Gal. dicit; Apostema, quod non aggregat, neque dispargitur, malignum est, & maxime cum producit membrum ad perditionem, quod propter multitudinem materię calidum innatum membri suffocant, aut à malignitate eius, cum extraneatur calor, & recedit à sua naturalitate. Frigidi verò tumores non ita citò resoluntur, aut marcescunt, siue calidi, ut declarat Auic. cap. de exituris calidis, quia calor non est ita promptus, & potens agere in ipsam materiam; nam ex Arist. non quodlibet in quodlibet. Et idè Hypp. dicebat; Multis tumoribus ipsam materiam non inferens, & digitis cedens, longiori tempore finitur, sed non ita graue ab eo periculum ponit, quod si intra sexaginta dies neque febris definit, neque tumor refedit, suppurationem expectare oportet. Et per mollem tumorem cum pituitosum, quem cedema appellamus, intelligit; tales enim de facili ad intensam duritiem, si malo regimine gubernantur, deueniunt, & longissimo egere tempore in cura eorum. A fortiori atrabiliosi tumores, quos scirrhus vocamus, minus resoluntur, & raro putrescunt, vel suppurantur propter qualitatem frigidam, & siccitatem sui succi. Cancros verò omnes, ut docet Hypp. melius est non curare, quam curare: curati enim citò pereunt ægrotantes, non curati vix longius tempus perdurant, & idem alibi scribit; Durus tumor, & magnus, dolore crucians, mortis periculum non multo post fore denunciat. De his tumoribus multa loca propriè dicemus.

3. 1. 4. cap. 16.  
13. com.

1. prognost. 3.

4. parte aphor.

34

1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. prognost. 44.

4. com.

A forma tumoris interdum prædicimus, ut facit Hypp. quando dicit; Oportet te esse attentum in his, quæ cum putrescunt secundum huiusmodi disciplinam, quod eminet, & omnino extra est, & minus est, & peracutum, laudabile, quod vero spatiosum, & minus acutum, pessimum. Gal. reddit rationem, & inquit, quod laudabile apostema illud est, cui inest pincalis figura, quia significat fortitudinem virtutis ad



re tis ad extra expellentis. Ideo dicebat Auic. cap. de exituris calidis: Quanto plus est apostema vehementioris elucationis, & acutioris capitis, procedens ad pincam figuram, est velocioris maturationis: quæ autem sunt cum diuersitate lata, profunda, pauca rubedinis, & grossæ materiei, mala. Et 6. Epidemiarum dicitur: Ea apostemata sunt laudanda, quæ magis extrinsecè apparent, & post hæc, quæ magis acuta videntur: pessima verò habentur, quæ huic naturæ sunt contraria.

Ab accidenti prænuñciamus suppurationem, vt facit Auic. Cum videris pulsationem plurimam, aut duritiem prolongatam, & caliditatem, tunc enim existima, quod apostema sit in via, vt hat exitura. Et cum videris lenitatem quandam, & doloris sedationem, tunc scias, quod est in via maturationis. Ait Gal. si dolor est maximus, prænuñciat tumoris putredinem: & si rorè semper suppuratio magnam sequitur apostema: & omne apostema solidum, magnum, cum vehemēti dolore, horrendum est, & citò mortiferum: & omne apostema molle, sine dolore, & sub tactu cursibile, tardum. Dicit Auic. Scias quod omne apostema in exterioribus, cum quo non est pulsatio, non facit saniem. Et durus magnusque tumor, dicit Hypp. Dolor crucians mortis periculum non multò post fore denunciatur. Dat vnuerisalem regulam Hypp. cum dicit: Dum pus conficitur, dolores, ac febres magis accidunt, quàm iam confecto. Sed quando resoluitur tumor, apparent signa, & accidentia superius dicta, & gradatim minuantur, & remittitur dolor, grauitas, febris, & his similia: paulatim diminuendū procedunt; & pulsus fit fortis, quia virtus exoneratur à pondere. Inflatio tollitur, secundum quod materia minuitur. Quando verò tumor induratur, & febris, & dolor, & pulsatio minuitur gradatim, donec ex toto cessant, tumor autem in sua permanet quantitate, nec granit à membro tollitur, etiam quod materia aliquo modo minuitur, quæ remanet, paulatim induratur, donec ad scirrhum deueniat. Cum verò corruptitur, & gnoscat sensus; nam apparet sator malus, & ex tumore egreditur virulentia, & membrum fit stupidum, & interdum sensus omnino ab eo aufertur, vnde liuescit primò, deinde virescit, postea nigrescit.

Prognosticatio est in medium aliquando afferenda, ex notitia regionis teruelcentis, quæ periculum in se continet, vt membra primaria, & ea, quæ prope sunt; quæ nam sint membra primaria, declarabat Gal. scilicet cot. hepatis, cerebrum, & testes. Prope his verò ea sunt, quæ eis subministrant: vt nerui cerebri, arteriæ cordi, & venæ hepatis. Ideo dicebat Auic. Non omnia membra sunt apta, vt in eis oriatur tumor: nam cum supradictis membris occurrunt, permittunt minatur. Sed ea, quæ de foris nascuntur in cutibus, dicebat Gal. sine periculo sanantur: Et Auic. dicit, melior exiturarum est illa, quæ facit incurere lenitatem, & maturationem, & est vehementis inclinationis ad exteriora, & est longinqua à membris nobilibus: & exituræ minoris malitiæ sunt, cum membrum, ad quod declinant, est inferius, & est præter hoc, quod est, ex generatione sua inferius ignobile, amplius loci, capiens totam materiam: Mala sunt apostemata, quæ neruis contingunt. Vnde Auic. dicebat cap. de signis solutionis continuuatis; debes scire, quod apostemata, quæ deteriora habent accidentia, sunt illa, quæ in membris existunt nervosis, fortis sensus: deinde deteriora sunt illa, quæ sunt super iuncturas, quando tardè maturationem recipiunt. Et rursus in iuncturis minoratur egressio exituræ, quoniam in eis sunt humores muclilaginosi, & loca eorum ampla, non suffocantia materiam, neque retinētia egressionem puridi, & si egreditur illic exitura, est propter rem magnam. Et deterior exiturarum, & malignior earum est, quæ egreditur super extenuitates lacertorum, & propriè lacertorum plurium neruorum.

Natura, & compositio membri particularis facit diuersitatem in prognostico, vnde dicebat Gal. Apostemata calida, quæ accidunt in mirach, si non fuerint magna valde, non ex eis euenit timor. Et Hypp. dicit: Apostema circa ventrē minus colligit humore, quàm quod in hypochondrijs: minime omnium, quod sub vmbilico est. Et Gal. reddit rationem istius actionis, dicens: Aggregatio saniei in apostematibus, quæ accidunt in mirach ventris: sub hypochondrijs, quando non expirant, est velocior, & hoc propter caliditatem illius loci: & secundum elongationem apostematis ab hoc loco ad inferiora, est diminutio aggregationis saniei, & paucitas illius: & propter hoc fit, quod apostema, quod accidit sub vmbilico, non transit, nisi rarò, in pus. Hæc Gal. sententia confert in omnibus tumoribus calidis, in quibus pus generatur, scilicet quod quanto magis caliditas membri fuerit eluata, tanto citius pus concoquitur.

Dicit Hypp. Desillationes in veniem superiorem suppurantur intra viginis dies. & Gal. dicit, per ventrem superiorem intelligere debemus, qui à thorace præfinitur, quem pulmo obinet. Non ab re igitur Auic. de pleurisi mouet questionem de malignitate quo ad latera, & dicit: quod deterior, quæ contingit in latere sinistro: sed est conuenientior ad hoc, vt maturaretur, aut resoluatur: si materia fuerit dispoluta ad hoc, scire oportet (dicit Paulus) quod crispelara, quæ capiti potissimè oboriuntur, plus facillè re negotii, adeoque esse periculosas, vt nisi efficac consequatur auxilium, metior quoque affectus strangulat. Loquendo Auic. de extrinsecis tumoribus, in fine dicit: loca conuenientiora ad expectandum, vt in eis maturaretur pus, sunt loca carnosia paucorum neruorum, & venarum. Pronosticamus ex materia tumoris multoties, sicut facit Hypp. Quicunque suppurati videntur, vel secantur, si pus purum, & album fuerit, euadunt, si verò subcruentum, & scæculentum, ac fatidum, pereunt. Notandum est, quod sunt aliqua apostemata, vt pincalia eluata, acutiorum capitis, quæ sicut dicit Auic. Parum indigent peroratione, neque ante, neque post maturationem. Sciendum est etiam, quod interdum medici de morte, aut salute infirmi aliquid dicunt, ingenium accipiendo ab operationibus infirmi, vt faciunt Hypp. & Gal.

Com. 12.

3. fen. 4. cap. 1.

3. de loc. aff. cap. 3.

3. fen. 4.

1. persig. 4. n.

2. aphor. 67.

1. art. med. cap. 9.

3. fen. 4. cap. 10.

3. ad Gl. D. 1.

cap. 5.

3. 4. cap. 17.

3. fen. 1.

3. fen. 4. cap. 10.

1. proci. com. 39.

1. proci. 41.

In com.

7. part. 2. lib. 3. In com.

3. fen. 3. et. 4. cap. 11.

Lib. 4. cap. 1.

3. fen. 4. cap. 17.

7. aphor. 46.

3. fen. 4. cap. 17.

3. prodr. 1.6.  
1. de Critib. 1.4.  
Lib. 2. cap. 1.

3. prodr. 1.6.  
1. de Critib. cap.  
12.  
2. item de lib. 1.  
cap. 1.7.

& Gal. & Celsus. his quorum morbi ad sanitatem tendunt, facile spirant, non dolent, dormiunt noctu, ac quoque reliqua signa eis pollicentur securitatem: perituri vero difficile spirant, delirant, vigiliant, ceteraque id genus pessima signa eis accidunt. Et quia non sumus in re determinata, sufficit declarasse nonnulla principia, quibus mediantibus possumus in particularibus passionibus prædictionem in medium afferre, considerando essentiam morbi, fortitudinem virtutis, complexionem totius, patientis membri compagem, infirmi aetatem, anni tempora, & tandem omnia ea, quæ considerantur à Gal. verum est, quod aliquando, dicit Gal. in prognostica melius est scire, quam procedere cum errore suo per iudicium. Dacbat Avic. Exitus, quæ cunctant, & maxime in significationibus, & occultantur, absque maturatione, earum dispositio non caret duobus rebus, aut ut redeat maior, quam fuit, aut, sedcat æritudo, aut expellatur materia ad iuncturas, aut ad membra dolorosa, aut fessa, aut debilia.

FINIS PRIMI TRACTATVS.



cum os

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

long.

DE

## LIBRI PRIM I.

## TRACTATVS SECVNDVS.

## SECTIO PRIMA.



30 **Q**UONIAM omnis nostra cognitio ab vniuersalibus est, atq; confusis, ad particula-  
ria, & distincta, ideo non incongruum esse putauimus, si priusquam de singulis  
tumoribus ageremus, in vniuersali totum hoc negotium quasi prae oculis po-  
neremus hoc schemate; cuius doctrinam eo vtiliorem fore speramus, quoniam  
vnaquaeque diuisio ab humoribus desumpta est, qui singulorum morborum causae  
se esse solent in humanis corporibus. Legat igitur vnusquisq; hunc laborem no-  
strum, atq; legendo se componat ad exquisitiorem, & promptiorem eorum, quae  
sequuntur, cognitionem; nam omnium tumorum scientiam quasi informatam amplexus, demum  
tam cunctius delineare, atq; expolire valebit.



# DE TUMORIBVS SANGVINEIS.



## Et primum de Phlegmone. Cap. I.

De m. p. p. 111.  
cap. 10. Et 113.  
m. p. p. 111. &  
1 de d. d. m. p.  
cap. 11.  
2. de loc. 11.  
cap. 7.



**PHLEGMON** ex sententia Gal. est tumor sanguineus, ex sanguine puro, laudabili, profuso. Signa eius hæc sunt, tumor eleuatus, dolor crudelis, caliditas ardens, rubedo obscura, pulsatio magna, & tactui renitencia. Hæc omnia signa, dicebat Gal., sunt phlegmonantis particule, quorum aliquæ sunt ei propria; vt durior, & pulsus: aliqua communia, vt calor, rubor, & dolor.

### DIGRESSIO.

Gal. 1. ad Glau.  
cap. 1.  
4. coll. cap. 34.  
1. de Crisib. cap.  
11.

1. ad Glau. cap. 1.  
1. de Crisib. cap.  
11.  
2. de m. p. p. 111.  
1. de Crisib. cap. 11.

4. coll. cap. 34.  
cap. 11.

1. ad Glau. cap. 1.  
de lib. de quæ.  
m. p. p. 111.  
cap. 11.  
3. de Crisib. cap. 11.

1. de m. p. p. 111.  
1. de Crisib. cap. 11.

1. de An. res. 1.  
1. de Crisib. cap. 11.

1. ad Glau. cap. 1.  
1. de Crisib. cap. 11.  
1. de m. p. p. 111.  
1. de Crisib. cap. 11.  
1. de Crisib. cap. 11.

1. de Crisib. cap. 11.

Hæc omnia signa solent apparere in omni phlegmone, si tamen non satis insensibilis sit locus. Vnde Auer. dicebat; Appareor hæc signa in phlegmone, nisi dum est in membro insensibili; & diuersificatur secundum quod tumor est, magnus, & paruus. Gal. dicit, quod & febris sequitur interdum hæc passionem, secundum diuersitatem loci, & habitudinem corporis: quæ tantum lenis est, & salubris. Quod eius causa materialis sit sanguis laudabilis, grossus, patet ex Gal. quando dicit; Sanguine igitur optimo, ac medicorem crassitudinem obtinente, ad particulam aliquam vniuersim fluente, phlegmon contingit. Nec de hoc dubitandum est; nam ipse ait; Sæpe ipsa inguiscum inflammatio ex bono sanguine fit, & Paulus Aegineta de inflammatione dicit; Cum sanguis probus, & crassius medicoris, in particulam aliquam vniuersim confluxerit, ac propter copiam impactus inhererit, inflammatio proprie appellata nascitur. Vnde Aui. dicens, apostema dicitur, & factum quidem a sanguine laudabili, grosso est phlegmon. Et Auer. dicit; Scias, quod in apostematibus calidis sanguineis, sanguis mundus est à putredine; & quando putredine generantur pustule. Gal. primo de diff. morborum, postquam dixit, quod antiqui solebant nominare phlegmonem, omnem inflammationem, subdit; Vtrentio tamen mea in eo est, cui est dolor, rubor, calor, tumor, & pulsus tactui repugnans. Et rursus; Verum phlegmon (ait) est continuus fevor in alto, cum dolore, tumore, tensione, & pulsu. Et est ipsius sententia, quod phlegmonis nomen allucit à Græcis fieri de eis, quæ in tumore maiori sunt, carnositas particulis, simul cum tensione, & renitencia in dolore pulsuali, & caliditate, cum rubedine. Vnde Aui. cap. de phlegmone, dicebat; Scias, quod nomen phlegmonis in lingua Græcorum est absolutum super omne, quod est inflammatum, deinde dicitur de omni apostemate calido, postea dicitur de eo, quod est ex apostemate calido cum proprietatibus iam dictis, scilicet caliditate, inflammatione, dolore, & tensione. Hæc omnia simphothina consequuntur ad phlegmonem, ideo ab eo incipiendum est, vt docent Galenus, & Paulus; & eo magis quia sapissime fit; & ad eum multa consequuntur accidentia, quæ faciunt ad eius cognitionem. Et verè passiones istæ, etiam quod sint extrinsecæ, cognoscuntur per accidentia propria, quæ sunt ei communia; nam, dicit Arist. Accidentia conferunt magnam partem ad cognoscendum, quod quid est. Et Auer. exponit, quod talia accidentia debent esse essentialia, & in se. Hæc proculdubio sunt à medico consideranda, quibus medicantibus venit in considerationem materię peccantis, quæ ignota, ignoratur & cura, p. 111. Gal. Vnde Aui. dicebat; Cum vniuersumque ægritudinis conueniens sit cum auxilio signorum. Dicebat autem Gal. Natura ægritudinis cognoscitur ex accidentibus, quæ sunt ei propria, & sortitudo ægritudinis cognoscitur ex quantitate eorum. Et rursus; Stude in cognoscendis propriis accidentibus cuiusque morbi, & in eis, quæ communia sunt alijs passionibus. Et iterum; Quæ propria sunt morbi accidentia, simul cum morbo inueniuntur, atque incipiunt reliqua verò omnia mox apparent. In phlegmone autem si tumor, prout declarabat Gal. dicens; Tu mor nequaquam circa corpus fiet, absque quod substantia eius diuordum alterum patiar, vel enim alteratur à qualitate diuersa, vel debilitatur à tristi sensatione, & continuum soluitur: vnde sagax natura sibi magis discretas humiditates ad dolentem particulam transmittit vel extrorsum substantiam aliquam acquirit, quam excretiua virtus demandat, opposita & quantitate, vel insignita à qualitate: quæ cum digestionem non recipit, incumatur, & tumorem causat. Nec statim in his tumoribus reperitur, sicut in multis alijs, neq. alter humor, nisi sanguis. Quod non continetur alter humor, palam est ex incisione; nam si secatur, sanguis effusus multus apparet, & regio tota euidenter sanguine plena: sicut in mactata sponsa, & color solius sanguinis est, & proprius, & inseparabilis. Et quia fluxibilis, multus, & crassus

14 & crassus est, tumorem facit. Et ideo dicebat Auic. cap. de phlegmone: Apparent venæ illius membri plenas, quæ occultæ erant. Et sunt verba Gal.

Apparet rubedo fusca, & ad nigredinem declivis, quia materia stat vnita, & profundatur. Et necessarium apparet rubedo, quia nulla alia eorum, quæ in corpore sunt, particularum, vel humorum rubra est, quam caro, ut dicitur cap. de signis domini sanguinis; ac phlegmon non est multitudo carnis, sed sanguinis. Et si ita multa carnositas secundum corpus, absque sanguinis multitudine, tumor quidem maior fit eo, quod est secundum naturam, color tamen in sanatis terminis manet, in nullo ab ea, quæ à principio, alteratur natura; sed cum materia sanguinea fuerit, & regio plena, rubedo intensa, & multa demonstrabitur; Augentur siquidem loca à substantia, & alteratur à qualitatibus (est enim color qualitas) propter hoc itaque est aliud à multa carnositate phlegmon.

50 Pulsus in eo reperitur, quando adaucta fuerit agritudo, eo quia in altum eleuatur, & coarctatur. Et Princeps dicebat cap. prop. Et quanto plius fuerint arteriæ maiores, & magis grandes, erit pulsatio eius vehementior. Et ratio est; nam cum arteriæ, & venæ à materia d' uersa in quali, & quanto sunt oppressæ, & conculcatæ, motum proprium querentes distolando, & sistolando, qui in loco fit, cum difficultate, & violentè mouentur, in quo motu maior fit pulsus. Et Gal. dicit: Cum exortum fuerit phlegmon, extenditur, atque constringitur locus copiositate sanguinis abundantis: unde dolor crudelis arripit hominem, & pulsus profundus, terribilisque sentitur. & rursum; Insuperabilis est pulsus à magno phlegmone. Et nota, quod talis motus ibi reperitur absque quod generetur sanies, quod non fit in alijs tumoribus. Pulsatio tumorum duplex est, una ex prohibita transpiratione propter oppilationem pororum, à quantitate materiæ: alia est, quæ fit in ebullitione, dum pus generatur, extranea succedente caliditate.

1 Dolor extensius propter sanguinis multitudinem ei coexistit: quod probatur, quia dolor causatur à mala complexionem materiali, quæ soluendo dolorem causat; & tantò magis, dum erit in sensibili membro; quia, ut docent Gal. & Auic. dolor, quencumque obfedit locum, aut continuitatis solutionem, aut subitam alterationem offendit. Videamus, an fit vera ista propositio, quod mala qualitas in eo, quod soluit, dolorem causet. Et primò videamus, quid sit dolor. Dolor nil aliud est, nisi sensus nocivus, vel ut dicit Princeps: Dolor est sensibilitas rei contrariæ, quæ nihil aliud est, nisi sensatio tristis. Nec credendum est, quod fit læsio in operatione sensitiua, quia non est ablatio sensus, quod est non sentire. Neque est debilis sensus, quod est non apprehendere impressionem factam à re sensibili. Neque est praus sensus, quod est sentire aliquid, nullo presente sensibili obiecto, ut non existentes materias videre: sed dolor est sensus rei nocentis, quæ nil aliud est, nisi qualitas diuersa. Dicit Gal. Mala complexio non est parum quid in dolore generando, & hoc quia credebatur, quod doloris immediata causa esset solutio continui, & mala qualitas soluendo. Hoc patet ex Gal. in lib. de inæquali intemperie, ubi dicit, quod passio, & dolor non fit in his, quæ verè alterata sunt, eo quia non fit amplius solutio. Et in eodem lib. dicit, Non enim in eo, quod transmutatur est crasis, sed in eo, quod transmutatur, & corrumpitur, dolores fiunt. Et primo de causis symptom. Dolor non fit, postquam membrum est incisum, vel fissum, sed donec in ipsa passione sunt moriones, atque scissuræ, nisi cum accidentaliter infirmo loco humores acuri decurrunt, aut cum apostema calidum locum illum extendat. Et alibi de mente Hypp. dicit: Dolor tunc corpori accidit, quando à sua natura mutatur, atque corrumpitur, non quando mutata est, atque corrupta. Idem voluit mirabilis Hypp. Et ideo dicendò est, quod & febris, & dolor post tumorum supurationem quiescunt: quia in sanici productione stat quidam res minus ebullitionis, à qua soluitur continuum. Atqui terminus iste cessat, cum iam confecta est sanies, quare tunc nullus adest dolor; & pure euacuato, suligo, quæ dum petebat cor, causabat febrem, expurgatur. Et ut Gal. dicebat res, quæ indiget, ut fiat pus, quandoque est caro, quæ ateriatur, & putredat, & quandoque est humor ibi coaceruatus. Adducit autem vnam rationem, quæ demonstrat, continui solutionem principalem esse causam doloris, & dicit: Aqua feruens soluit continuum, si supra carnem apponatur, adeo quod causat dolorem: si verò supra cutem, non causat dolorem, quia non soluit. Item frigidum in summo gradu in cuti non facit dolorem, sed bene in carne. Et ratio est, quia caro est mollis, & cutis dura, & viscosa, nec in ea solui potest continuum. Et sic etiam calidum remissum causat dolorem in carne, & non in cute propter rationem prædictam. Si verò dolor causaretur à materiali qualitate sola, ut tenet Auer. cum cutis possit calefieri, ut caro, sequeretur, quod in cute etiam fieret dolor, qui tamen non fit. Dicebat etiam Gal. Si aliquis acu pungitur, non patitur dolorem maiorem, quam si ab acutis pungatur humoribus, sed ex utroque his doloribus, id est acu, & humoribus, continuatio perturbatur. Ad propositum redeundo, dico, quod in phlegmone reperitur dolor; quia caliditas mordicat, & humor multus diuersus soluit, & partes adinuicem separantur. Et sciendum est, quod caliditas, & frigiditas, quia sunt qualitates actiue, ut dicitur in lib. de constitutione artis, Et ab Auer. & à Principe, causant dolorem per se, siccitas verò per accidens, humiditas autem nullo modo causat dolorem; quamuis aliter sentiat Mesue cap. de dolore aurium. sed Auic. ubi agit de foda facta ex malicia complexionis, dicit: Complexio quidem humida, secundum quod est complexio humida, non efficit dolorem, nisi illic sit materia humida, faciens dolorem ex parte euaporationis, & euentus

1. Item, 1. do 2.  
2. cap. 19.  
3. locuti cap. 1.  
Lib. 5. cap. 23.

13. meth. cap. 23.

ventositatis facientis solutionem continuitatis. Et rursus ex sententia Gal. & Aetij dicitur: Licet vnum ex generibus causarum doloris sit malitia complexionis diuersa, non tamen omnis malitia diuersa, imò calidum essentialiter, & frigidum essentialiter, & siccum accidentaliter, & humidum nullo modo dolorem faciant. & ratio est (dicit Gal.) quia ad dolorem causandum requiritur vehemens, & subita mutatio: quia dolor est sensibilis rei contrarie subito imprimentis. & Gal. scribit: Alceratio, quae fit paulatim, nunquam poterit facere dolorem, sed humiditas non potest per se subito mutare complexionem membri, cum sit qualitas passiva; siccitas verò, si comparatur ad frigiditatem, & caliditatem, non causat dolorem, si verò ad humiditatem, paruum dolorem generat: sed humiditas, nec parum, nec magnam: siccitas verò tenet aliquid acuitatis.

Calor ardens huic passioni contingit, ratione qualitatis peccantis humoris: nam sanguis calidus est, & humidus, & multus; & dum est extra vasa propria, dum non stat in latitudine suae naturae, acquirit caliditatem extraneam, & putredinalem, & magis cum a crassitie, & viscositate sanguinis cutis potius oppilatur; & ad intra referatur calor.

### ADDITIO.

Quaeritur, utrum à sanguine laudabili possit fieri apostema: Ex videtur, quod non; quia sanguis laudabilis non expellitur à natura, nec eritice, nec symptomaticae; ergo ab eo non fit tumor. Secundum talis sanguis malum qualitatem in membro introducere non potest, nec apostema. Tertiò si à sanguine laudabili generetur omnis phlegmon, sequeretur, quod nullus suppureretur: Consequens probatur; quia potius natura cum in optimum nutrimentum conuerteret, quam ad sanem deduceret. Aliter credunt Doctores, & pro ratione quaesiti sciendum est, quod tumor dupliciter consideratur, aut quod ad fieri, & sui initium: aut quod ad sui esse. Sciendum est etiam, quod sanguis dicitur laudabilis per comparationem ad sanguinem malum, venosum, aut subtile, acutum, à quo sanum produciuntur accidentia. Vnde respondendo ad primum argumentum, dico, quod sanguis laudabilis non expellitur à natura, nisi stimulata à causa primitiua. Dum enim in corpore temperato boni succi accidit confusio, dolet locus, & natura succurrere intendens, mittit & sanguinem, & spiritum in maiori quantitate, quam sit virtus membri, regulare sufficiens; vnde incunatur, & fit tumor. Tamen ille sanguis pro tunc, & in tali latitudine est laudabilis. Nec aliter credendum est; quia emborifina, ut dicit Auic. aut mater sanguinis, ut Gal. est tumor sanguineus, & tamen pro tunc ille sanguis esse laudabilis, qui egreditur venam. Verum est, quod si per spatium temporis steterit extra vasa sua, non amplius remanet sub forma sanguinis, ut docet Gal. sed secundum sui naturam permanens fit phlegmon ex sanguine, scilicet sano, & vero.

Ad secundum argumentum dico, quod verum est, quod non ponit in membro malam complexionem, nisi in eo acquiescit caliditatem extraneam; quia talis sanguis determinat sibi certas qualitates, dum stat sub causa antecedenti, quas deperdit, dum fit sub causa coniuncta, & sic fit successiue illa laudabilis, & potest introducere malam qualitatem.

Ad tertium dico, quod si talis sanguis non peccaret in quantitate, sequeretur eius potius digestio, quam putrefactio: quod patet, nam non semper phlegmon deuenit ad suppurationem, nisi quando suffocatur natura à sanguinis multitudine, ut etiam infra declarabimus.

Et si quis diceret, difficile est credere, quod sanguis laudabilis dicatur esse grossus, cum talis sit aequalis substantiae, ut docet Auic. cap. de humoribus, igitur non habet partes nec grossas, nec subtiles. Dico, quod est grossus per comparisonem ad alios sanguines malos, & talis debet esse calidus, & humidus complexionis; Et ideo ad eum non sequuntur ea accidentia, quae ad sanguinem subtilem; Ideo Auic. dicebat: à sanguine subtili, malo, accidet phlegmon, quod declinat ad erysipelam cum malitia, & fraudulencia. Haec de phlegmone dicta sint. Ad eius curam modò deueniamus.

### De Cura Phlegmonis. Cap. II.

Actiu. Lib. 14.  
cap. 30.

3. meth. cap. 23.  
91.



OSTENDITUR medicus cognouerit morbi essentiam per propria signa, ad curam se conferat, quae sumi debet à morbi essentia. & statim inquirat, nunquid causa fuerit antecedens, vel primitiua: & si desitoris, nunquid inuenierit corporis repletionem, aut temperiem: quod si inuenierit corpus mundum, nulla alia restat intentio, dicebat Auic. cap. de cura phlegmonis, nisi curatio apostematis, in quantum est apostema: & talis fit per extractionem causae coniunctae. Talis autem extrahitur, ut docet Gal. aut retrocedendo, aut per patientem particulam. Et si obuiat repletio corporis, tunc resultant diuersae operationes, sicut in cura causati ab antecedenti causa: prima est regimen in sex rebus non naturalibus; secunda est curare tumorem secundum eius tempora; tertia si qua consequuntur accidentia, ea corrigere.

### DIGRESSIO.

Plerique eorum, qui hanc exercere facultatem, omni studio, omni diligentia conati sunt, tumorem



40 rati omnium sigillatim naturam declarare, dico sigillatim, quia de tumoribus brachiorum, tibiarum, digitorum, & aliorum singularium membrorum multa dixere. Hinc est, quod magna scribere volumina. Ego vero breuitati studens, breuia quaedam enarrabo, quia si operatoribus fuerint notae, passim nec omnes exteriores naturae auxilio ad pristinam reducant salutem. Et si nonnulli tumores fortiter nominata a particulari membro patiente, non dixerit eo modo, quod pleurexis a pleura, & peripneumonia a pulmone, sed ophthalmia, quia oculo accidit; lethargus, quia cerebro, parancium, quia digito; & alteri loco minime occurrunt, aut ita non denominantur: attamen non propter hoc degenerant ab una quatuor accidentium materia, quia ophthalmia non erit aliud a phlegmone, nam ophthalmia est phlegmon occidens oculo: nec lethargus est aliud ab oedemate. Ideo si quis phlegmonis intentionem cognouerit curatius, eas assumendo ab essentia morbi, ut docet Gal. sciet & ophthalmiam ad salutem reuocare; quia tumor sanguineus non, nonnullis tamen requisitis conditionibus adhibitis. Similiter qui erysipelas cognouerit, omnem cholemicum tumorem curabit. Volo igitur de extrinsecis tumoribus in vniuersali ab iniqua materiali causa contingentibus in his meis digressionibus tractare, ut de si quis in recta corporum sectione, & in naturae operationibus fuerit exercitatus, his theorematibus notis, has omnes passiones curabit. Sanguineum tumorem curandi modum nunc aggredior, & dico, quod duplex est via sanationis huius morbi, altera vniuersalis, altera vero particularis: vniuersalis enim & prima erit regimen in sex rebus non naturalibus: Et aer in primis eligendus est sincerus, & clarus, non humidus ratione thalami, nec rheumaticus, sed temperate frigidus, & siccus. Cibum usque ad satum sit levis, pauci nutrimenti: & dimittenda sunt pinguis, & omnia dulcia, lacticia, legumina, & sanguinem grossum, & multum generantia. Laudantur lactuca, spinachia, borago, & femina; panatella cum zu-  
 50 charo, aut in brodio pulchrum, cum dum, prillana oleacea cum amigdalis, aut feminibus communibus. Et summatim talis diætia fit tenuis, & maxime, ut docet Rasis, si qua apparuerit febris, aut in magno tumore, siue propè membra fuerit primaria, & talis celebretur, donec vera tumoris determinatio apparuerit. Dimittendum est vinum, nisi granatorum, si stabit virtus, & in principio tumoris; aut utatur vino lymphato. Febricitibus vero lyrrupus violaceus cum vino ex granatis, & coriandria aqua exhibetur. Dormiat in nocte, & fugiat a solis meridiano. Quiescat paciens, quia motus ad dolentem locum materias diuersas decurrere facit, quoniam aliter sentiat Gal. ubi dicitur, cum cura phlegmone laborant, non esse vel ambulatione, vel cursu exercitandum, sed nec stare illis esse iubendum: imò sedendi plurimum fricari, mox manuum motu exercitari illi est satius: At si cui in superius partibus caput pars aliqua phlegmone tentari, huius motus ex inambulatione, aut cursu est salutaris; similiter & frictio his quidè ea potior est, quae cruribus adhibetur illis, quae in superius partibus administrantur, quod ipse præcepit in contrarium auctoritatis in omnibus casibus commune est: Sed læti animi, aliquid coque, de malis cogitationibus, quia ex a. Aphr. In omni morbo lætari bonum. Sed quod magis urget, est corporis euacuatio, quae aut pharmaco, aut venæ sectione celebratur. Sed primum ea confideranda sunt, quae a Gal. dicuntur, quando incæperit aliqua phlegmonare particula, seruandum est, nunquid propter calorem aliquem præter naturam in ea factum, viue propter dolorem, aut aliorum membrorum hoc euenire facientium, ut te cessare facient causam, phlegmon non vitra augeatur. Et confort talis consideratio, quia Auicenna in lib. de cura phlegmonis dicebat: cum per phlegmone causam antecedens, oportet, ut incipias cum euacuatio ne, aut per phlebotomiam; aut per pharmacia. Sed necessitas euacuandi fit, aut quia corpus est immundum, aut quia aggritudo est magna. Et eo magis, quia phlegmon est aggritudo de repletione, quoniam manerio, & euacuatio curat ex Hippo. Ideo Gal. dicebat: In quolibet plethora euacuatio est necessaria; & si adhuc (dicit ipse) non appareat repletio, ut incipiente phlegmone ab una quolibet causam, imiliter o. 2. uo. methodi in cura febris ex obstru-  
 60 tione, ait: ubi robur agro non deest, secunda vena est. etia in pleuritidibus signi non adfuit. Et idè Princeps cap. prop. dicebat: Aliquando euacuatio est necessaria, licet corpus non sit in altum superfluitatum, sed in mebro accidit, quod ipsi non debet: quare ad ipsum attrahantur multæ superfluitates corporis. Dicit Gal. hoc sunt duo errata, quae coningunt empiricis, totius corporis nullam habere considerationem, & membra indebitè aut calefacere, aut infringere. Sed quod & ratio, & experientia fuisse, totum quidem corpus euacuandum est, quacumq; indiget euacuatione. Et Hippo. eos reprehendit, qui inter initia morbi, non premissa venæ sectione, phlegmones medicamentis soluere conantur: Vnde Auic. de curatione extirpaturum apparetur: dicebat: Euacuatio; & reperculio sunt res, in quibus communicant apostemata calida, & in ipsis errant stolidi nullam de eis habendo considerationem. Dicebant Rasis, Auer. & Gal. Cum in aliqua corporis parte calidum exoritur apostema, eius curatio a sanguinis detractione est incipienda. Et Auic. dicit: Inchoetur a phlebot. in omni phlegmone, habito testimonio certo super ipso. Et Gal. dicit: Cum accidit phlegmon; phlebotomico quidem existente corpore, vel cacochymia, cura difficilior est, difficilior, est; neutro vero existente, sanatio certissima est, & facilis. Clarè etiam locus est Gal. 3. ar. med. ubi dicit: higitur vniuersum corpus plus æquo plenum fuerit, per patientem locum minime euacuandum; nam si scarificantiis, aut sectionibus sensibilibus euacuabimus, plus ratione excitati doloris attrahemus: si vero caliditatis ubi spergere tenabimur, plus erit id, quod vi caloris ad partem attrahetur. namq; diuersum: quod si  
 70

co elaborabimus, ut quod infuxit, retrocedat, corpus plenum non admittet. Ad hæc igitur ambo totum corpus euacuare oportet. Vnde Auic. cap. prop. dicit: Cum inuena corporis repletio, non tangas apostema cum molitibus, quoniam attrahetur ad ipsum, plulquam id, quod resoluatur, sed oportet, ut euacuatur materia per phlebotomiam, & fortasse indiget solutione ventris. E hoc dicit, quia sunt aliqua corpora, que non euacuatur per ablationem sanguinis tantum, ut plethorica multarum superfluantia ex Gal. sed cum pharmaco, ieiunio, exercitio, balneo, vomitu, & quæ per vterum fit, & per ora venarum sedis, & frictionibus, & clysterijs, &c. Ex his dicendum est, apparente phlegmone, & plethora, ac tunc in initio, & consentiente etate, tempore, & virum qualitate, atque his omnibus, quæ à Gal. in de euatione per sanguinis missionem considerantur, venam leuam, & cam; quam medici mediam, basilicam, nigram, et hepaticam vocant. Sit quantitas sanguinis ad mensuram virtutis, habitudinis corporis, etatis, regionis, temporis, & quantitatis egritudinis. phlebotomij etiam iubent Aetius, & Paulus. phlebotomia enim est vniuersalis euacuatio, & præcipue sanguinis, ut habetur capite de phlebotomia ab Auic. Et Gal. dicebat, quod est vera, & vniuersalis medicina omnium morborum de repletione, & in aegritudinibus sanguineis semper phlebotomia pharmaci præcedere debet ex Gal. Sed questio est de loco, & situ secandi venam. Vnde dux occurrit consideraciones, in prima nunquid corpus sit plenum, & iuuenis, & fortis: secunda, nunquid tumor sit in principio, & fluere iam incipit sanguis, aut dubitatur, ne fluat. nam his apparentibus à longinquo, & opposito situ, vena secanda est, ut Gal. dicebat: incipiente vero brachio phlegmone pari, non est eiusdem brachij vena secanda, quia non propinqua, sed ipsius ægræ particulæ vena est: quare vel alterius brachij, vel eruris venam, quæ secundum rectitudinem laborantis est lateris, incidemus. Dicebat quoque Gal. Incipiente phlegmone phleb. & maxime diuersa sumere conuenit. Et Rasis dicit, cura sanguinei apostematatis est, ut prohibeatur eorum generatio, & illud quidem fit cum phleb. ex latere contrario. Idem vult etiam Auer. & Gal. Est verè in pluribus locis à Galeno hæc opinio declarata huius, & propositio diuulgata est, semper fluxionis motum ad contrarium trahere oportet: & ubi agit de causis inflammationis, casum ponit in terminis, & dicitur ad genu fluxus deferatur, atque hoc subito plurimum attollitur, tibi vero totum corpus plenum sanguine appareat, & valida laborantis vis, tempus autem anni sit ver, regio temperata, æger verò sit adolescens, aut iuuenis, in sanguinis euacuatione ex superioribus partibus indiget, oportere incidere eius in cubito venam; aut anteriorem, aut mediam: si verò aliqua pars superior pateretur, per inferiora sanguis est educendus. In veteri autem traductione dicitur, quod vena debet solui per antispasim, id est contrariam detractionem, ut si dextera pars corporis patitur, sinistram feriamus: si vero sinistra, dextram venam incidamus, si verò inferior pars molestetur, de superiori parte sanguinem detrahere debemus. Vnde Auic. dicebat cap. pro. Necessaria est euacuatio, & minoratio materiei, & attractio ad contrarium. Ex pro nunc de hac re sermonem prorogare minimè iudico, nam huius rei disputatio habebitur, ubi de phlebotomia, & modo phlebotomandi agitur: sed pro hac parte sufficiat diuise, quod phlebotomia debet celebrari, & aliter non conuenit in his passionibus, nisi in principio, ex latere opposito, ut declaratur in lib. de phlebotomia. Est enim eligendus locus omnino oppositus tumori, ut consequatur vera diuersio in extrinsecis tumoribus, & sit vnus diametri. Sunt, dicit Auer. sex dimensiones in nostro corpore, duæ latitudinales, scilicet dextrum, & sinistrum; duæ longitudinales, scilicet sursum, & deorsum, & duæ profunditatis, ut ante, & retro: & est doct. Arist. in secundo lib. de celo celebrata phlebotomia, si corpus adhuc plenum apparebit, in sequenti die, aut die tertio exhibeatur patienti pharmacum secundum eius virtutem, etatem, & complexionem, in quo fit tantum intentio euacuandi materias existentes in viji cõmunibus, aliquantulum remittendo ebullitionem humorum; Quia sperandum non est, sicut à phlebotomia, ita à pharmaco sanguinem posse euacuari: nam ex Gal. medicina sanguinis euacuatiua non datur, nisi venenosa: sed per pharmacà materias putridas, & sanguinem alterantes purgamus. & minus conuenit fortis medicina, dum coniuncta materia digesta non est; nam ut Hipp. dicebat: Qui statim inter morbi initia inflammationis medicamento soltere conatur, iij à distema, inflammationes parte nihil auferunt, assiduus verò, ut pote crudus, non remittitur, ac partes sanæ, morbo resistentes, colliquecunt; quo circa morbus imbecillum iam corpus vincens, curationi non obedit, huius opinio suffragatur etiam Gal. Sint igitur medicij huiusmodi: R. floris cassie nouit. ext. 3. p. bolis. Aur. 34. floris cassie nouit. ext. 3. ij. ellec. lenis. 3. ij. cum zucharo fiant boli. Aur. R. pulpe cassie nouit. ext. 3. x. succi ros. puri 3. s. syrups rosat. fol. 3. xvi. aquarum endiuar, lupulorum, an. q. s. m. & fiat p. 6. Aur. R. floris cassie nouit. ext. marina ellec. m. 3. ij. aque lupulorum q. s. pro 6. p. Aur. R. ellec. lenis. 3. ij. diaprunis fol. 3. ij. syr. ros. fol. 3. ij. aque boraginis. q. s. p. 6. p. Tale pharmacum tepidum exhibeatur in mane, & transactus quatuor horis, cibetur ptiens, ut dictum est. Et sic peractis euacuacionibus, medicus erit tutus, ne causa antecedens transierit in conuulsum: & preferuabitur, ne tumor in maiorem eleuetur dimensionem, & Princeps dicebat: Ex reditu verò materiei ad membra principalia securatur euacuatio: Ex quia hæc passiones velocitatem status demonstrant, non expectant sic, quod materia digestionem, & præparationem appetat. Et si aut ratione febris, aut quia ægritudo furiosa, & malignitatem ostendens, ad eius præparationem cogimur: Iam dantur syrups de enduia, ros, de fumaria, acetosis simp. & similes: Aquæ verò lupu-



10. totum, boriginis, endulge, fumaria, & similes. Verum est tamen, sicut dicit Auer. non in omnibus moribus fumus coacti ad euacuationem; quia in phlegmone paruo, membrorum carnosorum, cuius materia est benigna, & ei non consequuntur prava accidentia, nulla est consideratio, nisi ad rem non naturalem, & curare tumorem in eo, quod tumor.

Secunda intentio, & particularis est regere tumorem secundum eius tempora. Et dicendum est, quod cura tumorum est remouere, & euacuare causam facientem ipsum tumorem. & hac in eius principio fit cu reperculsiu, & apocriticis medicinis. Et hec est secunda operatio in cura phlegmonis, aut in augmento cum resoluendis; & hac est tunc: aut in statu cum digerentibus causam coniunctam; & hac via vt plurimum est necessaria in sanguineis tumoribus. Igitur de impulsione aliquid dicamus, & videamus, nunquid celebrata euacuatione, secunda operatio sit repercutere materiam fluentem; & si

est secunda operatio, in quo tempore, & in quibus tumoribus vtenda sit. Non est dubium, quod sit secunda operatio ex Galeno, vbi dicit: Secunda operatio est superlinire partem inflammatam, his, quod id, quod insuit, repellendi vim habeant. Et mox: Post detractione sanguinis, tali vtinur caraplastmate, quo possumus abijcere, & repercutere theuma a loco, in quo fluit. Idem voluit Rasis, & Aui. qui dicit: Apoplepticis calidis adhibenda sunt in principio, quae repellant, insigilant, & insipient. Et cap. prop. dicit: Incipe cum reperculsiu. Dicebat Galen. de asperitate, & lenitate; Si quidem morbus talis est, immoderata pars repleto: necessarium igitur est, vt superfluitas retrocedens euacuetur, aut per ipsam patientem particulam. Retrocedet autem aut impulsu, vel attracta, vel transmissa, vel vno aliquo modorum, vel omnibus. Et notandum est, quod tali medio vtinur in principio tumoris, & et in augmento, vt docet Galen. Verum est, quod resolutio cum reperculsiu in augmento admienda sunt. Nam ibi Galen. phlegmonem curare docet, vt est tiens, factum, & futurum; & ibi potissimum indicationes funt a tumore, qui tiens, & factus. & dicit: Phlegmonis vero, quae in generatione adhuc est, duplex indicatio est, veluti in reliquis morbis omnibus, quicunque in gignendo adhuc sunt, nec du abfoluione sunt affecti: nam quod eorum generatum iam est, id medicinis artis parti, quae morbus curat, subiicitur: quod autem in generatione adhuc est, parti, quae futurum morbum praecaut. Idem dicitur, videntes etiam, quod paruae & incipientes sint, prohibere eas oportet, ne maiores efficiantur; & hac est praeservatio. Galen. enim dicit: Quae phlegmonum adhuc in generatione sunt, eoru causas prius abicendes: quae vero iam facta, hac vtique curabis sola. Abicisio enim causarum non fit, nisi cum rebus obuiantibus materiam venire ad locum. Ergo secunda intentio completur in frigidando, & stipicando in principio tumorum, & augmento: quia quod factum est, ipsum solum cura: quae vero

40. sunt, praecustodi, ne maiora efficiantur. Et per factum, materiam coniunctam intelligere debemus, quae indiget cura, & non praecustodia. Et notandum est etiam primum, vt docet Galen. quod coacue sit illa intentio in cura tumoris per viam cathartici, & non per viam coacuationis, qui vt plurimum sunt ex impotentia virtutis digestivae, aut expulsiuae: vnde succus redditur crudus, & ex medicaminum frigiditate appositione magis inrudesceat. Deinde, quod dicit Galenus, magis profectio ad incipientem phlegmonem frigidis, abstringentibusque, quam ipsi, quae digerunt, est vtendum: atque etiam nam magis vbi crassum, quod consuit, non est, speranda est reperculsiu ex Gal. quod materia fuerit calida, subtilis, & benigna in membro poroso, & carnosio, & non sicco. Et vere magna consideratio adhibenda est huic operationi. Tertiū notandum, quod in materia transmissa ad nobili, & principali membro reperculsiu non laudatur. Dicebat Aui. cap. de cura abfcessus: Si illud membrum, quod

apostemate laborat, fuerit veluti excretorium alicuius principis, vt sunt loca adnosa colli, & apud ore ipsius quidem cerebri, ascelle autem cordis, inguinique hepatis, tunc nullo pacto debent eis applicari, quae repellant; non quasi haec non sit vera curandi ratio eorum apostematum, imo hoc est vere praesens remedium illorum apostematum, sed nolumus ea apostemata sanare, immo cupimus ea augere, materiamque ad ea trahere: nec timeamus addere lesionem illi particulari, cum principi optulari quaeramus. Na si materiam remoueremus, nunquam sine formidine essemus, quin materia ad nobile membrum perueniret, vbi irreparabile sublequeretur inco modum: Nam nos praeclegimus membrum liedi ignobile, vbi nobili succurrat; immo nos studemus trahere materiam ad membrum ignobile, vt in eo apostema oriatur, siue cucurbitulis, siue emplastris calidis vim attractiuam habentibus. Et hec est sententia Galeni capite de tumoribus, qui sunt post aures: ibi dicit Galen. In his alio modo procedendum est, quoniam in phlegmone aliorum membrorum, scilicet pharmacis attractiuis vtentes, & ventosam afferentes, volumus enim de profundo ad curam trahentem humorem attrahere. Quatio notandum, quod easenda est talis operatio, quando materia fuerit capula per viam crisi ex Auer. quia sic vult natura; est enim motus naturae, & denotatur victoria eius contra morbum. Dicit enim estque educere oportet, quo maxime natura vergit, per loca conferentia, eoducere. Et Princeps dicit: Nullo modo agas contra operationem naturae. Et rursus; si fuerint per viam crisi, aut secundum similitudinem: ex pulsiue in membro principali, tunc non oportet, vt prohibeat omnino. & Paulus dicit: In his autem tumoribus, qui ob febres, aut omnino humorem abundantiam procreantur, cauendi debent repellentia. Quinto nullo modo infirmandus est locus, quando humor sapit naturam veneni, quia ex Arist. Natura veneni est immediate petens cor, & est naturae inimica ex Galeno, sed in his morbis fiat attractio,

1. de temp. c. 4. quocumq; modo, vt dictum est, aut etiam, vt docet Galen. scarificando profundè, & reiterando cor-  
 13. umbr. poris euacuationem, & cum phlebotomia: sed, vt docet Auic. melior est multiplicatio numeri, quam  
 2. fin. 1. cap. de phlebotomia. quantitas, ne materia ad intra retrahatur. Et Galen. dicebat. Venenum mortiferum non euacuatur,  
 3. de simpl. d. 4. nisi per medicinas, quæ ponuntur de foris, & istæ medicinz attrahunt hoc venenum, aut per caliditatē  
 4. cap. 4. suam, aut per similitudinem totius substantiæ suæ. Dextro, in corpore pleno non est laudata impulsio;  
 3. art. med. quia (vt dicit Galen.) si in eo laborabimus, quod inluit, vt retrocedat, corpus plenum non admittet.  
 3. art. med. & 1. aphor. com. 1. Deprimò, in membro nobili extrinseco absolute non sunt applicanda medicamina frigida: quia facillime  
 mortificantur, & edo magis, si fuerint sensibilia, vt testes, concatenationes, & ligamenta: nec natura  
 patitur horum medicaminum applicationem propter repentinam mutationem. Oñtaud, & vlti-  
 3. art. med. & 1. aphor. com. 1. mō, cauenda est nimia infrigidatio in omni membro. Auic. cap. de cura phlegmonis circa medium dicit:  
 Et quando cadit superfluitas in infrigidatione, fortasse perducit ad corruptionem membri, & cor-  
 ruptionem humoris constricti in apostemate, & tendit apostema ad viriditatem, & nigredinem: Nec  
 10 credendum est, quòd frigiditas sit causa, quòd locus humidus tendat ad nigredinem: nam qui moriuntur  
 ex frigiditate, remanent alibi sed caliditas membri, dum à nimia frigiditate constringitur in mem-  
 20 bro, agens ipsa in materia calidam eam adurit, & spiritus per constipatas vias transire non possunt, vnde  
 membrum putrefcit, & ad nigredinem tendit. Quæ nam sunt tales medicinz? Apocritica medi-  
 3. de simpl. d. 4. cap. 4. camenta ea sunt, dicebat Galen. quæ impellunt humores, quibus occurrunt, ad profundum corporis;  
 3. can. d. c. 4. quorum substantia est frigida, & grossam calidum semper attrahit & frigidum impellit, & maxime frigidum,  
 cum quo est maxima crassities, sicut res stiprica. Cum enim medicina est talis, habet contrin-  
 gere membrum, & retinere spiritum, confortando virtutem retentiam. Auicenn. verò dicit: Repercul-  
 sua medicina est illa, cuius proprietas est propter frigiditatem suam, vt in mēbro faciat proqueire frigus,  
 & insipissenter, & contringantur porii ipsius, & tranguat caliditas eius attractiua, & congeletur  
 10 illud, quod ad ipsum decurrit, & insipiet ipsium, & prohibeat ipsam, ne ad membrum currat, & prohibeat  
 membrum à receptione ipsius. Addit Auic. quòd nullo modo hæ medicinz debent esse mor-  
 dicatiz, quia expelluntur à porositatibus membrorum. Ad hanc periciendam operationem aliqua  
 sunt simplicia, & aliqua composita. Ex simplicibus nonnulla sunt ex plantis, & multa ex mineralibus:  
 Ex plantis solatrum, cimolka, rosa, galla, glandes, iusquiamus, acacia, plantago, minthus, virga pastoris,  
 papauer, semperuium, vermicularis, portulaca, granata omnia, viola, nenuphar, fanthalia, poma  
 acerola, cornu rubi, balauista, vmbilicus Veneris, sumach, coriandrum, & tales herbar, aut earum succi,  
 aqua rosarum, & acetum. Ex mineralibus plumbum, bolus armenus, terra figillata, sanguis draconis,  
 cerussa, turia, camphora, lythargium, ancimonium, coralli omnes, &c. Dicit Auic. quòd ad talem  
 20 operationem medicamina debent esse mediæ, & temperatæ. & a leuiori est inchoandum. Vnde ipse  
 cap. de cura phlegmonis dicebat, Quæ fortiter repercutiunt in primis, & quæ fortiter resoluntur in fine,  
 mala: causa ergo, quantum potes. Dicebat quoq; Gal. quem secutus est Auic. cap. de cura erysipelatis,  
 & Auic. In cura phlegmonis debemus magis tendere ad euacuationem, quam ad infrigidatio-  
 nem: in erysipela verò est contra; quia materia phlegmonis est sanguis crassus. De compositis medi-  
 30 cinis ad hanc operationem aliqua dicamus, nec multæ: hæ expēdientur descriptiones, cum morbi  
 essentia medicaminum diuersitatem postulet. Horum medicaminum diuersi sunt gradus, quorum p.  
 est talis: 1. Albuminis ouorum, aquæ rosarum an. q. iij. conquantur à dinuicem, & insusis stupis ac  
 censo loco supponantur. Aut 12. boli arm. sanguinis draconis an. p. 2. quales, aceti q. s. misce pro li-  
 40 nimento. Gal. laudat spongiam insusam in oxicato aut vino austero, & superpositam. Dicit etiam,  
 quòd expedit emplastrum apponere ex semperuiuo, & corticibus malorum Punicorum in vino deco-  
 ctis, & rhu, & farina hordei compositum: hoc enim in talibus optimum est, atq; ad omnia, quæ face-  
 rent intendimus, efficaciz: repellit enim id, quod inluit, atq; id, quod conicitur, esciscat, & membra  
 50 circumsita corroborat. Mirum in modum Gal. laudat vnguentum diacalcitico cum rosaceo, aut  
 mirrhino in formam linimenti. Et rursus dicit: In phlegmone tantisper est refrigerandum, quatenus  
 ad incrementum eius sistendum, inhibendumq; est commodum. Auic. dicebat cap. de cura phlegmo-  
 3. ad Glanc. & 1. metho. & 2. ad Glanc. nis: Medicinæ reperculsiuæ sunt sicut succi herbarum frigidarum, & propriè corpora earum præpa-  
 1. ad Glanc. & 1. metho. cor. rata ad emplastrum, & ibi enumerat portulacam, cucurbitam, & fere omnia iam dicta, & dicit:  
 Si queris maiorem infrigidationem, vtere fanthalia, acacia, lentiscalis, memiche, & iusquiamo albo.  
 Et addit, quòd herba apostematam, quam nos cimpalarum, aut vmbilicus Veneris vocamus, in prin-  
 60 cipio est valde bona. Sunt & multa vnguenta, quibus vti possumus ad hanc intentionem: vt rosatum  
 Mesue, de corticibus castancarum, intrigidans Gal. quòd à Principe ceratum cum aqua frigida nomi-  
 natur vnguentum populeonis, album &c. Ex semper memorie tenendum est, quòd dicit Hypp. plori-  
 mum, atq; repente euacuare, vel replere, vel calcitrare, vel refrigerare, siue quouis alio modo cor-  
 pus mouere, periculosum; quoniam omne niuium est naturæ inimicum: sed quod paulatim fit, tutum  
 est, tum aliàs, tum cum ab altero ad alterum transitus sit. Aliud aduertit Auicenna, & sunt vltima  
 verba cap. de cura phlegmonis, quòd talia apostemata liniantur cum penna, quoniam digiti ledunt  
 ipsa: Mali est. n. ad d. calidi calido, quia contrariatur intentioni. Hæc sunt dicta de principio tumoris.  
 Verum est, quòd Gal. & Auic. vnum aliud considerant in t. illi tempore, quòd medicum à tali operatio-  
 ne deli-

- ne desistere facit, scilicet cum maximis appareat dolor: cum magno enim dolore fluxu incidente non sic oportet facere, neque aquam calidam, neque oleum, neque farinam triticam cathaplasmata ostendere. Hæc enim omnia fluxionibus aduersantur, quamuis ab initio aliquid iuuare videantur. Sufficit autem in huiusmodi affectibus vehementiam doloris mitigare cum aliquo ex his, quod ex vino dulci, & oleo rosæ, & pauca cera, quæ in utroque sit liquefacta, conficitur. oportet autem hæc lanis excipere fordidas, quæ plurimum æstipi habeant, & æstate quidem frigida, hyeme autem tepida apponere. Sic etiam cathaplasmata ex arnoglossa, lente, pane, & rosaceo oleo adhibere. Quandoque accidit (dicebat Aulic.) ex respiratione vehementia doloris propter suffocationem materiei, & soliditatem membri: Et tunc refutat noua intentio: nam, ut ipse dicit, vehementia doloris facit te indigere medicinis mollificatibus absque attractione, & fortasse erit cum eis infrigidatio, non prohibens mollificationem. Et infra adducit verba Gal. dicentis: si uolueris regere in principio cum sedatione doloris, non approximes eis aquam calidam, & olea mollificantia, & emplastra facta ex huiusmodi medicinis: ipsa enim sunt contraria vehementer ei, quod est necessarium de prohibitione effusionis: & redeas ad bolum armenum, solutum in oleo rosato, aut ad lentes decoctas cum rosis, aut merdæ fengi cum oleo rosato. Et tandè recitat de verbo ad verbum ea, quæ laudantur à Gal. in prohibitione dolorum: qui omnino fugiendi sunt, & maxime intensi, quia dicebat Gal. Omnis dolor fluxiones commouet. Et rursus: Dolor vehementis causat febrem. Et iterum: dolor facit repentinam mutationem, quam natura non tolerat. Et rursus: Dolor vehemens virtutem prostermit: et tandem à tali accidente prouenit mors. Dicebat Princeps: dolor, qui validior sit, interficis quidem, ac primò corpori frigiditatem, rigoremque accipit: mox minor redditur pulsus, deinde penitus amittitur, postremò tandem moritur aeger: Apparentibus igitur huiusmodi accidentibus, ducuntur intentiones, cum morbus sit complicatus ex tumore, & molesto accidenti: ad duas enim passiones ducuntur requiruntur intentiones: Est tumor in fieri, & dolor: his omnibus viâ incumbendum est: Tumor indiget repercussione, & dolor temperamento, aut virtutis sensitiuæ ablatione: & possunt hæ intentiones ab vno tantum medicamine similiter perfici, scilicet per prius repercute materiam, & per posterius aliquid dolorē sedare: qui non leparatur à phlegmone, cum sit ei proprium accidens. Et idè in tali tempore anodina erunia frigida sunt conuenientia, de quibus supra nonnulla diximus ex Gal. & Aulic. Ego verò opportunum remedium læpe inueni in pinguedine gallinæ, aut anseris cum albumine, & vitello ovi, de quo multa dixit Gal. Aut R. maluum, & ipsam decoque in aqua, & pistetur, & addita farina hordei, & oleo rosato, fiat emplastrum. Dicebat Gal. Oleum rosatum ex parte rosarum refrenat, ex parte olei euaporat. Et idè Aulic. dicebat: in oleo rosato est resolutio quædam. Aut R. panis tritici albitrurii lib. i. infundatur in aqua per horam: vitellorum ouorum numero ii. florum nenuparis, iosefami albi an. ij. croci ʒi. rob. q. si pro emplastro. Ex hæc satis de principio phlegmonis.

- Debet medicus & in augmento istius tumoris maximam adhibere considerationem, & sollicitus valde in naturæ operationibus esse debet: & videre, nunquid humorum fluxus cessauerit, vel si quod iam fluxit, possit resolui: Quia in augmento (dicebat Aulic.) ea conueniunt, quæ resoluunt, & retineant. Nam est tempus, in quo materia & fluxit, & pro parte fluxa est: & quæ fluxa est, ex Gal. euacuabitur: partim quidem manifestè, & sensibilibiter, partim verò in vapores resoluta. Quæ verò fluxit, impulsionem desiderat. Vnde R. rosarum, florum nimphæ, fertulæ Campanæ an. m. j. farinæ hordei, fabarum an. ʒ. ij. olei rosati, violati an. q. s. misce, & fiat emplastrum. Aut R. succi solatri, portulacæ, virgæ pæloris an. ʒ. i. s. farinæ hordei, fenu græci an. ʒ. ij. florum nenuparis, rosarum, turbaris tritici, an. ʒ. i. olei violati, mirrhini an. q. s. misce, & fiat emplastrum. Aut R. florum malug, nenuparis, parietaræ, turbaris subtilis an. m. j. farinæ hordei, fenu græci, fabarum, an. ʒ. ij. medullæ panis bene fermentati ʒiij. olei rosati, mirrhini, violati an. q. s. croci parum misce, & cū oxicato fiat emplastrum. Et si natura tendit ad resolutionem, cū resolutibilibus procedendum est. Diaforetica medicamenta ea sunt, dicit Aulic. quorū proprietas est, ut separent humorem, faciendo ipsū vaporem, & extrahendo ipsū à loco, in quo fuit: detentus per partem post partem, donec assiduatione illius operationis finiat illud, quod ex eo remanet, fortitudine suæ caliditatis. Hæc enim operatio fit aperiendo porositates, & reducendo humores in partes aeræ. Vnde dicendum est, quod non quilibet humor est aptus resolutioni, neque quodlibet membrum est aptum, ut humores in eo contenti resoluantur, & tunc cataplasmata fiant ex decocto pinguium carcarum cum hyssopo, origano, & farina hordeacea, fenu græci, & seminibus lini cum pauco salis. Et si querat natura materiem expulsionem, tunc expectare debes statum tumoris, in quo materia fit coniuncta, & ponitur effectus, vnde repercussus minime conueniunt, dicebat Gal. Si languis in particula, quam phlegmones comprehendit, vehementer est insuæctus, non est amplius repercurientibus vitendum, sed tum digerere est tempestiuium. Vnde Aulic. cap. prop. dicebat: Cui ergo videtur incceptionem apostematis incedere timere exituræ, tunc dimittit infrigidantia, & incedit in viam eius, quod maturat, & aperit. Et parum supra dicebat: & quantum procedi in augmento, præcedas in additione resolutionum paulatim: & apud finem (supple) argenti, & statum, & vltimitatem magnitudinis, & additionem suæ vltimitatis, fac vincere mollificationem, & fac ea pura. Nam credendum non est: quod sanguis aut laudabilis, aut malus eiusdem naturæ sit cum bile flaua: nam bilis tenuis est

4. aphor. 3. n.  
lib. 1. de morbo.

2. de diff. feb. 9.  
R. 2. de crisi. 4.  
13.  
3. aphor. 6. 17.

4. meteoror. 1.  
11. 6.  
R. 5. 6m. 12d.  
D. 4. cap. 3.  
5. coli. cap. 5.  
4. lib. 1. lib.

3. 4. c. 13.  
2. canon.

7. simpl. med.  
d. 2. cap. 4.  
7. simpl. med.  
d. 2. cap. 1.

7. simpl. d. 2.  
cap. 5.

13. method. d. 2.  
cap. 1. 5. 6m.  
p. 1. med. R. 7. me.  
dic. per gen. R.  
2. ad Glau. c.  
5. etc.  
5. coli. cap. 5.

13. method.

tenuis est, & facillimè resolvitur, sanguis verò quandocunq; fuerit extra vasa propria, putrescit ex sententia Hypp. Si in ventrem sanguis præter naturam effunditur, necesse est suppurari; & quando incipit puertereri, non amplius remanet sub forma sanguinis ex Gal. Vnde dicendum non est, quod natura cum iam putrescentem resolvit, imò omnino expellet. Verum est, quod Gal. dicit; quod si non deventerit ad multam putredinem, quod poterit reuerti in naturam suam, sed quando est in valis proprij. Igitur cum sit sub causa coniuncta, non resolvitur; quia de sui natura est putrescibilis, nisi fuerit in corpore nitido, potentiissimæ virtutis, ac in tempore opportuno, & parvæ quantitatis, & qualitatis benignæ. Ego verò vti plurimum vidi ea suppurata phlegmone, quæ ad statum pervenire; quia & à dolore, & à humorum multitudine destituta membrum à calore proprio, & accedente extrinseco, fit contentorum humorum putrefactio. Putrefactio est passio mixti, & fit à calido tanquam ab agente, & ab humido tanq; patiente; calidum. n. agens in humiditatem causat putrefactionem ex Arist. Est igitur querenda maturatio tumoris in tali tempore, quæ sit per refrigerationem caloris ab intra, sicut docet Serapion in de simplicibus. cap. de medicinis maturantibus. & Auer. & Auic. cap. de cura abscessus, dicens; Maturatio autem perficitur his, quæ oppilatiua, ac glutinativa vim habent, ut ipse calor retineatur, & agat in materiam. Pro hac igitur operatione ea eligenda sunt, quæ membrorum porositate sua viscositate, & pinguedine claudere possunt; sua quidem caliditate auxilia ri caliditati naturali illius membri, si fieri debeat æqualis concessio. Et diuertitur secundum diuer sitatem calorum diuersorum membrorum. Sed quod præcipuum est in ista parte, est confortare mē bi virtutem, quia naturalis calor est quasi sepultus in membro, in quo est sparsa materia. Ex prope rea necessarium est, ut medicina habeat ex sui natura, ut faciat digestionem, quemadmodum est illa, quæ assimilatur calori intrinseco, & ideo temperata debent esse in caliditate, & humiditate, sicut docet Auic. Medicinarum maturantium caliditas oportet, ut sit proxima caliditati corporis, & sit eius inuicatio quædam. Et in cap. de operationibus medicinarum singularium, dixit; In medicina matura virtus debet esse contractiva, seu oppilatiua, confringendo, ne humores laboriose resolvantur, i. ne subtiles euacuentur absq; glosis; sed ut æqualiter partes concoquantur. Et scias, dicebat Gal, quod quādo medicina est in vltimo assimilationis complexioni hominis, maturat. Et rursus; Emplasta facta ex farina tritici sunt calida, & humida; & sunt ex quibus maturantur apostematata in corporib; temperatæ complexionis; & non minuunt de humiditate naturali, quæ est in membris, diminutione, de qua fit curandum; & non addunt forsitan in eam, neque confortant caliditatem, neq; frangunt de ea; sed tantum addunt in substantiam eius. Ex Paulo post. Conuersio quidem (ait) ad farinam est vna ex operationibus naturalibus; quoniam est conuersio, & alteratio, in qua est aliquid digestionis; & necessarium quidem est, quando voluntas est, ut digeratur res, ut conseruetur ei deintus spiritus mokus. Medicinarum verò hanc perficientium operationem aliquæ sunt debiles, aliæ verò fortes; de seruanti bus pium ordinem, ex Gal. Auer. & Auic. est embrocatio cum aqua calida, aut oleo communi ca lido, aut emplastrum cum tritico masticato; de compositis est tetrapharmacum Gal. Et dicit ipse; Si ad suppuratōnem perducere volueris, cathaplasma ex farina triticea, quæ in oleo, atq; aqua ebullierit, ap ponendum. Et iterum; super calidum extrinsecus cathaplasma dare, quod ex farina, vel hordeacea, vel triticea, vel ambabus mixtis constet; humorem autem habet aquam cum oleo pauillulo, sed se cundū ad Gla. vbi de sinu, magis laudat triticeam farinam, quam hordeaceam; vbi dicit, cum tumorem posse resolvere desperaueris, ex farina triticea vtere cathaplasmatibus; & ibi dicit, quod aquæ quantitas sit multiplex ad oleum, & talis aqua (dicit Gal.) prius ebulliat cum albæ radicibus. Vnde Auic. cap. prop. dicebat; Et curatio apostematatis, in quantum apostema, est extractio materiæ extraneæ, quæ facit accidere apostema; & illud fit per mollificationem leuiam, sicut emplastrum de farina tritici cocta cum aqua, & oleo. Tale fit isto modo. R. aquæ claræ partem vnam, olei communis partem mediam, cō quassentur omnia bene simul, & ponantur in caciola nitida ad ignem, & parum bulliant; deinde adde tritici farinam cribratam, & bulliant vsq; ad perfectum corpus. & Paulus dicit; particulam ture radices altheæ incoctæ fouebis. At si tumor ad suppuratōnem contumax est, aut ægrò discurrat, cathaplas mate ex sicca siccatis vtere. Oportet autem sicca dulces, pinguesq; incoctas aqua eliquescere, ac ius ip sarum in tenuis mellis speciem cogi, farinamq; hordeaceam adijci quod etiam laudatur à Gal. 2. ad Glau. & ibi Gal. dicit. Oportet autem non ipsas assumere caricas, sed aquam, in qua ebullientes sint liquefactæ; expedit autem caricas pingues, & dulces, ut earum humor non dissimilis melli videatur. & si hordeaceam farinam non habebis, pane opio vtere, opus est; Aut vtere emplastro de nido hirundi nis. R. nidum hirundinis, quem bullire fac in aqua, & cola per cribrum, & in colatura bene decoquantur R. radicem lilij, altheæ, foliorum malue, violarum, parietariæ an. m. i. pistentur, & adde farinæ hor dei, sem. lini an. s. i. s. olei camomelini, pinguedinis porci an. q. s. Valet emplastrum de ruta; hoc, R. rutæ recētis m. i. fermenti acris s. 5. caricarum pinguinum numero iij. pipris, baurach an. 3. i. farinæ tri tici parum, assungit porc. q. s. siu vltre Emplastrum de fermēto Pauli in septimo fermenti, assungit an. s. vj. salis s. iij. picæ refinæ s. iij. ceræ s. iij. aphronitri s. i. ligatæ ammoniaci s. iij. mellis s. vj. vaposus s. iij. Aut R. radicem maluaufici, bulliant vsq; ad cocturam, & pistent, & adde farinæ hordei, aut tritici p. i. assungit porcine q. s. pro emplastro. Aut. R. radices maluaufici, foliorum malue an. m. s. decoquantur optime,

- 19 optimè, & expressè ab aqua terantur, & adde farinè tritici, seminis lini, hordei an. 3. iterum simul terantur, & impinguantur cum pinguedine porcina recentis, & fiat emplastrum. Aliud, R. foliorum maluarum, violarum an. m. j. radicum althæe 3. iij. cepæ liliorum alborum numero ij. decoquantur omnia in aqua suisiceni usque ad perfectam cocturam, & facta expressione pistentur, & adde farinæ seminis lini, tritici an. s. ij. olei cōmunis, butiri recentis, pinguedinis porci sine sale an. 3. ij. vitelli ouorum numero ij. rob parum, misce, & fiat emplastrum secundum artem. Aut R. radicem lilij, ibifci, maluarum, brachæ usque an. m. j. coquantur perfecte, & mundentur, deinde terantur, & adde farinæ tritici, hordei an. 3. ij. assungie gallinæ, auferis, anatis, porci, an. 3. s. croci parum, & cum prædicta decoctione fiat emplastrum. Et nota, quod Gal. dicit, quod inter adipem nihil magis valet in ista operatione adipe porci, & vituli. Et quia non sumus in re determinata, sed in confusa scribendo, res determinatas describere non possumus. Nam Gal. dicebat, Ad talia quidem omnia phlegmone communes medicationes sunt; variantur autem pro laborantium particularum ratione: & eò magis, quia, quæ de nouo emergunt; indigent nouo auxilio: sufficit descriptisse vniuersales intentiones; fiat enim in medico pectore secundum indigentiam aliquid innovare. Copiosius est Gal. de hac re: Stat & alia consideratio in statu tumoris, quod aliquando sanguini materia aliqua aut crassa, aut frigida admiscetur, quæ opportunam impedit concoctionem, & aliquando materiam occultam, & in profundo retinet; vnde medicus cognoscere non potest, nunquid sit digesta, vel non: crassa enim materia partes cutaneas non adeo petis, quod subtilis. Stat & alia causa, scilicet membri grossities, atque durities; necnon pororum angustia, vt docet bonus Hypp. Quibuscumque suppuratio, in corpore existens, non innotescit, his ob crassitudinem puris, aut loci non innotescit. Vnde Auic. dicebat; Et quandoque contingit, vt fiat sanies in interiori parte membri, & non innotescat sensui propter profunditatem puris, & grossitatem eius, qui est super ipsum: Vnde tunc medicus est coactus omni ingenio ad finalem cognitionem materiam attrahere, quod perficitur cum emplastris calidis, vim attractiui habentibus, quorum diuersæ sunt descriptiones, & multa simplicia descripsit Gal. de compositis autem sunt hæc. R. farinæ ciccorum, lupinorum, fenu græci, tritici, absinthij, florum camomillæ an. 3. ij. apij 3. ij. squillæ parum, fimi columbini m. s. assungie porcina, olei anetini an. q. s. misce, & fiat emplastrum. Aut R. farinæ seminis lini, tritici, fenu græci an. 3. ij. radicum althææ, liliorum an. m. s. bulliant in sufficienti aqua; & facta sufficienti expressione, pistentur, & adde fermenti recentis, stercoreis columbini an. 3. i. s. caricarum pinguium 3. iij. linaciarum numero ij. & bene omnia simul pistentur, & in fine adde croci 3. ij. butiri recentis, pinguedinis vituli, porci an. q. s. & cum prædicto decocto fiat emplastrum secundum artem. Ex tali cathaplasmate fiet & attractio, & matericum concoctio: quæ, vt in frequenti cap. cognoscitur ex proprijs signis. Vnum aliud considerandum est in hoc tempore, scilicet si, quæ solent apparere, accidentia apparent (inter quæ solet enumerari vehementissimus dolor, de quo supra dictum est) solet apparere, & interius durities; & ideo dicebat Auic. Et si timetur, vt declinet ad duritiem, administra mollificantia, in quibus est calefactio, & humectatio cum fortitudine. Istud accidens considerabatur à Gal. quod interdum provenit ex malo medici regimine, resoluendo partes subtiles, crassas dimittendo: aut medicinis valde frigidis humores congelando. Igitur apparente tali accidente, procedatur, vt docet Auic. Et tunc tale medicamentum summe landatur. R. farinæ fenu græci, seminis lini, radicum althææ an. 3. ij. bulliant in aqua multa, cui adde butiri recentis, pinguedinis vituli, an. 3. ij. bdelij, storacis, an. 3. s. ammoniaci sol. in aceto 3. j. rob q. s. pro emplastro. Et si appareat intensa durities, R. adipis vituli, 50 tassi, cerui, medullæ crurium vacce, pinguedinis anatis, cespiti humidæ, an. 3. j. mucilaginis, fenu græci, seminis lini, maluauisci an. 3. iij. bdelij, ammoniaci, an. 3. s. olei amigdalarum dulcium, liliorum an. 3. ij. cere, q. s. fiat unguentum molle secundum artem, & vtere. Sed timorolus est id, quod dicit Auic. Et quando accidit superfluitas in infrigidatione, fortasse perducit ad corruptionem membri, & corruptionem humoris constricti in apostemate, & tendit apostema ad viriditatem, & nigredinem. Quod etiam aduenit aut propter multam materiam, aut quia maligna. Et cum timeris hoc, dicit Auic. emplastra locum cum farina hordei, & volubili, in quo est mollificatio: si verò appareat aliquid de hoc, tunc scarifica locum, & excoria ipsum, & non expectes collectionem, neque maturationem; & maximè quando illud, quod est effusum, est plurimum. Scalpellationis autem alia est magis apparsens, & alia magis profunda, & illud est secundum locum apostematis, & dispositionem membri. Et cum 60 scalpellaueris, embroca cum aqua maris &c. De hac re erit sermo infra, ubi de gangrena, sphaceloque agemus. Vnum aliud sciendum est, quod si tumor ex toto resoluitur, in eius manifesta declinatione excruciatu sunt, quæ sanant in fine ex Auic. cap. proprio: & prohibere aliquid remanere, quod faciat saniem. Et si aliquid dimittitur, ipsum resoluit optima natura. Sed raro est, quin magna phlegmona ad saniem non deueniant, de qua nunc, Deo fauente, erit sermo.

1. de s. m. D. a. cap. 1.

13. metho. 1. 3

1. simp. cap. 3. 5. & 6.

6. aphor. 41. 3. de 4. cap. 10

3. simpl. med. cap. 16.

3. ad Glan. & 13. metho.



## De Causis, &amp; Iudicijs Saniei. Cap. III.

3. simpl. d. 4. c. 3.  
Et 1. de diff.  
feb. cap. 3. & 9.  
methodi.  
4. metho. cap. 3.

de tumo. cap. 3.

8. metho.

3. sen. 4. cap. 3.

Lib. de caus.  
morb. cap. 1. &  
1. de diff. feb.  
cap. 4.

3. sen. 4. cap. 32.  
1. per. com. r. 10.

3. metho. 3.

part. 6. cap. 9.

1. per. com. r. 10.

3. sen. 4. cap. pro  
prio.

2. de possib. nat.

3. sen. 4. cap. de  
iudicijs saniei.



Nam tumores omnes, si qui debent putrescere, putrescant phlegmona, quia eorum materia est calide, & humidze complexionis. Hinc dicit Gal. Omnes res, de quarum proprietate est receptio putrefactionis, non putrescunt, nisi cum calescunt, & humectantur. Et rursus; Sanies non generatur, nisi ex quadam putredine; & omne, quod putrefit, necesse est, quòd sit calidum & humidum. Et iterum; Quęcumq; calida, & humida à calido loco acervantur, parata putrescunt; Nam pater putrefactionis est calor, eius mater humiditas, & nutritrix est prohibita transpiratio ex Gal. Qualis autem sit hic calor, aut naturalis, aut præternaturalis, nunc dicam. Gal. in expositione eorum verborum, dum pus conficitur, dolores, ac febres accidunt magis, quam iam confectio; dicit, Pus ex sanguine ortum habet, qui semimalam (vt ita dixerim) habet transmutationem; nam mala simpliciter est, cum sit olida putrefactio: quę simpliciter sit optima, est ipsa nutritio animalis; puris enim generatio mediū inter has obtinet locum; neq; à solo calore extraneo, neque ab intrinseco solo. Actio verò, quę provenit in tali dispositione, sit ab actore mixto ex vtriusq; caloribus. Ideo Auic. dicebat; Sanies laudabilis est illa, quę est alba, lenis, cui non est odor horribilis, in qua non est operata, nisi caliditas innata, licet non sit excusatio à communitate extraneæ.

Sed quare generatur intensus dolor in saniei productione? Dico non ob aliam causam, nisi quia in tali actione multum extenditur particula à multa materia, & diversa; & id magis, quia accenditur, & supercalidit ex actione duorum calorum. Præterea non solum putrescit materia coniuncta extranea, sed & regio, in qua confederit talis materia, & laceratur.

Quare coniungunt febres? Quia cum supercalidit sanguis in vna parte per supercalidationem partis post partem, super calidit sanguis in dextro ventre cordis, deinde spiritus in sinistro, & sequitur febris: febres enim sequuntur principio calefacto ex Gal.

Quare post puris generationem, & si adhuc stat materia, non apparent accidentia? Dico, cum sanguis ex toto exulsi fuerit, residuum eius sit pus, quemadmodum ex lignorum extrusione cinisideo tem pore illo dolores, & febres sedantur: præsertim cum pus fuerit præparatum, vt pore iam semidigesta materia, extincta autem ignea caliditate. Et ideo dicebat Auic. Cum videris lenitatem quandam, & sedationem doloris in apote mate, tunc iudica, quòd est in via maturationis. Dilucidatur res ista à sententia Gal. ubi dicit, quòd vltima digestio sit per additionem nutrientis in nutritio, & assimilationem eius cum eo; & necesse est vnumquodq; membrum nutriri in spatio longo. Et subdit alibi, quòd pro nutritione, & generatione carnis duo continuè producantur, vnum grossum, & aliud subtile, vt etiam clarè demonstrat in lib. de oculis. subtile resoluitur, aut per sudorem, aut per insensibilem transpirationem: grossum verò stat pro membri nutritione. Et subdit in lib. de grossitudine extra naturā, quòd aliquando tale nutrimentum egreditur à proprijs vasīs, in quibus comprehendit ipsum naturā, vnde impossibile est, vt redeat ad naturam, & locum proprium; sed putrescit, sicut omnes res, quæ calefunt calefactione vehemēti in loco non suo: Et si caliditas innata egreditur ab æqualitate sua naturali, putrescit humiditas ibi contenta. Et si virtus eius fuerit adhuc remansens in naturali esse, accidit sanguini, seu nutrimento, dispositio composita ex dispositione naturali, & non naturali; quare putrescit pars eius propter dispositionem innaturalem. Et quæcunque harum dispositionum vincit, tunc significationes operationis eius sunt magis vincentes, in colore, odore, & substantia. Et ideo dicebat etiam Gal. quòd possibile est, quòd alteratio sanguinis ad saniem sit alteratio laudabilis, & hoc quando victoria est innata caloris; Hæc non putrescit, sed recipit maturationem, quamuis appareat in ea aliquid putrefactionis egressæ à naturā; veruntamen illud est parum, sicut dicit Hypp. non habens odorem horribilem.

Quare sanies debet esse alba? Quia, vt dicit Gal. assimilatur colori spermatis, sed non est ita verè albus; nam in spermate non agit nisi naturalis calor, in sanie verò mixtus. Et ideo Auic. dicebat; Requiritur, quòd sit alba; quoniam color membrorum radicalium est albus, & non assimilatur eam nisi natura potens super eam. Semper natura, dicebat Gal. agens in materiam intendit eam ad benignum te ducere, & in nutrimentum membrorum conuerrere, & agit assimilando ipsam ipsi membrīs nutriti dis, & præcipue radicalibus, qui sunt minera vitæ, & hoc pro eius posse. Nutrimentum verò primariorum membrorum est benignus, est quæ albus, quia chylus.

Quare debet esse lenis? Dicebat Auic. non additur ei lenitas, nisi vt sciatur, quòd ipsa est præparata parti à virtute digestiua: & non diuersificatur eius preparatio in inobediente, & obediēte, id est non coniungit lenitas, quando vna pars est præparata maturationi, altera verò non: & cum est talis diuersitas, sanies non fit lenis, sed diuersa, & ponderosa. Aequalitas verò attenditur in colore, & substantia: in colore, vt sit secundum omnes eius partes tam intrinsecas, quam extrinsecas, alba. In substantia, vt sit homogenea, similis, & vniuersi modi secundum omnes partes; qui modus debet esse mediū inter grossitatem, & subtilitatem; & inter densitatem, & raritatem. Ideo debet esse lenis, & æqualis in tota substantia, nec debet esse globosa, nec aspera, nec dura, immo lenis, & æqualis. Ideoq; à natu

- 10 rali calore fit æqualis coctio, ab extraneo verò non æqualis coctio, & vna pars altera subtilior apparet: Sed bona fanies debet effie alba, lenis, æqualis, & fine fætere, vt dicit diutius Hypp. Vno vifu candidum, ac crassum fit, & fibi simile vndique, leue autem tangenti, ac minime fetidum: Idem Galenus, & Auic. cuius verba sunt hæc. Sanies mala est frigida, significans putrefactionem, quæ est contraria maturationi, & significat dominium caliditatis extraneæ; & quando egreditur fanies diuersarum partium, colorem, & substantiarum, est etiam de genere diuerso à bona. Ait etiam Celsus; fanies mala est multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum vlcus, & iunctam ei currem erodit: melior autem non nuda, modicè crassa, subrubicunda, aut subalbida. Ex Auic. vbi de viceribus in generali, dicit; Meliores significationes significantes salutem vicerum sunt, cum in successibus eorum est fanies, quæ est cum medicina faciente pus, & ex operatio-  
 20 ne naturæ: illa enim operatio naturæ est secundum curam naturalem, & non generatur fanies, nisi à digestionē naturali, & non allociatur ei malum ex accidentibus vicerum malorum; & propriè fanies laudabilis, alba, lenis, & æqualis, quæ confecuta est complementum digestionis, neq; allociatur ei fætor, cum in ea non fit putrefactio: Et fortasse non euacuatur à fætere paruo fanies, cui accide actio caliditatis innata, & alterius extraneæ. Ex his notandum est, quodd mala, & bona fanies potest provenire, aut à qualitate materiæ, aut à dispositione agenis, aut ab vtroque. Cum verò materia fuerit benigna, & calor naturalis vincens, generabitur fanies bona, & laudabilis cum prædictis conditionibus: Cum autem materia fuerit diuersa in modo substantiæ male qualitatis, aut calor extraneus natu-  
 30 rum superauerit, fanies erit mala in aliqua prædictarum conditionum. Et si materia fuerit mala, & calor extraneus vincens, erit fanies illa laudabilis secundum omnes dispositiones, & simpliciter mala, & sic illa laudabilis fanies contrariatur laudabili in colore, & substantia. Tres igitur possunt esse actiones in materia, vna à naturali calore, & fit laudabilis concoctio, quæ & digestio dicitur: nam Arist. dicebat; Digestio à calido naturali fit, & est eius actio in qualitate passiva, quod affirmavit etiam Gal. Alia ab extraneo, & fit putrefactio, & putrefactio est corruptio caloris innati à caliditate ambientis in humidum fuso. Tertia à mixto ex naturali, & extraneo: & fit fanies. Vnde Arist. dicebat; Maturatione est operatio caloris naturalis in substantia materiæ, & maturatione est ordinata secundum ordinem, quem habet digestio in cibo. Igitur quando spargitur in aliquo membro materia, quæ egreditur à natura in quantum, aut quali, aut vtrifque simul, & talis putrefc. generatur in illo membro de necessitate vnus calor mixtus ex naturali, & extraneo. Et si materia fuerit apta digestionī, fiet fanies laudabilis; quia alba fanies est materia inter digestionem perfectam, & diminutam. Nulla enim cauſarum, dicit Gal. fi-  
 40 ne patientis aptitudine agere potest.

DIGRESSIO.

Quia de rumore, qui vt plurimum ad saniem deuenit, nonnulla diximus, necnon multa de sanie, eius naturam, & causas declarandum, reflat vt de ingenis, quibus contentam materiam aut digestam, aut putridam cognoscere valeamus, aliqua enarremus. Er digito, quod sensus, & visus, & tactus facit ad hoc; facit etiam aliquorum saniei propriorum accidentium cognatio, sed sensus in extrinsecis tumoribus est verus iudex, & maxime tactus; visus vero est adiutus. Dicebat Auic. Scias, quod locus declaratur, in quo est sanies, per tactum. Er Gal. Potest comprehendere digito membrum, quando maturauerit, continens in fe saniem. Subdit Auic. Quando tangitur cum digito, obferua cum digitis alijs, alteris alterius manus, an expellatur aliquid ex chisti. Sic autem faciendum est; Si eatura fue rit magna, experiri debet cum digitis ambarum manuum, aut indice, & medio vnus manus, & pre mittere cum vno digito; vnus manus, & obseruare, si sub alijs sentitur motus inundationis; & digiti non debet contingi, sed tunc secundum tumoris quantitatem distantes. Sensus est verus iudex in hoc, & errant interdum alia signa: sed auxilium prebere in intrinsecis exituris, & profundis; qua per tactum non possimus, aut diffcultur, saniem esse concoctam, cognoscere. Sensus visus interdum cognoscit saniem concoctam, aut putridam: nam dicebat Auic. Locus quidem saniei apparet ex declinatione coloris ad albedinem; & dum non est matura, est declilius ad rubedinem, & quandoque est locus saniei declilius ad rubedinem, & citrinitatem, cum sanies non est bona. De accidentibus vero ali qua sunt preterita, & aliqua presentia. Dicit Auic. Cum senseris pulsationem plurimam, & duritiam prolongatam, & caliditatem, tunc existima, quod apostema est in via, vt fiat exitura. Er rursus; cum videris lenitatem quandam, & sedationem doloris, tunc scias, quod apostema est in via maturatio nis. Gal. etiam dicit; Si dolor est maximus, denorat materiam putreheri. & cum cessat, est putrida ex Hypo.

## QVAESTIONES DE SANIE

Scriptores de re ista dixerunt, quod sanies est sanguis in seminaliam qualitatem mutatus; aut materia in vno sinu collecta, quæ ratione modi substantiæ, vel qualitatis in ipsa materia existentis, refugit propriam digestionem, pro transmutatione in membris ab ipso calore naturali mediante cooperatione caloris propter naturam. Et Hypp. in lib. de vulneribus, et vloribus, dicit ad hoc propoliturum; posuit De Tum. sang. Lib. I. Traç. 2. C. creatur

1. simpl. d. 3.  
cap. 4.

creatur sanguine putrefacto, corrupto, vel mutato, calefactoque, donec marcescat, & pus fiat. Et Gal. Materia saniei (inquit) aut est caro, quæ atteritur, aut est humor faciens apostema. Aliqui dicunt, quod sanies in sua complexione radicali est calida, & humida: sed caliditas, & humiditas materiz, quæ sania est, habet latitudinem in plus, & minus; ita & sanies, sed non exspoliatur ab aliqua acuitate ratione suæ putrefactionis; & quanto putrefactio in ea fuerit maior, & eius materia acuta, tanto erit eius acuitas intensior, à qua redditur aut pungitina, aut corrosiva.

Apparet in hac materia tres difficultates, quarum prima est, utrum sanies fiat à calore naturali, vel præternaturali, vel ab utroque simul: Et videtur, quod à calore præternaturali: Et ratio est, quia sanies est quid præternaturam, ergo fit ab agente tali, ergo à calore præternaturali.

Secundò probatur, quod à naturali: Et ratio est, quia sanies fit eum quadam digestionem, in qua operatur calor naturalis, ergo sanies fit à calore naturali.

2. peror. com. vbi.  
2. aphor. com.  
47.

Tertiò probatur, quod ab utroque, auct. Gal. ut supra declarauimus. Sed respondendo ad primum argumentum conceditur, quod sanies est quid præternaturam secundum quid, & non simpliciter, cum in ea reperitur vestigium caloris naturalis; nam de sanie dicendum est, sicut de siccibus, & vrina, quæ non sunt absolute præternaturam, cum dicantur esse effectus digestionum naturalium, scilicet primæ, & secundæ, quæ perficiuntur ab innato calore.

Ad secundum dico, quod non est vera digestio, cum non sit eius vera præparatio pro nutritione, sed capitur talis mutatio, quando est laudabilis, pro digestionem.

Ad tertium dico, quod verum est, quod sanies fit ab utroque calore; & patet, quia in ea inuenitur effectus utriusque caloris: patet de naturali, quia in ea inuenitur albedo, & lenitas, quemadmodum in nutrimento membrorum radicalium, & maxime in sanie laudabili; & si calor naturalis agit in materiam diuersam, & nocuam, agit, ut illam conuertat, & reducat ad benignum, & magis fit in ea non fuerit multa malitia: & si aderit malitia talis, dat & illam perfectionem, & potentiam, quam potest. Patet de extranea, quia non fit in ea vltima bona digestio, & apparet in ea aliquis fœtor, qui produciatur ab extranea, & non à naturali caliditate.

1. de pot. nat.

Epilogando autem dico, quod simplex putredo est, quæ fit à calore simpliciter præternaturali.

Opus præternaturale id est, dicebat Gal. quod est corruptum: quod verò à natura, simpliciter naturaliter est, ut animalia, plantæ, & similia: tertium verò opus est, & quod à natura, & à re præternaturali causatur, ut sanies, sedimen vrinæ &c. Vel dicere possumus, quod actio præternaturalis sit motus corruptiuius, ut simplex putredo: naturalis verò actus est actus factiuius, & productiuius, ut generatio, & augmentatio: tertia verò actio, quæ à naturali, & extraneo procedit, est motus quodammodo factiuius, & corruptiuius, ut semiuiuatorum humorum mutatio, quæ non simpliciter putredo dicitur, ut pus, & sedimen vrinarum: Vnde illa postea dicitur simplex putredo, cuius substantia à calore extraneo ambiebat mutatur, alteraturque; quippe superante natura, ea dicitur putredo non simpliciter, & non maligna, alba, lenis, æqualis, & sine fœtore, ut clare docet Gal. cum dicit, quod calor naturalis distat ab extraneo; quoniam iste est saluber, ille verò morbosus; iste conseruat, ille destruit; hic benignus, & suauis est calor, ille autem acris & mordax; iste digerit, ille verò putrefacit.

De simpl. cap.  
de mod. natur.  
rante.  
& 1. aphor.  
com. 14.

Secundò dubitatur, utrum in generatione saniei fiant pulsationes, & dolores: Et videtur, quod non, quia generatio saniei est eius materialis causæ adæquatio, ergo in eius generatione non debent fieri dolores, & pulsationes. Conseq. est nota. antecedens probatur, quia sanies præparatur ex materia, mediante aliqua digestionem; modò digestio dolores, & pulsationes cessare facit: nam dolor accipit aut à qualitate mala, aut à soluta continuitate in digestionem verò, quodcumque horum remittitur, ergo &c. Secundò arguitur sic. In generatione saniei resoluantur partes humoris subtiles ex actione calororum, quæ pulsationes causare possunt, ergo non debet sequi pulsatio: Conseq. bona, quia remota causa, remouetur effectus.

Tertiò arguo sic. Vbi non sunt causæ doloris, ibi non debet esse dolor: Sed in generatione saniei non sunt causæ doloris, ergo &c. Conf. bona: maior est nota, & minor probatur, præsupponendo, quod sanies generetur per ipsam satis longum: modò in tali spatio non debet fieri dolor, cum dolor fit sensibilitas rei contrariæ subito imprimentis.

Ad primum argumentum breuiter dico, quod generatio saniei est adæquatio talis, quæ conuenit ipsi saniei: sed non aequè conuenit perfectæ digestionem, quæ est transmutatio bona in membro; vnde non dicitur adæquatio absolute: Imò negatur conf. quia sanies non merè fit à calore naturali, sed à mixto, ut dictum est.

Ad secundum negatur conf. quia licet partes subtiles resoluantur, non tollitur tamen, quin articulariz ab his, quæ remanere, comprimantur: & semper de nouo à tali materia aliquæ partes subtiliantur, quæ possunt pulsationem causare.

Ad tertium vbi non sunt causæ doloris &c. negatur minor. Ad probationem dico, quod dispositiones præparantes ad saniem sunt seles succedentes, non propter hoc tollitur dolor; quia dum incipit actio calorum in ipsam materiam, alterantur membra à mala complexione, & similiter propter ebullitionem, & solutio continui, quæ sunt causæ doloris, & pulsationis.



10 Tercio dubitatur etiam, vtrum sanies fiat a sanguine, sicut cinis ex aduisione lignorum, vt inquit Gal. Er videtur, quod non: quia cinis est terminus consumptionis humiditatis, sed sanies non est huiusmodi quia in ipsa reperitur multa humiditas.

a. apbor. com. 47.

Respondendo dico, quod similitudo est sic intelligenda, primum quod sanies, & cinis generantur ab agente, quod est calor. Secundò in termino motus, quia facta sanies, calor pro tali forma non agit, cum iam introducta sit, sicut est ignis actio in ligno. His visis, adhuc vnum sciendum est, quod cum sanies sit quedam digestio, seu quedam res semidigesta, quæ sit ab vltima digestionum; quæ strictè sunt quattuor principales: prima in stomacho, vbi ex cibo fit chylus; secunda in hepate, vbi ex chilo fit massa humoralis; tertia in venis, vbi aliquoties disponitur pro nutritione: & quarta in membris pro assimilatione nutrimenti in nutrimentum. Vnde dicendum est, quod sanies ab operatione quartæ digestionis

30 fit, scilicet ex materia, quæ erat apta conuerri in substantiam membri propter debilitatem virtutis, & disproportionalem malam materiam, vnde conuertitur in saniem. Et ideo Auic. dicebat cap. de vlcere in generali: Et non facit pus, nisi propterea quod cibis, qui veniunt ad ea, conuertitur ad corruptiorem propter debilitatem membri. Dicebat Cornelius, Ex vulnere, vlcereque: exit sanguis, sanies, & pus. sanguis omnibus notus est, sanies est tenuior hoc, variè crassa, glutinosa, & colorata: pus crassissimum est, albidissimumque, glutinosius & sanguine, & sanie. Exit sanguis ex vulnere recenti, aut iam sanescente, sanies est inter vtrunq; tempus: pus ex vlcere iam ad sanitatem spectante. Sed apud Auic. apparet, quod pus sit nomen absolutum super omnem digestionem aut bonam, aut malam; & est tanque genus: sanies verò est nomen determinatum super materiam bene digestam, & laudabilem: virus autem, seu virulentia denotat materiam subtilem, tenocem, non digestam; quæ non generatur, nisi ex subtilitate humorum aquosorum, aut calidorum: sordes, vel sordities est res spissa, coagulata, non æqualiter cocta, alba, aut ad nigredinem declinans, quæ ex grossis generatur humoribus.

Lib. 5. cap. de ligno sinui.

4. sen. 4. r. 5. vbi de vlcibus in genere.

De modo aperiendi abscessus, & de cura eorum. Cap. IIII.

40 **S**ANOVIS est calidæ, & humidæ habitudinis, & pater omnium humorum, & crassæ substantiæ, & raro solus reperitur ex Gal. & Auic. cap. de cura phlegmonis. Hinc est, quod vltimum ad putredinem tendit; cum putredo sit passio mixta vt etiam dicit Hypp. & Galenus. & cum ad talem dispositionem devenit tumor, a medicis appellatur exitura, suppuratio, aut abscessus. Nam dicebat Gal. iam tempus est, vt transeamus ad abscessum tractationem; sic autem nominat eas dispositiones, in quibus inuicem distant, quæ prius se continebant corpora. Spacium igitur vacuum in medio fieri oportet, quod aliquam substantiam spirituosam, vel humidam, aut mixtam ex vtriusque comprehendit; ad hoc verò ex inflammationibus quedam, atque ex erysipelas, & inflammationibus similes non pauca mutantur. & 14. methodi dicit: Mihi verò tempussum est de alijs tumoribus docere, quorum se primum abscessus offert, apostema id Græcè dicitur. Huius duplex genus est, vnum, cum phlegmone in pus versa, pus ipsum tanquam in sinu aliquo est collectum: Alterum, cum nulla precedente phlegmone, humor aliquis statim ab initio, isque aliis specie aliis, ceterum omnino acris, in particula aliqua colligitur. Et Paulus dicit, Abscessus itaque est carni-  
nium, seu partium carnosarum, nempe musculorum, venarum, arteriarum corruptio, mutatioque, cum omnino in pus transierit: sed æqueam materia in pus transierit, dum fit sub causa coniuncta, a Medicis collectio appellatur: & cum est in fieri, tumor dicitur. Arabes verò priusam passionem exituram vocant, quam alij abscessus; secundam dubellet, quam alij collectionem interiam apostema, quam alij tumorem. Cum igitur tumor ad putredinem devenit, opus est talem extrahere, & euacuare. Nam dicebat Auic. cap. de curatione exiturarum apparentium. illud verò, quod ei exituræ approximatur de regimine, est extractio eius, quod aggregatum est in ea. Ad quam operationem tria sunt consideranda. I. tempus operationis, locus, in quo henda est operatio, & instrumenta apta operationi. De tempore, dicebat Auic. hoc est secundum duos modos regiminis; vnus est regimen currens secundum rectitudinem, & hoc appellatur regulare regimen, quod fit in cura abscessus, non omnino præter naturam, cum ægritudo non egreditur ab eo, quod conseruetur est plurimum. Et est, vt ingeniatur in maturacione materiei, vt fiat sanies, & in eruptione eius post illud. In istis exituris medicus debet expectare perfectam sanici coctionem, & maxime quando exitura est in membris carnosiss, paucarum venarum, nervorum, & arteriarum, vt docent Gal. & Paulus Aegineta, & Cornelius. Vnde Rasis dicebat; Carnosa autem loca bonum est, vt sic dimittantur, donec sanies sit bene matura; si enim ante eius maturacionem perforarentur, virus ab eis diu manabit, atque vlcus multa sordidit, ac putredine abun-  
dabit, labia quoque eius, atque profundum dura fierent, ipsunque vulnus pus, & virus continuè emitter. De hac re locutus est ad plenum 14. Continentis. Nec est credendum istis, qui crudorum abscessuum sectionem laudant, quia in benigna materia digesta medicari, & mouere, non in cruda, oportet, nisi turgat; plurima verò non turget, & Albucaſis dicit; & oportet, vt non perfores apostema crudum non completæ digestionis, nisi præpò anum, vt non putrefiat profundum, & longetur ad interiora a

1. de diff. mor.

cap. 12.

6. apbor. 10.

In conseru.

1. ad Glau. vbi de abscessibus.

Lib. 4. c. 18.

lib. 6. cap. 34.

3. de 4. cap. 17.

13. method. d. 3.

cap. 5.

Lib. 6. cap. 4.

Lib. 7. cap. 1.

7. ad Alim. cap. 3.

Gal. 1. ad Glau.

d. 2. cap. 5.

1. apbor. 22.

1. de Crisib.

cap. 2.

1. de 4. cap. 7.

Lib. 1. cap. 40.

ni, & fiat fistula, aut fiat in termino eius, quod non sanatur. Expectetur igitur digestio ante perforationem, sed non vltima, in istis casibus; quia dicebat Gal. Vbi, qui ad abscessum perueniunt tumores, tardè secesserunt, aut ob medicamentum impericium, aut eorum, quibus modè adhibetur, timiditatem, qui cessari non patiuntur, sed expectant, vt longiori tempore cutis à pure rodatur; contingit sepius vniuersam cutem à pure circa abscessum aggregato sufficienter extenuari infusa lacerae velis; vnde & illi nomen lacerosi à medicis indium puto. Turgente verò materia, seu furiosa, sicut dignoscit Gal. quacuque traxerim indigesta, aut loci sectione, aut vt 2. ad Glau. profunda scarificatione. Ideo dicebat Auic. Secundus modus, qui dicitur regimen egrediens à recludendo propter dispositionis necessitatem, quando argritudo est magna, & exitura pertransiens in magnitudine sua, illud, quod conseruatum est: & timetur festinatio rei in expectatione maturacionis in ea, & scitur, quòd virtus non sufficit in maturacione illius totius, & si administrantur maturatiua, perducunt illud ad vestigium immaturacionis, tunc necessaria est perforatio. Et cum senferis, quòd materia fit talis grossificata, quòd non maturabitur, & quòd calor innatus sit tantè paruitatis, quòd non maturabitur materia; aut timueris, quòd ipsa propter suam abbreviacionem est talis, quòd alterabitur alteratione non maturacionis vèrè, quòd exitura est propè iuncturas, & membra principalia, quare timetur, quòd ipsa corrumperet ea: tunc sumus coacti extrahere talem materiam, etiam quòd indigesta sit, & talis dicitur cura coacta secundùm quid. Natura, & membri compositio cogit medicum ad tale opus, vt docet Gal. Vnde Auic. dicebat: Cum inuenis exituram grossie carnis, & cutis, cum maturacione, cuius non speratur eius eruptio, & sunt illic nervi, venæ, & cordæ: tunc oportet, vt perfores: quoniam si dimiseris saniem, corrumpetur, & corrumperet, & corroderet cordas, venas, & villus neruorum; & illud quidem vehementius erit, cum fuerit propè iuncturas. Vnum notat Cornelius in istis incisionibus, quòd dubitamus nervos, aut venas incidere, vt puta in profunda exitura mutorum neruorum, & venarum, & dicat: Cetera membra subcutanea aperiri possunt, inter neruos verò vltima expectanda maturitas est, quæ cutem extenuet, & elique pus iungat, quòd proprius reperitur. Suntque nonnulli tumores, qui neque ante & maturacionem, neque post ipsam sectione indigent, sicut dicit Auic. ex Galeno; sunt exitura pineales acutorum caputim, & cinis formatur propter caliditatem, & subtilitatem materie, & tales vltimum rumpuntur per se. Non omnia membra sunt apta, vt in eis oriatur exitura, etiam quòd possint apostemari, sicut ossa, nervi, & cartilagines, & concatenationes: in quibus humores mucilaginosi, frigidi, & crassi incutuntur: qui si debent ad saniem deduci, vt calidi sunt, opus est: per accedens tamen, & cum magno labore, dicuntur saniem pati.

Habita igitur faniei ceteritudine, vt in præcedenti cap. dictum est, uitorem seca, & quare cum perforatione locum maturiorem, & decluiorem, vt exitus putridarum materium sit halitior. Dicitur Gal. Aliquando puris copia si medicamenta superet, nec ea videantur tibi totum digerere posse, secare exitum ei, quod digestioni non cessat, eo potissimum loco oportet, quo est ednissimum: quippe tenuissimam etiam illic inuenies cutim. Et Rasis dicit; Oportet, vt exitus, cum mature fuerint, & apertione indigerent; perforantur in inferiori loco, qui in ipsis inuenitur, & interiori, & magis gibbosi, si possibile fuerit; vnde Aetius dicitur; & tu quidem quare cum tua perforatione locum faniei, & sis sollicitus. vt cadat porta perforationis inferius. Et Gal. Oportet secare (inquit) ubi apparet exitus apostematis, & est finis alacissimus ipsius; ibi enim inuenies luberrimam cutem. Et rursus (& est locus citatus a Principe) Oportet (scribit) vt feces ex loco eius vehementioris eminentiæ, & vt inclinet ipsum, & non sit tractus perforationis, nisi ad partem, ex qua est possibile currere plus ad inferiora. Et Albucasis dicit; Oportet, vt facias cadere perforationem in inferiori loco apostematis, & vehementioris eminentiæ: & sit perforatio vadens in longitudinem corporis. Multa dixit Aetius de tali operatione in cap. de abscessibus, quæ vide.

De numero incisionum autem (dicit Celsus) Maiores finis interdum etiam duabus, aut pluribus lineis, incidendi sunt: dandaque opera, vt imus finis exitum habeat, ne quis humor intus subleuat, qui proxima, & adhuc laesa rodar. Et Paulus ait: In minoribus vnam scalpelli sectionem molimur, in magnis plures, iuxta amplitudinis rationem, vbiq; ea, quæ tenuiora sunt, & effusionis idonea incidentes. Vnde Avic. dicebat: Et fit in omni dispositione tua studio, ne incidas arteriam, neque venam magnam, aut neruum, aut villos lacerti, & perforatio fit secundum magnitudinem exitus: sed si fuerit parua, & currit quod est in ea ex loco vno, tunc feca eam in loco vno: & si fuerit magna, tunc feca eam, & perfora ex principio: deinde intromite dignum tuum indeo finitrum in eo, & perfora eam, vbi penetraverit caput eius: deinde intromite etiam in foramine secundo, & secundum hoc donec venias super eam. Et si exitus fuerit locus sufficiens, ex quo fit possibile currere, & exire quod est in ea, perforabis illam in illo loco. Et si fuerit rotunda, aut fuerit ci figura talis, ne egredietur quod est in ea ex perforatione vna, perforabis eam in interiore parte sui in duobus locis, aut tribus, secundum quantitatem, quam scis, quod omne, quod aggregatur in ea, currit in hora. Siquæ vna, per plures sectiones secundum indigentiam. Dicit Albucasis: Oportet, vt administres in apostematibus parvis perforationem parvam, & in magnis amplam, aut sectiones multas per similitudinem magnitudinis apostematis.

- 10 Cum autem erit tempus extrahendi materiam secundo tumorem, subtilia regimen, & corpus munda, saltem a facibus cum Clisteri: & seca ieiuno patientis stomacho, nisi apparente indigentia. Sectio vero multis ingenij celebrari potest, aut ferro secante, aut vrence, aut caustico potentiali, aut medicamento vique ad cutis putrefactionem. Et quia vltimum instrumentum secante hoc fit, praecepto Aui. volo de eo in primis sermonem habere. Incisio fienda est ferro instrumento, optimè incidente, ne intensus causticus dolor, etiam quod aliter sentiat Arist. qui dicit, quod instrumentum aeneum cum sit medicinale, sit aptius. Sed Gal. dicit, quod indolorosae debent esse tales actiones; aeneum vero instrumentum non ita secat, sicut ferreum. Et dico, quod si aegro nesciente hoc facere possumus, bonum est: sitque instrumentum aptum huic operi, aut quale describit Gal. ad myrthacei folij speciem formatum, quod nos lancetam, aut lanceolam, siue sagittam vocamus; à quo provenit sectio eiusdem formae. Nam Gal. & Aetius dicebant; Sanè quidam in his, quae in axillis, & bubonibus suppurant, in mirthei folij speciem semper excidi cutim iubent. Et Celsus dicebat; sed excidi ita debet, vt plaga ad similitudinem mirthei folij fiat, quod facilius sanescat, idque perpetuum est: & Paulus dicebat; Plaga in trianguli, aut mirthacei folij, aut alterius anguli figuram facta, diuidimus, cum circularis ad cicatricem recipiendam sit inidonea. Instrumenti autem forma habetur fuisse explicata in altero tractatu huius voluminis, quod inscribitur, Officina Chirurgiae.

4. c. m. circa finem.  
1. parvè probl. aut.  
16. method. cap. 13.  
14. method.

13. method.  
Lib. 7. cap. 2.  
Lib. 6. cap. 14.

Hoc in loco tamen notandum, talia instrumenta debere esse magnitudinis imparia. nam (vt dicit Celsus, & Paulus) habeto fundamentum ad quantitatem, & locum tumoris: cumque volueris exituram aperire, considera modum eius; si quidem si fuerit profunda, grossae cutis, incisio debet esse profunda iuxta modum exitus: si vero fuerit acuta, & cutanea, sectione profunda non eget.

1. ad Glau.  
4. l. 1. cap. 16  
3. l. 4. c. 3.

6. method. cap. 3.  
2. 3. 4. section. cap. 3.  
c. 1. 4. cap. 3.  
c. 3. l. 4. c. 37.  
c. 2. l. 4. cap. 10.

13. method.

3. l. 4.

Tract. 3.

- 30 Et notandum est, quod in omni sectione procedendum est secundum rugas, seu villos, aut staminum musculorum, sicut docent Gal. & Aui. si quis aliquem abscessum aperire voluerit, debet scissura rugas illius membri imitari. Et rursus; Oportet in sectione, vt consequaris lineas naturales. Dicitum est à Gal. quod in fronte, & in summe, seu mirach, aut abdomine rugae procedunt transversaliter, & non secundum processum musculorum: quia muscoli frontis, & summi longitudinales, longitudinaliter procedunt ad viam compositi. Igitur ne lacerti ledantur, qui sunt instrumenta motus, nisi quando motus destructionis minimè curamus, convulsionem, siue aliud accidens evitando, vt docet Gal. & Aui. cum dicit; Perforatio, aut sectio incadat secundum longitudinem villorum; vt plurimum quidem longitudo villorum est secundum longitudinem corporis, nisi in locis appropriatis, licet in fronte, & summe; similiter inuenies plurimum longitudinis villorum cum plurimo ligaturae & rugarum. Si enim (dicebat Aui.) scissura secundum rugas fieret, incideret musculos frontis, & supercilium cadere: Verum in membris, in quibus rugae contra ordinem villorum musculi procedunt, contrarium fiat. Debet igitur qui incidit, scire ante secandi nervos, ac venas, & arterias, ne oberret, & aliquid horum incidat. Et vnum dico, quod apostemata, quae generantur extrinseca, aut contingunt sic in superficie membri, quod musculi, qui cooperiuntur proprio panniculo, & panniculo carnoso, pinguedine, & triplici cute, non leduntur; & tunc non sumus coacti observare illegentiam villorum, & cordarum; sed cum materia est adeo profunda, quod imbibatur in musculorum substantia, tunc cautè agendum est: ne illius membri operationes ex alicuius membri lesione impediuntur. Nec laudatur magna sectio; nam Gal. dicit; Maximas aliqui sectiones faciunt, quarum occasione particula, vbi ad cicatricem est perducta, non solum turpissima redditur, sed etiam fit imbecillior, & quae sepe homini ad motus fit in mora. Hec igitur ipsi vitantes plurimum, certè sola incisione, & medicamentis valenter siccantibus huiusmodi abscessus sanamus. Quod si aliquando excidere aliquod propter multitudinem, non puris modò, sed etiam corruptarum partium, fuit opus, contenti eramus sectione, quae mirthi folium imitatur, planè non magna. Dicit Celsus; Semper autem vbi scalpelli admoventur, id agendum est, vt & quam minimè, & quam paucissimè plaga fiat, cum eo tamen, vt necessarii succurrantur, & in modo, & in numero. Dicit etiam ibi Cornelius; Si autem alius malum est, considerari debet, nervosus ne is locus sit, an non sit: nam si sine nervis sit, candenti ferramento aperiri debet: cuius hæc gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus euocandum patet, paruaque postea cicatrix fit. At si nervi iuxta sunt ignis alienum est, ne vel distendantur hi, vel membrum debilem, sed necessaria opera scalpelli est. Vltimò dicit Aui. Perforatio sit cum cautela, ne ferrum tangat illud, quod sequitur cxi-  
turam de membris nobilibus, in tactu quorum à ferro est timor.

Lib. 7. cap. 1.

3. l. 4. cap. 12.

Datur et alter modus aperiendi abscessus absque ferro, quo vitmur aut ratione loci, aut quantitate tumoris; Nam, dicebat Cornelius; si pus maturuit in alio quidem, & in inguinibus, rarò secandum est. Item vbique mediocris abscessus est. Item quotiens in summa cute, vel etiam carne vitium est, nisi festinare curantis imbecillitas cogit, satis est cataplasmata efflicere, vt per se pus aperiat: nam ferè sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Vnde Aui. dicebat; Si autem speramus, quod rumpatur per se, non perforabimus. & similiter si speramus, quod ipsa erumpatur per medicinas facientes eruptionem; fortasse enim inuenimus in medicinis facientibus eruptionem, quod stat loco perforationis. Medicamenta huic operationi opportuna describam infra cap. de cura nodi. Quomodo cunque igitur celebrata loci aperiione, tota euacuetur materia, si euacuari debet: hoc di-

co, quia in magnis exituris apud arterias, & venas existentibus, in quibus multa reperitur materia, **10**  
 ut dicit Gal. & Albucasis, totam vna euacuare minimè debemus, propter nimiam spirituum euacuationem. Vnde Rasis dicebat; Et si exitura maxima fuerit, totum eius virus non subitò est extrahendum, ne agro superueniant sincopes: sed paulatim eitis extrahendum, & præcipue si æger fuerit debilis, aut mulier pregnans, aut puer parvus, aut senex decrepituus erit. Vnde Auic. & Albucasis dicebant; Oportet, vt tu obserues virtutem, & conferues eam, ne prosterneat eam dolor, & erupio: plures enim hoc

minum moriui sunt fingitendo ex arefactione virtutis: imò, dicit Gal. 2. ad Glau. in cap. de cura febrium continuatum sine accidentibus, quòd si hoc accideret, confectum quiddè hi optimis odoribus solum dunt sunt: Et paulò post sybotionibus concoqui facilibus sunt relinendi. Scindendum etiam est, quòd in magna inanitione hepar trahit sanguinem existentem in dextro ventriculo cordis, purum, & clarum, & ab omni superfluitate denudatum, ex quo in ventre sinistro fit vitalis spiritus: vnde sequitur spiritum de

fectus. Igitur materia pluribus vicibus euacuanda est; in omni enim euacuatione tam nocitiua, quam iuuatiua natura multum laborat; quia multum resoluunt de instrumenti virtutis. Et ideò Gal. dicebat; Quando bene maturatum videris apostema, ad sectionem securus deuenies, iuxta loci vel membri qualiatem, & magnitudinem apostematis; si vna, si duabus, si tribus, vel eo amplius sectionibus, vel plagis secandum sit. Et secata, non semel tantum euacuabis materiam, præsertim si grandis fuerit

abscessus, sed partim, vt non defectus patiat. Et rursus; Defectus animi sæpe contingit ex abscessuum disruptione, aut sectione, ex superflua euacuatione. Cum igitur magnam perforas exituram, materia tribus, aut quatuor vicibus euacuanda est, vt clarè etiam docet ipse Gal. in 6. par. Aphor. in com. 27. similiter, & Hypp. in eodem Aphorismo. Facta perforatione, euacuata materia, si sanguinis aliquis apparuerit fluxus, constringatur cum albumine oui, aut cum astringentibus sanguinem. Ideò, di

cebat Auic. Incisor medicamenta, sanguinem adstringentia, apud se præparata habeat, ac emplastra dolorem mitigantia, & instrumenta ad id idonea; Habeatque secum aliqua, vt sunt medicamina Galeni, velut pilos leporis, & telas, seu stamina araneorum, & album oui. Si autem fluxus non apparuerit, vitellum cum albumine oui imponatur ad maiorem loci confortationem, pro prima tantum medela. In secunda autem visitatione, saniem inspicias, nunquid fuerit laudabilis, vel mala, quia digesta innatæ caliditatis dominium declarat: Vnde facilliter possunt partes vniui. Ideò Gal. dicebat; Post excisam cutinè medicamentò, quod Græci thuris mannâ vocant, affricat partem implebimus; est autem ea purgamentum thuris. Et rursus ait; si videris ea, quæ circa sectionem sunt, libera inflammationem, medicamentis, quæ emplastrica dicuntur, vt. Fit autem eorum vis ad exsicccandum habilis; careant etiam

morfu. Cellus dicebat; Vbiunque medicus, ex quacunque causa eutem excidit, pure effuso in alis, vel inguinibus, linamento opus non habet, spongia ex vino imponenda est. In cæteris partibus, si æquè ea linamenta superuacua sunt, purgationis causa paulum mellis insundendum, deinde glutinantia superdanda, si illa necessaria sunt: super ea quoque similiter dari spongia eodem modo ex vino expressa debet. Auic. verò dicebat; Et cum aperitur abscessus, & extrahitur id, quod intus erat, non debet admoueri ei oleum, neque aqua, neque linimentum, in quo sit oleum, neque seum abundans, vt est vnguentum basilicum: sed debet apponi velut linimentum ex chalcitide. quod fiat, cum eo indiges, & supra ipsum imponat spongiam madefactam in vino austero. Non esse approximanda pinguiori vulneri post sectionem, iubent etiam Gal. Paulus, Cornelius, Rasis, Albucasis, & Auic. sed procedendum esse cum exsicccantibus, aut cum diachalciticos, aut lsis, aut cum aliquo ex his, quæ describuntur ab Actio.

Sed cum in sectionis circumferentia aliqua apparet inflammatio; aut dolor, vel pus non maturum, aut malum apparuerit, aliter procedendum est. Nam sic docet Gal. quando hæc apparuerint, prius mitigare incitiam partem, sicut dictum est, quantum poscere videbitur, oportet fomentis primum, deinde cataplasmate, mox humectante aliquo medicamento, aut non siccant extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere tum mannâ, vt dictum est, tum ex præsidij, quæ lintecolis excipiunt, primum ea, quæ pus citant, deinde ea, quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ si cauitas etiam sit, quæ impleant, adhibenda sunt: sin aliter, ea, quæ cicatricem inducunt, Græcè synulotica, & epulotica vocantur: veluti quod ex cadmia conficitur. Et ideò sileant, qui digerentium medicaminum applicationem viruperant; nam talia sunt, quæ pus citant; & conuenit hæc operatio propter duas causas. prima vt labia, & parietes abscessus aliquantulum aperiantur: vt si qua cruda materia in eorum substantia continetur, digeratur. Item ex frigidorum medicaminum appositione, in sanguinis hæmorrhagia, incrudantur, conspantur, & infripidantur labia secti vulneris, vnde opus est ea digerere, & præparare, vt pristinâ recipiant vniuitatem. Digerere enim est præparare, & non putrefacere, vt aliqui dicunt. Item a tali medicamine dolores ledantur, & locus confortatur. Conueniunt ergo vsquequò bona apparuerit sanies: & vulnus aliquantulum rubescere, vt desiderat Gal. Fit tale medicamentum ex glutine alborum, & vitello oui, & dicitur vnguentum Etheleos. Aut R. theribentij claræ 3. ij. vitellum oui, mannæ thuris 3. ij. olei rosati parum in magno dolore. Remittitur enim nirostas theribentine ex ouo, & oleo rosato. Apparente verò digestionem, ad ea, quæ expurgant, deueniendum est, quia dicebat Gal. & Auic. Oportet, vt administrantur medicinz facientes nasci carnem, cum iam mundificatus est locus à fordiciis, & fi-

- 10 milibus. Quod clarè declaratur a. de med. per gen. vbi de Emplastris glutinantibus. Vnde R. the-  
 rebentina: clara: s. ij. vitellum oui, mellis rosati s. i. s. succi apij s. i. bulhian: parum, & adde farina:  
 hordei s. ij. boli ar. s. ij. croci s. i. & fiat vnguentum. Aut R. farina: hordei, mellis crudi an. s. ij.  
 succi apij s. i. croci s. s. misce. Aut R. mellis rubri s. vj. thebentine: clara:, farina: hordei an. s. ij. far-  
 cocolla:, olibani an. s. i. vitellum oui numero i. croci s. s. misce. Et si desideras maiorem mundifica-  
 tionem, addas vni istorum medicamentum parum Aegyptiaci. & Actius scit. 14. cap. 31. post tumoris  
 sectionem iubet, vt repurgantibus medicinis locus regatur, inter quas laudat medicamentum Aegi-  
 ptium. hoc verò habet, thebentina: clara: & liquida:, mellis, & olei rosati an. partes equales simul  
 liquatas. Valet etiam vnguentum cerasae, Apofolorum, lisi, & similes. Et cum apparuerit locus  
 mundificatus, ad carnis productionem deueniendum est, cum vnguento basilicone, vel regali ex Scri-  
 bonio, Cornelio, & Paulo: Aut R. sepi castrati s. vj. olei rosati s. ij. cera: s. ij. yreos, rosarum rub. s. ij  
 thuris, sarcocollæ an. s. s. aristolochia: rot. aloes succotrinii an. s. ij. thebentine: s. ij. misce, & fiat vng-  
 uentum in bona forma. Aut R. vnguenti de cerussa s. ij. sand. alborum rub. boli arm, terra: sigil-  
 lata: an. s. j. camphora: s. ij. olei ros. parum, cera: q. s. pro vnguento. Aut R. opoponacis s. j. ta-  
 sura: telæ: cartæ adustæ an. s. s. vini opini, mellis, olei mirrhini an. s. i. s. aloes, sarcocollæ, mirrhæ  
 an. s. iij. cera: q. s. misce, & fiat vnguentum secundum artem. Vltimò ea, quæ cicatricem inducunt,  
 vtriusque sunt, sicut cerotum triapharmacum Græcum, aut de minio, aut aliquod magistrale: Vnum addunt  
 Auic. & Paulus, quod si inuenieris sanie corruptam, & putrescentem, non est exulatio, quin laues lo-  
 cum cum aqua mellis, aut vino mellite, aut oxicato. Et Gal. non solum laudat has medicinas, sed  
 & lixiuum: & dicit, cum locus fuerit mundificatus, ad paracolefem venire oportet, id est ad partium  
 30 vnionem.

Lib. 4. cap. 18.  
 1. ad Glau.

# DIGRESSIO.

- Forè autem tota cura huius passionis est in partium vnione; Ideo Auic. dicit; Cum perforaueris exi-  
 turam, & extraxeris, quod est in ea, tunc necessarium est, vt tu succurras ad conglutinandum curem  
 cum carne, vt non rumpatur, & indurescat: & fiat taliter, quod non conglutinetur, quare fiat sinus,  
 quæ non cesset impleri, & redeat similis exitura: primæ. Idem & docet dixit Rasis. Et verè cum inci-  
 duntur, & non mundificantur, non implentur, & sunt de genere fistularum, vt demonstrat Gal. nam  
 fistula est sinus concauus, cuius labia sunt indurata. Et alibi; Quando subexcoriat particula pus,  
 & distat eam facit à tubiculis, & demum euacuato eo secundum quencunque modum, non sunt po-  
 40 tentes, quæ distant, partes pristina: assumere consistentiam, nominatur hæc passio sinus: si verò quæ  
 non citò ipsam euacuauerit, & cicatrizauerit, fit durus, & non est possibilis conglutinatio. Nam qui-  
 per fistulam aliqua subnuit, rursus impletur, & fit iterum, quod à principio erat, apostema. Igitur,  
 cum reiteratur pluries materia in aliquo loco, & euacuatur, & iterum inouatur, propter talem inno-  
 uationem acquiritur vna quedam mala qualitas, sicca, & vna quedam dispositio obstruosa, quæ con-  
 solidationem impedit. Et hæc passio à Gal. sinus appellatur. Et sequitur: est autem fistula strictus, &  
 longus sinus, contractionem, & duritiem patiens. Fuit declarata hæc passio ab Hypp. ab Actio, &  
 à Principe, de qua Deo fauente erit sermo in proprio tractatu ad plenum, & cap. de cura vlceris ca-  
 uernosi. Restat, vt de modo aperiendi exituras absque ferro, aliqua dicamus. Hoc opus dupliciter  
 fit, aut caustico, aut maturante medicamento vsque ad cutis apertionem; & tali vimur in superficialia.  
 50 si tumore, à cuti capitis: & sunt de genere illorum, qui non indigent perforatione, nec ante, nec post  
 saniofitatem: quorum materia est subtilis, calida, & facilius ad cutaneas partes deducitur, aut ex se  
 est superficialis: non autem in profundo, quia tunc ad caustica deueniendum est. Horum medicami-  
 num aliqua sunt debilia, & nonnulla fortia. Quando enim aut ratione loci (vt gula:, testium, loco-  
 rum neuroforum, aut nobilium) aut propter ægotantis timorem, (vt mulierum veterum, & puero-  
 rum) exituram rumpi desideramus, non nisi coacti deuenimus ad fortes medicinas; quia sua calidita-  
 te in membro quodam introducunt discrasiam: debiles verò suam longo tempore offendunt opera-  
 tionem. Et si incuncta materia fuerit maligna, partes sibi vicinas corrodet: vnde generantur vlcera  
 maligna, corrosiua, & maiorum modorum. Verū est, quod si exitura: contingunt in membris, in in-  
 cisione quorum est timor, ad talem operationem deuenire oportet. Et in primis considerare opus est,  
 60 nunquid exitura sit salua, aut perniciosa, & maligna; quod ex natura, & prauitate accidentium co-  
 gnoscitur potest: salua: enim rumpuntur ab aqua calida: aut huius ingenijs, R. radicum liliorum alborum  
 numero 11. mellis s. ij. radicum harundinis s. ij. olei liliorum, colosonia:, forditiæ valorum apum an.  
 s. i. s. misce. Radices, & frondes pedis coruini idem faciunt. Similiter mel anacardinum cum pice na-  
 tuali, deductus in mortario. Calx viuæ cum sapone idem facit. Aut R. ammoniaci s. iij. cera: s. ij. glu-  
 tinis alborum, sulfuris citrini, niri an. s. s. misce, & fiat medicamentum. Proponit & Auic. medica-  
 mentum, quod dicit à se expertum fuisse, & est hoc, R. medullam granorum coti, nucem rancidam, fer-  
 mentum, caules, radices liliorum decoctas cum sinapi, & fimo columbino. Valet & diaquilon solu-  
 tum in mucilagine sinapis, cum hucus, & sale. Et semen vtriusque cum sale am. rumpit sine dolore.  
 Multa à Paulo dicuntur, & laudat rad. narcissi in polinem detrita, & in mulla cum irino decoctam; vel

3. sic. 4. c. 19.

7. ad Alm. 3.  
 2. de moror.  
 cap. 4.  
 1. ad Glau. d. 2.  
 cap. 1.

Lib. de Fistula  
 Lib. 14. cap. 5.  
 4. de tr. 3. cap. 4.  
 Lib. 3. inuasa  
 voluimus.

3. f. 4. cap. 19.

Lib. cap. 18.

teneram calami radicem cum melle: vel aristolochiam cum pice, melle, & popoline. Vide locum. Et si quis desideraret exituram aperire potentiali caustico: & maxime talem, qualem Gal. Cornelius, & Paulus astherocema meliceris, & adipinum appellant, videat infra tractatu 3. cap. de cura nodi, quia ibi horum medicaminum nonnullas inueniet descriptiones. Et ego aliquando in loco valde neruoso dum exitura esset profunda, quæsiui eam aperire caustico: quod si ad cauitatem non penetrauerit, reliquum ferro secare decreui, & bene succelsit, cum paucissimo dolore. Deinde locus digestus, & bene mundificatus, ad cicatricem de facili peruenit. Sic fieri debet in bubone, materia cruda existente, aut à prædominio, aut à subdominio. Et laudatur hæc via ab Arist. primo Problematum, & maxime in locis summe sensitiuis. Idem Rasis, Auic, & Paulus asserunt.

13. com.  
3. l. 4. cap. 39.

## ADDITIO.

Concedunt Gal. Paulus, Rasis, & Auic. quod sanies digesta, nisi proprio cōtineatur chisti, possit adhuc resolui. Quod credere difficile est, cum sit superflua in sinu contenta, derelicta ab vltima digestionē, quæ fit in membris, nec potest iterum venas ingredi, cum sit grosse substantiæ, nec potest conuerti in nutrimentum, cū acquisierit dispositionem quandam præter naturam. Tamen multi polliciti sunt pluries vidisse talem euaporationem, quibus suffragatus est Gal. & Actius. Et dicunt, quod membra, dum præcesserit aliqua inanitio, loco indigentie ex sanie nutrirī possunt, cum laudabilis fuerit, & propē aliquod membrum incuncta, in quo virtus attractiua fuerit fortis, sicut iecur, & ventriculus, & propē attracta in ipsis talis materia possit de nouo præparari, vt fit de pituita, cum ad bonum conuerteretur sanguinem. Et tancō magis sanies resolutioni erit apta, quantō fuerit benigna, & laudabilis, & superficialis, & calor extraneus non multum potens super eam, & corpus temperatum, rempus æstiuum, & regio calida. Operantibus sæpe aduenit in sectione tumorum, qui ex toto ad coctionem deuenisse creduntur, cuius materia sanguinea est, nec multum à naturali calore derelicta: & cum eos secare credunt, materiam resolutam inuenere. Non propter hoc dico, quod debeamus sectionem, cum fuerit opus, tardare: quia resolutiones de raro contingunt propter oppilationem pororum à materia diuersa: & si contingant, non nisi longo tempore, & cum periculo, ne materia putrida circumstantes regiones de nouo corruptat, id facere solent.

Docent Doctores nonnulla medicamina ad talem operationem: Quare dicebat Gal. Cum medicinis, vt resoluatur sanies. Fit Auic. dicebat de medicinis resoluentibus saniem: est omne calidum resolutiuum iteratum super membrum, cum ratificatione membri, & raritate eius, cum euaporationibus facientibus illud de illis, in quibus est humiditas calida: & quantō plus resoluatur, emplatretur multo durities ipsius, quia necessarium est, vt administrantur lenientia sola, & medicinæ resoluentes saniem sunt de lumina albaaurach, & sinapis, & stercoris auium, & arsenici, & calcitidis, & corderumeni. Et cum eis misceatur thus, glutinum albotim, & mastix cum aceto, & oleo antiquo: Aut ex pirethroy, staphisagria, baurach, & melle: Aliud ex Scribonio, Paulo, & Auic. R. lapidis piritis, ammoniaci triti, an 3. xij. iocenti, id est farinæ fabarum 3. vj. picis liquidæ q. s. pellicule illorum imponitur. Splenium verò non prius auferatur, quam sua sponte deciderit. Et oportet, vt administretur statim, quoniam citò exsiccat. Aliud Auic. R. salis ammoniaci ʒ. iij. bezahar, id est galbani ʒ. s. lythargirij ʒ. iij. olei an tiqui ʒ. iij. s. fiat linimentum: Aut R. picis, baurach, rhu, adipis tauri, baccarum lauri, calcis viuæ partes æquales, misce. Medicamentum Rasis, marchesita trita in aqua, in qua dissolutum sit galbanum, fiat linimentum. Aliud eiusdem, quod resoluuit saniem, & non comburit cutem: & fit ex aristolochia, lana vsta, thure, nitro, modico therebentine, oleo de Cherua, & cera. Sequitur Paulus, & Auic. & quando non conferunt medicinæ, sicut prædiximus, necessarium est perforare, aut cauterizare. Et hæc satis ad Dei laudem.

13. com.

## De furunculo. Cap. V.

3. l. 4. c. 1.  
Cap. proprio.



**F**URUNCULUS, sicut dicunt Auic. & Mesue, est tumor sanguineus ex sanguine laudabili, subtili. Eius signa sunt, tumor parvus, sine pulsatione, coloris rubei, pincalis, & acutæ figuræ, doloris pungitiui, ad modum punctiōnis spinæ: quare interdum dicitur spina, vel clauus, vel aldememul, aut aldemurenul, vel adenul, aut carbunculus, aut dohieneceph apud Græcos.

## DIGRESSIO.

Dicebat Auic. à sanguine laudabili subtili generatur phlegmon, quod accipit cutem solam, & est spina, & non est cum pulsatione. Diuus Mesue cap. quod intulatur, de phlegmone, quod spina dicitur, vel clauus, aut aldememul, dicit: quod est apostema phlegmonicum, id est accensum ex sanguine laudabili, subtili, à corpore induxo ad subcutaneas partes, quod subtilitate substantiæ in carnosius partibus non remanet, sed ad curancas pertransit, & colligitur in suis poris densatis, vt nequeat respirare. Vnde

1. l. 4. cap. 1.



- 10 Vnde Auic. dicebat, hæc passio est de genere exiturarum, id est de materia sanguinea, quæ propter sui qualitatē, facillimè peruenit ad exituram. Dicit Cellus; Furunculus est tuberculum acutum, cum inflammatione, & dolore, maximèque ubi iam in pus vertitur. Et cap. de phimatis dicit; Furunculus oui dimidij magnitudinem raro explet, nunquā excedit. Et Paulus dicebat; Furunculus tumor est, abscessum præferens, qui interdum ex crassis humoribus in carnosus plerumque partibus concipitur; mitis quidem, cum in sola cute coit; pericula autem, malignusque, ubi subiectæ radicibus in superficiem erumpit. Eius causa semper interna est; nam, ut dicit Auic. fit ex malita digestionum, & ex motibus super repletionem, & quæ currunt cursu illorum. Volebat Rasis, quod aldemenui sit genus apostema res calidi, quod multiplicatur in eo, qui vitur multum cibis generantibus plurimum, & maxime in his, qui afflicti erant phlebotomari, & dimiserunt. Dicit Hipp. Quibus febres longè contingunt, his tubercula, vel labores fiunt in articulis. Et sequitur; Quibus tubercula, vel in articulis labores fiunt, hi pluribus vtuntur cibis. Et Gal. Qui vtuntur nimio cibo (ait) reddunt ventriculum debilem; Vnde rationabile est his repletis, & plethoricis euenire, & maxime ob virium imbecillitatem, vt in convalescentibus sepe aduenit. Primum, quod notatur in hac passione, est discrenia eius à phlegmone ratione causæ materialis; quia hæc à sanguine subtili, illa à grosso; & ratione aliquorum effectuum, quoniam hæc passio ferè semper erumpit sine ferro, & ex se. ut dicit Cornelius; maturefcit enim per se, atque erumpit, sed dolorem efficit crudelem. Secundum est materia contenta; nam in phlegmone pus inuenitur, in hac verò passione quedam materia grossa, ad instar corrupti perui. Et Cornelius dicebat; Vbi adperius est, & exit, super apparet pars carnis in pus versa, corrupta, subal bida, aut subrubra; & in eius apertione plurima apparent officina. Si talis passio (dicebat Rasis) cum debito regimine non pertrahatur; malignatur; & cum talis aduritur, in carbunculi naturam facillimè transfit. Dicebat Gal. Cum putrescit sanguis, pars tenuissima in pallidam bilem, crassior autem in atram, vertitur, quemadmodum accidit in carbunculis; etenim in his sanguis vehementer putrescitur mutatur in humorem melancholicum. Dicit etiam Auic. cap. de cura aldemenui; Non oportet, vt sit negligentia in curatione aldemenui; quoniam multoties conuertitur ad exituram magnam; & deteriores sunt, qui sunt profundioris; & cum corrumpitur sanguis corruptione venenosa, accedit ad naturam anthracis, & tunc color liuidus, aut niger apparet; sic voluit Rasis in diuisionibus, cum dicit; Cui ergo accidit aldemenui plurima, aut post exituram tremor in corde, aut nausea, aut sudor frigidus, tunc illud signum est malum. Sciendum est, quod talis inflammatio est peior phlegmone; peior, dico, quod ad subitoam introductionem malorum accidentium propter eius materiæ malignitatem; non tamen ita per durat, sicut in phlegmone grosso.

De cura furunculi. Cap. VI.



ITEM est, quod fit talis inflammatio non regulatur, ad malignitatem perducitur. Et Alpharabius in sua practica dicit; Hoc apostema est magis difficile; phlegmone; nam possibile est, quod interficiat. Vnde pro eius cura tres teiulant intentiones: prima est regimen victus in rebus non naturalibus; secunda est remotio causæ coniuictæ, quæ vt plurimum fit talis; tertia est, sanatio accidentia, quæ in tali morbo apparere solent, corrigere.

DIGRESSIO.

- 10 Dicit Alpharabius in sua practica, & Rasis in diuisionibus; In his minoretur cibus, & propriè carnes, & confectioes de melle, & lac, & vinum; & cibus ad acerositatem declinet; & respiciat se patiens à nauicatua facietate, & superfluo exercicio, & præsertim post comelionem, ne corrumpatur digestio. Si verò fuerit necesse (dicebat Rasis ad Alm.) vt patiens bibat vinum, tale fit clarum, & limphatum. Ex his autem, quæ eos generari non permittunt, sunt venæ sectio, interdum cucurbitularum appositio, & venæ solutio cum mirabolanis citrinis, diaphinicone, thamarindis, cum decoctione prunorum, fenug, fumarie, & similibus rerum. Credidit Alpharabius, quod eius causa fit sanguis corruptus, mixtus cholæræ, & aliquando nigra cholera. Et Rasis dicit; Quando talis sanguis fit grossior, 60 per admixtionem, erit magis ardens in concutitate corporis; & tunc est crudelis, & malus, & est de genere carbunculorum: Tunc euacuatur patiens, quia & Princeps cap. proprio dicebat; cura eius est euacuatio secundum quantitatem necessitatis phlebotomiæ, & solutionis ventris. Vnde Auer. In carbunculo (ait) ebullit sanguis, & putrescit; & propterea de necessitate inducit febres pestilenciales; & eius medicatio fieri debet cum duabus speciebus euacuationis, vt pharmacis, & phlebotomia. Aperiatur igitur basilica eiusdem lateris, & sanguis secundum indigentiam extrahatur; deinde pharmacetur. Et ad summum, dicebat Rasis; Oportet, vt in initio regatur cum eis, quibus tegitur apostema calidum. Et Mesue dicebat; Et cura eius est cura phlegmonis, vt fecetur vena, & euacuatur materia, quæ stat sub causa antecedenti; quæ verò fluat ad locum impellatur. Vnde Princeps cap. de cura aldemenui; Quando apparet aldemenui (inquit) tunc eorum cura circiter tres dies est cura apostematum

sternatur calidorum. Et Rasis in diuisionibus dicebat: Si autem pertranscunt tres dies, & non exte-  
nuantur, id est non resoluntur; sed permanet eorum pulsatio, & febris: tunc est necesse, vt sanici col-  
lectionem faciant: quare inuenitur, vt velox fiat eorum maturatio, & apertio. Et Auic. dicebat: Dein  
de post illud, id est post tres dies, oportet, vt sit occupatio in resolendo, & maturando: fortasse enim  
resoluitur, & illud est secundum minus, sed maturatur. Et verò est ita secundum minus, quod nun-  
quā resoluitur, cum sit res ex toto præter naturam. Nec Doctores villam de resolutione memoriam  
fecere: sed bene de maturatione. Ideo cum medicus celebratis euacuationibus, in latitudine trium die  
rum, cognouerit causam posse repelli, vtatur medicamine ex oleo ros. aceto, & humano lacte: Aut  
R. boli armeni, sanguinis draconis an. 3.ij. li. hargirij argentei, pulueris rolarum an. 3. s. olei violati q. s.  
pro emplastro, & vtere. Et si materia resolutionem petat, eo medicamine vtere, quod fit ex flori-  
bus chamomeli, passulis, melle, & baurach, siue nitro.

Si verò natura materiam ad extra expellere cupit, & morbus ad sanici declinat, dicit Auic. quod  
ex pulsatione cognoscitur, tunc necessarium est maturare, ergo adiungetur ad illam. Et Rasis ait: Cum  
accidit aldemenul, non est necessarium, nisi, vt in ipsius maturatione studium impendatur. Idem di-  
cit Celsus. De maturantibus bonis, dicebat Auic. hoc est, R. feminis almaru, id est lingæ bouis, triti,  
psylli an. 3. i. lactis fici 3. iij. far. fen. græci, sem. lini an. 3. v. fermenti acetosi 3. i. olei veteris 3. s. s. omnia  
decoquantur in lacte, & fiat emplastrum; hoc enim maturat, & aperit. Dioscorides dicit, quod fer-  
mentum tritici, cum sale decoctum, maturat has passiones. Idem facit triticum masticatum ex Prin-  
cipe cap. prop. quod laudarunt etiam Galenus, & Paulus. Aut cathaplasma ex far. feminis lini, fi-  
mo columbino, & fermento, cum scibus, aut caricæ cum passulis, & melle. Dicit Auic. Cum al-  
demenul difficulter venit ad pus, phlebothoma venas, quæ imbibunt ipsum, deinde ventosa locum; Et  
non facias hoc in principio; quoniam egredietur sanguis virulentus, & retinebitur grossus, & fiet illic  
vlcus durum. Et quando maturatur, & non aperitur, perfora ipsum, aut cum causticis, aut cum ferro,  
vt dictum est de modo aperiendi abscessus: sed de bonis erumpentibus est sem. lini, simus columbinus,  
& fermentum. Cornelius laudat galbanum, resinam, & fermentum.

Et quia in eorum maturatione dolores acerrimi contingunt, deinde praua accidentia euenire solent,  
vt dicit Rasis: ideo bonum est, membrum supra tumorem aliquo defensiuo illinire per spatium quattuor  
digitorum, & vltra. Super locum autem tali vtere cathaplasmate, quo pluries vsus sum. R. capi-  
tum liliorum alb. 3. vi. radicum buglossæ tenellæ 3. ii. foliorum maluarum, & violarum an. m. i. hæc om-  
nia in sufficienti aquæ quantitate decocta, & expressa pistentur, & cum farina hordei, feminis lini fiat em-  
plastrum solidum ad ignem sine addendo, butiri recentis, olei violati an. 3. ii. pinguedinis gallinæ 3. iij.  
virella ouorum numero ij. croci 3. s. Et vtere, quia valet. Digesta materia, & extracta, curetur, vt  
docet Rasis, mundificetur locus cum vnguento de melle sup. descriptionis, quod fit ex melle, sarcocol-  
la, & farina hordei an. p. æquales. Hoc vnguentum (dicebat Rasis) omne vlcus saniosum mundifi-  
cat; & cum carbunculus fuerit mundificatus, ipse perse citò solidabitur. Et Celsus dicebat, Expressio  
pure, nulla vltra curatio necessaria est. Tamen si consolidatio tardauerit, cum aliquo vnguento ex car-  
nem producentibus consolidetur. Et ex Mesue, bonum est, semper locum oleo rosato inungere. Et  
ex Rasi, ex albo vnguento illinire, quia malam complexionem derelictam remouet: sed cum sapit na-  
turam veneni, eius regimen est, vt de anthrace cum Dei auxilio infra dicemus.

## De panaritio. Cap. VII.



**P**ANARITIUM, sicut dicit Auic. est apostema calidum, exitiale, cuius materia est  
sanguis subtilis, qui in lateribus vnguium, aut extremitatibus digitorum expelli-  
tur, & ibi tumorem causat accensum, dolorosum, non multæ, eleuatur ve dimen-  
sionis, subitæ materiæ: cum quo, vt plurimum, ossium caries subsequatur, & fe-  
bris, & alia symptomata vna sunt. Hæc passio à Græcis interdum paronichion  
dicitur, multoties autem pterigium vocatur. Verum tamen est, quod pterigium,  
vt dicit Paulus, carnis incrementum est, aliquam vnguis partem operiens; Panari-  
tium autem, vt idem testatur, vel paronichia, est abscessus, qui ad reducia vnguium  
coit, vnde passio reducia nuncupatur.

## DIGRESSIO.

Aliquando in vnguium circuitu, dicebat Rasis, & Auenzoar, apostema calidum, exitiale, rubeum,  
inflammatum, & dolorosum valde fieri contingit: quod aliquando viceratur, & perducit membrum ad  
corruptionem, cum fluxu humoris virulenti, & foetidi. Et Auic. dicebat: Cum hæc accidit, est timor  
digni. Dicit Rasis, ex eo plerumque accidit febris, & pertingit dolor vsque ad loca, quæ sunt bus ascel-  
lis, & in inguinibus. Et non ob aliam causam sunt adeo crudeles hi dolores, nisi quia talis materia est  
sanguis subtilis acutus, qui cum à calore nativo derelinquitur, accedit ad veneni naturam. Et talis non  
tantum in musculorum, & neruorum, vel cordarum substantia insigit, sed, & ossium: vnde vt pluri-  
mum

9 ad alm. 4. 19.  
Thuris cap.  
vltimo.

p. 4. m. 4. c. 8.

Lib. 3. cap. 91.

69

10 mium corrumpuntur. Sunt accidentia in istis tumoribus adeo faua propter eorum compositionem, & paupertatem caloris, cum hæc membra à fonte sint valde longinqua, & in extremitatibus digitorum sunt capita, & extremitates musculorum, cordarum, nervorum, artheriarum, & venarum. Dicitur Gal. & Auic. Scire debes, quod apostemata, quæ deteriora habent accidentia, sunt, quæ in membris contingunt nervosis. Digni sunt membra sicca, & carnis paupera, ac in eis paucus reperitur calor, à quo extraneæ humiditates regularur. Talis verò succus, dum tali in membro coaceruatur, resoluti non potest, etiam quod fit subtilis, & remanet ita furiosus, & faua adducit accidentia, & interdum mortem. Dicit Auenzoar: Huius ægritudinis reperitur quædam species mala valde, quæ corrodit extremitatem digitorum, & sæpe ad totum membrum corrosio extenditur. Potest hæc passio poni sub titulo de spinea ventositate; cum semper ossa corrumpantur: & eius principalis malitia est in osse, aut

3. de loc. aff.  
2. de 1. de 3. de 1.  
cap. 11.

30 in eius tunica, aut in nervo, & semper ab interiori causa procedit.

### De cura panaritij. Cap. VIII.



N cura istius passionis, tres requiruntur intentiones: Prima regimen victus in cibo, & potu. Secunda est corporis euacuatio secundum indigentiam. Tertia tumorem secundum temporis diversitatem gubernare, corrigendo accidentia, quæ ad eum consequi solent.

#### DIGRESSIO.

30 Diæta tenui, & frigida in hac passione vti, ab omnibus laudatur: & vt docet Auic. dimittendo vinum, & carnes, & omnia ea, quæ sanguinem subtilem generare possunt. Dicit Rasis: Si diu est, quod patiens non fuerit phlebotomatus, phlebotometur. Vnde Auic. dicebat: Si ne cessaria fuerit phlebotomia, aut ventris solutio; fiat: imò Auenzoar dicebat: Et si non fueris sollicitus, & studiosus in euacuatione, antequam deueniat ad maturationem, & corruptionem, parum proficiet ei cura. Apparentibus igitur conditionibus phlebotomie, secetur vena basilica in principio tumoris, lateris diametraliter oppositi morbo. Et si corpus fuerit plenum, euacuatur cum calida, elle

7. ad alm.

2. Thea. vltimo

De localibus multa dixit Aetius, & subdit Auic. Locus regatur, sicut reguntur cætera apostemata calida, in obseruatione principij, augmenti, status, & declinationis. Sic voluit & Mesue. Si possimus (ait) nostra intentio tota sit in doloris remotione. Dicit etiam, quod bonum est vti remedio Gal. in tumoris initio: quod itidem Auic. cap. proprio laudat: Est autem digitum plures in calido aceto submergere: & si siccum erunt furfuris, erit melius: Aut læpe submergatur in oleo calido, vt docet Auic. & Rasis. Et si vehemens dolor apparuerit, locus emplastreus cum mucilagine psylli, extracta cum aceto; cui adde parum opij. Vnguentum de camphora à Doctoribus laudatur. Similiter & gallæ, puluerizate, trite cum aceto, & melle. Laudant Paulus, Princeps, Rasis, & Mesues forditiem aurium cum lycio, quoniam prohibet eius augmentum. Dicit etiam Auic, quod iuvat sæpe ponere digitum in aqua frigida. Ex Rasis, digitum superponere pannum infusum in aqua niuis, aut in niue; quoniam prohibet eius confirmationem. Non oportet, vt diu moretur (dicit Auic.) super infirmandantia; nam ipsa, quando transit hora prima principij, inspissant curem, & obfident materiam, & vehementior fit dolor. Nam ad augmentum tumoris augmentantur dolores: quibus apparentibus, apponantur defensus supra cubitum, aut genu, & supra concatenationem manus, vel pedis, & super locum dolentem, R. vicella ouorum numero iij. quæ prius fuerint elixa, & dura, butiri recentia. 3. ij. farina fenu greci, feminis lini, mucilaginis, maluaufici, an. 3. l. opij, iosciamini an. 3. j. feminum apij 3. s. acci 3. ij. omnia simul pistentur pro vnguento. Dicit Auic. quod medicamentum ex aloë, balsauftis, olibano, gallis, & melle sanat panaritium in augmento. Et ibi dicit Auic. Et non attendatur tunc illud, quod sentitur de caliditate, quantum sit, sicut ignis, imò resoluatur, & exsiccoetur. Vult dicere Auic. quod dum pus conficitur, vehementi accessione apprehenditur locus, & dolor intensus eum molestat: & si apparent talia accidentia, non est procedendum, vt sanies gignatur, sed potius cum resolutis, & exsiccantibus. Multæ ordinationes reperiuntur à Celso, & à Paulo, & hoc medicamentum ambo laudant: R. calchithidis, malicoerij, squamæ æris, ficus pingues decoctas, mellis an. partes æquales. Alter Cornelij. R. carthæ combustæ, auripigmenti, sulphuris ignem non experti, an. pæquales, olei mirrhini, ceræ parum. Sequitur Auic. Et cum accedit maturatio, & est tempus status, super ipsum pone semen lingue bouis, & psillum cum lacte. Ex Rasis in diuisionibus dicebat: Cum maturatur, pone super ipsum, quod generat saniem: sicut tripharmacum ex farina, oleo, & aqua. Sequitur Auic. Cum materia fuerit digesta aliquo modo (quia non est expectanda vltima digestio in hac passione) perforetur perforatione subtili, & parua: vt egrediatur, quod est in ipso. Idemque dicit Rasis in diuisionibus. Et Paulus dicebat: suppuras autem reduuias acu adducta, humorem emittere oportet. Ne forsitan atrox membra talia ex ampla sectione debilitentur, angustum foramen laudant antiqui. Nonnulli verò, vt Celsus, & Albucasis, dicunt, quod locus candenti, & tenui fermento aduren-

Secl. 1. p. 2.  
cap. 8.

D. ubi 137.

Lib. 3. cap. 81.

7. ad alm.

Lib. 6. cap. 19.  
Lib. 3. cap. 81.

Lib. 1. cap. 91.  
dus

dus est, quam operationem multi recentiorum laudant: Tamen, ut millies vidi, ex natura, & malitia contenti humoris tumores isti exasperantur, ut docet etiam Rasis. Cumque expurgata fuerit sanies, quæ iam comotionem receperat, reliqua digeratur cum tali medicamine. R. thebentinæ claræ s. ij. viæl lum oui, croci s. a. mellis crudi, succi apij an. s. j. mirrhæ, aloes, an. s. j. misce. Desuper verò emplastre tur, ut docet Auic. cum rebus stipiticis, confortantibus, sicut lentes, rosæ, & similia. Aut R. rosarum, balustiorum, florum chamomeli, mirthullorum, stachados, an. m. j. bulliant in vino nigro, & hat decoctum, in quo infusus stupis superponatur. Et si accidat, quòd locus viceretur, aloes est de melioribus medicinis. Et dum currit sanies, addas aliquid ziniar, sarcocollæ, & thuris vnguentum de cerussa, aut prædicto digestio, & vtere. Aut R. ex Paulo, lachrimæ thuris, squamæ aris, æruginis ralis an. s. j. mellis s. iij. misce. Illa verò sunt fortia medicamenta, quæ interdum dolorem adducunt. Vnde in duris corporibus, ut rusticorum, & laborantium, possunt vti. In tenellis verò, & delicatis, non, ut mulierum, puerorum, & nobilium. In his verò vrimur vnguento damasceno, cerafeos, aut apostolorum in ipso vkere: deluper verò rali emplastro ex Gal. laudato à Mesue, & Auic. R. pulueris corticum granatorum acetolorum, galliarum an. s. ij. osarum siccarum s. j. stachados, ferulæ campanæ an. m. j. coriæ aris, sisoris aris an. s. j. mellis s. iij. misce. Cum timetur vlceratio, dicit Auic. non approximare vlcere nec oleum, nec aquam, nec aliquid humidum. Et si perambulat corrosio, vtere trociscis calcadicon, ex arsenico, dragantho, flore gris, & calce, quoniam efficcant, & non est melius eis. Et si adhuc currit sanies, non est excusatio à loci sectione: & si fuerit opus, vitione; quam adeo laudat Albucaasis, & dicit, quòd est valde iuuatium. Dicit Auenzoar; Et accidit quandoque in hac passione, quòd cor rumpitur os, & denigratur: quare impossibile est, quòd super illud os possit caro generari, nec condensari, vnde necesse est radere illud os fortiter, & cum rasorio incidere carnem illam totam, quæ est infecta, & corrupta, & subtile regimere. Et cum vlcus eiecerit saniem, emplastra locum cū farina orobis, & melle: & iniunge partes vicinas cum oleo rosato. Et Albucaasis dicebat, Si autem corruptio iam imprimet in os, tunc oportet, ut incidas illud os, & extrahas ipsum: non enim sanatur vnquam, dum permanet in eo os corruptum. Quòd si vides corrosionem, & corruptionem occupare digitum, tunc incide eum in vno odorum: Deinde cura, donec sanetur. Et si vnguis carnem pungit, eam incide. Et si illi accidit pruritus, dicit Rasis, cadet vnguis. Si autem aliquid præbet aut nocumētum, aut impedimentum, fac eam cadere, ut docet Cellus, ut in eorum locum meliores renascantur.

## De anthrace, seu althohoin. Cap. VIII.



**ANTHRA** est tumor, qui subito fit, in principio parvus, inflammatus, sanguineus, ex sanguine malo, putrefacto, fraudulento, & venenoso; particulam, cui accidit, corrumpens, ipsam vlcerando, & innatum calorem corrumpendo. Qui in processu in magnam tumorem eleuatur; coloris rubri, aut citrini, aut viridis, secundum maiorem, & minorem putrefactionem, vel adustionem. Cui sequitur febris, sinepoid, pulsus cordis, anxietas stomachi, vomitus, & sæpe mors.

## DIGRESSIO.

Ex sanguine puro malo, adusto, fraudulento, putrefacto, & venenoso contingunt tumores, v<sup>t</sup> plurimum in locis adenosus, qui à Gal. anthraces, & à Principe althohoin appellantur. Dicebat Gal. hæc passio ab humore grosso, bulliente, deducto ad naturam melancholicæ, fieri solet. & Auic. dicit, cumque exitura ex sanguine corrupto in carnis sit laxis, & sub cellis, & post aurículas, & in inguinibus, vocatur apostema, idest mortiferum. Ex rursus; quando multiplicatur materia apostematis calidi, & magnificatur apostema, tumor est de summa apostematum chumathum, idest venenosorum, & mortificantium; & de summa prædictorum est, quæ dicitur barachiem, idest adustum, vel fuscum; & istæ species malæ, & quæ eis assimilantur. Multiplicantur in anno pestilentiæ. Et hi tumores chumatha vocantur. Sed dicit Auic. quòd hoc nomen antiqui althohoin determinabant super omnem tumorem glandosæ carnis: quarum aliquæ sentiunt, ut maxillarum, & origines lingue; aliquæ verò sensu carent, ut caro glandosæ mamillarum, subascellarum, inguinum &c. Et ralia apostemata cōmuniter, cum non pendunt à materia mala, dicuntur bubones, aut phyma, aut phygethlon. Nam Gal. & Paulus dicunt, tumores laxarum parium, quas adenas medici vocant, sunt sicut bubo, phyma, & phygethlon. Bubo quidem phlegmon est; Phyma autem, quod sitim augetur, atque ad suppuratorem festinat; phygethlon verò est harum partium phlegmon erysipelodes, vel erysipela phlegmonodes. Et generantur hi tumores, ut docent Gal. et Auic. ex materia transmissa in membro principali, in corpore pleno; aut accidit in loco aliquo casu expulsiōis in crisi bus; & fortasse attrahunt ea vlcera, & apostemata alia super extrema, ad quæ currunt materie, in visis quarum necdunt carnes illæ. Quare inuoluuntur cum eis, sicut accidit inguini, & subascellæ ex apostematione anthurum in eo, qui habet scabiem, aut vlcera super pedes, vel manus. Et cum hi tumores oriuntur post aures, à Gal. parotides appellantur, & dicit, parotides quidem de genere sunt phlegmonis, sunt autem

s. ad Alin. p.

auic. n. canon.  
s. de con. med.  
fac. loc.

Lib. 6. cap. 19.

24. metha. cap.  
30  
31. f. 4. tra. 1.  
cap. 17  
Lib. de a. a. holi  
cap. 1.  
3. f. 1. do. 1.  
cap. 5.  
3. f. 4. tra. 1. c. 1.  
3. f. 4. tra. 1. c. 1.  
cap. 19.G. d. ad. Gm.  
cap. 1.  
Paul. 4. 2. 1.11. metha. d. 1.  
s. cap. 1.  
3. f. 4. tra. 1.  
cap. 19.

autem

- 10 autem adenibus, quæ sunt secus aures, phlegmonantibus. A Principe verò fugillie dicuntur: & dicitur, fugillie est de genere apostematum glandolorum, & hoc nomen appropriatur illi, quod fit post aures: Secundò dicitur de tumore malo, qui in omni membro, & si non fuerit glandolum, oriri potest. Ideo dicebat Auic. talis est tumor calidus perdens, idest periculosus, & corrumpens: Et talis dicitur carbo. Gal. & Paulus dicunt, cum verò sanguis calidus sufficienter fluens exierit, & crassus, quodcumque membrum subito occupauerit, hoc comburendo, facit vlcus cum crusta; quicquid verò circumiacet, in inflammationem leuat; & effluenscentem, grauemque dolorem infert; vocat autem carbo huiusmodi di passio. Cum verò sanguis niger exierit, crassiusque, ac fusculentus, ac feruens, qualique antea di ximus; simul autem & humiditates nonnullas tenues admixtas habuerit, pustulas quasdam per summa cutis excitat, similes ipsi, quæ ex igne fiunt; quibus disruptis, crustosum sub ipsis vlcus inuenitur, etiam hoc carbo est. Rursusque dicebat; est autem & aliud vitium, quod ex humore crasso, feruentique nascitur, incipitque hoc plerumque à pustula, aliquando verò & sine hac, ceterum inter initia, quibus hoc instat, scabunt particulam omnino, mox oritur pustula quadam, qua rupta, vlcus cum crusta gignitur: quod vlcus, exanthema dicitur. Sepe verò non vna oritur scabientibus pustula, sed multæ exiles, veluti milij semina, crebre in particula residentes, quibus perturbatis, similiter crustosum vlcus proenit. In carbunculis verò, qui per Asiam populatim sunt grassati, etiam circa pustulam nonnullis excoerita stant tim cutis est: omnibus tamen, ut dixi, crustosum vlcus fit, modò crusta ipsa cineris colorem præferentem, modò nigrorem. Omnibus præterea his circumposita caro in summam peruenit inflammationem, non tamen coloris aspicitur erysipelatis; immo qui adhuc phlegmonis colorem fit nigror, veluti si plusculo rubro minus misceatur nigrum. Et talis crusta à Gal. appellatur Ephelcida. Celsus de carbunculo sic dicit: minus hæ notæ sunt, rubor est, superque cum non nimium pustula eminent, maxime nigra, interdum subfluida, in his sanies esse videtur, infra color niger est, ipsum corpus atidum, & durius, quam naturaliter oportet: circa quem quasi crusta est, eaque inflammatione cingitur, neque in eo loco leuatur cutis potest, sed inferiori carni quasi inhaerens, sonus vrget, nonnunquam horror, aut febris oritur, aut vtrunque, idque vitium subteractis quasi quibusdam radicibus serpit. Quod autem dicebat Gal. ne cessari febrecitare, qui ita sunt affecti: idque non minus, immo magis quam illi, quibus erysipelatosus est phlegmone, id vitæ latere neminem potest. Vnde Auic. dicebat, carbunculus verò, eo quod pro maiori parte fit in aere pestilentiali, ebullitque sanguis, & putrefit; de necessitate inducit fibres pestilenciales. Huic tumori inest aliqua materia venenosa, & ideo habet potentiam perdendi hominem: & si non alia, saltem est eius permixturio ad bilem atram, vt docet Gal. dicens, carbunculum ex calido quidem esse feruere, verum crassa materia constitutum. & alibi; carbunculus periculosus est affectus; nam ex vitiolis constat humoribus. Præterea dicitur de tumore pernicioso, propter conuersionem eius humiditatis ad substantiam venenolam, quod corrumpit membrum, & alterat colorẽ eius, quod lequitur ipsum, & adducit qualitatem malam ad cor ex via arteriarum: quare accidunt vomitus, & pulsus cordis, febris, & sincopis propter fumos eleuatos à tali materia petentes cor, cerebrum, & ventriculum. Et quando talia accidentia fiunt vehementia, dicit Auic. moritur eger, & talis tumor propriè dicitur anthrax, idest petens antrum, hoc est corporis intimum, & propriè cor, qui est in medio, à proprietate suæ venenositatis. Ex ea tora eius natura est asperitudo acuta, & periculosa; quia de materia venenosa, pestilentiali, & contagiosa. Eius materialis causa est sanguis grossus, & malus, qui in termino putrefactionis acquisiuit talem substantiam, accedente calore extraneo, epidimiali: Vnde fit venenolus. Cumque sanguis, dicebat Gal. recedit à natura sua, fit malignus, & quanto magis recedit, fit maioris malitiæ: & in hoc apparent sæua accidentia, quia à putrida re multi generantur vapores, & pauci resoluuntur, quia sunt minus mobiles: & in tali dispositione sunt tumores magni ex vi naturæ in expulsiōne mali succi. Aliquando verò generatur anthrax ex sanguine adusto, in quo non adeo sæua ostenduntur accidentia; cum à re adusta non multi eleuentur vapores: verum est, quod dum sanguis aduritur, fit venenolus, & cum materia est talis, non apparet tumor magnus: sed declarat ex loci feruore, & veficatione, & vitione, & corrosione: quæ ex acuitate rei vltæ proueniunt. Febricitant de necessitate, quæ ita laborant corpora; & talis est putrida, continua, & acuta; quæ delirium excitat, & bilis vomitionem. Simul præcordia intenduntur, labores efficiunt, sudores largi erumpunt, extrema algent, alui profluvia vrgent biliosa, tenuia, & flauofo: vrinæ cernuntur dilutæ, tenues, biliosæ, & nigra, mala habent subsidencia, quæ superinnant, pessima: nares sanguinem destillant, pedus ardet, lingua torrida est, siticulosa, tristitia oboritur, torquent vigilie, conuulsiones violentæ, alia quæ multa praua in hoc morbo apparent. In summitate verò tumoris efchara, sicut efficit facta ab igne, videri potest, in principio paruæ quantitatis, in cuius medio stat nigrities quedam, à qua propter pororum dilatationem virus, & sanguis refudat, cum materia sit adeo acuta. Eius status non pertranfit quartam, nisi cum ad salutem protendit. Dicebat Rasis; cum superfluent hæc accidentia, moritur eger, & maxime dum tumoris color est niger, quia materiam intensam aduotionem significat. Vnde Auic. pronosticando dicit; & saluus aliohomin mortalium est illud, quod est rubeum, deinde citrinum; & ex eo, quod ad nigredinem est declinæ, non euadit aliquis. Rubeus tumor non est adeo mortalis, quia adhuc eius materia stat sub forma sanguinis, nec corruptus, nec adustus, vt in bubonibus. Et cum ma

34. cap. 2.

1. ad Glan. 1.  
Lib. 4. cap. 37.

14. metho.

7. methodi cap. 34.

5. metho. 15.  
7. coll. 31.  
Lib. 9. cap. 34.

1. de diff. remij  
feb. cap. 11.  
3. de morbi val  
gubus com. 10  
3. causæ com. 15

4. Epidem.

1a. diuision. cap.  
111.  
Loco citato.

teria aliquoties potest, vel aduritur, recedit à temperamento, & in tali motu amittit colorem propter agitationem diuersorum calorum, & acquirit colorem, aut citrinum, aut viridè: cui inest aliqua venenositatis, & appellantur carbones. Et non necessariò interficiunt, sicut concedit Gal. quamvis fateatur eius accidentia fore periculosa, vbi dicit, carbunculus vlcus est, crustam citò cum inflammatione totius partis circumque validè faciens; vt febres vehemens, & periculosas inferat: Sed cum materia adeo malignatur, quod color tumoris fiat niger, & regio obscura cum iam dictis accidentibus, fugiendum est, quia materia absolute est venenosa, & adusta. Et eò magis timendum est, cum tumor appareat, & recedit, & maxime in subalcellis, & in inguinibus, & post aures propter vicinitatem eorum ad membra, quæ sunt vehemens principalia. Hi tumores multiplicantur in pestilentijs, & in regione pestilentiali. Omnes verò semper per viam expulsiõis, nunquam autem exacerbatò generantur.

## Dubia de venenositate Humorum. Et solutiones.

Hæc nomina, bubo, phyma, phygethlon, carbo, anthrax, althohoin, parotides, fugille, turfios, chumate, furios, carmaki, & atanguarij. declarant tumorem adenosorum locorum: quorum aliqua salubria sunt, aliqua verò mortifera propter eius venenositatem. Nec dubitandum est, vtrùm materia anthracis sit venenosa, etiam quòd tales rationes sint in contrarium, scilicet, in corpore nostro non sunt causæ venenum producentes, ergo nec venenum, & per consequens materia anthracis non erit venenosa. Præterea si talis materia esset venenosa, pro eius cura scitò veni non competeret, quam concedit Auic. Item si tale venenum generatur, aut fit in aliquo particulari membro, aut vni cū massa sanguinis non in vno membro, quia nullum habemus tale membrum, quod possit talem materiam producere, nec generatur cum massa sanguinea, quæ sequetur principalium membrorum occulta lesio, cum talis statet aut in hepate, aut in cordis regione, ergo &c.

Ad primum argumentum respondendum est, quòd in corpore humano sunt veneni causæ, & materiales, & efficientes, vt vitellina cholera, quæ cum aduritur, fit præsina, etiam est venenum; efficiens vero est superfluous calor intrinsecus, aut acquisitus ab ambiente aere malo, & pestifero, aut à contactu rei talis qualitate infectæ. Et si istæ causæ non sunt formaliter, & continuæ in actu reali, tamen habent potentiam, & stant virtualiter, cum extrinsecè illis opitulantur. Nec credendum est, quòd causa venenositatis sit membrum aliquod: aut tumor talis, eum generans propter venenositatem, quam habet; quia nullum est membrum in homine, nec apostema tale. Sed aliquando reperitur aliquis humor malus, vt sanguis pro generatione anthracis, & calor extraneus putredinalis, vel intraneus adustius, potens tale humorem malum putrefacere, vel adurere, putrefactione, vel adustione talis modi, quòd efficiatur venenosus, & corpus inficere potens sua venenositate.

Ad secundum dico, quòd Auic. venæ sectionem non concedit in venenosa materia, nisi aliquibus conditionibus seruatis, vt patebit inferius in sequenti capite, vbi de phlebotomia agemus.

Ad tertium respondendum est, quòd talis humor generatur in sanguinea substantia, tamen non lædit subito intrinseca membra, ex doctrina Gal. dicentis generatur in corpore paulatim humor malus, similis veneno mortifero, cuius modica est actio in membris corporis, sed cum peruenit ad summum malitiæ, apparet subito eius actio, & citò interficit. Actio venenorum raro fit à quantitate, sed à qualitate, ideo successiuè agit, vt dicitur de cholera zinnaria à Gal. & à Principe. Vnde Auer. dicebat, quòd cholera æruginosa generatur isto modo, & assimilatur veneno; & egritudines, quæ proveniunt ab his, sunt incurabiles, propterea quia non recipiunt digestionem, nec permutantur ab innato calore; imò corrumpunt formam specificam eius, sicut facit venenum. Pari modo preparatur sanguis pro anthracis generatione; & dum est sparsus in intrinsecis, & membra non sunt potentia super materiam, vt eam expellere possint ad extra, deficiunt à proprii operationibus, & principaliter cor, & moritur eger. Si verò fuerit potentia ad expulsiõem, eam transmittunt ad loca adenosæ, aut alibi, & ibi generatur tumor; qui si non fuerit multæ venenositatis, saluari potest: sed si materia fuerit multæ venenositatis, fit potens super calorem naturalem, & corrumpit ipsum, & mittit fumos ad cor, cerebrum, & stomachum, vnde provenit febris, cordis pulsus, alienatio, vomitus, & tandem mors.

## De cura anthracis. Cap. X.



VRA istius passionis, quam anthracem vocamus, quinque ordinatas requirit intentiones, quarum prima est ipsa diæta, & per diætham ipsum regimen in sex rebus non naturalibus intelligere debemus, scilicet in aere, cibo, & potu; somno & vigilia; inanitione & repletionem; motu & quiete, & accidentibus animi. Secunda est primaria membra defendere, & confortare; scilicet hepar, cerebrum, & cor; quod de facili à tali morbo patitur. Tertia est materiam antecedentem secundum necessitatem evacuare. Quarta causam ipsam consumendam canonicè extrahere, & regulare. Quinta, est accidentia mala corrigere.

Sciendum primò est, quòd illæ tres passionem, de quibus locutus est Auic. cap. de althohoin, diuersè sunt,

3. simpl. d. 4. c. 1.  
1. de med. per  
3. cap. vltim.  
ca. fecim.

3. Epidem.

3. de loc. aff.  
1. d. 1. cap. de his  
morib.  
3. coll. cap. 3.

3. f. a. d. 1.  
1. 10



10 sunt, igitur & eorum cura diuersa est. Nam bubones, seu apoplemata glandosa, quæ non incedit via attinguntur, sicut dicit ipse, idest via apoplemata venosorum, aut non fuerint expulsa in cribris, aut à membris principalibus, regantur eo modo, quo & alij phlegmones, vt etiam dicam in fine huius, aut in alijs libris in digressionibus de tumoribus emunctiorum. Si verò materia sapit naturam veneni, & tumor stat vul nomine carbonis, alij & diuersæ requirunt intentiones, sicut docent Gal. & Paulus; in his non vltimè reperculsiuit, vt in alijs phlegmonibus facimus, sed contrarium agimus, pharmacis atra etiùs vtentes, aut venosam attrahentes: debemus enim de profundo trahere humorem attrahere, id magis dubitando, ne occulta sequatur falsio. Sed ibi docet Gal. quòd quando impetuosè mouetur natura in ali, quod inhiuit, nihil est operandum, sed naturæ totum committimus, forsitan propter ea, quæ dicuntur ab Hypp. si enim dicit Gal. venosam, aut aliud pharmacum attrahens de profundo ad eum humores attrahamus, dolor vehemens comprehendit hominem, vt per eum vigiliæ fiant, & febris adueniat, & virtus dissoluatur, sed vti debemus cathaplasmatibus dolorem mitigantibus, in quibus sit moderata caliditas, & virtus digerendi materiam, & suppurandi apoplema; quæ tamen medicinæ ab aliquali attractione non expoliantur.

Sed cum multa malitia non apparet in carbunculo, eodem modo procedendum est, vt docent medici. Dicebat Gal. cum apparent ipsi crustæ, vehementer medicamentum imponere oportet, ex his, quæ ad nomas dictum est; circumpositas autem partes cathaplasmatibus fovere, quæ æqualem vim occupent, vt repellant, & medicocriter infrigant, & digerant. Alibohain verò ipsum, dicit Auiç. & quod currit curru eius de eis, quæ nominata sunt, idest de bubone, & carbunculo, curentur in principio cum eis, quæ constringunt, & infrigunt. Dicebat Gal. Imponi vero sibi laborans particula, quod ad infam matiemem spectat, refrigerantia desiderat; ceterum propter humoris crassitudinem, æque etiam malitiam, nec fluxionem auertere poteris, & si quando id feceris, aliud quippiam, quod in alto fit corpore, offendes: at qui nec affluere is permittendus est, quin potius inquirenda remedia sunt, quæ modice reprimendo etiam digerere possint. Et Paulus dicit, particula laboranti inducuntur, quæ modice reprimunt, dissipant. Et ideo Rasis scribit, cum acciderint carbones, non est negligendum, quin eis succurratur; fortassis enim tota eorum materia in vno corporis loco colligetur, ex qua maligna fit exitura, ideo dissipatur. Et notandum est, quod medicine, quæ laudantur ab istis medicis, non sunt fortes; sed mediciores, in quibus est virtus resoluiua. Auiç. laudat spongiam infusam in aqua, & aceto, aut in oleo rosato, aut oleo de pomis, & arbore malichis, aut oleo de mirrho, & ista sunt in principio. Ista enim repersuscula sunt descripta ab Archygene, vt refert Gal. In spongia, sicut dicitur à Principe, est resolutio, & escario; in aceto est incilio istarum adustarum materiarum, cum membri præseruatione: oleum rosatum magis confortat, & resoluat, quàm impellat, similiter malichinum, & mirrhinum. Laudant Gal. & Paulus emplastrum ex plantagine, & lentis decoctis cum pane furfuraceo, in quo stat virtus diaphoretica. Hæc est prima consideratio, quod ad localia. Sed quod ad euacuationem secundum necessitatem hæc completur pluribus medijs. Dicit Auiç. Euacuatio quidem cum phlebotomia, & cum eo quod tolerat hora, aut quod fit necessarium ex eis, quæ educunt humorem purrefactum, est necessaria. Idem dicit Auer. quod carbo medicari debet cum duabus speciebus euacuationis, scilicet pharmacia, & venæ sectione. Nec Rasis in diuisionibus negat phlebotomiam, sed dicit, rubrum anthrax, aut viride, aut nigrum, vnumquodque est malum, & signa eius est bothor, & apostema, cum quibus egredietur inflammatio vehemens, ladens valde, pertransiens mensuram in hoc, & fit quod est in circuitu eius, velociter nigrum, aut viride, & accidit cum eo vomitus, & pulsus cordis, & finchopis.

Et si superfluit istæ intentiones cū eo, est mortiferum cū eo, & non oportet, vt phlebotomia fiat cum hac ægritudine. Et ratio est, quia in statu apparuit talia accidentia, in quo materia ex toto iam deducta est ad malignitatem.

Sed in cura carbonis laudat Rafis phlebotomias, quæ fit in principio morbi. Paulus etiam de cura carbunculi dicit; Curatio ipforum, nisi admodum exiguæ fuerint, à vacatione sanguinis est vena ad animæ defensionem vique dimitti, tentanda est. Gal. dicit; sed & incipiendam ab incisa vena curationem esse, id quodque neminem latere arbitror, qui præsertim meminerit, quæ in curatione febrium, de sanguinis missione diximus: nec illud obcurum, sanguinis missionem, quæ ad animi defectum vique sit adhibenda, magis his etiam collatarum: nisi tamen aliud quippiam obster ex ijs, quæ venam incidi vetent.

60 Hanc venæ sectionem laudat Mesues: & dicit, quod talis debet esse diuersius, nisi transiis fiat super principia. Talis enim præsertim à magnitudine plethoris circumstantes particulas. Et certè ferendum est, quod vni euacuetur venosus sanguis. Phlebotomiam vique ad sinopim laudat Auiet. cap. de cura ignis periculi, & dicit; necessaria est phlebotomia, vt euacuetur sanguis cholericus: & quando aggritudo est timorosa, tunc necessarium est ipsam approximare sinopi. Hæc est sententia Gal. qui dicit, quod talis phlebotomia est conueniens in acuis apostematis, & maxime in corpore exillente pleno. Competit phlebotomia huic aggritudini ratione vique essentie; est enim aggritudo sanguinea. Viterius Gal. cum phlebotomamus, ait, in petacuris febribus vique ad animi defectionem, refrigeratur corpus, febris exinguitur, plurimis ventres soluantur, sudores patiuntur, & multi periculi sanantur. Phlebotomia vique ad sinopim conceditur à Gal. pluribus in locis; tamen dicit, quod est valde pe-

riculosa, cum apparent mala accidentia. Et tantò magis competit phleb. in cura carbonis, quantò magis materia fuerit sanguis non adustus, quæ cognoscitur ex tumoris colore, & paruitate accidentium: in malignis autem materiis potius pharmaco utendum est.

Quem locum, & quam venam secare debeamus, nunc dico: distinguendo latitudinem temporis istius tumoris; nam in eius principio, cum aliqua apparet inflammatio, & corpus plenum, & dolor vehemens, locum apprehendit, consentientibus conditionibus phlebotomiz, venam secare oportet ratione diversitatis à loco longiori per vnam diametrum. Dixi enim, quòd materia carbonis, & anthracis, generatur vna cum massa sanguinea, & credo in iecore, & magnis venis: vnde cum ibi multiplicatur, & fit talis, bonum est saphenam incidere, cum quasi immediatè ab hepate euacuare possit; & maximè lateris dextri, etiam quòd natura tentet tumorem in inguine producere: simulque talem succum dixerimus, ne ad cordis regionem deferatur; et sanguinem detrahare vsque ad animi defectum. Ex hoc semper in principio tumoris. Sed in augmento datur alia consideratio; nam pro parte materia talis facta est sub causa coniuncta, nec sperandum est, quòd teneari possit, nisi cum magno documento; nam seu accidentia tunc apparere incipiunt: & ideo secare oportet venam lateris proprii, & forsitan propinquiorem, quàm habere possumus: vt euacuetur sanguis malignus. Vnde si tumor post aures apparet, aperitur cephalica; si in subscellis, basilica; si in inguinibus, saphena: sic docent Melues, & Auerroes. In debili vero virtute nullo modo secare venam debemus; sed cucurbitulis vii scarificatis. Et caue (dicebat Melues) in omni euacuatione, ne trahas materiam super principalia membra; ne virtus; & calor à malignitate suffocentur: Sed si tumor peruenit ad statum, in quo, vt dicit Hypp. accidentia sunt fortiora, sectio venæ nullo modo laudatur. Sed Gal. dicit; quando ita putredinem foueris, quin etiam scarificare eiusmodi tumores post sanguinis missionem alienum non sit; sunt autem incisiones mediocribus altiores, propter infestantem humoris crassitudinem: cessante verò iam inflammatione, vltus ad cicatricem similiter reliquis viceribus perducas, quam sententiam expressit & Paulus, dicens: post venæ sectionem, mox scarificatus rectè accommodatur plagus ob succi crassitudinem altioribus. Vnde Avic. dicebat in statu vero curetur cum scalpatione, si possibile est, & fiat vt curat, quod est in ipso: & non dimittatur, vt brunum fiat, quoniam additur venositas eius; & si indiget ventosis fugentibus cum subtilitate, fiat. Et in illo quòd habet substantiam exituræ, oportet, vt administretur apud statum eius, aut circa statum eius, cum apertione. Nec dimittenda est talis materia, ne membrum corumpatur, sed etiam cruda extrahatur. Vnde Rasis in diuisionibus dicebat, Cum vitur materia, locum scalpella, & ablue sanguinem cum aqua calida, ne congeletur, & sugatur fustione leui, vt egrediatur paulatim, nec liniatur epithimate frigido; imo prohibe & infirmum, & locum à frigore, in quo est infirmus. Et dicit Rasis, quòd teneatur coopertus tumor pannis calidis.

Si vero tumor expectat induritas in statu, & augmento, aut propter aliqualem benignitatem materiz, aut quia pauca, aut propter complexionem, & virtutem membri, in quo est, tumor; et est opus auxilio extrinseco, vt materia præparetur, cum iam declarata est fortitudo naturæ in expulsiōe huius moris, R. radicem apij, marrubij, scabiosæ, florum chamæmeli an. m. j. coquantur, & pistentur, deinde adde assungia veteris s. iij. mellis, fermenti an. s. j. misce, & fiat emplastrum. Aut R. radicem cucumeris agrestis, glutinis albotini an. s. iij. salis nitri s. j. ficum pinguium s. j. fermenti s. j. misce. Aut R. vitella ouorum numero ij. falis an. s. j. croci s. j. fermenti, assungia gallinaceæ an. s. j. misce, pro emplastro. Et cum materia ad saniem peruenit, secatur, & euacuata, locus tali medicamine regatur. R. theribentinz claræ s. iij. mellis ro. s. j. farinæ hordei s. i. s. succi apij s. j. bulliant omnia vsque ad succi consumptionem; & adde, vnguenti ægyptiaci s. j. misce, & vtere in vulnere cum ellichais vsque ad loci rectificationem. Desuper verò tale emplastrum: R. fabarum farinæ, orobi, lentium, lupinorum an. s. ij. succi absynthij, apij an. s. iij. aceti boni s. j. florum stachados, rosarum, balsamium an. m. a. chamæmeli m. j. lictij boni q. s. misce, & secundum artem fiat emplastrum. In circuitu tumoris liniatur membrum tali medicamento: R. vnguenti ros. Mel. s. iij. boli armeni, sanguinis draconis an. s. s. succi plantaginis, aceti boni an. parum pro linimento. Aut R. olei rosati, mirrhini an. s. j. succi plantaginis, solarii, aceti albi an. s. j. s. bulliant omnia aduicè vsque ad succi consumptionem; deinde addatur cera albæ s. j. santholorum omnium an. s. j. boli armeni terre fig. an. s. s. corallorum alb. & rub. an. s. j. s. misce, pro vnguento molli. Cumque apparuerit loci mundificatio, incarnetur cum vnguento citrino, aut basilicone, aut simili. Vltimò locus sigilletur cum cerotto de minio. In anthrace verò manifestæ venenositatis, quæ cognoscitur, vt docet Rasis, quia locus apostematiz velociter fit niger, aut viridis; vrinæ laudæ, aut subingales, febris continua, pulsus cordis, vomitus, alienatio dec. aer eligendus est frigidus, & siccus, qui si non est sic naturalis, hæc ab arte, ad minus aer thalami. Nam Princeps dicebat; roretur mansio infirmi cum aceto plurimo, & folijs salicis, & violis, & rosas, & nensare, si fuerit efflas. Nec credo, quòd caliditas conueniat in æstare, vt aliqui dicunt; quia causatur spirituum resolutio. et addit, in humorum putredine, nec valde frigida sunt opportuna, quia confringunt poros, vnde retinetur materia ad intraneas partes, & sequuntur praua accidentia. Vnde si fuerit byems, accendatur in camera ignis ex lignis iurpeli, cupressi, lauri, pini, rotis marini, mirrhi, & similibus. Et suffumigetur mane, & sero cum massiche, thure, mirrha, theribentina, lauina, acoro, laudano, storace, thymiana, &

- 70 beluino. Ardeatque ignis die, noctueque. Suspendantur citrones, & poma aurancia per thalamū, vt fiant ibi boni odores. Sicut; paratē dug camare, & quotidie permuteur, & vt ait Gal. opemus. ac si lit purus: eiufmodi verō fuerit, qui nec stagni, nec paludis halitu sit infectus: nec ex profundo specu pestilentē auram spirat, qualis quī ex cloacis, quē vibem, aut numerosum exercitum purgent, viuium contraxi: nec qui ex animalium, oleorum, aut leguminum putredine, aut fimo corrumpitur: nec qui ob stagnum, vel flu men vicinū nebulosus est: nec qui editis vndique moribus in cauo loco clausus nullum recipit perlatū: nā talis humor contrariissimus iudicatur. Cibus infirmi, dicit Auic. & Rasis in diuisionibus, sit, sicut lentes decoctæ cum aceto. Eius cibi sint acetosi ex carne vituli, aut hædi. Vtatur rob granatorum, & cinthiorum in suis ferulis cum lentes noceant capiti, & stomacho, potius panatellam in brodio pulli, aut micā panis infusam in brodio, aut pisanam hordeaceam, vel condrum exhibeamus. Car nes frigida, & sicce sunt oportune, facili concoctionis, & difficilis corruptionis, aliquoliter sangui nem refrigerantes; vt paruē pullē, aues montanæ, rurtures, perdices, similesque carnes preparatæ ad coagulum cum agresta, & aceto, succo limonum, & auranciarum. Et si patiens masticare non poterit, accipe pulpas perdici, aut caponis, aut hædi, & eas minutim incide, & pista vnā cum seminibus cōmu nibus, & per tamidum distilla, & adde parū aquę buglossę, aut melissę, & pone ad ignē, & bulliant. Vl timō adde vini gran. aquę rosarum, vt tibi videbitur: Aut vtatur aqua carnis cum auro, aut gemmis. Vtatur bolo armeno in suis ferulis, & cibarijs. R. bolum armenum, & pone in sindone munda, & liga, & pone in lebere feruli, & bulliat, donec caro fuerit decocta, & exprimitur. & quod residet, reiciat ur; prohibet enim humorum corruptionem. Aut R. boli arm. orientalis, zuchari an. 3. ij. aquę me lissę parum, & exhibetur patienti per duas horas ante prandū. Aut R. conferę buglossę, aut melissę, 30 aut violarum s. s. boli ar. orientalis 3. i. misce. Laudatur theriacha, mitridatum, triphera persica Mef. ā 3. s. vique ad 3. i. in mane cum syr. de acet. citri, aut cum aqua melissę. Aut R. diaboraginatum, diabu gllotatum, an. s. ij. foliorum auri numero iij. fragmentorum perlarū preparat. an. 3. i. s. syr. de succo ace tofæ q. s. pro mixtura mirabile est elect. diamargariton, de gemmis triumphantalorum, & iimilia. Aut R. conferę boraginis, nenusarii, buglossę, rosarum an. s. s. cort. citri conditi cum zucharo s. j. coriandrorū preparat. seminum acetosę, santholorum alb. & rub. an. 3. v. rafazę eboris, carabę, boli arm. spodiān. 3. iij. camphurę 3. i. foliorum auri numero iij. zuchari fini syr. de acet. citri an. q. s. pro mixtu ra. Panis autē sit triticus, bene fermentatus, & coctus. Vtatur post cibum coriandris pręparat. Et tan dem quę intrinseca a censionem exinguūt, & corruptionē prohibent, & fumos ā materia putrida ele uari, & dirigi ad cor, in hoc morbo laudantur. Fugienda sunt lacticia omnia, legumina, & lalsa. De 40 oleribus, spinachia, borago, buglossa, melissa, endiua, intrabus, & lupulus concedi possunt. Ex pi scibus, tantum fixatiles, & rubei loco necessitatis. Fructus omnes mali sunt, & præcipue horarij. Et nota, quod egrotantes non sunt multum cibandi, cum ægritudo sit peracuta, & habeat statum propin quum ex Hypp. Quamvis dicat Auic. cap. de febre putlentiali: Illi, qui viriliter agunt in comedendo, fortasse euadunt ā tali morbo. Hora autem comedendi sit ægrotantis consuetudo, cum continua fe bre vixerit, aut ea hora, quā minus affligitur. Porus sit vinum granatorum cum aqua coriandrarū, & iuleb rosato. Aut aqua decocta cum iuleb de citro, seu de limonibus, aut de succo vine æcerbę. Verū cum dubitatur de casu virtutis, exhibeatur vinum clarum, & odoriferum, & pauciterum. Nec audiendi sunt, qui potentia vina, & vinosa exhibere audent, cum febris, quę apparet, sit talis nature. Caueat patiens a nimio somno, & maxime in die; quia, vt docet Gal. in tali somno calor contrahitur ad 50 intra, & concentratur; ad cuius concentrationem, concentrantur & humores; vnde periculum est, ne ma teria reuocetur. Et quando magis materia est maligna, tantō magis prohibendus est profundus som nus, & maxime in principio noctis, & subitō post cibi assumptionem. Si in hac passione possit infir mus, & exeretari, bonum esset, & laudata est exercitatio: si non autem, quiescat. Ab iura, tristitia, ti more, sollicitudine, cogitatione, cauendum est; quia concentrationem malorum humorum causare possent: Sed gaudium, & lactia introducatur egrotanti, & spes bona ā medico, & astantibus, & amicis de cita, & felici liberatione: quod difficile est propter mortis periculum. Ex quo igitur hæc epi dimialis passio est ita contagiosa, caueant & astantes, & medici.
- Quod ad euacuationem dico, in hac passione venę sectionem nullo modo conuenire, nisi in pura ma teria sanguinea, & in principio ægritudinis, antequam materia expellatur ad extrinseca: Tunc enim cum uenē possit, si celebratur ā iccoraria vena lateris dextri, vique quod euacuatur sanguis malus, reli quum verō rectificando, & vigorando. Sed in emissionē sanguinis notandum est, vt vrum sit bonus, vel nialus; qui cognoscitur colore, & substantia. Nam si euacuatur bonus, non est extrahendus, ma lus verō euacuetur. Et cum timetur, ne materia ad intrinseca reitineatur, dum apparet cordis pulsus, aut alienatio &c. loco phlebotomię apponantur cucurbitule scarificatę in dorso, sub oisibus spatula rum, super natibus, & in emunctorijs. Nec timere oportet malum sanguinem existentem in centro, in venis prope cor, ad circumferentes partes attrahere: Sed cum tumor apparet, vbi declaratur natu ra operatio, illum sequimini. Si verō ægritudo talis expectat indutias, ad malorum humorum euacuationem deveniendum est. Et patienti exhibeatur pharvacum, in quo sit virtus euacuandi humo res aduults, & putrefactos. Nec timendum est ā tali euacuatione, quod possit esse causa, vt materia

De munda vi  
leuolitate.

z. aphor. 10.

De dissol. condi  
nat cap. 1.

4. am. 4. cap. 1.  
Lib. 1. cap. 3.  
Lib. 2. cap. 1.  
Eud. 4. am. cap. 2.  
Cap. 3.

7. coll. 370.

3. aphor. 11.

3. Theor.  
1. aphor. 6.

Lib. 1. cap. 37.

Cap. periculis.

Diuis. 137.

deducta sub causa coniuncta retrocedat; vt timetur in morfu animalis venenosi, aut rabidi, aut extrin  
seco veneno, vt docet Auc. Paulus, Dioscorides, & Rafis, etiã quoddam proprium pharmaci sit deducere  
humores à circumferentijs ad centrum ad faciliorem euacuationem, vt docet Gal. in lib. de virtute phar  
macorum. Sed quatinus cum pharmaco, vt euacuentur humores, qui stant sub causa antecedenti, ne  
transcant in coniunctam, & maiorem inferant lesionem. Materia anthracis generata est in murinosis  
membris, & facta est admixtio, ac putrefactio vna cum alijs humiditatibus, debent igitur scerri, si  
cut dicit Auerr. Materia tumoris est transmissa ab interioribus ad exteriora, quod signum est corruptio  
nis intrinsecarum humiditatum, quae indigent euacuatione. Nam quae relinquuntur in morbis, recidi  
tas facere consuevere, teste Hypp. Necnon maius iuuamentum ex humorum corruptorum habetur  
euacuatione, quam sit nocuumtum, quod possit euenire ex pharmaci attractione à circumferentia ad  
centrum. Pro tali autem euacuatione eligenda est medicina sanguinis mundificatiua, in qua sit inuen  
tio euacuandi humores cuiuscunque speciei adustos, & corruptos; quae tamen non habeat mouere vio  
lenter, quia tunc nimis natura fatigatur. Et laudantur mirabolani omnes, thamarindi, cassia, man  
na, siue ros syriacum, ellect. de succo rosarum, diaphenicon, & triphera perfica, & syr. rosarum sol. vt  
puta: R. pulpae cassiae nouit. extracta, manna ellect. an. 3. j. triphera perfica 3. j. aquae buglossae q. s. aut  
zuchari pro 6. Vel R. mannae ellect. 3. ellect. de succo ros. 3. s. triphera perfica 3. j. s. decoctionis flo  
rum, & fructuum cordialium q. s. Vel R. syr. rosati sol. 3. iij. aquae mellisae q. s. misce. Et si materia  
possit digeri, valet syr. de endiua, acet. simpl. de citro, de succo acetosorum pomorum, de succo ace  
tosae, de acet. citri, de buglossa, & similes. & debet patiens bis in die assumere syrupum, & maximè ex  
acetositate citri ante pradium, & carnem per duas horas: sed si intensa non apparuerit febris, nil melius,  
quam patiens per sex horas ante cibum exhibere theriacam opemiam ad quantitatem vnus fabae, aut à  
3. s. vsque ad 3. i. cum aqua scabiosa, mellisae, buglossae, acetosae, boraginis, aut similibus. In materia  
verò furiosa absque respectu exhibere potes. Nec tunc consideratur hora, teste Aucuzoar, quia ad vlti  
mas ægritudines exquisita remedia sunt opportuna. Et nota, quod in vltima malignitate materię potest  
exhiberi patienti bolus huiusmodi, cui non est par. R. euforbij recentis optimi 3. i. mastiche 3. ij. misce  
& puluerizetur: R. predicta pulueris 3. i. conferuaz pulueris 3. s. misce pro bolo, & quotidie  
per duas horas ante cibum mane assumat bollit. Valent summopere pilulae de tribus Rusi ex aloec, myr  
rha, & croco. Pilulae imperiales. Sed apud Paulum, qui ex commentarijs Rusi caput facit de peste, lau  
datur de mente Rusi tale medicamentum: & dicit, quod non superatur. R. aloes partes duas, guraz  
ammoniaci partes duas, mirrab partem vnam: hæc contrita cum vino odorato infusa dimidij cyathi  
exhibentur, nimirum quotidie. His celebratis, secundum tamen indigentiam, & temporis opportuni  
tatem, dicebant Auic. & Rafis, quos sequuti sunt omnes scribentes, oportet, vt reuertaris ad cor cum de  
fensione eius, & confortatione ipsius cum eis, in quibus est infirmitas. & confortatio: & in vltimo re  
gantur regimine habentis pestem. Frigida enim debent esse talia pro cordis confortatione, quia mate  
ria peccans est calida, adusta, & venenosa, & de sui natura petit cor. Ideo laudabile est, cordi appli  
care sacculum ex rosis, violis, floribus buglossae, nimpheae, boraginis, sanctalis albis, corticibus, & se  
minibus citri, camphuræ, & speciebus cord. temp. Aut R. aquae buglossae, mellisae, rosarum, acetosae,  
florum salicis, an. 3. iij. pulueris rosarum, florum boraginis, buglossae an. 3. iij. santhalorum 3. ij. camphu  
ræ 3. i. s. misce, & simul bulliant: & cum panno scarlato saepe tepide regionē cordis epithemare opus  
est. Aut R. aquae rosatae, mellisae, buglossae an. 3. vi. santhalorum omnium. 3. s. pulueris rosati 3. iij.  
croci, camphuræ an. 3. j. specierum cord. temp. 3. s. vini maluitici parum, & vere, vt dictum est. Aut  
R. olei ros. omphacini, vnguenti ros. Mel. an. 3. ij. aceti rosati 3. iij. aquae rosarum, florum salicis an. 3. j.  
bulliant simul, vsque ad aceti consumptionem: & adde ceræ albae 3. i. s. & liquefacta ceræ, adde sani ha  
lorum omnium an. 3. ij. corallorum alb. & rub. an. 3. i. s. croci 3. s. misce pro linimento in regione cordis.  
Bonum est etiam epithemare iecur cum aqua rosarum, plantaginis, & pulueris santhalorum, & ven  
triculum tali epithemate, R. aquarum mentæ, absinthij an. 3. vi. vini maluitici 3. iij. aquae ros. 3. ij. pul  
ueris gariophylorum, cinamomi, coral. rub. mastiche, ligni aloes, an. 3. s. vini citronum 3. ij. misce,  
& fiat epithema pro stomacho. Patiens etiam in manibus continē teneat odoramentum tale. R. pul  
ueris rosarum, santhalorum an. 3. j. camphuræ 3. s. ponantur in sindone serico, ad modum pile; aut  
pomum laudani: R. laudani 3. j. beccaboli & rubei, rosarum rub. an. 3. ij. fiboracis liquidae 3. iij. mirrhe  
solorum mentæ, gariophylorum an. 3. j. camphuræ 3. s. & cum succo mellisae, & aqua rosarum fiat po  
mum, seu teneat continue spongiam infusam in aceto: aut pomum cedri, aut medium. Dñ hæc agun  
tur, tumor, si appareat, non est dimittendus. Sed quibus medicamentis gubernari debet? Non apocru  
sticis, quia in materia venenosa, & pestifera non conueniunt; & si Auicenna laudat spongiam infusam  
in aqua, & aceto, aut oleo rosaceo, dico quod non laudat propter hoc repercussionem, sicut in phleg  
mone. Nam, vt dixi, esse omnia ea medicamenta sunt potius resoluentia cum confortatione, quam re  
percussoria. Nec voluit Auic. quod repercussione vtamur in cura tumoris pestiferi, cum quo, vt acci  
dens inseparabile, semper adest febris: nam dicit Auic. & quando est illis febris, tardabis cum infrigi  
datione, ne reducas cum ea materiam retro; & est sententia Pauli. Vnde Rafis dicit: cum vides, quod  
iam accidit ab epithemate, & aqua frigida pulsus cordis, & febris, tunc incipe, & embroccha cum aqua  
calida

10 calida, & calefac ipsum. Sileant igitur, qui in hoc Auicennam reprehendunt; quia ad pauca respiciunt; & facile pronunciant. Sed quid agendum est? dico, quod in principio etiam tumoris attractio cum ali quali membri præseruatione applicari debent, ut puta cum tali emplastro, R. pulueris zedoariae, centauræ, dictami, cameleontis, tormentillæ, carlinæ, an. ʒ. ij. succi apij, cucumeris agrestis, glutinis alborum an. ʒ. iij. fermenti, sicum pinguium an. ʒ. ij. boli arm. luti sigillan. ʒ. j. nitri ʒ. s. mellis ʒ. iij. tarinæ fabarum, orobi an. ʒ. ij. lixiij. huius q. s. pro emplastro. Aut, R. radicem apij, marrubij, scabiolæ, cucumeris agrestis an. m. j. bulliant in sufficienti q. aquæ, & pistentur, & adde sicum ficcarum, fermenti, ammoniaci an. ʒ. j. sinapis ʒ. s. zuchari fini, mellis an. ʒ. ij. tritici malticati stomacho ieiunio ʒ. iij. vitellæ ouorum numero ij. croci ʒ. s. rob. q. s. pro emplastro. Aut pro pauperibus in omni tempore, R. cepas communes numero ij. coquantur sub cineribus, & pistentur, & adde salis communis, fuliginis camini an. ʒ. ij. faponis nigri ʒ. s. pinguedinis porci ʒ. iij. laring tritici, fermenti an. ʒ. j. mellis q. s. pro emplastro. Multa possent recenseri in tali re; sed quia materia est furiosa, opus est deuenire ad vltimas curationes; & ideo applicatis defensionibus, ut dictum est, aut loco optima theriaca lenito, ad manuum operam deueniendum est, scilicet ferro optime incidente locum secando: dico in ampla sectione, ut melius, & citius malus succus euacuari possit. Quia facta sectione, locus à circum adiacentibus humoribus diligenter exprimitur; deinde cum digestiuo communi, alterato cum vnguento agiptiaco, locus incisus curetur. Desuper verò applicando aliquod ex iam dictis emplastris, vique ad loci rectificationem; denique incarnetur, ut dictum est. Sed dico, quod nullum meliorem modum inuenire potui, quàm locum caustico, aut actuali, aut potentiali aperire. Et qualiscunque fuerit, profunda esse debet apertio, quia non tantum consumere debet coniunctam materiam, sed antecedentem attrahere. Ideo nec cera, 30 nec feruens oleum operatur, sed laudatur chalcitis, vinde æris, arsenicum, calx viua: aut capitellum ex calce, & sapone nigro, cum aqua forti; aut calx viua cum sapone. & pipere trito, & aceto fortissimo; aut med. ex cantharidibus, fermento, & sale am. aut vtere vno ex meis infra dicendis cap. de cura nodi. Et si vna applicatione cauterij materia non euacuatur, cum adhuc crudus sit tumor, reapplicetur. Aut post calum elcharæ reliquum secatur. Aut cum producta fuerit elchara, remouetur cum butiro, aut suillo adipe, aut vi, & curetur, ut dictum est. Sed cum materia fuerit multum maligna, sua venenositate corrumpit & nutrimentum, & vitam; Vnde ad actualem causi cum deueniendum est, idest ferro ignito locum adure; & credo quod hæc sit breuior via, & secutior omnium aliarum. Nam, ut dictum est à Principe; vltio est efficacissimum remedium, quod valet ad prohibendum expansionem corruptionis, & particulam, cuius intemperiem corrigere cupimus, roborandam, materiaque corruptas membro infixas dissoluendas. Est ergo efficacissimum remedium in tali casu, quia materiam venenosam à principalibus diuertit, & de profundo corporis attrahit, & in loco adductam, & contentam dissipat, & insensibiliter resoluit. Proinde dicebat Mesius; non tardetur, quin statim euacuatione præmissa, huiusmodi cauterizatio fiat: dilatio enim ipsius perducit ad mortem festinam. Et Celsus dicebat; nihil melius est, quàm protinus adurere. Neque id graue est, nam non fenit, quoniam ea caro est mortua; finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est: tum demum vix sicut cetera adusta curetur. Celebrata aduisione, locus emplastratur cum scabiosa, minori consolidata, betonica, cauda equina, agrimoniam, apio, dictamo, zedoaria an. m. j. bulliant in sufficienti q. aquæ, & pistentur, & adde therebentinæ claræ ʒ. vj. farinæ orobi, florum stochados, chamæmeli an. m. s. syr. acetosi, zuchari an. ʒ. iij. mellis, rob. an. q. s. pro emplastro. sublataque elchara, locus manducetur, deinde incarnetur, vltimo sigilletur, ut dictum fuit.

4. l. i. cap. 39.

Lib. 5. cap. 12.

De aneurysmate. Cap. XI.



60 **A**LTIOR etiam à sanguine tumoris genus accidere solet, cum nimirum sanguis spirituosus, extra vasa propria subito exierit, & in aliquo situ contineri videtur talis passio, à medicis aneurysma, emborisma, hyporisma; aut mater sanguinis, dici solet. Quæ passio etiam ad aperta arteria nonnunquam occurrit. Et differentiam ad aperta venæ, ab arteria ponit Paulus, cum dicit; Quæ ad aperta arteria sunt aneurysmata, prolixiora apparêt, & in alto constituuntur, digitisq; impressis, ceu strepitus quidam, exauditur, cum nullus sonus in his, quæ rupturæ feruntur, accepti percipiuntur, illa uerò rotunda magis sunt, & per summa abotuntur. Gal. loquendo de cura arterij incisæ, dicit, implendum vulnus carne quamprimum esse, priusquam vinculum à vase decidat; nisi enim prodacta caro prius locum, qui circa præcisam arteriam est, impleuerit, si locus vacuus super fuerit, vtiq; quod Græci aneurysma dicunt, sequitur. Additur autem in veteri translatione; alij uerò dicunt eam passionem matrem sanguinis. Qui tumor est mollis, & aëneque cedens, & sanguine plenus. Et rursus recitat casum cuiusdam, cuius loco venæ in phlebotomia secta fuit arteria, & ad aneurysma deuenit. Idem voluit & Aetius, & Auic. qui dicit; quando non desuper coarctatur locus eius post solutionem coniuncturæ eius, & inuenit vacuitatem, provenit res ad emborismum, quod nominatur mater sanguinis. Paulus verò sic ait; Aneurysma tumor blandus est, digitisque cedit, ex sanguine & lpi

Lib. 4. cap. 37.

14. metho. de li. de tumor. Et 7. metho. analger longum processum, & max. cap. 4. Lib. 5. metho. cap. 7. Lib. 6. cap. 10. 4. l. 6. v. 2. cap. 16. Lib. 6. cap. 37.

ritu contractus. Et citat Gal. dicens. Gal. de eo hunc in modum scribit. Arteria aperta, affectus 10  
 aneurysina vocatur. Fit autem eadem convulserata, quotiens exterior cutis cicatricem duxerit, arthe-  
 ria verò sine cicatrice remanserit, nec coalescens, nec carne obstruata. Interdum etiam, vt dicit Auic.  
 de fluxu sanguinis accidit arterijs de intus, & disrumpuntur, præter quod disrumpatur cutis, & aggre-  
 gatur sub cute emborisima, id est apostema leue ex sanguine, & vëto sitare quod possibile est quiescere cū  
 compressione. Vide ibi & cōmentum Dini. Casum vidi in Mag. domino Philippo Zeno Venetis in Ca-  
 nali regio, an. 1547. de mense Maij. & erat arteria ex nimio motu, vociferando disrupta, vnde factus  
 est tumor. Et nota, quod potissimum signum huius passionis est, quod motus tumoris mouetur ordina-  
 te ad motum cordis. Agnoscentur præterea, dicunt Paulus, et Aëtius huiusmodi affectus arteria-  
 rum pullu, imò etiam prementibus nobis tumor quodammodo euanesceit, substantia, quæ ipsū effi-  
 cit, in arterijs recurrente. hæc quidem Gal. Interdum etiam expanditur sanguis per partem cuta-  
 neam ad locum amplum, & ad gangrenæ colorem perducit regionem. Solet fieri hæc passio, non ex  
 incisa arteria, aut vena, sed ab acuto mucrone perforata, dum cutis ad cicatricem peruenierit, nulla  
 contracta in arteria cicatrice. Et differt aneurysina à phlegmone; quia hæc subito fit, phlegmon ve-  
 rò successiue, vt iam declaratum est. Quoniam modo vena, aut arteria aperiatur, dicam in sequenti  
 lib. vbi de sanguinis fluxu, & nonnulla tangam in hunc sequentis capituli de mente Pauli, & Albucasis.

## De cura aneurysmatis. Cap. XII.



Vt, vt dictum est, inter sanguineos tumores hæc passio ab antiquis enumeratur, 30  
 & quia sæpe coningit, idè in hoc loco de ea hæc pauca volui dixisse. Sear sub  
 duplici consideratione hæc ægritudo, aut enim adhuc est aperta arteria, aut tantum  
 aliqua portio sanguinis stat sub causa coniuncta in regione cutis, quæ passio Græcè  
 ecchymoma dici solet, teste Olibasio, & Actuatio; est autem ecchymoma sanguis  
 subter cutem effusio. De prima erit sermo in sequenti lib. vbi de cura hæmorr-  
 rhagiæ sanguinis. De secunda dico, quod tentandum est, si carminantibus medi-  
 cinis sanguinem resolutioni dare possimus. Si non autem, ad loci scalpellationem deuenire oportet.  
 Quas operationes, multitudine sanguinis, & natura, & membri compositio ostendunt. Medicina, quæ  
 hoc facit, est illa, dicebat Auic. 2. canonis, quæ caliditate sua virtutem habet subtiliandi materiam,  
 & separandi ipsam, & aperienti porositates ipsam euaporando per partem post partem assiduitate sue  
 operationis, donec materia tota extrahatur, & euacuetur per membri porositates. Et propterea oportet 40  
 quod sit in sua caliditate satis temperata, subtilium partium, subtilisque substantiæ. Harum ali-  
 quæ sunt simplices, aliquæ verò compositæ: simplices sunt sicut camamelum, parietaria, ferrula cam-  
 pana, fursures, anethum, mentha, stechados, calamintum, origanum, absinthium, prasiū,  
 squinantum, apium, finapis, fāniculus, coriandrum, fenu græcum, farina hordei, labarum, orobi, lupi-  
 norum, & panis fursuraceus: oleum anethinum, rutaceum, laurinum, chamæmelinum, sambocinum,  
 & de spica; pinguedo vrsi, & aliæ &c. compositæ verò sunt huius ordinis: R. florum stechados, fer-  
 tula campanæ, calamintæ, camomellæ, an. m. s. farinæ orobi, labarum, cicorum an. s. j. cinimii pisti .ij.  
 olei de absinthio, mirthini an. s. .ij. vini optimi q. s. pro emplastro. Vel R. mellilori, anethi, origa-  
 ni, fursuris, an. m. ij. radicem petroselin. cnulæ an. m. j. anthos, cinimii an. s. j. calamintæ, parietariæ  
 an. m. j. baccharum luri m. s. lixiij boni q. s. pro emplastro. Vel R. radicem consolide maioris & mi- 50  
 noris an. m. ij. chamæmeli, mellilori, an. s. .ij. croci s. j. faring labarum s. .iij. fenu græci s. .ij. coquan-  
 tur radices in aqua prius, de in pistentur, & adde cinimii, absinthij an. s. j. & cum alijs rebus fiat empla-  
 strum secundum artem.

Si verò adhuc fiat materia ad locum, aut via refudationis, vel adhuc fiat solutio in vena, vel arthe-  
 ria, præmissa euacuatione per phlebotomiam, & celebrata diuersione per ligaturas dolorosas, & ad  
 emplastica peruenire opus est, in quibus viget stipticitas, vt locus induretur, vt docet Albucasis, & do-  
 cet emplastrum ex rotas coctis in aqua, & vino stiptico, & balaustijs, & corticibus granatorum, & fan-  
 thalis, & pulvere mirthi, & aloë, & sanocolia cū aqua rosarum, & albumine oui. Superposito autem em-  
 plastro, de super applicetur anacratiron ex stupis, deinde ligetur, & fiat fortis contractio; & remo-  
 uatur medicamentum de tertio in tertium. Cum tamen hoc medio morbus hic curari non potest, ad  
 manuum operam deuenire oportet. Et opus fiat, sicut docet Paulus & Albucasis. Dicunt tamen, quod si 60  
 aut alas, aut inguina, aut ceruicem itescant, aliæque loca eximie magnitudinis, aneurysmatis curare  
 maribus propter vasorum amplitudinem non tentabimus. Quæ verò summas cutes, & artus, vel cap-  
 put attingunt, hæc ratione aggre de conuenit. Siquidem ex arteria dilatata tumor obuenerit, cutem li-  
 nea recta in longum incidimus, deinde deducto ore excoriamus, & scalpellis, quibus membrana uel  
 luntur, circum purgata arteria nudabitur, acu traiecit duobus funiculis deligatur, puncta prius scal-  
 pello per medium: vbi cum ambient membrana vnita fuerit, curatione pus maturante vtremur, vscq;  
 dum funiculi exciderint. At si ex ruptura arteriæ constat fit aneurysma, totum id, quæremus fieri  
 licet, cum cute digitis apprehendendam est, deinde acu duplex linum trahente, inferius eo, quod ex-  
 ceptum

Lib. 1. cap. 97.

Lib. 6. cap. 37.  
Lib. 1. cap. 97.



ceptum est, tranſiendum. & poſt acus traictum anſulam forcipe præcidere oportet, atque ſic duobus ſilis hinc. illic tumorẽ deligare; veluti in ſtaphilomate comprehenſum eſt. At ſi metus ſit, ne ſila circumuoluatur, altera etiam tranſmittenda eſt acus per totum, quæ priorem premat, ſimiliter duo ſila ducens, & amputata anſula, ex quatuor ita tumorem deuincimus. Vel tumore per medium adaperto, poſt extrenſionem cutem adimemus, eam, quæ ligata eſt, relinquentes: ac ſplenium ex æneleo imponentes, remedijs in linamenta illitis, ſecurẽ vtemur. Laudat Actius emplaſtrum ex cupreſſo, quod ita conſicitur. R. foliorum cupreſſi q. s. decoque in vini auſteri ſufficiant quantitate, & vtire.

Finis ſecundi tractatus de tumoribus ſanguineis.

# LIBRI PRIMII

## TRACTATUS TERTIVS.

### De cholericis tumoribus.

#### De eryſipelate. Cap. I.



**N** Vnde de tumoribus cholericis habeatur ſermo, ab eryſipelate exordium ſumendo, cum à communioribus inchoandum ſit, & quia phlegmoni in multis aſimilatur. Eſt enim eryſipela cholericus tumor, vel mala complexio materialis cholerica, non multæ eleuatz dimensionis, rubedinis claræ, & expaſæ, doloris purgitiui, cum febrili diſpoſitione: cuius materia aut eſt ſanguis ſubtilis cholericus: aut ex ſanguine, & ſua bile calidioribus, quàm oporteat, mixta fluxio. Eryſipelas hæc paſſio vocatur, inſultum phlegmone calidior, magiſque color em ſtuum rappræſentans. Et ſi tætigeris, facilè ſanguis ſubter fugit, ruſſique illa bitur, exquiſitè tenuis, & alpeſtu rubidus, non tamen dolet hic, veluti phlegmon. neque vt aliqua inflammationis ſpecies. Puſſum, aut compreſſionem, aut ſimilem vehit tenſionem: ſed quandoque valde parum inſeſcat, ac tum præſertim, quando per ſolam cutem diſuſum fuerit, nihil inferiorẽ carnem moleſtans. eſquidem tale ali- quid ſæpius accidit, atque hoc eſt exquiſitum eryſipelas. Quemadmodum qui attingit inferiorẽ carnem, neque ex verè tenui bile conſiſtit, neque tantum eſt eryſipelas, ſed diſpoſitio mixta, æc eryſipelaſe, atque phlegmone. Vnde dicendum eſt, quòd à duplici materia poteſt generari eryſipelas, aut à ſanguine cholerico, & appellatur cholera benigna: & in tali iam dicta apparet accidentia: aut à bile calidiori, & tenuiori ſubſtantia, in qua ſecundum diuerſos modos exulceratur locus: & hæc eſt tantum cutanea paſſio, & verum eryſipelas: vnde Gal. loquendo de eryſipelate, dicebat; bilioſe fluxionis germen eſt, ac circa cutim maximè conſiſtens: tum hanc, inquam, foris, quæ omnium partium commune eſt tegumentum: tum membranoſam, & tenuem, quæ ſingulis internarum eſt circumdata. Ergo ſicuti prior affectus etiam cutis aliquid apprehendit, ita hic quoque aliquid ſubiectè ſibi carnis occupat. Quòd ſi craſſior humor, acriorque cutis, ſummam cuticulam, Græci epidermia vocant, excoriat, ſpatioque ad profundum aliquando fitis exulcerata peruenit. Arque hic quidem affectus eryſipelas nuncupatur, duplici (vt iam dictum eſt) diuerſitate: quòd vel abſque exulceratione, vel vnà cum hac inci- dat. Primam Gal. appellat eryſipelas; ſecundam, de mente Platonis, herpetem vocant: herpetem vocant: Vbi verò & ſanguis, & bilis ſua ſimul incubuerint, eryſipelas excitatur: & verè Gal. nullam aſignat diſtinctionem inter hæc paſſiones, niſi hanc, quòd dicit; ſerpens vlcus, qui herpes Græcò dicitur, eſe eiſdem eſt generis, cum exulcerato eryſipelate: & parum infra dicit; Hepetas namque bilioſus procreat ſucus, quò ſit, vt eatenus eiſdem ſit cum eryſipelate generis, atque huius quoque magis etiam cum eo, quòd exulceratum eſt, diſſert autem ab eryſipelate humoris renuitate: eſt enim admodum tenuis, qui herpetem excitat, adeo proſectò, vt non ſolum omnes interiores partes, quæ vtiq; carnoſe ſunt, tranſeat, ſed etiam cutim ipſam ad ſummam vſque cuticulam: quam ſolam, propet ea quòd ab ea remora- tur, tum erodit, tum exedit. Et ideo Auic. cap. de eryſipelate dicit; Et quandoque conſequitur ex ca- liditate eryſipelaſis, vt comburatur cutis; quare alteratur illud, quòd nominatur eryſipela, & no- minatur paſſio talis, aut ignis perſicus, aut gangrena &c. Dicitur autem forte eryſipelas, quaſi pellis adhaerens.

Dictum

1.1-cap. de egg  
indubius com-  
posita,  
in lib. de chole-  
ra nigra cap. 7.  
Et 1. ad Glac. 1.  
14. metho. cap. 1.

Dictum est à Principe, a quolibet humore posse causari tumorem præter naturam, scilicet à bile  
 flava, à bile atra, à pituita, & à sanguine. De languinibus aliqua fuere dicta, nunc igitur, de choleris.  
 tempus est ut agatur. Scribit Gal. quòd cholera flava phlegmonante in vnam aliquam particulam, ery  
 sipelas generatur. Differt hic tumor à phlegmone, in colore, in forma tumoris, & homogeneitate ma  
 terie: inter duos verò à nonnullis extrinsecis accidentibus. Dicebat Gal. Est alius morbus, quem Graeci  
 erysipelas vocant, is, ut monstratum est, ex bilioso succo nascitur: sed præstiterit fortassis vni plu  
 ribus verbis à phlegmone distinguere; ergo communia quidem ambobus sunt tumores, qui præter  
 naturam sit, tum verò color. Dissident inter se, primum, & maxime colore; quando si is ruber sit,  
 phlegmone vitio appellatur, si pallidus, stauus ve, vel ex pallido flauoque mixtus, erysipelas. Et  
 Rasis, Calida (inquit) apostematà alia sunt sanguinea, alia cholerica, & communicat eis simul caliditas  
 loci, sed differunt colore. Vnde Auic. dicit; Et discernitur à phlegmone, quoniam erysipelas appa  
 reat magis habet colorem, & ex phlegmone apparet rubedo ad nigredinem declinans. Et reddens ra  
 tionem dicit; quoniam plurimum coloris eius est occultum in profundo: & rubedo erysipelatis destrui  
 tur per actum flammæ, & albet eius locus. Et reddens rationem dicit; causa subtilitatis materiei ru  
 beæ, aut separationis eius, deinde redit velociter. Est similiter non est rubedo phlegmonis. Et vides  
 in rubedine erysipelatis colorem croci, & citrinitatem. Gal. optinè docet tumorem diversitatem in co  
 loribus. Differtur etiam illi morbi, in forma tumoris. pulsario enim, teste Gal. magnæ phlegmones  
 proprium est symptomata, quippè quæ altè magis in corpus dimittatur: erysipelas in cute potius con  
 sistit, quam alie descendat. Et rursum; Vna quidem est hæc dispositio sanguinis tumoris, in carnisfor  
 mibus corporibus maxime fiens, secunda verò est cholerici circa cutem consistens maxime. Vnde di  
 cebat Auic. & purum erysipelas non impellit penitus, & phlegmon impellit: Cuius rei assignans ra  
 tionem Galenus, inquit; Vnde est, quòd erysipelas non eleuat, & magis apparet in cute? Quoniam  
 tenuis substantiæ est pallida bilis humor, itaque facile ad ipsam cutem transiit, carnosus rarique cor  
 poribus transiit; cutis verò densitas non æque est huic bili peruia, nisi fit admodum tenuis, æquola  
 que est: talis namque maxime est etiam, quæ quotidie cum sudore exit. Bilis autem, cum ad cutem  
 pervenit, expanditur, & accipit tantum eius latitudinem, & non vnitur, neque finem occupat. Ideo  
 Auer. dicit; Signa choloriorum apostematum sunt, coloris citrinitas, humorum subtilitas, & dolor  
 fortissimus, sine extenhone secundum omnem modum.

Differentia ex puritate materiae ex iam dictis elici potest: nam in phlegmone sanguis est, cum quo  
fieri semper aliquis alter humor concurrit; bilis vero sola haec esse potest. Et ideo Auic. dicebat; Ery-  
sipelas est purum, id est potest coningere ex bile sola, & non est ali phlegmon. Vnde notandum est  
quod docent Gal. & Aetius, quod erysipelas est (sub duplici consideratione, scilicet aut eius quiddam curam  
exulcerat, aut magis profundatur. Nam sola existente bile, aut mala, aut adusta, sua quodam acuta-  
te, & caliditate curam offendit, cum ulcerando. Et hoc dicit Gal. Est purum erysipelas, quod antiqui  
perpetem nominabant. Et hoc est, quod Auic. dicebat; Et prouenit quandoque ex caliditate erysi-  
pelas ad hoc, vt comburatur cutem, & eius virulencia vesicatur, & exoritur. Hoc etiam dicit Gal. Quan-  
do enim prouenit cholericum rheuma, quod quidem tale cuterdinaliter est, vlcera cutem: quod ve-  
ro aequum, aut sanguini commixtum, minus est acre, & magis in tumorem eleuat particulam, quam  
ulceret; Haec consideratio fuit ad curam. Nam Gal. & alii scriptores in puro erysipelate negant venae  
sectionem. Et ideo Auic. in cap. de cura erysipelatis dicit; Si indiget phlebotomia, phlebotomia etiam;  
non enim in omni erysipelate sectio venae conuenit, nisi in admixta materia. Et Gal. dicebat; Si fuerit  
cholera admixta sanguini, venam secare opus est. Et talis passio erysipelas phlegmonodes denomina-  
re debet. Quando vero neque certissime fuerit cholericum rheuma, neque sanguineum, sed ex vtri-  
usque mixtum, ab eo, quod praedominatur in mixtione, ei nomen imponatur; pari modo ex bile, & alte-  
ro succo mixto fieri potest.

In aliquibus lymphomatibus differt hæc passio à pleurione, quæ hanc concomitantur ægritudinem. Dicebat Aulic. Erysipelas atteratit febrem vehementius, quàm pleurionem. Declarat Gal. veritatem huius propositionis, dicens: Quando calor sanguinis, qui est in membro apostemato, fuerit, calor quietus, & fuerit sanguis, quem totum continet corpus, æqualis complexionis, forsitan non accidit ei, vt calefactione membri infirmi calefact corpus: Sed quando talis caliditas fuerit fortis, calefact corpus fortitudine ebullitionis eius. Et quando fuerit, vt sanguis, quem totum continet corpus, dominetur cholera, tunc non fiat, quin calefactione sua manifesta, & superficiali, calefact totum corpus: Nam id velocius calefit, quod est velox ad resoluendum, & in natura sua est calidum. Et similiter quod refrigeratur, est res, quæ est velox ad coagulandum, & in natura sua est frigida. Velocius autem ad resoluendum ex eis, quæ in corpore sunt, est spiritus. Quod verò est subtilius, tenuius, & calidius, est cholera rubra; ergo acutius, & subtilius, ac caliditas huius humoris facile potest superfacile facere spiritum, & spiritalem, seu ephemeram febrem generare: quæ cum ad tumorem sequitur, accidens dici potest, vt ex Hypp. & Principe liquet: Et idco propter sui humoris subtilitatem erysipelas est velox ad febrem citandam; idque magis cum in bilioso corpore contingit. Et Gal. dicebat, scæpet videmus febrem, quæ peracuta dicitur, sequi incensum passionem propter humores cholericos, & putrefactos, & inflam-

- 10 inflammatus in corpore. Quo nam modo ex tumoribus accendatur febris, docet Gal. dicens; Calor ab eo, in quo est purredo, exordium capit, deinde ad vicinum membrum distenditur, & ab eo ad aliud, usque ad illud, quod caloris est initium, & fundamentum: postea totum corpus cum corde vnum efficiuntur in passione. Accidit talis passio saepe in facie, ut dicit Auic. Et incipit à lepore nasi, & augmentatur apostema, & expanditur per faciem totam. Hoc fit, cum causa est intrinseca. Gal. reddens rationem, inquit; Bilis est de natura ignis, ideo supremas facilius petit partes, & ideo ad calvariae laciones concurret. Hic morbus de facili aduenit, necnon in morbis membrorum siccorum, & est multi timoris. Dicebat Celsus; Erysipelas periculum magnum avertit vique, si circa ceruicem, aut caput consistit. Et Paulus dicit; id verò scire oportet, erysipelatam, quae capiti potissimum oboriuntur, plus facillè negotij, adeoque esse periculosa, ut nisi efficax consequatur auxilium, interim quoque affectos strangunt. Malum est etiam erysipelas, quod in osse denudato apparet, auctore Hypp. Vnde Auic. dicebat; & quando accidit erysipelas in fractura ossis, tunc est malum. Gal. dicit; raro accidit erysipelas in osse denudato, sed quod malum est, est videre substantiam ossis denudatam, & carnem circumstantem erysipelatam. Dicebat etiam Hypp. Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, malū. & Gal. dicit, q̄ malignis erysipelatibus hoc accidit; Nam, ut diximus, malum phlegmon est, quod non suppuratur, eum natura sui humoris fit suppurari: pari modo, malum erysipelas est, quod ad supurationem tendit; nam eius materia resolutioni valde apta est. Dicitur etiam ab Hypp. erysipelatam ab exterioribus verti ad interiora, non esse bonum; ab interioribus autem ad exteriora, bonum: pessimum autem est, si in corpore pregnantis contingit; nam, auctore Hypp. factum enecat. Ilius tumoris principium cum difficultate cognoscitur, propter motus velocitatem; cognoscitur augmentum ex accidentium additione; status patet, quia sunt in summo; declinatio manifesta est. Fit vipturimum per viam cathari; Ferè nunquā exacerbat. Eius materia est calida, & sicca, subtilis substantiae: Aut fit ex tenuiori, & calidiori parte sanguinis, vnde inter acutas enumeratur passionēs. Motum sequitur tertianarum, nam cum materia tertianarum habet affinitatem.

1. de diff. feb. cap. 17. & li. com. mor. li. cap. 1.

Lib. 7. cap. de cura erysipelas. Lib. 4. cap. 1.

7. part. aph. 19 in com. aph. 7. aphor. 10. 20. com.

4. aphor. 17. & 1. lib. de mor. bus lib.

De cura erysipelatis. Cap. II.

- 40 **M**ODUM curandi hanc intemperiem materialem cholericam nunc declarare intendō. Et dico, quod finis illius curæ duplici intentione sortitur. prima, totum corpus in rebus non naturalibus regendo, & præcipuè in euacuatione, aut cum phar macis chologogis, idest cholerae educiuis, aut sanguinem emittendo. secunda membrum particulare opportunis remedijs gubernando, reperculsionem fortiorē, quā in phlegmone, querendo, nulla obuiante causa: vel euaporationem secundum immanifestam sensui transpirationem eligendo; & accidentia, si occurrerint, remouendo.

- Aer in hac passione eligendus est temperatus, magis ad frigidum, & humidum vergens, quā alio modo. Et si non fuerit sic naturalis, fiat ab arte; & præcipuè in æstate, cum effusione aquæ fontis in thalamo patientis, & foliorum salicis, nimpheæ, vicis, rosarum, violarum, & similium rerum, ut in passio nibus calidis docent Gal. & Auic. Tale etiam sit victus regimen ad frigidum, & humidum vergens, ex Hypp. cum passio in actius sit calida, & in passiuis sicca, cibi sanguinem aliqualem ingrostantes sum me conueniunt; quamvis dietha tenui vtendum sit. Sufficit comedere panatellam, cum lacte seminum communium, aut hordeum decoctum, vel psitanam hordeaccam, aut condrum, aut comedat lactucas, boragines, cucurbitas, & similia. Sim hæc decocta in iure macræ pullæ; quia sunt frugienda pingua omnia, vinctuosa, calida, acuta, salia, & dulcia; sed acetosis vtatur rebus, & sobriè viuat, absque carnibus, ouis, & cafeo. Dimittat vinum, dicebat Celsus, & maxime cum aliqua apparuerit febris: Sed vtatur vino ex granatis cum Iuleb violato, & aqua hordei, aut coriandrorum, aut fontis: Membrum verò erysipelatum omnino quiescat, sed illi opposita leuiter, loco exercitij, fricentur, ut succus aliquater diuertatur. Dormiat patiens, quia vigilæ corpora exsiccant. Et omnino ab ira, clamore, & omni sanguinis motione fugiat, atque castè, honestè, & late viuat.

- De euacuatione, dicebat Auic. oportet, ut euacues corpus ab ea cholera, quæ ventrem cholerae ex auct. Gal. vbi dicit; Scito hos purgatorijs chologogis, idest cholerae educiuis, per ventrem purgandos esse. Et rursum; Quid verò me commemorare opus est (ait) ut nullum remedium sacro igni (erysipelas Græci dicunt) efficacius adhibeatur, quā bilem expurgans? Et iterum; Sed pro sanguinis misione medicamento, quod bilem trahat, purgantes faciemus. Vnde Auic. enumerando passionēs cholericas, enumerat erysipelas. & dicit; In cura quidem horum morborum est, sicut in cura tertianæ febris, procedendum. Educatur ergo cholera absque phlebot. Ille auctoritates vter sunt in pura bile, ut in herpete; nam, dicit Gal. ex vena in talibus sanguis mittendus non est, sed ventrem tantummodo expurgare sufficit, dandum autem medicamen, quod bilem stauam educat. Sed cum admixta est aliqua portio sanguinis, dico, quod competet etiam phlebot. nam dicebat Auic. cap. de cura erysipelatis; Si indiget phleb. phlebotoma etiam. Non tamen absolute phlebotomiam præcipit, sed cum conditione,

10. metho. c. 8. 1. li. 7. cap. 19. 1. aphor. 16.

3. ad Gluc. cap. 1. & 4. Li. quæ quid purg. conuenit. 14. methodi 3. com. 100.

3. ad Gluc.

Lib. 7. cap. pro-  
prio.

3. practica.

5. Remedia.

tionem, si indicet. In pura enim bile venæ sectio non conuenit. Ait Celsus; si vires patiuntur, sanguinem mittere oportet, & id magis, cum sanguini bilis admixta fuerit: quod cognoscitur ex tumore, & pulsu; Vnde etiam Halliabus dicebat; Quando erysipelas est sine tumore, tunc competit solutio ventris; & si fuerit cum tumore, phlebotomia conueniens, & solutio ventris. Idem dicit Serapion. Vnde si sectione venæ opus fuerit, secā, sique talis potius diuersa, quam euacuatiua: & sit in principio morbi. In sequenti verò die patienti exhibetur pharmacum ex casia, aut diacath. aut manna, aut syr. ros. fol. Aut R. pulpæ casie no. ex. 3. j. diaprunis fol. 3. ij. zuchari q. s. prof. bolo: Aut R. pulpæ casie, elect. diacath. an. 3. vj. elect. ros. Mel. 3. ij. decoct. fructuum q. s. syr. ros. 3. j. misce, & fiat p. cuius medica. dosis poterit minui, & alterari pro ægrotantis robore, natura, consuetudine &c. Residuum præparetur cum syr. acetoso simpl. de endiuia, violato, an. 3. s. & roretur cum aqua acetosæ, endiuie, portulacæ, an. 3. j. aut cum aqua fontis 3. ij. Aut in materia maligna R. syr. de succo acetosæ, de succo endiuie, rosati an. 3. s. Aquarum acetosæ, buglossæ, cycoreæ an. 3. j. misce. Præparata materia, si fuerit opus alia euacuatiua, vt R. floribus casie no. ex. 3. vj. manæ elect. syr. ros. fol. an. 3. ij. aquæ endiuie q. s. Vel R. elect. diacath. manna an. 3. s. elect. de psyllio 3. i. s. rheubarbari elect. secundum artem intusi 3. s. syr. violat. fol. 3. j. decoctionis communis q. s. fiat p. 6. Aut R. rheubarbari elect. 3. s. spicæ g. ij. vini maluatici, parum, aquæ acetosæ q. s. misce, & fiat infusio; & facta diligenti expressione, adde syr. ros. fol. 3. ij. & p. Ralis summe laudat scammonium cum aqua casie, aut tamarindorum.

Hæc stant in pectore medici; nam aliquando querit euacuare materiam antecedentem, ne transeat in consumtum; interdum corpus refrigerare solum curat. Sed auctoritate Gal. debemus euacuare, quando materia est multa: aut primarijs membris vicina, aut ægritudo furiosa. Et Auic. Bis venam secare, bulque pharmacum exhibere non negat: nam dicit; Et si indigueris reiteratione solutionis ventris, vel phlebotomiz, fac illud secundum quod calet ex duabus materijs. Notat Gal. quod si passio parua fuerit, neque hoc facere est necessarium, sed sufficit chlistere acri vti; Vt utroque modo patiens quotidie habebat ventris benedictum, saltem cum enematis, vt R. foliorum maluarum, violarum, an. m. ij. hordei, fursuris an. m. j. seminis citoniorum 3. ij. bulliant in aqua fontis secundum artem. R. prædictæ decoctionis, vt erit opus, vt puta lib. j. & adde, olei violati 3. ij. mellis violati 3. ij. vitelli ouorum numero j. salis coctæ duo, misce, & fiat enema, & vere ante cibi assumptionem.

ad Glau. 4.

De secunda operatione dicebat Gal. Et hoc per initia quidem infrigidandum est, tunc præsertim, quum sine manifestâ occasione factum fuerit. Vnde Auic. dicebat; Post euacuationem permulta te ad infrigidandum illud cum infrigidantibus fortibus, sitis in capite phlegmone. Idem voluit Cornelius, Actius, & Paulus. Debent esse talia medicamina frigidiora his, quibus in phlegmone vitium; Et ideo, quæ potenter valent in phlegmone, erysipelata etiam curare possunt. In phlegmone temperatè frigida conueniunt, dicit Princeps ex sententia Gal. sed in erysipelate, quæ multum infrigidant: quoniam (dicit Auic.) flamma, & dolor inflammatus in ea est plus: & euacuatio in phlegmone est magis necessaria, quando materia in eo est magis inobediens, & grossior: Non tamen nec ad opium, vel hiosciamum, aut mandragoram deueniendum est; nam Gal. dicit; si sine methodo infrigidatio adhibita fuerit, scytotizabit apostema sic, quod temissima minime proficiunt. Eligenda igitur medicamina opportuna sunt, vt & membri natura, & morbi qualitas, & virtus infirmi deliderat. Et terminum infrigidationis assignat Gal. dicens; Esto autem refrigerationis terminus, ipsa coloris mutatio: etenim quod purum erysipelas est, statim cum hoc quiescit: Vnde Auic. dicebat; Infrigida, donec alteretur color, purum enim destruitur cum alteratione coloris, & diminutione ipsius. Dicit Gal. quod si non fuerit purum erysipelas, sed phlegmonodes, & priusquam refrigeres, liuidam cutem præfert, tunc rationabiliter est cessare infrigerantes, priusquam percutiam particulam liuor, vel nigredo præoccupet, innato calore refrigerato: Ergo satius est, ubi laborantis particula alteratum colorem videris, à refrigerantibus, astringentibusque ad contraria transire, priusquam vel liuida, vel nigra prorsus fiat. Et hoc est, quod dicebat Serapion, & Auic. cap. proprio: & caue iterum, ne denigretur membrum, & fuscum fiat, & incipiat ire in viam corruptionis. & cum apparet aliquid de hoc, incede in contrarium &c.

14. methodi.

Vnum notat Gal. & Ralis, quod si inflammatio fuerit multa sic, quod corrumpat complexionem membrum, tunc debet infrigidari, & remitti, etiam si nulla præcesserit euacuatio, atamen in corpore non impleto, & in tumore à principalibus remoto. De medicinis hanc operationem perficientibus, opinioniones multe, multæque descriptiones reperiuntur. Nam in erysipelate a benigna materia, cū quæ excoriationes minime apparent, auctore Gal. vt etiam docet Ralis, frigida, & humide medicinz conueniunt, & maxime in principio, & augmento: ex quibus laudat Gal. solastrum, semperuium, portulacum, vmbilicum Veneris, psyllium, altercum, lactucam, intubum, lentilium palustrem; & cetera ex aqua admodum frigida. Vnde Auic. dicebat; Et permulta te ad infrigidandum cum infrigidantibus fortibus, sicut cum aqua frigida. Laudat Hypp. hanc intentionem, quando dicit; Frigidum erysipelas non laceratum iuuat, viceratum verò ladir. Conferunt etiam talia medicamina, indicatione sumpta à materia erysipelatis, quæ calida est, & sicca; ideo medicamina debent esse frigida, & humida, vt talis fuscus ad temperiem reducat; quia talis humor, dicebat Gal. non solum contristat membrum, in quo est, sua quantitate, sed etiam qualitate.

Cum

- 10 Cum vero apparet aliqua excoriatio, quæ infigrant, & siccant, summè conveniunt cum aliquali stipticitate; & ideo Auic. loquendo de hac passione, dicebat; Et oportet, vt sit infigrantio eius in principio fortis stipticitatis, ad hoc, vt forsitàn augmentetur eius stipticitas super ipsius frigus. Et ratio est: nam cum exulceratio apparet, ex Gal. materia peccans subtilis est, ideo indicatione sumpta à tali materia, frigida conveniunt propter caliditatem, & sicca propter subtilitatem, vt expellatur materia, & confortetur membrum. Et quanto materia fuerit subtilior, tantò magis medicina debet esse stiptica. Ideò Auic. non absolute stipticitatem præcipit frigiditatem prævalere, sed dicit; ad hoc vt forsitàn augmentetur, scilicet cum apparent excoriationes, aut vlcationes, quæ siccitatem desiderant. Verificatur operatio hæc ex Auic. quando dicit; Et cum erysipelas est incedens super cutem, curetur cum his, in quibus est resolutio, & exsiccatio fortis cum infigrantione: & non incedit erysipelas super cutem, nisi dum excoriatur. Verificatur item hæc opinio, quia Auic. de cura formicæ, & quæ currunt cursu eius, dicit; Via autem, secundum quam curatur formica, est, vt quæ ex ipsa est corrosiva, alienetur ab humectatione, quam iam administrasti in erysipelate; quia humectatio ab vlcibus valde aliena est. Et verè eadem est materia formicæ corrosivæ cum erysipelate apparente, quòd herpes exardens dici potest. Nam, dicebat Auic. Cholericum apostema, aut est à cholera subtili valde, quæ non continetur in eo, quod sit magis intus, quàm illud, quod apparet de cute, & est acuta, & sit formica; & ex ea aut ambulatiua sola, & est subtilior; aut ambulatiua corrosiva, & est mala.

3. l. 4. tract. 1. cap. 7.

idem 4. l. 1. c. 8

3. l. 4. cap. 2.

- Igitur cum apparet mala complexio materialis in aliquo membro, præmissa vniuersali intentione circa regimen in rebus non naturalibus, ad talia medicamina deveniendum est, & maxime in principio, & augmentosquorum latitudo adeò brevis est, quòd magna cum difficultate percipi potest, propter naturam humoris. Cognoscitur tamen ex vehementia, & acuitate accidentiũ, & primò hæc olea laudantur, & si oleum est calidæ complexionis; nam Gal. dicit; Omnia olea sapiunt naturam eorum, quæ in grediuntur, ideo valet oleum rosatum, & maxime omphacinum, violatum, de semine citrulli, de semine cucurbitæ Gal. de nensure Rafis, de semine lactucæ Gal. de semine papaveris Gal. de semine hiosciami eiusdem. De vnguentis, vnguentum rosatum Mesue, de calce lota cum oleo rosato, infigrants Gal. populeonis, de lytherigra crudo &c. Aut R. aquam fontis frigidam, & cum ea locum super fomenta. Aut R. olei ros. ompha. mirrhini an. 3. ij. vnguenti ros. Mes. 3. j. populeonis 3. s. ceræ albæ q. s. pro vnguento. Aut R. succi plantaginis, vnguenti ros. an. 3. j. & cum albumine oui fiat linimentum. Alter, auctore Gal. R. coriandros contritos cum modica cera, & albumine oui. Aut R. ex Gal. succi solani, olei violacæ an. q. u. spumæ argenti, cerussæ ad fissitudinem. Alter, quo vtor. R. spumæ argenti 3. ij. olei violati 3. ij. misce, & emplastra. R. florum chamamelis, rosarum, farinæ hordei, sumachi, mirthillorum an. m. s. violarum, nimpheæ, an. m. j. bulliant in vino nigro stiptico, & fiat emplastrum. Aut R. malvas decoctas cum coriandris, & lentibus, & pistentur, & cum oleo violato, & parum aceti, fiat emplastrum. Aut R. foliorum maluarum, violarum, nimpheæ, hordei mundi, an. m. j. bulliant in aqua, & pistentur, cui addatur seminum cithoniorum, mucilaginis, plilij, an. 3. j. vnguenti populeonis, ros. Mes. an. 3. j. olei violati q. s. misce, & in mortario plumbeo fiat emplastrum.

6. simpl. cap. 110

7. simpl. cap. 3. r. 3. ad alm. c. 11 3. almi. for. c. 3. 9. 7. simpl. cap. 101 8. simpl. cap. 148

3. ad Glm. 4.

- Sequitur Auic. loquendo de diversitate complexionum medicinarum, quò ad temporum diversitatem, & dicit; Circa statum verò sit ipsius frigus vehementius stipticitate eius, & dicit auct. Hypp. & Gal. Cave cum hoc, ne redire facias materiam ad membrum intrinsecum, aut ad membrum nobile; Quare non debent esse stiptica medicamina in statu, sed frigida; quia cavendum est (dicebat Gal.) cum materia est coniuncta, ne ad duritiem perducatur: sed frigiditas cum aliquali resolutione laudatur; nam in statu indigenus alteratione aliqua, cum resolutione, vt doctè docet Rafis. Et ideo convenit emplastrum ex folijs liliorum alborum, decoctis in vino, tritis cum farina molendini, & oleo violarum. Aut R. lanæ succidæ vtr. 3. xij. carbonis de interiore cortice pini 3. x. scorie plumbi, sepi caprini veteris, abluti cum aqua solatri 3. xv. olei mirrhini 3. v. ceræ. 3. xx. Aliud, R. plumbi vtri, succi ruthe, olei rosati an. 3. ij. ceræ. 3. s. Aliud Rafis in Antidotario, fenthal. rub. siph. memite, faufel, cerussæ, boli arm. an. 3. s. corticum mandragoræ, opij an. 3. vj. aquæ rosarum, aceti an. parum ceræ 3. ij. misce in mortario plumbeo, & fiat vnguentum.

7. aphor. 3. r. 14. metho. 3. 3. ad Glm.

Diuis. 126.

- Tempus declinationis continetur in statu, nam cum coniungitur, materia citò resoluitur; & ideo de tali tempore nihil dixit Auic. sed Rafis in diuisionibus dicebat; Cholericum apostema parum indiget resolutione, quoniam resoluitur per se ipsum post statum ipsius, adeo quòd nulla indiget operatione. Et quia talia apostemata rarò sunt exuralia; ideo de eis nihil dicam. Sed notandum est, quòd cum frigus inimicus sit vlcibus, quòd erysipelati excoriatio aucta calida medicamenta applicentur. Non tandum est etiam, quòd post istius dispositionis resolutionem, sæpe in membra aliqua mala dispositio remanet, quæ mala sua qualitate, interdum venenosa, membri complexionem corrumpit; & ideo dicebat Gal. Transacto autem seruire, & impetu, murato etiam colore, si locum scarificare volueris, nihil læferis, sed profueris; & veteri cataplasmate resolvente, & exsiccante ex farina hordei, aceto, & aqua maris. Et si remanserit durities, veteri cerato diaquilone.

7. aphor. 20.

3. ad Glm. R. 14 methodi.

- Vum restat videre, quod adnotauit Hypp. dicens; Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, malum. Et Gal. dicit, quòd illud erysipelas est malum, quòd tendit ad putredinem: quod est malù per se De Choler. Tumo. Lib. I. Tract. 3.

7. aphor. 20. metho.

E viam

viam causæ: quia sanies in erysipelate sit à materia acuta, & calida, & per consequens corrosiva, ad quam sequitur vlcus phagedenicum. Et est mala per viam signi; quia naturæ impotentiam declarat, cum materiam resolutioni aptam resoluerè minimè possit. Necnon materiam valde malam declarat, quia crassam, deductam ad sanguinis substantiam. Ideo Auic. dicebat: Et si fuerit cholera mala, & transierit in grossiorem suam usque ad substantiam sanguinis, accidet erysipelas malum. Hac autem aut pruna, aut sacer ignis, vel herpes dici solet.

## De Venæ sectione Dubitationes.

Videndum est, nunquid in cura erysipelatis venæ sectio conveniat. Et primò videtur, quòd sic ratione, & auctoritatibus. Ratio est, quia à phlebotomia talis materia evacuari potest; ergo competit: maior est nota, cum phlebotomia sit vniuersalis euacuatio, auctore Gal. & Auic. Præterea cum concedunt etiam Celsus, & Paulus. In contrariū meī sententia Gal. qui cum loqueretur de cura istius morbi, dicit; Scito hos uniuersimè esse phlebotomandos. Et rursus alibi dicit; Loco phlebotomiæ medicinis cholerae eductiuis patiens est purgandus, ab hac sententia non recedit Rasis, & huic opinioni videtur suffragari illa Auicennæ auctoritas, quæ dicit; Et in vniuersum cauere debes, ne egrotò duorum aliorum alteras, vel humorum biliosorum ebullitionem, vel frigidorū crudelitatem: cum enim sanguis, auctore Gal. si fœnum cholerae, eo remoto, cholerae acuitas magis accenditur. Huc dubitationi ex superius dictis responsio patet. Nam in pura materia cholerica nullo modo venæ sectio conuenit: in materia verò sanguini admixta competit sanguinis emissio, sic voluit Aetius, quando dicit; Eam igitur, si sanguis caubere, venæ sectione curabimus: si bilis, medicamentò fluxam bilem ducente, corpus euacuabimus. Et quia verba Principis in hoc loco sunt aliquantulò obscura, decreui ea exponere. Dicit Auic. cap. de cura erysipelatis, loquendo de phlebotomia; Phlebotomia nō multum confert, nisi quando materia est inter duas cutes; si autem profunda fuerit, minoratur eius iuuamentum, & fortasse attrahit. Verè hæc verba magnam in actu practico difficultatem semper fecerunt, cum iam dictum sit, quòd quanto magis materia fuerit pura, & subtilis, tanto minus laudatur venæ sectio: igitur si materia fuerit inter duas cutes, declaratur eius simplicitas, auctore Gal. cum dicit; Verum enim, & certum erysipelatis cutis tantum, vel pellis passio est. & Auic. dicebat; Cholericum apostema aut est à cholera subtili valde, quæ non continetur in eo, quòd sit magis intus, quàm illud, quòd apparet de cute: ergo in tali dispositione sanguis emissio non est scienda.

Sequitur Auic. Si autem profunda fuerit, minoratur eius iuuamentum. Profunditas succi eius arguit mixtionem cum sanguine. & si scienda est phlebotomia, summè conuenit in tali tempore, & dispositione: itamen Princeps dicit, quòd minoratur eius iuuamentum. Conatur & Dinus, & Gentilis hanc exponere sententiam, & Principis verba saluare. Tres expositiones huius rei assignant Doctores, & dicunt, quòd per materiam esse inter duas cutes, paucam bilem cum sanguine multo admixtam intelligere debemus, qui sit aptus fluere, & pro parte est in fluxu: si autem profunda fuerit, idest si bilis multa fuerit, & quòd non profundatur per admixtionem sanguinis, sed propter eius quantitatem: tunc minoratur iuuamentum phlebotomiæ. Secunda expositio talis est. Quando materia est inter duas cutes, idest quando materia plus impellit, & apparet errumet, signū est, quòd sanguis secum est plurima admixtio, cum natura sanguinis sit impellere, & tumorem causare, vt de phlegmone dictum est: si autem profunda fuerit, idest si minus impellit, vel nullo modo impellit apparetur, minoratur iuuamentum phlebotomiæ, nam bilem peccare declaratur, & fortasse attrahit, idest fortasse augentur tumores: Tertia exp. est. Quando materia est inter duas cutes, idest quando materia est benigna, & non adusta, sicut erysipelas ex bile benigna, vel ex sanguine subtili proportionato cholerae, conuenit phlebotomia: si verò profunda fuerit, idest si fuerit grossa, vel adusta, & calidissima, sicut erysipelas malum; quòd vesicat, & vicerat cutem (nam bilis propter eius adustionem profundatur, & etiam cutem exulcerat) tunc phlebotomia iuuamentum minoratur. Profectò istæ expositiones non sunt ad rem. Et ad primam dico, quòd Princeps ibi loquitur de materia cholerica sola, & non de admixta; cum inferius, vbi de pruna, igne persico, & formica agit, diffusè locutus sit de bile admixta, & adusta. Nec est vera hæc prima exp. quia si bilis fuerit pauca, & sanguis multus, non debet dici erysipelatis, sed phlegmonis, auctore Gal. Nam tunc fiet tumor eleuatus, & materia non stabit inter cutes. Nec valet dicere, quòd sanguis sit aptus fluere; quia tunc erit materia cholerica pura, & pauca; & ex methòdo non competit phlebotomia. Ad alteram partem autem si profunda fuerit, idest si fuerit multa, & non admixta, sed multa in quantitate, tunc minoratur iuuamentum phlebotomiæ. Ad hanc dico, quòd si fuerit sola, etiam quòd multa, non per hoc stabit in profundo; quia (vt declaratu est) eius natura est, expandi ad extra. Ad secundam expositionem dico, quòd aliud est esse inter duas cutes, & aliud esse eleuari in tumorem, & impellere. Hæc accidentia differentiam ponunt inter erysipelas, & phlegmonem. Et verè quòd inest vni, non accidet alteri. Non est igitur dicendum, quòd erysipelas eleuet; quia eleuare est de ratione grossarum partium. Et ad alteram partem, quando dicunt; si verò profunda fuerit, idest si non impellit, quia materia est pura, & sola, iuuamentum minoratur: dico, quòd non est vera exp. quia de ratione cholerae non est neque profundare, neque eleuare: & eò magis, si sola fuerit, & pura, vt ipsi exponunt.



10 Ad tertia expositionem, quæ satis apparens est, quando dicitur, quod bilis alia est benigna, & naturalis; alia furiosa, & acuta. & ponendo differentiam inter ipsas scribitur, quod cholera benigna non eleuatur, neque profundatur, sed stat inter duas cutes. Quæ autem est crassa, & adusta, ex qua fit malum erysipelas, profundatur; et in hac non competit phlebotomia, imò attrahit; sed peccante cholera benigna, potest competere phlebotomia. Hæc, ut dixi, verior est, non tamen visquequæ consentit verbis Auicennæ, & omnino repugnat dictis antiquorum, qui vno ore negarunt, in erysipelate ex materia simpliciter cholerica, cuiusmodi est, quæ ad cutem diffunditur, conuenire venæ sectionem, ut iam demonstratum est. Quare reiciatur.

Aliqui dicunt, quod textus debet stare sic; & phlebotomia non multum confert, nisi quando materia est inter duas materias; id est quod ly cutes, debet dicere materias: si autem in profunda fuerit, id est superficialis, minoratur iuuamentum, vel profunda, id est pura bilis, sed adusta: nam minoratur iuuamentum phlebotomia in materia cholerica adusta, per comparationem ad materiam cholicam, sanguini admixtam, aut ad sanguinem cholicum.

Ego verò credo, quod condicionalis illa [nisi] nullo modo possit stare, & textus debeat legi sic: Et phlebotomia quidem non multum confert, quando materia est inter duas cutes, id est pura, biliosa, quia tunc expanditur inter cutes; Ideo dicebant antiqui, quod erysipelas est passio cutanea: si autem profunda fuerit, minoratur eius iuuamentum, id est si fuerit adusta, phlebotomia est minoris iuuamenti; cum verò cholera est adusta, est magis crassa, & magis profundatur; & dico, quod est minoris iuuamenti per comparationem ad phlegmonem, cuius materia profundatur, cum sit pura sanguinea. Princeps verò non negat iuuamentum in materia cholerica profunda, sed dicit quod minoratur. & ratio est, quia vera cura sanguineæ passionis est sanguinis emissio. Ex forte etiam tres inuadit gradus erysipelatis inter se differentes, quorum prior est super cuticulam, tanquam hos apparet; secundus inter duas cutes; tertius verò etiam in carne, primo non conuenit venæ sectio, quia à simplici bile procedit. Secundo autem conuenit principaliter, quia à bile cum sanguine mixta generatur. tertio autem minus competit phlebotomia, quoniam ab humore valde crasso fit talis morbus. Quod autem adit erysipelas super cutem incedens, in eodem loco declarauit Auicenna. Et hanc arbitror esse veram huius loci explanationem: quemadmodum vnicuique etiam patebit, qui sedulo, atque integrè caput illud perlegerit, atque totam sententiam auctoris collegit, quæ profecto tantum abest, ut Galeni dictis repugnet, quod potius illa exponit, atque diligentius, clariusque enucleat.

40 De pruna, & igne sacro. Cap. III.

**S**AECULUS ignis, aut percussus ignis, more Arabum, vel herpes, ut placuit Hypp. Gal. Paulito, Aetio, Oribasio, ac omnibus Græcis, aut ignis sancti Antonij, vel morbus diuinus, vel etiam hercularius ab Hercule, qui eo laborabat, est pustula, aut pustulæ plurimæ conuelliunt, adurentes, vesicantes cum ambulatione, & emissionne cholerica humiditatis, pauca nigredinis, sed plurimæ adustionis, ebullitionis, & eleuationis. & differt herpes hic à formica, nam quæ corrodit formica, non continuatur in forma vlcis, sicut herpes, sed habet pluralitatem: vlcis: herpes verò, de quo nunc loquimur, ad phagedenæ naturam conuertitur: nam fit hic morbus, quando sit uabilis, non naturalis, sola, & secreta, nullo alio admixto humore, in particulam aliquam condit, & talia producit simphomata: nec multum differt à puro erysipelate. verum. ut Gal. docet secundo ad Gla. tenuior est bilis, quæ herpetæ creat, quam quæ exulceratur erysipelæ.

50 Pruna autem, seu carbunculus, est pustula, aut pustulæ adurentes, & incum ad modum carbonis denigrantes absque humiditate, submersæ nigredinis. Et fortasse non apparent pustulæ; imò statim tantum escchara cum aliqua eleuata dimensione.

Solent namque in humanis corporibus à bile staua tumores parui generari, qui à medicis pustulæ appellantur; & diuersificantur ab erysipelate, quia materia erysipelatis est sanguis cholericus, aut sanguis mixtus cum cholera: sed ignis sacri succus, ut docet Gal. est sanguis seruofactus, & coactè deductus, vel naturam bilis. si enim ex sanguine, staua bile commixto, & intemperato, & calidiori, quam par est, vel si ex sanguine tantum seruenti, & tenui phlegmon fuerit exortum, erysipelas dicitur, id est ignis sacer. Magnam symboleatrem cum puro erysipelate tenet hic herpes, adeo quod antiqui seui nullam inter has passiones posuerint differentiam. Et cum istæ humiditates per vlcis: em coctionem adurantur, ad bilem atram conuertuntur, passioque illa fit, quæ pruna, & multotiens carbunculus nuncupatur. Et quia istæ duæ passiones sunt quæ eiusdem forme, & eiusdem materie, etiam quod vna sit adustio altera, id est de eis erit sermo sub vno capite. Dicebat Auic. materia prunæ, & ignis persici, est sanguis malus, cuius malitia est vehemens: vnde fit adustio, & prouenit crusta. Et quia sanguis cum adurit, ut declarat Cap. I. vique reuertit etiam Auic. ex eius subtili parte fit cholera, & ex crassa melancholia, id est cum aduine, permixtur, & non remanet amplius sub forma sanguinis, & expellitur à natura, ut dicit Auic. & non retinetur in aliquo membro, nisi in cute, & quod approximatur ei, id est in aliqua parte

Carnosa; & hoc quia ista humor, etiam quod sit factus biliosus, sapit tantum crassitudinem sanguinis. Succus verò erysipelatis, quia ab origine est cholericus, non continetur nisi in eo, quod apparet de cute. Si verò sanguis, qui permutatur, adurit, erit aptus, vt ex sui natura bilis atra generetur: quæ si ad extra expellitur, ex tali pruna generabitur, non autem cancer; quia materia cancri, siue carcinomaris est melancholia, genita ex bile flaua, vt cap. de carcinomate dicemus. Si verò in permutatione sanguinis subtilis, bilis multa generatur, quæ non tenet formam sanguinis, sed cholera, generabitur Herpes; ideò Gal. dicebat; flaua verò bilis quando sui seruans naturã, vna cum sanguine per totum corpus defertur, morbum facit, qui regius appellatur. sola verò, quando excernitur, & in aliquo membro confilit, Herpes vocatur: cum verò humor deductus est ad melancholiam, fit carbunculus, aut pruna.

Nec mirandum est, si Gal. & Rasis, & Paulus, necnon Oribasius, Aenilius, Auenzoar, Haliabas, & alij hanc passionem carbunculum appellauerunt. nam (vt dicit Paulus) cum sanguis in atram bilem conuersus, inferuescentque aliqua fe parte receperit, carbunculus fieri solet: quod vitium plerumque à putredine, & inebriatione confilii, interim verò & sine hac incipit.

Dicamus modò cum Principe, quòd ista duo nomina absoluantur super omnem pustulam corrosiuam, vesicantem, adurentem, facientem accidere escharam, qualem facit accideret combustio, & cauterium. Et verum est, quòd istud vltimum symphoma, inter sacrum ignem, & prunam quandam differentiam ponere videtur. Differentiam etiam ponit inter herpetem, & formicam: nam formica vesicat, corrodit, & adurit, non tamen crustam causat. Dicit Gal. Tumores hosce solitos esse aliquando secundum fucci malignitatem pustulas, aut ampullas præmittere; aliquando verò escharam tantum: Sed in hoc cognoscitur facis ignis, quia in primis locum pustulat, deinde vkerat, & escharam ducit.

Et ideò hæc passiones ab humore bulliente fiunt, & incipiunt aliquando ab ampulla, deinde fit vlcus escharoxes. Et Cellus dicebat, quòd istæ pustulæ sunt exasperatæ, continue, quarum nulla altera maior est, sed plurimæ, & perexigæ. Et Rasis dicit: Aliquibus membris pruritus, & serior intolerabilis quandoque accidit, vbi succedente tempore, ampullæ aqua subtili plenæ generantur. Vnde Auic. dicebat: Et totum illud incipit cum pruritu, sicut in scabie. Ratio est, quia materia talis non est totaliter apta transpirationi: Apparet interdum pruritus aliquo in membro, deinde vesicæ subtili quodam humore plenæ, quæ cum aperiantur, statim efficitur vlcus cum eschara, & talis passio appellatur ignis facis.

Et Cornelius dicebat, quòd ignis facis malis vlcibus adnumerari potest, nam scripit id nunquam sanescentem, eo quòd primum vitiatum est. Dicit Auic. Absoluitur istud nomen super illud apostema paruum, quod est de genere formicæ comeditiuæ cum talibus accidentibus, scilicet quòd materia propter sui caliditatem adurit; & quia subtilis, vesicat omnes partes, nisi epidermidam, penetrando. Quæ dum rumpuntur, ab eis exit humiditas cholerica, vlcens, & ambulans propter eius acuitatem, cum loci inflammatione propter fucci caliditatem. Et in hac non apparet nigredo, neque putrefactio multa, sed multæ apparent pustulæ alteratæ cum humore fetido, plurimum ebullientes, qui non est verò humor, sed humiditas foetida, sicut apparet in omni re calida, & humida, dum putrescit. Dicit Cellus, quòd potest videri id, quod exire; nam est medium inter saniem, & pus. Et quia non per se deò coquitur, in ea est fetor. Et quia in eius ebullitione status quidam reperitur, ideò ampullæ, & diuersæ procreantur. Dicit Gal. In his passionibus vlus cicatrizosum fit, quandoque quidem in cinericea eschara, quandoque verò nigra. Et caro, quæ in circuitu est, valde inflammatur. Absoluitur autem nomen prunæ, dicebat Auic. super illud paruum apostema, quod denigrat focum, id est cuius acuties nigra est. Nec dicendum est, quòd illa nigredo assimilatur est hyemeno: sed quia materia facta est melancholica, ideò tumor est obscurus, & talis nigredo est plurima, & submersa; & non multum eleuatur talis eminentia: non quòd de natura humoris melancholici non fit eleuare, vt in carcinomate, & scirrhu videri potest: sed non multum eleuatur; quia quantitas istorum tumorum est parua, vt dicit Cellus, & Princeps, scilicet ad lupini quantitatem. Talis etiam humor est siccus, & non fluxibilis, & per consequens non penetrabilis ad extrinsecam. Et aliquando talis succus nullo modo impellit, & nulla apparet pustula, imò in primis apparet pruna, id est eschara nigra ad modum carbonis, & supinalis, vt dicit Auic. Gal. verò dicit: eorum color non est liuidus, sed habet quid tplendens, sicut asphaltus, aut pix. Et rursus dicit nigra autem vt plurimum, & cinerica apparet eschara in vlcere carbunculo- rum. Vnde Auic. dicebat: & illud, quod appropriatur nomine prunæ, est nigra radices igne, & est eius splendor prunæ. Dicit Auic. quòd est apostema absque humiditate; & verum est, quia humor frigidus est, & siccus. Et Rasis dicit: Pruna est vlus, aut borhor cum crustis absque humiditate; & verè credo, quòd hæc passio ab Oribasio, & Paulo therebinthus appellatur, quibus suffragatur Dioscorides.

Sciendum est, quòd escharæ, quæ generantur in istis passionibus, sunt partes substantiæ carnosæ, aut cotanæ, quæ relinquuntur à proprio humido, accedente calido aliquo violento. Vnde remanet pars ita siccæ, quæ postea alienatur à substantia membri, & ideò separatur aut vi naturæ, aut virtute humidarum medicinarum.

Et quia non semper fit vltima adustus in huiusmodi sanguine; ideò aliquando apparet color ruber, qui à colore phlegmonis diuersificatur, cum ad quandam nigredinem tendat. Et cum subtilior pars fucci adustus remanet sub forma virulentæ, à tumore refultat: vt in membro cauterizato videri solet,

1. ad Glau.

14. methodi.  
15. continens.  
16. 4. cap. 15.

3. 4. cap. 9.

Lib. de tumor.  
prop. nat. 14.  
metho. cap. 10.Lib. 5. cap. prop.  
7. ad Alm. 17.

6. 4. cap. 9.

14. methodi. c. 10.

Lib. de tumor. c. 7.

Dinis. 133.

1. lib. 4. cap. 14.

10 let, à quo emanat humiditas tenuis. Differunt istæ passiones in hoc, auctore Auic. quia apparitio, & resolutio fit velocior in igne sacro, quam in pruna, cum pruna à magis adusta materia causari solet, & ideo stat supinalis, & profunda; in sacro igne est magis acuta.

De facili resoluuntur hæc pustulæ (dicit Princeps) quando oriuntur in membro carnosio: cum difficultate verò, cum in nervosis, & frigidis insiguntur. Et 14. methodi dicitur, quod febriunt de necessitate, quæ ita laborant, corpora. Et Princeps dicit, quod sunt cum hæc egritudinebus species malæ febris, vehementes caliditatis, & perniciosæ. Nec mirandum est, vt docet ipse auctoritate Gal. si accedant hæc passiones quandoque causa pestilentia, & earum materia sapiat naturam veneni, aut humoris corrupti. Dicit Auic. quod multoties hæc pustulæ phlegmoni assimilantur, & ad nigredinem tendunt in sui principio: & propriè in ætate sua. Nec credo Auic. aliud per hæc verba voluisse, nisi quod talis materia tempore pestis interdum generari solet ex humore corrupto, quod in aliquibus accidentibus phlegmoni assimilatur, vt in colore, & accensione membri, cum inflammatione totius. Nam color est nigrior colore phlegmonis, & apparet in tumoris principio, cum talis humor malignus, adustus, corruptus, aut venenosus membrum sua mala intemperie malè affectum reddat, statim quod ad ipsum opera nature expellit; vnde ad quandam nigredinem tendit, & propriè in ætate sua, id est in sui consistentia; & est tempus, in quo materia est coniuncta, & apparet effectus. Correllariè in istis passionibus pruritus in primis apparet, deinde pustulæ cum ampullis, & alijs accidentibus, vt dictum est. Dicit Celsus, quod talia vlcera sunt cachoetæ, & generantur in facie, pedore, & lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueque in plantis, & est cutis passio sine altitudine.

Lib. de tumor. prur. nac.

14. methodi.

30 De cura prunæ, & sacri ignis. Cap. IIIL.



Va istarum passionum tres principales habet conceptus: quorum primus est, rerum non naturalium debita administratio, vt docet Gal. secundus est antecedentem materiã adæquareterius ad localia extenditur, accidentia coarctat. Regimen rerum non naturalium in aliquibus regimini erysipelatis assimilatur, & magis, cum materia ad bilem declinat. Fugiendus est aer calidus, & siccus, nec propter hoc humidior eligendus est, cum in putredinem addat, sit igitur tēperatus.

1. de comp. m.

40 omnia calefacientia, & exsiccantia. Sed auctore Gal. humedantia frigida bona sunt. Hæc actū, & potentia fin talia, cum morbus ab adusta causa creetur. Non laudatur motus, nec vigilie, cum corpora siccant. Sic etiam nec ira, sollicitudo, tristitia, & animi passiones, vt supra diffusio diximus. Dicit Cornelius, vbi de sacro igne, & eius curatione: cum tamen febricula accessit, abstinentia, lectulum, alui educatione opus est. In omni verò sacro igne neque lenibus, & glutinosi cibis, neque falsis, & acerbis vtendum est, sed quæ inter vtunque sint, qualis panis est sine fermento, pisces, hædus, aues omnique fere venatio, excepto apro. Et si non est febris, & gestatio vtilis est, & ambulatio, & vinum austerum, & balneum, atque in hoc quoque genere potio magis liberalis esse debet, quam cibus.

Secundus conceptus, corpus euacuando, consequi solet, aut sanguinem emittendo, aut alui educatione. Quod venæ sectio conueniat, rationem reddit Auic. vbi dicit; Necessaria est phlebotomia, vt euacuetur sanguis cholericus; & quando egritudo est timorosa, tunc necessarium est ipsam approximari finchopi. Rasis dicebat; Quando in corpore egrediuntur bothor, & incipiunt velociter peruenire ad hoc, vt fiant crustæ nigrae, aut virides, & quod est in circuitu eorum, rubrum, aut coloris violacti, tunc id nominatur ignis perficus: & tunc oportet, vt extrahatur sanguis cum phlebotomia ex loco opposito educatione plurima, donec accidat finchopis. Hæc fuit Gal. opinio, cum dicit; Et quidem vtique, & quod à phlebotomia incipienda sit sanatio, manifestum esse existimo. & si fuerit vsque ad lipothimiam, cū magis iuuabit, præterquam aliorum quid absit, quod prohibeat phlebotomare. Sit igitur sanguinis emissio copiosa; quia in materia timorosa, & venenosa phlebot. est facienda vsque ad animi defectum, vt docet Princeps ex doctrina Gal. dicentis, quod talis phlebot. est conueniens in acutis apostematibus, cum necessariò febriant, qui tales patiuntur morbos; quia ex tali euacuatione refrigerantur corpora, & extinguuntur febres, ac dolores sedantur. & Gal. phlebotomiam concedit vsque ad animi defectum, aut in magnis phlegmonibus, aut in ardentissimis febribus, aut in doloribus vehementissimis. Dicit Auic. quod talis euacuatio est magis facienda in igne sacro, quam in pruna, vt euacuetur sanguis cholericus; & non immeritò equidem; nam cholera talis, dum stat sub forma causæ antecedentis, nō separatur à sanguine: ideo phlebotomia conuenit, vt vnà hi mali succi euacuentur.

3. l. 4. tract. 1. cap. 16. Deuin. cap. 133.

14. methodi.

1. aphor. 19.

7 ad. alim. 1.

50 Addit Rasis, quod oportet, cum in aliquo membro aliquid tale sentitur, vt velociter sanguis mittatur. Valet igitur in principio; & si materia fuerit venenosa, sit phlebot. copiosa, & à proprio latere, non fiat deductio super principalia. Nec dubium est, quod in extrinsecis tumoribus, quando materia est subtilis, vt cholera, aut crassa vt sanguis, possibile sit tali mediante phlebot. eam materiam euacuare. Sed quando est dura, aut adusta, omnino impossibile est. Et si contingit, cum difficultate tamen. Sed in hac passione principalis causa phlebotomiae est accidentium sedatio, ac vt intrinsecæ materie

extrinsecam passionem fouentes, propter earum simboleitatem purgentur. Non autem sperandum est, quod immediate à tali operatione coniunctæ amoucantur.

Laudatur venæ sectio in cura igitur sacri, potius quam in cura erysipelatis, aut formicæ; cum hæc passiones producantur à cholera naturali, etiam quod facta sit innaturalis, & mixta sanguini. Sed materia sacri igitur non est cholera naturalis, nec facta innaturalis, sed est sanguis cholericus, nulla remanente forma sanguinis.

1. de corp. per gr.  
nera 14. metho.  
cap. 10.

In pruna, dicebat Auic. fortasse necessarium est scalpellationem profundam facere, ut egrediatur sanguis malus, constrictus in ea, qui est in natura veneni; & non fiat illud, quando materia est declinans ad cholera. Omnia hæc fuerit dicta à Gal. ubi scribit, nimirum scarificare hos tales labores, cum de murem præphlebotomaueris, non incongruum erit, & profundis incisionibus propter grossitatem humoris contritantis vi. In pruna materia est adusta, ad melicholiciæ naturam redacta; igitur debet euacuari facilius modo per loca habilia, & propinquiora. Magno equidem labore hæc humiditates continentæ in circumferentia ad centrū deducuntur, ut euacuationi aptæ sint, & magis cum veneni naturam sapiunt; & valde magis scarificatio competere videtur, cum materia aliquo in situ consistens, transpirationi rebellis redditur, sicut in loco profundo; & ideo, ut habilis resolutioni reddatur, locus scarificandus est. Et quanto magis fuerit materia crassa, & profunda, scarificationes profundiores esse debent: ut si non tota, attamen maior pars euacuetur. Quod autem refidet, præparatur. Non est autem sic dicendum de sacro igne, cum eius materia sit subtilis, & resolubilis, & non venenosa, ac in fluxu perficie posita.

Et quia interdum sanguinem emittere tantum non sufficit, sed opus est pharmaco vi, aut cholera, aut atram bilem educere, idque magis in plethorico, aut cachochimo corpore: igitur cogente tempore, & necessitate, patienti pharmacum exhibeat, compositum ex elect. de succo ros. aut diaprunis sol. rhabarbaro, cassia, manna, & similibus. In adusta verò materia ex confectione hamech; de daet. diascenna, &c.

Diuis. cap. 133.

Et sic facta materiem minoratione, reliquum digeratur cum syr. de fumaria, bisantino, de epithimi, de lupulis, de endiuia, acetofo simpl. &c. Et irroretur cum aqua endiuia, fumaris, lupulorum, boraginis, cichoreæ &c. Et si opus fuerit alia euacuatione, euacuetur, sicut diuersitas matericum requirit, ut clare docet Rasis, scilicet subtiliando, & humectando sanguinem absque acuitate; nam sanguis iste in se est grossus, & siccus.

Lib. 30. cap. 13.  
Lib. 4. cap. 11.

Isti vniuersales celebratis intentionibus, ad localem curam deveniendum est, ad quam intentionem multa dixerunt Plinius, & Paulus. sed notandum est, quod hæc passio interdum fiat sub forma ac censionis plurimum alteratæ: aliquando parui tumoris, nonnunquam vlcis; vnde sub vno tantum methodo standum minimè est. Cum igitur ad membrum aliqua bilis fluxit, & locus inflammatur, & adhuc nec vlus, nec escara apparet, dicit Auic. quod talis debet esse cura, qualis erysipelatis non vlcera, quæ frigida, repercutiens est, & potens. Verum est, dicit Auic. quod in igne sacro non oportet, ut sit linimentum vehementis infrigidationis, sicut in erysipelate, quoniam materia ad grossitatem est declinans: aut quando est talis, quod non rolerat, ut parum ex ea redeat ad interiora, scilicet quando est venenosa. Nec licet, dicit Auic. ut administrentur ea, quæ sunt vehementis suppuritatis quia materia est tardæ resolutionis, & stipticitas opilat poros, & materiam ingrossat. Nec licet, ait ipse, resolutiua ad ministrare, neque in principio rei, cum apparet, neque apud quietem inflammationis, & est tempus status; quoniam additur in qualitate materici, & augetur; cum & materia peccans, & applicata medicina sit eiusdem qualitatis, & potentie. Sed oportet, dicit Auic. ut administretur medicinas esciccatiuas, in quibus est infrigidatio, & resolutio quardam, cum expulsiōe: sicut est emplastrum, quod fit ex arnaglossa, id est lingua bouis, & gallus, & lentibus, & pane plurimi farfuris. Nam huiusmodi panis subtilior est in sua substantia. Hæc sententia reperitur formaliter in verbis Gal. cum dicit: In parte verò patiente, quantum quidem ex inflammatione humoris, frigidis est opus; sed propter eius grossitatem, & malam morigerationem, opus est inuenire pharmacum moderatè expellens, & euaporans. Et ibi Gal. describit lapscripti emplastrum. Aut vtere, dicit Auic. gallis, aut alumine cum aceto vini in forma linimenti; aut granata acetosa scilla, decocta in aceto, & trita ad formam linimenti; quia valet in omni hora, & agritudinem eradicat in principio, & statu. Ego verò addo huic emplastro furfures, & chamæmeli flores, & parum liciuij. Valet emplastrum ex lentibus, rosis, farina bordei, & oleo rosato. Nec laudantur in hoc tempore emplastra pinguis, & glutinancia propter opilationem pororum. Supra membrum verò patientis ponatur defensiuum ex bolo, aceto, & oleo ros. Dicit Rasis; cum apparent ampulle, non sunt dimittende, donec aliquo modo in eis adnuerit, sed in circuitu ipsarum ex bolo arm. & aqua, & aceto epithema est faciendum. Vnde Auic. dicebat: Et oportet, ut subuenias ei, quod continet locum, & loca aduersionis cum bolo arm. & aceto, & aqua, & reliquis, quæ infrigidant, & repercutiunt; & id, quod est propinquius in illo, est lana asyri, infusa in vino; sit autem talis non tota. Si verò in augmento, atque statu apparuerit vehemens inflammatio. R. fumach, plantaginis, gallarum an. ʒ. i. s. panis furfuracei ʒ. j. pulu. rosarum, violarum an. ʒ. j. vini nigri q. s. pro emplastro; Aut R. hordei mundi, lentium, fabarum an. m. j. arnaglossa m. ij. balustiorum, rosarum,

14. metho. 10.

9. ad Alu. 17.

10 an. m. j. granorum mirthi, sumach an. m. s. terantur omnia grosso modo, præter hordeum, & bulliant in sufficienti q. aquæ vsque ad hordei crepaturam; dein cum lapa, & vino nigro fiat emplastrum. Aut R. (& est medicina conueniens in pluribus horis, dicit Auic. & hoc quia aliquando dolores adeo sunt intensi, quod ad narcoticâ, vel stupefacientiâ deuenire opus est; & ideo valer in aliquibus horis, ideo in tempore vehementissimi doloris) opij, acatię, draganthi, corticum granatorum, floris aeris, seminum hiosciam an. 3. j. fiat emplastrum. Et ibi norat Auic. quod huiuscemodi medicinæ non ponuntur, nisi si super locum, quod non est vlceratum, sed vbi apparet inflammatio. Cum aurem apparent ampullę, dicit Celsus, tales acu aperiendæ sunt. Vnde Rasis dicebat; Pustulæ aperiendę sunt, & rotum virus, quod in cistinetur, est expellendum, deinde superponatur emplastrum de cerussa, & sit isto modo. R. ceræ albę 3. j. olei rosati 3. iiii. omnia ad ignem ponantur vsque ad liquefactionem cerę; deinde adde cerussę quantum capere potest, & continuę agitur, sicque dimittatur infrigidari aliquatim, & addde albumina duorum ouorum, camphurę parum, & continuę agitur vsque ad spissitudinem. Laudatur vnguentum de lythargirio crudo, aut de calce, & sit isto modo. R. calcis albę, & mundę 3. iiii. aquę clarę, donec calx cooperiatur, & sic dimittatur per duas horas, deinde projiciatur aqua, & noua reueretur; sicque septem vicibus reueretur, vsque quod fuerit bene lora: & adde olei rosati 3. vi. foliorum ficul. 3. ij. cerę albę 3. iij. omnia in mortario plumbeo ponantur, & cũ syr. acer. fiat vnguentum.

Lib. 7.  
7. ad Alim. 17.

Gal. 1. de med.  
per genera.

Et cauendum est à nimia exsiccatione, & infrigidatione, cum expurgatur materia talis, aliquatim venenosa, ne consuecitur, & redeat ad principalia membra; sed exsiccatio valet, cum iam expurgata fuerit materia, & locus ad cicatricem peruenit. Et ideo Auic. dicebat; In illo verò, quod de eo est vlceratum, est necessarium illud, quod exsiccatur, non tamen in vltimo, quoniam addit in malitia ægritudinis: sed quando talia vlcera sunt maligna, fortiter exsiccantia conueniunt, sicut medicamen Andaron, & similia, quæ describuntur à Rasi in diuisionibus, & à Petro de Arg. cap. de cura formicę corrosiue, auctoritate Cornelij, & Gal. vt dicam, vbi de cura gangrenę. Aut R. lythargirij, cerussę an. 3. iiii. mirthæ 3. ij. thuris 3. d. s. floris aeris 3. ij. olei mirthinij, cerę albę an. q. s. pro vnguento, aut adde aliquam partem ziniar vnguento de lythargirio, aut apostolorum, & vtere. Et si perambulat cor cuprio, & sit vlcus phagedenicum, R. Gallas, & tere cum aceto, & adde decimam partem aluminis, & duas ziniar, & vtere. Dicit Rasis; Et cum adhuc perambulat vlcus, oportet, vt projiciatur super ipsum medicamen acutum, aut cauterizetur. Vnde Auic. dicebat; Curentur talia vlcera cura vlcum corrodentium. Dicebat Celsus; Sepe, quod iam sanum videbatur, iterum exulceratur, & circa proxima cutis, quæ vitium receptura est, tumidior, & durior est, coloremque habet ex rubro subcinereo. Scribonius in hoc morbo maximè commendat hoc medicamentum. R. ruthe viridis 3. iiii. spu mæ argenti 3. viij. Aceti, olei an. 3. xxiij. Cum aceti parte ruthe, & spuma tertuntur, donec leuia fiant; postea quod superest aceti, vlcibus cum oleo adijcitur. Et hæc sufficientes de localibus ad ignem sacrum. Sequitur vtra, de cuius remedijs abundè superius tractatum fuit, cum de carbunculo ageremus; eadem enim vtrobique remedia conueniunt, quare huiusmodi morbis iam finem imponamus, ad alterum tumoris genus accedentes, quod formica solet communiter appellari.

7. de cõp. mod

Cap. 244.

# De formica. Cap. V.

10 **M** I x o quodam, & breui ordine Auic. huius passionis essentiam declarauit, dicens; 3. 4. tract. 1. 1. 1. Formica est pustula, aut pustulę, quæ egrediuntur, & faciunt accidere apostema purum, & paruum, quæ interdum ambulat, & aliquando vlcerant, & fortasse re soluantur. & Rasis dicit; In aliquibus corporis locis cum paruo apostemate parue pustulę cum pruritu, & ardore, ac vehemēti calore in tactu quandoque sicri conficere; quæ etiam citò vlcerantur, & interdum vicina loca perambulare incipiunt, ac dilatari. Et rursus ait; Exeunt in corpore bothor paruę, vna, aut plures numero, & apostematatur locus apostemate paruo, & quandoque scinditur, & incipit vlcerari, & vadit de loco ad locum: Hæc passio nomen formicę accepit à punctione, quæ in ipsa sentitur, auctore Auic. & sentitur in omni formica, sicut punctura formicę. Et Hallahs dicit; ideo dicitur formica, quia hæc, & illuc discursat, sicut animal illud paruum, quod formica appellatur.

3. 4. tract. 1. 1. 1.

7. ad Alim. cap. 16.

Diuis. cap. 133.

8. Theor. cap. 16.

60 De natura humoris cholerici non est multum eleuare: hinc est, quod cholericę passionis aliquando ad extra expelluntur sub forma pustulę, aut bothor, quod idem est, ac si diceret, paruum apostema. Ratio autem, quod non expanditur iste succus, sicut in erysipelate, est, quia adustus, & per consequens non ita fluxibilis. Et si non est adustus, sed valde tenuis, pertransit omnes partes vsque ad extremam cutem, & ampullas producit; deinde sua caliditate, subtilitate, & acuitate vlcerat regionem, in qua confederit, vt docet Gal. Suntque hi tumores paruī, & diuersi. Estque calidior, & subtilior materia formicę, quam erysipelatis; ideo cutem exulcerat, & comburit. Vnde dicebat Auic. cap. de erysipelate; Et quandoque consequitur ex caliditate erysipelatis, vt comburatur cutis, quare alteratur illud, quod nominatur erysipela: valde enim est subtilis humor, faciens formicam; & ideo exulcerat. Et quia non adustus, sicut in pruna, nullam creat escharam. Ideo etiam declarando causam materialem

14 metho. 17.

3. 2. 4. meth. 1. 2. 1.

4. meth. cap. 37.

14. meth. 17.

1. ad elen. 1. 14.

meth. 1.

Lib. 4. cap. 1. 1.

3. 4. meth. 1. 2. 1.

14. meth. 1.

Lib. de tumor.

cap. 16.

Lib. 4. cap. 1. 1.

3. 4. cap. 1.

Lib. de tumor.

cap. 16.

14. meth. cap.

37.

1. ad Glan. 1.

Lib. 4. cap. 1. 1.

13. meth. 1.

14. meth. 17.

3. 4. meth. 17.

1. ad elen. 1. 14.

1. ad elen. 1. 14.

1. ad elen. 1. 14.

3. 4. cap. 1.

Lib. 4. cap. 1. 1.

D. 4. cap. 1. 1.

In R. gal. de p.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

istorum tumorum Auic. dicit; cholicum aut apostema aut est à cholera subtili valde, quæ non continetur in eo, quod sit magis intus, quam illud, quod apparet de cute, & est acuta, & sit ex ea formica aut ambulatiua sola, & est subtilior, aut ambulatiua corrosiua, & est mala. Et Auer. inter tumores cholicos formicam ambulatiuam enumerat, sententia est Gal. quæ dicit; Valde enim est subtilis humor, qui herpetem, idest formicam, facit, ut non solum omnes pertranseat, quæ interioribus particulis, quæcumque carnosæ substantiæ sunt, sed & per cutem vique ad partem extrinsecam, quam solam corrodit, & comedat, eo quod decinetur quid ab ipso: quod si demum hanc quoque pertranseat, perinde atque sudor, nequaquam vtiq; vlcus operaretur. Hæc passio ab Hypp. & Gal. & à Paulo herpes exedens appellatur. Irritata natura, dicit Auic. propter aliquam causam, bilem peccantem aut in quali, aut quanto ad extra expellit, quæ non continetur intus de cute, & facit accidere nonnullos paruos, & puros tumores coloris citrini, q. acuitate humoris, corrodunt, & vicerant, cum pluralitate paruorū vlcus, pauca profunditatis, quæ hincinde serpendo discurrunt, & talis passio dicitur herpes exedens, aut formica ambulatiua. Et Celsus dicebat, quod in hac passione sæpe id, quod sanum videbatur, iterum exulceratur, & cutis proxima, quæ vitium receperat est, tumidior, & nigrior fit.

Et si talis cholera valde crassa fuerit, & adusta, solum corrodet, & corrosione perambulans non facit. Et talis dicitur formica corrosiua. Ait princeps, Et si fuerit materia crassior, & deterior, fiet formica corrosiua, & hoc, imprimendo suam malam qualitatem in membro. Hæc duæ passiones diuer sificantur secundum humoris peccantis diuersitatem.

Additur & tertia species formicæ, quæ & ipsa à cholera causa generatur, non tamen sub tali forma, sed à cholera cum phlegmate mixta, ut declarat Gal. Paulus, & Auic. dicentes, aut generatur à cholera grossiore illa, & est minoris caliditatis, & continetur magis intus, quam prima, in cute, & est quæ sit, fit in ea phlegma, & fit ex ea formica miliaris.

Aliquando igitur fit bilis, & puritæ admixtio, & causantur aliqui parui tumores; nam Gal. dicebat; Paruus verò est hic tumor ad quantitatem milii stans intus de cute non corrodens, coloris cinerici. Clarè etiam hoc declarat Gal. cū dicit; Est quandoque mixta cholera simul, & phlegma, quemadmodum in alterutra formica, quæ ad milii similitudinem producit: ista enim non mox vlcus operatur, quemadmodum alia, sed tumores ad similitudinem milii. Et rursus dicebat Gal. quod hæc passio fit ex bile minus acris, & calida, quam sit formica exedens, & hæc appellatur herpes miliaris, & maxime quādo in effectu pustulæ parue, ac multæ per summam cutem similes milio excitantur. Paulus autè dicebat; Cum bilis stans nullo infecta humore, excreta in particulam quampiam decumbit, malum herpes nuncupatur: si verò substantia crassior sit, acriorque, totam cutem adiusque carnem subiectam exulcerans, vocaturque herpes exedens: si verò tenuior, & minus acris, calidæque, pustulas exiguas, per summam cutem milio similes excitat, ob quam similitudinem herpes miliaris dicitur. At Orbasio auctore, pituita cum stans bile mixta miliarem herpetem creat. Vnum dicit Auic. sub corollario, quod ad summam omne apostema in cute, quod latitudinem, & profunditatem non habet, est formica: Verūm diuiditur, quia alia ambulatiua, alia corrosiua, & alia miliaris. Et Auicenna dicit; Quando fit vlcus, & purrefit, idest putredinem generat, sub titulo de apostemate amplius non stat, sed de vlcere parui do. Et nota, quod antequam hæc pustulæ vicerent, color pustularum, & regionis, ad citrinitatem cum inflammatione apparet declinans.

## De cura formicæ. Cap. VI.

39



**D**icitur Gal. dum de tumorum cura in vniuersali loqueretur; Vniuersalem doctrinam non obliuiscaris, ut per eam possis particularia operari. Hoc dixi, quia, vti ipse asserit, vanum est circa aliquem tumorem operari, & maxime ad aliqua vna situm matericum, aut materiam reperiendi, aut digerendo, siue exsiccano, vel resoluendo, si corpus fuerit plenum. Nam continet matricem ad latum locum, aut ratione doloris, aut loci debilitatis precipitatur. Plenariam doctrinam de hac operatione docuit Gal. de asperitate, & lenitate loquens. Hæc passiones sunt materiales, & à repletionem, ideo auctore Hypp. inanitione, & euacuatione curantur.

Erit igitur prima intentio, corpus euacuare. Ait Gal. Si quis anticipauerit, purgans vniuersum corpus, post hæc reperiuntibus, & repellentibus superinfluentes humores, vtatur pharmacis, sanabit fornicam. Neutrum autem horum operans, sed solis contrariis consolidandis vicerant epidermidam, hæc quidem sanabit, continuam verò ei pati non prohibuit. Et rursus; Illa consolidata, ea quæ continua est, excoariatur, & hoc amplius fit, velut serpente passione, donec vtiq; operans humor euacuetur. Et ibi Gal. recitat casum cuiusdam mulieris nobilis Romanæ, quæ ante euacuationem, nunquam sanitate præstita est. Vnde Auic. dicit; Cum non incipis in ea cum euacuatione humoris, secundū quod oportet, imò medicaris vlcus cum eo, quod sanat, redit ex alio loco cum documento, & non cessat humor facere corrosione post corrosione. Idem voluerunt Paulus, Rasis, & Hall. Perficitur hæc operatio cum his, quæ purgant materiam, secundum quod oportet, sicut dicit Auic. nam in formica

amb



10 an bulatua materia est cholericā, subillis, sicut in Romana illa muliere, cuius passio successiue pertin-  
gebat à pedis clauicula vsque ad inguinem. & cum accepisset aquam lactis iussu Galeni cum paucissimo  
scamoniō, liberata est. Hinc Auic. dicebat cap. de cura formicæ. & aqua quidem casei cum scamo-  
niō iuuatua est in euacuatione materiæ formicæ, & ei similium. Et Auer. dicebat: Formica ambulati-  
ua, quæ sit ex humore cholericō subillis, debet curari cum medicinis, illis humorem euacuanti-  
bus, si-  
cut est scamoniū cum fero caprino. Rasis verò exhibet scamoniū cum aqua fructuum; vt puta,  
R. aquæ casei, aut feri capri, aut decocti fructuum, aut decocti thamarindorum. §. iij. vel §. iij. scam-  
oniij preparati gr. iij. tat potio. & exhibeatur patienti per quatuor horas ante cibi assumptionem.  
Aut R. (et est de bonis euacuanti-  
bus in hac passione) syr. de fumaria, acetosi sim. de endiuia an. §. s. aquarum  
fumarie, cichoreæ, lupulorum an. §. j. diaprūni sol. §. iij. misce, & vt vt supra; & patiens siet si  
ne somno. Valer ellect. de succo rosarum, rosarum Mef. de psilio, rheubarbarum, Diacat. & similia.  
Pro digestionē reliquarum materierum, si quæ erunt, valent syr. superscripti & violatus, de succo  
endiuiæ, acetosus, nenusarius &c.

Et si formica fuerit corrosiua, & bilis fuerit adusta, & acuta, purgetur patiens cum diacat. diapheni-  
cone, diaprūni, & similibus ellect. Aut R. pul. casij no. ex. Diacat. an. §. s. confect. hamech. §. ij. aquæ  
fumarie, aut decocti thamarindorum q. s. syr. violati §. j. misce, & fiat p. 6. Aut R. rheubarbari ellect.  
§. j. s. teratur, & infundatur in tribus vncijs decocti fumarie per septem horas, deinde exprimatur, &  
adde ellect. rosai Mefue §. j. syr. rosati sol. §. iij. aquæ acetosæ q. s. fiat potio breuis.

Si vero fuerit miliaris herpes, in quo materia est pituitosa, pro solutuo, dicit Auic. quod turbih  
valent summopere, & melius epithimū est; agaricus verò mirabilis est, similiter ellect. lenit. Dialen-  
30 na, confectio hamech. &c. Aut R. ellect. lenit. diapheniconis an. §. s. turbih preparati. §. j. aquarum  
fumarie q. s. Aut R. Diapheniconis §. vij. confectiois hamech, diaprūni sol. an. §. ij. decocti epithimi  
Mefue q. s. misce, & fiat p. 6. & adde syr. violati §. j. Dicit Auic. Miliaris formica est tardioris resolu-  
tionis, & ideo non ab re est materiam digerere, cum syr. de fumaria, de epithimo, de lupulis, bifantino  
&c. Aut cum decocto epithimi Mef. aut R. scolopendriæ, capil. Veneris, polipodij, folliculorum sennæ  
epithimi, florum, & fructuum cordialium, an. p. eq. & fiat decoctum in sufficienti quæ quantitate,  
& patienti in mane exhibendum §. iij. vel iij. istius decocti cum saccharo. Et si indiget alia euacuatione,  
fiat cum pillulis de fumaria, & aggregatiuis. Aut R. pillula de fumaria, aggregatiuarum an. §. j. agari-  
citra. §. ij. turbih preparati §. j. & cum syr. de fumaria fiant pillula. viij. & tribus vicibus accipiantur.  
& sic secundum indigentiam crebretur euacuatio. De phlebot. nulli mentio, nisi quod Rasis di-  
40 cit: si autem cum hoc apostemate calor superfluus, & rubor affuerit, eius curam à phlebotomia incipe.

Patiens hoc interim siet in competenti diætā, quæ est valde similis diætæ erysipelatis; frigida enim  
& humida diætā est valde conueniens in hoc casu, vt docet Rasis. Siet igitur cum panatella, & lacte  
feminum communium, aut chondro, aut iulculis hordeaceis, vel cum spinachijs, betis, lactucis, bo-  
raginibus, endiuia, decoctis in aqua, aut brodio parue pullæ. Aut cum carne hædina, aut virulina,  
aut parue pullæ, vel venatiliū &c. Dimittat vinum præcepto Celli, nisi granatorum, cum aqua ex co-  
riandris, & luleb violato: aut falcem vinum sit pauciterum, & limphatum. Istis vniuersalibus in-  
ventionibus præmissis, ad localia deueniendum est: & dicamus cum Gal Principe, & alijs, quod hic mor-  
bus stat sub duplici consideratione; nam si tantum apparent pustule, intentio est materiam cum apo-  
cristicis retropellere, in quibus sit virtus frigida, & humida, ambabus suis qualitatibus contrariando  
50 complexionis materiæ peccantis, calidæ, & siccæ complexionis. Sed cum formica stat sub titulo vlceris,  
indiget alio ingenio, scilicet, medicina sicca; ideo dicebat Auic. cap. de cura formicæ: Via autem, secun-  
dum quam curatur formica, est, vt quæ est corrosiua, & vlcera-  
ta, alienetur ab humedicatione, quam  
iam administrasti in erysipellate. Humedatio autem non est conueniens vlceribus, vt patet auctoritate  
Hipp. & vt declarat Gal. Exsiccatio est cura vlcrum, & maxime eorū, quæ nitida sunt. Et ideo laudat  
Auic. in principio, id est antequam appareat vlcus, lactucam, nimphæam, semperuiuum, volubilem,  
portulacam. Et si opus fuerit medicinis non ita humidis, sed his, in quibus est maior vis exsiccan-  
di, laudatur solarium, & propriè siccum, & tritum. arnaglossum, rubus, lens, farina hordei, cortices  
granatorum, rami viis &c. Ex his enim est emplastra, & vnguentā perficere possumus, vt siet R. lactu-  
cam, semperuiuum, solatrum, nimphæam, marinam lenticulam an. q. u. Aut R. lactucæ, semperuiue, fo-  
60 latri an. m. j. pistentur, & exprimantur, & adde pulueris rosari, balaustiorum an. §. ij. olei rosati, mirri-  
ni, an. q. s. pro emplastro. Aut R. maluarum in. j. farinæ hordei, foliorum lactucæ an. m. s. decoquan-  
tur in sufficienti aquæ, pistentur, & lacta expressione, adde vitellum oui numero j. olei rosati parum  
pro emplastro. Dicit Rasis, quod in tali tempore cura est linire formicam cum luro armeno dissolu-  
to in aceto, & si locus fuerit vlceratus, aut timetur vlcera-  
tio, dicit Rasis, bonum est in circuitu loci ac-  
cens linire tali linimento; R. boli armeni, terræ sigillatæ an. q. s. misce, & cum ol. ros. & cera fiat vn-  
guentum molle.

Dicit Auic. Et cum timetur super eam corrosio, & vlcera, administra cum medicinis frigidis, & sic-  
cis aliquid mellis, & maxime cum farina thuris, & aceto, aut cum aqua. quæ currit ex ligno vitis, & sic  
aduiuit. Idem facit stercus caprarum cum coriandris, & aceto: acetum enim prohibet omnem corru-  
ptionem.

7 coll. 31.

7 ad Alm.

3. f. 4. cap. 1. de  
cap. de heret. 2.

7 ad Alm. 16.

7 ad Alm.

4. f. 1. cap. 1. 8.  
Lib. de cura vlc-  
cerum.  
5. metho cap. 1.  
& 1. stud. c. 1.  
14. metho. R. 1.  
2. 1. Glas.

in Disquisitionibus

7 ad Alm. 16.

pcionem. Aut R. pulueris rosarum 3. ij. malicorij. balaustiorum an. 3. i. anthalorum citrinorum 3. iij. cu  
pularum glandum, flumach an. 3. s. ceræ, olei mirrhini an. q. s. Aut R. lythargirij puluerizati, corticum  
granatoru, rosarum an. 3. j. ceræ parum, olei ros. q. s. Aut R. farinæ thuris, lentium, pulueris rosarum.  
cort. granatorum an. 3. s. mellis 3. j. ceræ parum, misce. Aut R. Paulo auctore, corij mali paniculi dulcis  
3. vi. argenti spumæ æidem 3. vi. lanæ illoræ, tedæ combustæ adhaerentis 3. iij. ceræ 3. xij. cerussæ 3. viij.  
thuris, aluminis scidis singulorum 3. j. vino, aut oleo mirtheo excipiuntur.

Lib. 4. f. 4. cap. 2.  
3. cap. 4. & 3.

Sed cum apparet, dicit Princeps, corrosio, & ambulatorio, administretur fortes medicinas in exsecan  
do, & prohibendo corrosione, sicut sunt troscisci andaracaron, idest de alumine, aut alumen zucha  
rium arte factum. Valent ceræ, si apponuntur cum vino stipitico, aut aceto, aut succo siluestris cucu  
meris. Idem facit sal cum felle hirci, aut rutha cum nigro, & urina pueri. & Paulus dicebat; In hoc pa  
stillos Mulæ, & Andronij efficax est. Aut vere his trosciscis: R. cort. granatorum 3. ij. aristolochiæ  
gallarum non perforatarum an. 3. iij. salis ammoniaci, thuris, aluminis iamenti, an. 3. s. calcanthi, mir  
rhæ an. 3. ij. terantur omnia, & cum aceto fiat pastillum. Aut R. arsenici, auri pigmenti an. 3. ij. succi plan  
taginis, solatri an. 3. iij. succi chelidonie 3. j. bulliant omnia in catiola vsque ad succi consumptionem,  
deinde educantur in mortariolo vitæa educatione. Verum est, quod interdum sufficit vnguentum co  
rasæos, aut apostolorum, aut ægyptiacum. Dicit Rafis ad Almanforem, quod sepe opus est ad actua  
lem ignem deuenire, vlcera talia phagedenica comburendo, quod præstantissimum remedium est, &  
laudatur etiam à Gal. & alijs auctoribus.

a. ad Gliscor.

In miliari verò formica, cum apparet, præmissa euacuatione, R. gallarum, nucum cipressi, fructus  
thamaris, cort. gran. boli armeni an. p. æquales, coquantur in aqua rosata, & aceto pro linimento.  
Aliud in statu R. ozimi, rutæ, rosarum, vitreoli Romani, recementi plumbi, lanæ non lotæ vitæ an.  
p. æqual. olei mirrhæ, aquæ fluentis ex vite an. q. s. pro emplastro. Modum faciendi aquam ex vite  
docet Leonardus de Predapalea, ubi de cura formicæ. Laudat Auic. capita piscium salitorum adulta  
cum vino pontico. Aut fortius R. sulphuris citrini, floris aeris, mellis an. 3. j. aquæ plantaginis, suc  
ci chelidonie an. 3. ij. bulliant ad ignem, & secundum artem fiat vnguentum. Sed ad quid in his labo  
rare, si nunc nouum ingenium has curandi passiones describere intendo colendissimi genitoris mei in  
uentione, qui in hac medicæ parte maximus fuit experientior? R. mirrhæ electæ, aloes hepaticæ,  
spicæ nardi, sanguinis draconis, thuris, mumiæ, opopanax, bdellij, carnoballami, croci, gummi arabi  
ci, mastiches, storacis liquide, storacis calamitæ, laudani an. 3. ij. therebentine claræ, olei antiqui an.  
lib. j. omnia in botla vitrea bene obturata ponantur: & per tres dies in fimo caballino ponantur; dein  
de in elambico ad ignem; & extrahatur oleum; & feruetur in vase bene obturato. Et R. galbani, vi  
ridis aeris, thuris, aristolochiæ longe, mastiches, mirrhæ, lapidis hematitis, opopanax an. 3. j. ly  
thargirij lib. j. ammoniaci 3. ij. ceræ nouæ 3. viij. therebentine 3. vj. olei communis 3. x. omnia po  
nantur in catia ænea nitida ad ignem, & secundum artem fiat vnguentum in bona forma. In primis igi  
tur facta vniuersali euacuatione, vlcera curentur sic, abstergantur cum lana, aut bombacæ, & præpara  
tis lichinijs latis, super ea extendatur vnguentum, & infusus in dicto oleo, superponantur vlcenibus, de  
super verò peria valde lata cum dicto vnguento applicetur. Et verè hæc est vera cura hæc passionum,  
si experientie credendum est. Si verò cum hac passione dolores appareant, circa locum vlceraum ap  
plicetur vnguentum rosatum Mes. in ipso autem vlcere vnguentum de lythargirio: et desuper empla  
strum ex mica panis, & lacte dulci vaccino.

1. de op. med.  
per genera.

Gal. auctoritas, quomodo intelligenda in cura formicæ cuspidæ pennæ.

Citat Princeps auctoritatem Gal. in cap. de cura formicæ in fine, dicens; Et Gal. quidem dixit ef  
fe conueniens, ut sumatur aliquid, sicut embuba pennæ, ex extremitate pennæ, aut alterius rei, cuius  
extremitas sit acuta, quam possibile sit deglutire formicam; deinde penetrat in circuitu eius vsque ad  
profundum cum acuitate sua; deinde eradicetur formicæ cum radice sua. Ego verò nescio, quantum  
valeat istud ingenium in cura formicæ; cum formica sit vt plurimum vlcus, idest solutio continui; nec  
credo, quod mirmix, de qua loquebantur Gal. & Paulus, sit ea formica, de qua nunc est sermo; sed po  
tius credendum est, quod sit excrecentia illa, quam nos porum vocamus. Nam verba Gal. in bona  
translatione hæc sunt; Plurima inueniuntur, hodieque sunt, quæ apud maiores nostros non fuisse inuen  
ta, veluti nunc Romæ quidam excogitauit, quemadmodum acrochordonas, & myrmecias ore sanet:  
verum de prioribus, vt pote a cute extrantibus, minus est mirum: de myrmecijs verò, potissimum quæ  
cum summa cute prorsus sunt æquales, mirum videbitur; veruntamen has quoque certa primum labio  
rum applicatione, cuius factu, ad se traxit, atque à radice euulsit, deinde primoribus apprehensas den  
tibus rotas simul exemit; sed & scalprio ad mirrhæci folij speciem formato, & ferramento eo, quod sco  
lopomacherion Græci vocant, quispian manibus exercitatus facili eas excidat, cum proprijs lineamen  
tis a circumposita cute circumscripta discernantur. Aequè verò, & valente aliqua penna, circulo myr  
mecij imposita, ipsam educimus; debet porro pennæ fistula esse myrmecia: crassitudine par, vt tam vi  
dique prorsus constringat. In vlcere verò hæc operatio fieri non potest. Nec formica est tantum vl  
cus, sed vlcera diuersa; nec agnosco, quomodo dentibus amplecti possit, aut radices euelli, cum nul  
la adsit

14 methodi.  
Lib. 4. cap. 17.  
& lib. 6. cap. 37.

10 la addit radix. Præterea myrmecia, seu mirmirices, vt docet Gal. sunt pensiles verruæ. Et si Albu-  
calis doceat curare formicam tali medio, & ingenio, dico quod per formicam intelligi porum, quia ibi  
dicit, quod est eminentia parua filtrata, grossa, super superficiem corporis, vadens in profundo valde;  
& dicit, quod plurimum eius fit in manibus, & Paulus myrmicem nomine formicæ appellat, quia simi-  
lem mordentis formicæ sensum inducit. & Dioscorides appellat verrucosæ formicas. Hæc passio est  
valde diuersa à formica, de qua nunc loquimur. Et in hoc vetè deceptus est Auicenna.

q. methodi in  
pencillo.  
Lib. 1. cap. 8.  
Lib. 4. cap. 17.  
Lib. 4. cap. de  
cicuta

De vesicis, & inflationibus. Cap. VII.

30 **A**CTUM est in superioribus sermonibus de tumoribus generatis à calidis humori-  
bus; nunc verò aliorum tumorum essentiam declarare remanet, quorum mate-  
ria calidorum humorum est superfluitas. Nam in ebullitione humorum in propriis  
vasis aliquando sequestrantur à virtute, quæ nostrum regit corpus, vt docet no-  
ster Gal. partes aliquæ subtiles, sicut etiam docet Auic. quæ eleuantur subito pro-  
pter earum subtilitatem, & pertranscunt omnes partes carnosas vsque ad cutem,  
quam inuenientes ipsiorem, & duriorē, quàm id, quod est sub ea, ibi retinen-  
tur, & colliguntur in inflationem, & tumorem paruum, qui est de genere pustularum. Et si talis humor ebul-  
litionis erit biliosus, eius superfluitas erit valde subtilis, & in substantia aquea, ex qua ampullæ generari  
solent, seu vesicæ quædam, aqua plenæ. Et hæc est inflatio, quam Auic. dicit esse propter aquosita-  
tem. Et Rafis dicebat; Exeunt in corpore vesicæ, aqua plenæ, similes eis, quæ accidunt ex aduisione  
34 ignis. Cum tali succo semper proportio aliqua naturalis humoris inuenitur. Et tales pustulæ, seu vesi-  
cæ, sunt passiones superficiales, coloris croci, & dolorosæ, & vix plurimum febrem adducunt, & ci-  
tò ad statum deueniunt, & facillimè resoluuntur. Multique vapores cum tali humiditate in his vesicis  
reperiuntur (vnde multi causam materialem vaporem esse iudicauerunt) qui postea in aquam conuertun-  
tur, vulgariter dicuntur schioppi. in sanguinis verò ebullitione partes magis crassæ sequestrantur, quàm  
in bulliente bile, & est vna quædam virulenta sanguinea, quæ magis supinalis permanet. Et quæ fa-  
cit sanguinis naturam, & in magis profundo loco quiescit, est valde parata putredini, & in sanicem con-  
ueritur, calore extrinseco accedente. Et talis passio nomen inflationis meretur, & est coloris valde  
40 rubri, & accensis. Hinc dicebat Auic. Secundus modus generationis inflationis est, vt fit loco aquo-  
sitate sanguis, quare fit pus desuper.

4. aphor. cum a  
lib. de natur. in-  
temp. cap. 4.  
3. 4. mod. sc. 3

Dia. cap. 133.

De cura vesicarum, & inflationum. Cap. VIII.

**A**VERTORI Gal. vbi est multus sanguis, ibi est multum de superfluitate sanguinis. sic  
etiā de bile dicendum est; Et idcō apparentibus superfluitatibus istis, sicut vesicæ,  
& inflationes sunt, quarū causa est humorum multitudo, opus est, vt euacuentur hu-  
mores, secundum quod peccant; sic docet Auic. cap. de cura vesicarum, quan-  
do dicit; Mundificatio corporis cum solutio, vel phlebotomia, est nec saria. sic  
& regimen in cibo, & potu. Et Rafis dicebat; Cura est phibetomia, si corpus ple-  
num fuerit: sed bile flaua peccante, cum pharmaco bilem educere purgetur; quod  
39 multæ caliditatis esse non debet. Celebrata euacuatione, detur ægro assidue (dicit Rafis) aqua pru-  
norum, & granatorum acetosorum; & cibetur æger cibis bilem extinguentibus; & quoties materia  
cum syrups alceretur.

Lib. 1. de Tem-  
porum.

Dia. cap. 133.

Cum verò & pruritus, & rubedo apparere incipit, locus tali linimento liniatur; R. spumæ argenti,  
boli armeni, thuyæ preparatæ an. 3. ij. olei violati q. s. & fiat linimentum in mortatorio plumbeo; Aut  
locus cum lentibus decoctis in aqua, & tritis emplastratur. Idem faciunt cortices granatorum, aut  
cortices ramorum eorum, in aqua decocti, & triti. Rafis laudat mirrthos cum aqua rosarum. Ab his  
medicinis remittitur pruritus, caliditas extinguitur, & locus ab ulceratione præseruiatur. Sed cum ap-  
parent vesicæ, & augmentantur, ait Rafis, rumpantur sic, quod currai ab eis totum, quod continetur.  
Et Auic. dicebat; Si autem exterius vesicæ, & volueris earum curationem, quando illæ, quæ sunt in  
60 grossiori cute, dolent, oportet, vt aperiantur cum acubus; & currat, quod in eis est; & quæ ex eis sunt  
subtiles, per se aperiantur. Et non oportet, dicit Princeps, vt tardetur; imò aperiantur, & exprima-  
tur quod est in eis cum facilitate paulatim, & maxime ampullæ, quæ dolorosæ in grossiori cute consi-  
stunt. Subtiles verò per se rumpuntur à succi acuitate.

Dicit Auic. facta tali euacuatione, impossibile est, quin aut locus sanetur, aut ulceretur. Et si exco-  
riatur, curetur cum vnguento de cerussa, aut de lythargio, aut de minio &c. & cum malignauerit ta-  
lis vlcera, & de eis mala caro reperitur, cadat caro illa cum vnguento apostolorum, aut lila viridis,  
aut ægyptiaco. Aut R. (spumæ auri 3. vj. olei veteris 3. viij. simul omnia coquantur sic, quod lythargi-  
um non aduratur, & adde arsenici 3. iij. & simul incorpora. Et si passio hæc contingat in membro hu-  
mido valde, erit opus multa exsiccatione, tunc R. colcothar, idest vitrioli citrini, calcadis, idest vi-  
trioli

trioli albi an. 3. iij. foliorum rosarum 3. ij. & cum aqua rosarum fiant pastilli, qui pro vsu ducantur in mortariolo, & cum oleo rosato, & pauca cera fiat lenimentum.

Et si apparuerit virulentia post vesicarum disruptionem, abstergatur; & exsiccet cum fimo capri no, & melle. Et si coniegit, quod à nimia exsiccatione eschara causetur, cadat cum buiro, aut alium gia, aut cum maluis decoctis; deinde vlcus, sicut alia simplicia, curetur. Et R. spumæ auri, & argenti. ʒ. ij. minij 3. v. boli arm. terræ sigill. an. ʒ. s. hutiz preparatz 3. vj. cerussæ ʒ. j. succi solatri, olei ros. an. ʒ. iij. camphuræ 3. i. ceræ albæ q. s. pro vnguento.

### De gangræna, sphacelo, & esthiomeno. Cap. VIII.



**D**icit Gal. Gangræna est mutatio cuiusvis coloris secundum naturam in colorem alium, aut mortificatio cum exulceratione, aut sine ea. Est igitur gangræna corruptio, seu mortificatio carnez, & superficialis partis. Sphacelus, seu alchachilos est corruptio, seu mortificatio partis sensitivæ, organicæ, & profundæ. Esthiomenus verò herpes est corruptio, seu mortificatio profunda, corrodens; & corro dendo, ac putrefaciendo perambulans in membro. Vnde dicendum est, quod tres istæ passionēs non differunt, nisi secundum maiorem, & minorem, vel superficialitatem, aut profundam corrosionem, vel putrefactionem.

Non ab re de his passionibus hic erit sermo; nam dicebat Auic. Sermo de his rebus est proportionalis quodammodo rebus, quarum memoratio præcessit: præcesserat autem sermo de erysipelate, de for mica, de sacro igne, vesicis, & similibus ægritudinibus, à quibus læpe propter mali succi naturam, corruptiones contingere solent. Vel forsitan dici potest, quod est proportionalis sermo: quia passionēs iam dictæ, cum apparent, maximam accensionem demonstrant, sic quod de præcorum mente phlegmones, vel accensiones dici possunt. Vnde Auic. de his passionibus loquendo dicebat: Et propriè quod est phlegmonodes in principio, fundamentum est; quia Gal. negat, quod vulnus deveniat ad sphacelum absque phlegmone, & dicit: Vulnus, de quo sumus suspecti, quod veniat ad sphacelum, palam intelligimus, quod magnum, & calidum apostema sequatur illud. Et rursus loquendo de superficiali corruptione, ait: Talia enim quedam etiam carnosissimis partibus in gangrænis accidunt passionēs ob magnitudinem inflammationis, insensibilitatem quandam, atque nigritiem, aut omnino mortuorum colorem afferentes parti patienti. Dicimus autem illos, qui in passionem incipiunt incidere, ad gangrænam ire: Vnde Paulus dicebat: Cum inflammatio neque diffunditur, neque in pus mutatur, læpe in gangrænam, & fiderationem, quæ Græcè dicitur sphacelos, incidit: gangræna enim appellatur, cum membrum aliquod, ob inflammationis, quæ consistat, magnitudinem, emoritur; neque iam confirmatas sic dicunt, sed quæ etiam fiunt. Passio igitur, quæ gangræna appellatur; null aliud est, quin superficialis corruptio, & ad sphacelum præparatio. Dicebat Auic. Et quod de hoc est in principio, & non corrumpitur cum eo sensus eius, cui est sensus, nominatur gangræna; in cute enim, ut cutis, nullus est sensus; ideo corruptione contingente in ea, gangræna denominatur. Et Gal. Gangræna, inquit, & carbunculi propè phlegmonem sunt, quando quasi ebulliens sanguis cutem combullerit. Et rursus; si non spissum sel fuerit, sed tenue, atque liquidum, summatrem loci, idest cutem tantum, quasi ex igne combullam reddit, & hoc non dicitur herpes esthiomenus, sed gangræna. Et iterum; Valde est subtilis humor, qui gangrænam operatur: Nec credendum est, quod gangræna sit adeo cutanea passio, quod aliqua pars carnis cum ea non sit corrupta sed superficialis. Vnde Gal. dicebat: Cum dicendum est tibi de gangræna, idest de quasi mortua carne, vel cure. Et alibi: Inter maximos phlegmones est vocata gangræna mortificatio patientis particulæ; & nisi citò quis eam curaverit, mortificat facili ter, quæ passa est, particulam, & comprehendit continuas, & interficit homines. Quo in loco Gal. clarè demonstrat istius corruptionis processum.

Sequitur Auic. Et quod ita confirmatur, est, ut destruat sensus eius, cui est sensus; & illud est, ut destruat caro, & quod ipsam sequitur, vsque ad os, siue fir incipiens, siue succedens apostemati, nominatur scachilos. Hæc passio à Grecis σφαχίλος, à Latinis fideratio dicitur. Dicebat Gal. Voco autem sphacelum corruptionem solidorum corporum vniuersam, ut & neruis, venis; & carnis innascentur. Cum ergo pars sensitiva corrumpitur, sphacelos dici debet, & maxime cum læcerit ledere, in quibus sensus reperitur, ut declaratur à Gal. Arist. & Auerr. Nec credendum est, quod caro ex se sentiat, ut dicit Auic. qui Aristotelem reprehendit, quoniam non cognouit carnem, mediante neruo, sentire. Nam verè sensus est in carne nervosa, seu admixta villis nervosis, aut dicitur Gal. dicens: Sensus est in pelliculis, idest in nervositate carnis. Sequitur Auic. Et cum corruptio incipit perambulare in membro, & apostemat, quod est in circuitu corrupei, & fortasse peruenit ad corruptionem; tunc dicitur totum accensum esthiomenus. Dicebat Gal. Herpes esthiomenus dicitur, quia comedit, & in circuitu serpens lætæ pacitur. Dicit Cornelius: Herpes esthiomenon Greci vocant, quod celeriter serpendo, penetrandoque vsque ossa, corpus vorat. Id vlcus inæ quale est, cenio simile; inestque multus humor, glutinosus; odor intolerabilis, maiorque, quam pro modo vlcis, inflammatio. Vnde dicere possu-

possi-

Lib. de diff. medicis.

3. f. 4. m. d. 1. cap. 15.

4. metho. cap. 6.

7. aphor. com. 71.

Lib. 4. cap. 19.

Lib. de humor. cap. 7.  
1. de vsu part. 1.  
14. metho. 1.  
3. ad Glau. d. 3.  
cap. 1.

De humor. c. 11.  
1. de vsu part. cap. 18.  
3. de 1. v. m. 175.  
129. in com.  
1. de anoma. 100.  
com 104.  
1. de partibus. cap. 6. ʒ. 1. 9. de grav. am. c. 3.  
Lib. de causis reip. 100. c. 3.  
3. ad Glau. c. 6.  
Lib. 1. cap. de thermione.

10 possumus, quod gangræna est corruptio siens, sphacelus est corruptio facta, esthiomenus verò est facta corruptio cum putredine multa, latè pascendo.

Signa istarum corruptionum patent ex iam dictis, & sunt ægritudines in propatulo; quæ, vt dicit Gal. non indigent demotione, cum sensui eorum ostendant essentiam.

Causæ verò putrefaciētes, & corruptentes membrum, illæ sunt, quæ faciunt membrum vitam de perdere; deperdit aut membrum vitam, quando proprium temperamentum amittit. Istius verò etiæ causa est optimi nutrimenti deperditio: nam, vt docent Gal. & Arist. tam diu viuimus, quando nutrimum. Quatuor efficiētes causas assignat Auic. quarum prima est: res corruptens complexionem membri, & vitalem spiritum, qui est in ipso: secunda est res prohibens spiritum ad membrum deuenire: tertia est, res simul prohibens aduentum spiritus ad membrum, & corruptens membri complexionem: quarta potest esse malum regimen à medico, vel ægroto procedens in cura alicuius passionis.

30 claratum est à Gal. quod omnis actio à membris peracta appetendo, atrahendo, digerendo, & expellendo fit mediante sanguine, & spiritu, & proprijs vasis, ad operationem deputatis. Cum autem corrumpitur complexio membri, tale ad operationem ineptum redditur, & maxime virtutum animæ, quæ perficiuntur, mediante sanguine, & spiritu. Corruptitur membri complexio, ac vitalis spiritus à multis causis, membri complexionem secundum omnes qualitates ad contrarium alterantibus. Et aliquando non tantum complexio, sed & compositio; vt à veneno aut calido, aut frigido, quod sua substantia, & natura animali, & vitali spiritui contrariatur; aut sicut tumores mali, aut vlcera cachectica, & phagedenica, aut pustule malæ venenosæ substantiæ. Causa verò prohibens spiritum ad membrum deuenire, aut est accidentalis primitiua, sicut infrigidatio nimia à narcoticis medicinis in calido

30 tumore, quæ vias claudendo, vitam transire prohibent. Ab abundantia etiam aeris frigiditate hoc euenire potest; vnde homines moriuntur. Aut fortis contractio quorundam membrorum in sua radice, vt docet Gal. Quando fortiter obstructa fuerit secundum maximas venas, & ora valorum, & pori omnes, qui secundum cutim ab ea, quæ secundum naturam, transpiratione sunt priuati, facilius mortificantur, quæ ita laborant corpora, & hoc multoties visum est ex nimia strictura in osium magnarum fracturarum restauratione. Aliquando talis causa est corporalis, & intrinseca, sicut apostema calidum, malum, fixum, magnum; grossæ materiæ, opilantes meatus, & retinentes spiritum; vnde membrum non nutritur, & corrumpitur. Et cum vnaquæque harum causarum fuerit valde potens, corrumpit membri complexionem, & spiritum ad nutriendum membrum venire prohibebit. Medici malum regimen istius erroris causa esse potest, vt docent Hypp. Galenus, & Auicenna, scilicet curando vilcera, aut vulnera cum humidis medicinis, putrefactionem causantibus, cum cura vlcærum sit exsiccatio; aut indebitè regendo luxata, aut fracta membra, aut dolorose operando &c.

40 Dicit Rasis; Gangræna illa est mala, quæ fit successione chronicarum, & acutarum ægritudinum. Et Celsus illa est mala, & cum difficultate curatur, quæ in senili corpore, aut in extremis corporis partibus contingit. Loca humida, sicut labia, & testes, huic dispositioni sunt valde parata. Hæc mortificatio, dicit Paulus, quam Græci gangrænam appellant, tantæ est ferocitatis, vt nisi quis, rupta omni mora, præsentissimè tulerit suppetas, laborans particula faciliè emoriatur, & vicinas sedes inuadat, ac hominem iugulet,

De cura gangrænæ, sphaceli, & Herpete Esthiomeno. Cap. X.

50 **A**UTORITAS est Gal. quod medicus debet cognoscere ægritudinis essentiam, & deinde ab ea ingenium curationis assumere. Ex alibi; Quia diuersificantur ægritudines, ideo & eorum curæ debent diuersificari. Igitur harum passionum cognita differentia, quæ secundum maiorem, & minorem corruptionem cognosci potest, secundum eorum indigentiam medicaminum diuersitatem assignare debemus. Curantur isti affectus duobus præcipuè medijs; primo, in omnibus regendo corpus: altero putrefactionem prohibendo. Primum medium multis indiget inventionibus, scilicet regimine rerum non naturalium, prohibitione præternaturalium, & conseruatione naturalium.

60 Quò ad sex res non naturales, aer aut temperatus, aut aliquid ad frigidum, & siccum tendens, eligendus est. Cibus frigidus, cum aliquali humiditate, & paræ quantitatis est conueniens, cum hæc passio inter acutas enumeretur; quia ante quartum decimum indicatur. Et dictum est. Quibus statim morbus consistit, his statim tenuis victus adhibendus est. At Celsus, præcipuè in hoc casu, petendum est, non à medicamentis solum, sed etiam à victus ratione, præsidium. Primo igitur, nisi imbecillitas prohibebit, abstinentia vrendum est, minuendusque cibus, & vinum subtrahendum. Ster patienti cum prifana, aut cum panarella, & lacte amigdalorum, aut seminum communium, aut cum brodio pulle alterato cum lactucis, boragine, endiuia &c. Eiusque potus sit decoctum hordei, aut coriandri cum syr. violano, & succo granatorum. Quies laudatur, ne humores in motu ponantur, quia facilius ad læsum locum, subtiles, acuti, & mali præcipitare consueverunt. Moderatè dormiat, vt in somno vir

1. de locis aff.

2. de Symptom. caus. cap. 1.  
3. de animæ, vitæ.  
3. l. 4. cap. de gl.  
6. pna.

Lib. de potest. natæ.

Ex 3. de morbo Lib. de morbo, cap. 9. Et de caus. morbo. cap. 11.

Lib. de Valori. 1. art. med. cap. de cur. febri. cō mou. in curæ.  
Et 4. metho. c. 1. & lib. de oculis. 3. l. 4. cap. 17. & 4. l. 4. cap. 1.

Lib. 4.

4. metho. cap. 1. Et 3. sentent. c. 1. Et 1. ad Glan. cap. 1.

1. aphor. 13.  
1. aphor. 10.  
Lib. 5. cap. de cura gangrænæ.

tes tum vitales, tum animales reficiantur. Setque bono, & hilari animo, absque coitu, ira, timore, & animi agitatione. Et tali regimine vtatur; maximè dum causa fuerit malignitas, & quantitas corruptorum humorum in quod cognoscitur ex festina, & manifesta corruptione, nulla primicia apparente causa.

Vt autem prohibeamus præternaturalia, scilicet morbum alium, aut æccidens, aut causam, euacuatio est necessaria, aut sanguinem emittendo, aut pharmaco euacuante. Nam ex hoc ab apostemate se erit curis, & a dolore, ac malorum humiditatum fluxu. Dicebat Cornelius; In huiusmodi casu primum est; si vires tolerare, sanguinem mittere; aut per potionem, aut cibum alium ducere. Verùm in hoc aduertendum est, vt si corruptio à venenosa materia provenit, vt sæpe contingit, vena sectio non sit talis, vt fuit tractus materie corruptæ ad cor, vt docet Auic. Sit igitur huiusmodi phlebot. aut à vena propinquiori affecto loco, aut à longiori per rectam diametrum. Multoties verò opus est euacuare, & non diuertere. Dicit Paulus; Gangranam curamus sanguine ex parte vitata astatim emissio; vel enim vena incisa, sanguis corruptus (cum vena amplior in ipso membro appareat) detrahendus: vel cute totius corporis diuisa, multis, atque plagis idem vt creat, procurandum est. Forti verò existente virtute, & pharmacum patienti exhibeatur, in quo sit virtus purgandi corruptos, & adustus humores, præ oculis habendo auctoritatem Hipp. In qua dicitur si qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facile ferunt; sin contra, difficulter. Et inspicere oportet regionem, atatem, tempus, & morbos, in quibus conuenit, aut non. Sit tale pharmacum benedictum, euacuans cum facilitare, ne materia mala in extrinsecis coniuncta, in centro deducatur, cuiusmodi est: R. floris cassie no. ex. 3. x. elect. de succo rosarum 3. j. zuchari fini q. s. fiat bolus. Aut R. pulpæ cassie no. ex. diacar. an. 3. vj. Decocti florum, & fructuum cord. q. s. misce, & fiat p. 6. & adde syr. violati 3. j. Aut R. calsie, manne elect. an. 3. j. reubarbari elect. secundum artem infusi 3. j. syr. violati 3. j. decoct. florum, & fructuum cor-

dialium q. s. misce, & fiat p. 6. In subtili materia R. cassie, diacar. an. 3. iij. elect. ros. Mesf. 3. ij. thamarindorum 3. j. syr. violati 3. j. & cum communi decocto fiat 6. p. & allumatur in mane per quatuor horas ante cibum. Deinde fiat humorum adæquatio cum syr. de succo acetosæ, de succo endiuie, de summatia, acetoso simp. violato, de lupulis, & similibus. cum aquis lupulorum, buglossæ, acetosæ, endiuie, fumariæ, boraginis &c. Et sic celebrata tali operatione, non concurrent nouæ superfuitates ad locum, & non emergent nouæ ægritudines, & naturalia præseruabimus. Nunc ad localia deueniamus: Pro quibus notare oportet morbi qualitatem; nam superficialis affectus debilis medicinis curari potest, cum ægritudo curam suscipere valeat. Dicebat Celsus; Gangranam, si nondum planè tenet, sed adhuc incipit, curare non difficillimum est, vtique in corpore iuuenili; & magis etiam si musculi integri sunt, si necul vel leui non sunt, vel leuiter affecti. Vnde Auic. dicebat; De gangræni quidem, dum in principio perseverant, speratur, quod sanentur. Similiter Gal. Sicut gangrenam iam ita completam, vt pars sit intermorta, sanare est impossibile; sic eandem, dum adhuc fit, possibile est. Et ideo in gangræne cura non nisi debilia medicamenta declarat, vt inquit Paulus. Scribit Auic. Cum vides colorem membri alterari, & est in via putrefactionis, oportet, vt succurras liniendo ipsum cum eo, quod prohibet putrefactionem, sicut est bolus arm. & terra sigil. cum aceto. Tale medicamentum laudatur etiam à Celso, & a Galeno. Ego verò credo, quod tali limenico locum superiorem linire potius debemus, defendendo, ne ad affectum locum currant humores. Vnde dico, quod bonum est vti tali defensiui: R. olei ros. omphacini, mirrhini an. 3. ij. succi plantag. folatri an. 3. iij. bulliant omnia vsque ad succi crassificationem, & colatur, cui colaturæ adde ceræ alb. 3. ij. sanguinis draconis, boli armeni, terræ sigillatæ an. 3. s. santhal. alborum, pulueris mirthillorum an. 3. ij. misce, & in morta: iolo plumbeo fiat vnguentum molle. Locus autem liuidus emplastretur cum frumento masticato, bolo armeno, &

aceto, aut cum emplastro Dioscoridis ex farina lolij, raphano, sale, & aceto. Sequitur Auic. Si autem illud non valet, ideo si locus incipit corrumpi, non inuenies excusationem, quin scalpellationem profundam facias diuersorum modorum in locis. Et Celsus; tunc inter sanam, viuatamque partem incidenda scalpello caro vsque ad osse sit, vt neque contra ipsum articulum id fiat, & porus ex sana parte aliquid excidatur, quam ex segre relinquantur. Gal. & idem dicit; Illa pars, quæ adhuc aliquid sensus retinet, & non penitus mortua est, frequenter scarificatione, & scalpello purgabitur; atque curabitur, nunc multis & profundis plagis, nunc paucis & leuioribus, vt locus, ideoque postulatuerit. Et Paulus dicebat; Cum disposio in principio tendit ad corruptionem, vbi comprehenditur eius sensus, & color est violaceus, & sanguis inclusus, debet curari cum emissionem totius illius, quod in membro dolenti est, aut cum minutione, si in loco illo fuerit magna vena, aut secari, aut cum scarificatione pelvis diuersa, & plurium viarum. Idem Auic. dum scribit; Phlebotomia venas paruas propinquas, vt euacuetur sanguis malus cum cautela, & aliquando cum appositione sanguifugarum. Facta scarificatione, dicit Princes, super locum ponatur quod putredinem prohibeat, sicut farina orobi cum syr. acetoso, aut farina fabarum cum syr. acet. & sale. Medicamen tale laudat Gal. dicens; Post scarificationem vterque his medicinis, quibus putrida sanentur, sicut farina orobi cum aceto, & melle. Et facit ad hoc, dicit Gal. etiam farina fabarum cum aceto, & melle cocta. Et si volueris, vehementius excicare, adde aliquid salis: Et Paulus dicebat; Post scarificationem medicamentum aliquod putridis conf-



- 10 cratum induci debet, quale est farina erui, aut lolij, aut linimentum ex melle acetoso. quod si valentius imponere cogites, salem adijce, aut pastillum Andronis. Diofco. laudat multum ad nomas, & depascencia vlcera acetum, & sal, quod medicamentum ab eo oxazme vocatur. Et Actuarius de medicamentorum comp. vbi de liquoribus medicatis, summè laudat acidum muriam, id est acetum salum. Aut R. faring tabarum, orobi, lentium, lupinorum an. s. iij. succi ablynthij, baurach an. s. ij. syr. aceti. s. j. s. lixiu barbitonensis q. s. pro emplastro: Ante verò medicamentum applicationem locus abluitur cura lixiu, aut aceto calido, aut cum decoctione lupinorum... & sive ad eorum crepaturam. nam dicitur Aegineta, opitulari ipsis & lupinorum amarorum decoctum us infersum. Et si hæc non curant, dicit Gal. vtere trociscis Andronij, qui summè laudantur a Paulo, & ab eo describuntur sub titulo pastillorum Andronij: R. floris fatiæ punice 3. x. gallæ 3. viij. myrrhæ 3. iij. aristolochiæ longæ 3. iij. atramenti futorij, croci, aluminis scissi, crocomagmati, misos, thuris, singulorum 3. ij. leuigantur in vino asfringenti, vel aceto. Aut vtere mercurio præcipitato, & sit breuiter isto modo. R. aquæ, cum qua partitur aurum ab argento s. viij. mercurij Hispani noui s. vj. sit per diem in infusione in dicta aqua in aliqua parua boccia; deinde bociam ad ignem pone in vasculo terreo; & inter vasculum, & bociam sit cinis, adeò quòd non tangantur adinuicem, & sic permittit bullire igne lento vique ad aquæ consumptionem; frangatur boccia, & inuenies mercurium condensatum: ipsum tritura super porcidum, & fiat pulvis subtilissimus. Aut R. ( & est medicina, cui non est par ) argentei viui lib. j. aquæ, cum qua separatur aurum ab argento lib. ij. omnia in elambico vitreo ponantur, & extrahatur aqua; qua sic extracta, iterum ponatur in elambico super dictum mercurium, & fiat noua distillatio, iterumque aqua superimponatur, & fiat tertia elambicatio. post quam argenti rubicundum
- 30 remanebit in fundo bociæ in forma pulueris; Frangatur boccia, & extrahatur pulvis, & ponatur in vase terreo super calidum cinerem, desuperque accommodetur palla ferrea, lara, igne magno accensa per horam, donec scilicet partes aeræ male euanescent, & mercurium perfectè rubificetur; deinde opus est super porcidum subtilissimè eum leuigare, & leuigatum ponere in ampulla vitrea, atque super illum aquam rosaceam infundere, adeò vt aqua super emineat mercurio per vnum digitum; bulliat postea leniter vique ad aquæ consumptionem; deinde puluerizetur, & iterum trituretur, semper rosaceam super infundendo, atque tandem ad solem exti cecur, & fiat trituratio sicut alchobol cum duobus solis auri, & seruetur tanquam aurum in vase vitreo, bene obturato. Valet calchantum, & sit isto modo. R. vitreoli Romani clati s. vj. ponatur in vase terreo nouo, & alio simili cooperatur, adeò quòd non respiret, & ponatur in igne magno vique ad vitreoli adfusionem; extrahatur postea, & trituretur. Gal. dicit, quòd inter metallica hoc maximè efficitur. Vnguentum cauterij summi, & sit isto modo. R. colcothar vsti 3. vj. calcis non extinctæ 3. ij. mellis 3. ij. ceræ parum. Mirabilis est etiam operatio vnguenti ægyptij, quod summè laudatur a Principe cap. de cura gangrenæ, & ibi dicit, quòd est de medicinis prohibentibus corrosione, & facit cadere illud, quod est putridum, & conseruat illud, quod sequitur, & sit isto modo. R. floris aris, mellis, aluminis, an p. æquales, misce. Alterum Rafis. R. floris aris, mellis, aceti an p. æq. misce: Istud vnguentum potest adhiberi per se, & cum lixiuio, aut sapa, vlcus abluendo, & maximè cauitate aliqua apparente. Et si queris exlicationem maiorem, adde huic lotioni granum arsenici; aut decoque tartarum vini in lixiuio decocti lupinorum. Optimè quoque hoc facit (dicit Cornelius) superimposita arundinis radix; si tenera est, protinus contrita; & si dura, in multâ decocta, cui semper mel adijciendum est. Vnguentum Azeneti multum laudatur ab Actuario. in de compositione med. & a Gal. lib. 5. de med. per genera. Aduerte tamen ea, quæ dicit Gal. vt semper attendas ad qualitatem, & habitudinem corporis, vel virtutem; cum fortes, & duri corporis medicamina de facili serant; molles autem, & tenuis corporis talia susterre non possint. Necessè est igitur talia adhibere virtute medicamina, qualia videritis & corpora: quia vir, mulier, & infans, multum & corpore, & virtute distant. Et si fueris vir, considerabis, an sit rusticus, aut operi quotidiani deditus; vel vrbanus, & otiosus; aut iuuenis, aut senex. Horum aliqui fortissimè virtutis medicamina, alij imbecilliora petunt. Vnde Auerr. cum diuersa corpora secundum diuersas regiones, & ætates, & sexus adinuicem compararet, dicit: Aliqui sunt, qui ex fortibus euadunt egrotudinis sine medico, & medicina, sicut Barbari, & Arabes, & qui in desertis habitant; & hoc vir, quia aliquando cum brutis assimilationem habent. Multa alia, quæ valent ad gangrenam, habetur ab Auic. qui deueniens ad sphacelum, dicit; Si autem pertransit dispositio dispositionem apostematæ, & dispositionem corruptionis coloris eius, & incipit peruenire ad molliem, & humidatatur parumper, tunc hæc est incipitio eius in putrefactione; & est tempus deueniendi ad vltiorem exficacionem. Quare oportet, vt puluerizetur super ipsam pulvis aristol. rot. & gallarum. Similiter calchantum, aut colcothar cum aceto, aut cucumeris agrestis succo, & epirbimetur. Et si pars carnis incipit corrumpi, incide eam. Modum autem faciendi hanc operationem docet Auic. Et Gal. scribit: Quando corruptionem auferre vultis, penitus debet fecare vique ad viuum, & vique ad eum locum, qui sanus est, ita vt nihil de mortua carne restet: cumque hoc feceris, reliquum scarifica. Aut fac ipsam cadere, dicit Auic. cum trociscis Andaracaron; aut fortius chaldicon. Trocisci andaronij describuntur a Petro de Argelata sub titulo Andaronis in cap. de cura formicæ corrosiue. sed trociscum andaracaron non inueni. Tro

Lib. 5. cap. 16.

3. ad Glaucon. Lib. 7. Gal. en. 7. de med. per genera.

3. de med. & gen.

Diana. simon. 1.

3. ad Glaucon.

7. coll. 31.

4. 4. m. 2. p. c. 9.

4. 1. cap. 37. 2. ad Glaucon.

cifici verò andaronis sic sunt: R. corticum gran. 3. liij. aristolochiz, gallarum non perforatarum 3. 8. 10  
 salis ammoniaci, thuris, aluminis iameni an. 3. x. calcaneoli, mirrhæ an. 3. ij. terantur omnia, & conti-  
 nentur cum aceto, & fiant troscisci. Troscisci verò calcadicon describuntur à tali his verbis: Medica-  
 mentum, quod vocatur calcadicon, carnem mortuam corrodens, R. calcis vias partem vnam, arsenici ci-  
 trini, chali, acatiz, arsenici rubei, omnium an. partem mediam: hæc omnia cum aqua, quæ vocatur  
 prima, terantur. Alia descriptio reperitur apud Principem hoc modo. R. arsenici, drag. unthi, floris gris,  
 calcis non extinctæ an. p. q. Et Petrus de Angelata describit trosciscos caldicones. R. calcis non extin-  
 ctæ 3. x. de tribus arsenicis 3. s. acatiz 3. ij. s. conbiciantur cum aceto. Hos etiam describit Guido in sua  
 parua Chirurgia cap. 6. Dinus in suo antidotario, & Mesue in cap. de polyppo sub nomine alcadico. Lau-  
 dantur & alij ad hunc pithili scopum, vt Polyde, Musæ, Pafionis, & Alphodelo, & Arsenico &c.  
 Troscisci alij, quibus vror: R. arsenici albi, salis ammoniaci, tartari calcinati, vitrioli albi an. 3. i. salis  
 natri 3. viij. fiat omnium pulvis, & ponatur in vase terreo nouo vitreato, & alio simili cooperiatur, in  
 cuius medio sit quædam perforatio, sic quòd aliquantulum possit respirare, & lura bene, & pone ad ignem  
 partium per medietatem horæ, deinde ignem augmenta, donec aliquantulum fumorem in vase audieris, &  
 sic pertrahere, donec fumor cesset: tunc autem adusto facta est; & tunc frangantur vasa; & quod intus  
 est, extrahatur, & in minutissimum puluerem redigatur. Et nota, quòd pulvis hic est fortissimæ op-  
 erationis: Cautè igitur eo vtere secundum indigentiam. Et quia caustica omnia substantiam humiditatem  
 extirpando escharam faciunt, dicit Princeps; succurre cum butiro, donec cadat primus ordo  
 escharæ; deinde fac cadere secundum, donec peruenias ad partem sanam, Gal. dicit; Appone folia  
 porri cum sale, & citò eschara, idest combustio, cadet: aut puluerem hermodactylorum cum melle;  
 aut medullam panis cum apio, aut ozimo: aut assungiam cum maluis decoctis; aut emplastrum Mace-  
 donicum; aut macherionis &c. De his multa dixit Paulus. Remota eschara, locus cum vnguento cera-  
 feos, aut damasceni, aut apostolorum mundificetur; postea incarnetur &c. Et quia non semper assequi  
 mori desideria nostra ex talium medicaminum applicatione, sicut dicit Cornelius; idè interdum opus  
 est ad ipsum ignem deuenire; & si opus igne periculi non potest, à membri amputatione fugere minime  
 possumus. Dicit Gal. Totius corporis medicamina ad tria reducuntur adiutoria, medicamentum, fer-  
 rum, & ignem: quod enim medicamento curari non potest, igne curare tentes; quodque igne sanari  
 non permittitur, ferro sanari conceditur: quod autem à nullo istorum, insanabile est; quia nulla alia cu-  
 ra superest. Verum est, quòd etsi vltio, quam cauterium vocamus, sit efficacissimum remedium, quod  
 valet ad prohibendum expansionem corruptionis, nihilominus ægrotantes terrefacit; idè nisi turgente  
 causa, ea vbi debemus: Sed furiosa existente materia, & igne, & ferro vtere; quia dicti est ab Hypp.  
 Extremis morbis extrema exquisitè remedia optima esse: sed de tali remedio aliqua dicamus. Si cor-  
 ruptio, & mollities multa cum foetore appareat, nec medicamento talem malignitatem corrigere pos-  
 sumus, ad ignem deueniendum est, his consideratis, quæ ab Auic. de vltione, dicuntur. Si locus  
 fuerit tolerans vltionem, tactus defensionibus circum circa locum corruptum in superiori parte cum iam  
 dicto defensiuo, & prope locum appositis stupis, in acero insulis, deinde in oui albumine, locus caute  
 rizeretur; Et opus est habere instrumenta diuersa, seu clauicula ferrea, magna, & parua; lata, & angusta,  
 optimè ignita, vt docet Albucasis, Cauterizetur locus ab omni parte, donec eradicetur corruptio tota,  
 & non remaneat ex ea aliquid penitus. Et hæc est cautela Auicennæ. Galenus autem scribit; Quando  
 necesse erit amputare, vel adungere aliquid corporis membrum, vsque ad continuum sanæ carnis abscin-  
 das; ita vt nihil puridæ carnis relinquant, sed magis de viua, aut sanâ carne aliquid ideradas, sic enim  
 & melius, & citius curabis. Et si adhuc aut mollities, aut liuiditas, aut corruptio aliqua in parte vide-  
 bitur, cauterium reiterare, vsque ad eradicationem totalem, timendum minimè est; cum à tali cautero-  
 rio & membri exsiccatio, confortatio, & rectificatio causetur. Dicebat Auic. Vltio, quam cauterium  
 vocant, efficacissimum remedium est: quod valet ad prohibendum expansionem corruptionis, & par-  
 ticulam, cuius inemperiem corrigere cupimus, roborandam, materiaque corruptas membro inhæ-  
 dissoluendas. Et si ad tollendam carnem corruptam vltionem feceris, & terminus incolumem depre-  
 hendere velis, scias cum esse, vbi adest dolor, & fortasse cogeris vna cum carne os, quod sub carne exi-  
 sit, vtere, & vltionem infligere, donec tota eius corruptio tollatur. Talem modum vrendi laudant  
 etiam Cornelius, & Paulus, atque tandem omnes scribentes in hac materia: Hinc Dioscorides dicebat;  
 contra virulentos, & venenosos istius vltio expeditissimum est auxilium, vt pote cum ignis cetera viri-  
 bus præstet medicamenta. Instrumentorum autem, quæ numero, & magnitudine plurima esse debent  
 ad hunc vsum, imagines fusæ in nono huius operis libro delineauimus: quare ibi consueuat omnis medi-  
 cinæ studiosus.

Cum autem remota fuerit eschara, locum mundifica, & incarna: sed caue, ne nervi alicuius incor-  
 rupi ita tangas substantiam, neque venam, neque cordam, neque ligamentum, & cauè age.

Si verò mollities, corruptio, & purrefactio confirmata omnes partes organicas intecus reddiderit,  
 passio erit sub titulo hæreticis esthiomeni. Et tunc non possumus excusari, quin ad totalem membri  
 amputationem deueniamus. Dicebat Cornelius; Vnum aliud auxilium solum est, vt cetera pars cor-  
 poris rursus sit membrum, quod moritur, totum abscindere. In qua inhumana operatione sic proceden-  
 dum

<sup>10</sup> dum est, vt docet Albucasis; Liga membrum incidendum per tres, aut quatuor digitos supra corruptum locum, si ligari potest, ligamento forti, propter sanguinis hæmorrhagiam: & facta rerum sanguinem sustinentem præparatione, (sicut est thus, sarcocolla, mirra, mastix, aristolochia, cum pilis leporum subtilissimè incisis; aut cum gipso, vel calcantho &c.) cum stupis in oui albumine, & sale madefactis; ac in superiori loco preparata defensione, primùm cum ferro incidere, aut ignito, aut non ignito, partem carnolam vsque ad sanam, in qua dolor sentitur, abscondas; deinde cum ferra opportuna partem ossis amoue; & illic cauterijs ignitis locum totum adure. Dicebat Paulus; Nonnulli vbi purridam partem præciderant, quò securius mali radicem euellere, candens ferramentum adigunt. Vnde Auic. vbi de cura esthiomeni, dicebat; Cum inciditur membrum, quod putrefactum est: tunc oportet, vt cauterizetur illud, quod continet ipsùm, cum igne.

<sup>20</sup> do dicit. Cumque res ad nigredinem transierit, aut viriditatem, & consequitur ipsam, ipsa secundum putrefactionem præcedentem, non laboret medicus, nisi vt auferatur illud, quod putruit, ne etiam sanum, quod in eis cõsistit, vicinitate putrefiat, & putrefactio paulatim ad interiora præcedat. De hac re etiam multa alibi dixi, quæ omnia à Paulo declarata fuere. Et quia aliqua reperiuntur membra, quæ abscondi minimè possunt, vti tamen cum difficultate, vti caput, testes, anus &c. dicebat Auic. tunc procede cum medicinis cauterizantibus, & adurentibus, & propriè in membris putrefactionem facilliter suscipientibus propter caliditatem suam: Et quia superfluitates calidæ eis approximantur, sicut sunt testiculi, & anus: & si corruptio in capite contingat, ait Princeps; caue in adustione, ne cerebrum feruescat, & ne membrana ipsæ conuellantur: alias verò non verearis integrè vrere. Hac operatione celebrata, si dahitur mora, eschara subleuata, locus tali medicamine mundificetur: R. the

<sup>30</sup> rebentinae claræ, mellis crudi an. s. ij. resinae pini, ceræ albæ an. s. s. boli arm. s. j. floris aris s. ij. misce pro vnguento. Vt autem incarnetur, R. ceræ albæ s. iij. olei seminum lini s. j. succi betonicae s. ij. the rebentinae, vitrioli Romani an. s. s. thuris, sanguinis draconis. mastiches an. s. j. s. oleum, & cera bulliant in succo, deinde omnia admisceantur, & fiat vnguentum: Aut R. succi solatri, plantaginis, acetii albi, olei seminum lini an. s. x. vnguenti populeonis, olibani, mastiches an. s. ij. olei laurini, lythargij argenti, ceræ albæ an. s. v. cerussæ, boli armeni an. s. iij. ammoniaci, gantholorum rubecorum an. s. j. minij. s. i. s. caphuræ s. j. i. reos s. i. diaquilonis albi s. vj. the rebentinae s. iij. pulueris malicorij, aluminis rochæ an. s. j. s. & secundum artem fiat vnguentum; Aut fiat in minori dosi, vt indigentia requireret. Valet vnguentum citrinum, basilicon, aureum, & similia, sigilleturque tandem cum vnguento de minio.


<sup>40</sup> Anno Domini 1546. die 15 Octob. in cuitare Cenedæ, calum præ manibus habui, in excel. iuris vtriusque Doctore, domino Petro Bragino, ex his, qui de raro coniungunt: et est valde similis ei, quem adnotauit bonus ille chirurgus Ioannes de Vico in Reuerendo domino Faccio, tituli sanctæ Sabinae, Cardinali. Pariter Venetijs in monasterio sanctæ Crucis Iudaicæ 1551. in quadâ moniali coram Trincauelio, & Sicco; Nec non aliud 1552. in contrata Sancti Angeli coram Buriano in quodam Biranello. Et hos omnes secundum cunctos antedictos curauimus, quemadmodum & alios vnusquisque poterit ad laudem Dei benedicti curare, si diligens obseruator extiterit, atque operator in hac arte. Et hæc sufficiunt de tumoribus cholecicis.

Lib. 1. cap. 89

3. 1. Doct. 1. c. 1

4. 1. cap. 17  
Lib. 6. cap. 84

Lib. 4. 2. de vice  
tumor cap. vici.



## LIBRI PRIMUS

## TRACTATUS QUARTUS.

## De Tumoribus pituitosis.

## De cedemate. Cap. I.

30



Vm de tumoribus, qui succis calidioribus contrahuntur, disputatum sit; nunc de contrariis agamus, ab cedemate, vel vndimia desumpto principio. Est enim talis passio pituitosa tumor ex naturali pituita, & est aliquoties eleuatus, & expansus; interdu vero expansus, & non eleuatus; albus, mollis, indolorosus, digitis cedens; absque caliditate, cum membri grauitate, & frigiditate; & cum in eo digitus imprimitur, fovea remanet. Dicitur autem vndimia, quia dum tangitur, eius materia inundare videtur.

Sicut autem ex biliosa fluxione erysipelas, & ex melancholia cancer; ita ex pituitosa constat cedema 30

auctoritate Gal. quem secuti sunt Paulus, Aetius, Rasis, & Auic. Est igitur causa materialis huius tumoris phlegma naturale. Signa autem tumor, albus, eleuatus, mollis, indolorosus, frigidus, & digitis cedens; nec caliditas in eo reperitur, nisi per accidens, dum putrescit; quia tumor omnis, dum putrescit, calcit. Talia apostemata, dicit Auer. sunt apparenia, & oculis discreta, & quasi semper simplicia; & est de frigidorum genere: quia eius materia in actibus est frigida, & in passibus humida. Nec reperitur in homine frigidior pars, quam cerebrum, quod est miora pituita, Aristotelis auctoritate.

Differt hec passio a melancholicis, dicit Auic. duplici differentia, scilicet in genere cause materialis, ex doctrina Gal. quia aliud est materia pituita, aliud bilis atra, quamuis bilis ex pituita generari possit, ut patet in scyrro. Differt etiam per aliqua inseparabilia accidentia; per duritiem, nam hoc molle est, illud vero durum; per colorem, quia hoc album, illud fuscum, aut ad nigritiem tendens; hic aliquoties 40

sensibilis, ille vero ex toto insensibilis. Dicit Auic. quod est de genere eleuationis; tamen de sui natura, & essentia in eo non reperitur multa eleuatio, cum eius materia tenuis sit, nisi acquisierit aliam naturam per admixtionem, aut aduersionem, & per consequens sit fluxibilis. Forsitan dixit, quod est de genere eleuationis, idest transit in eleuationem, hoc est, in statuosum tumorem; nam ventositas causatur ex resolutione subtilium, & siccum partium frigidorum elementorum, quae, cum prohibita inuenit transpirationem, eleuat, ut in tumefactis videri potest. Dicit Gal. Ventositas in ventre nascitur, dum materia phlegmatica liquefit, atque dissoluitur, debili agente caliditate. Vnde dici potest, quod cum resoluatur hic morbus, possit transire in eleuationem, & erit de genere eleuationis. Differt tamen vndimia ab eleuatione; quia eleuatio, sicut cedema, non cedit, & sonitum veluti tympanum red 50

dit, & Princeps dicebat; Et quanto plus materia phlegmatica est subtilior, & magis madida, & mollior eius vehementior, digitus facilius penetrat in eo phlegmate, quod comprimit ab extra, idest tumet. Non cum prohibitione eius materiae, quae est in eo apostemate, quod est eleuatum, idest ventosum; nam talis flatus digiti ingressum prohibet: quod in cedemate minime contingit; imò in eo remanet fovea post digiti compressionem. Et plurimum eius, dicebat Auic. supple. eleuationis in vndimia, est a vapore phlegmatis, idest a ventositate ab ipso phlegmate evaporante, & Gal. secundo ad Gla. vbi de cedemate, ait: Cedema aut vocamus tumorem mollem, doloris expertem, quae ex pituitosa substantia, aut spiritu vaporoso fieri constat. Est tumor sine dolore, quia materia benigna satis est. Et si de natura frigidi contrahendo, & lacerando sit causae dolorum, non tamen omnis frigidi, sed in summo. Hac vero pituita, cum sit sanguis diminute decoctus, sapit naturam sanguinis. Neque est de genere illius frigiditatis, de qua infra, vbi de nodo dicam. Dicebat Auic. Dolor non concomitatur frigidum, idest phleg. apostema: cuius reipotissima ratio est haec; quia cum materia est humida, nullo modo potest causare dolorem, frigiditas postea membrum stupidum reddit. Est tumor albus, quia nullus est alius humor in nobis albus, nisi pituita. Est molle, quia sapit naturam aquae in colore, odore, sapore, & substantia. Dicit Gal. quod vltimum in hydropicorum pedibus, atque tabidorum apparet complexio corporis cachochima facta, cum hepatis propria temperie per frigidum lapsus est. Verum haec passio inter accidentia, & non morbos, enumerari debet. Generatur hic tumor fere semper ab antecedenti causa; cum dictum sit a Gal. quod natura semper sanguinem bonum a malo seque strare intendit; & si potens est, cum ad extrinseca demandat. Contingit hic tumor in extremis, & infimis partibus, cum grauis, & ponderosus sit. Dicit Princeps; Et quandoque accidit ex percussione, & similibus.

34. methos. ex. 4.  
de v. ad v. v. 1.  
de cedemate.  
Lib. 4. cap. 17.  
Lib. 15. cap. 1.  
7. ad Alm. ex. 13.  
3. 4. ex. 1. cap. 3.  
7. coll. 36.  
Lib. de sensu, &  
suis.  
3. de inter. aff.  
cap. 7.

Gal. 14. methos.  
de h. de tumoribus.  
cap. 4.

Arist. 1. methos.  
tumor.  
3. de symptom.  
caus. cap. 3.

Gal. 14. methos.  
Rasis dicit.  
cap. 337.

Auic. 1. 1. 1. cap.  
de humoribus.  
3. 1. 1. 3. 1. 1.  
cap. 10.

14. methos.

3. de aff. inter.  
cap. 3.  
Lib. de arabile.  
6. 4. 1. 1. 1. 1.  
Lib. 3. 1. 1. 1. 1.

- 10 similibus. Et non concurrunt materia, quæ attrahitur ad locum, nisi phlegma; & tunc non apostematur præter apostema phlegmaticum, & illud est parum; & non euacuatur à dolore. Hoc dixit Auic. quoniam tumor à primitiua causa non fit, nisi quia ad locum læsum humores calidi à natura transmissi, prout est sanguis, & spiritus (cum hæc sint vitæ principia) concurrere consueverunt: tamen interdum concurrunt phlegma; non autem euacuatur à dolore, quia ibi fit tumor talis, sed quia iam facta est continui solutio lenta, ac secum semper est calidi succi proportio aliqua. Et quando dicit, non concurrunt nisi phlegma, est verum, pro maiori parte, sed raro hoc contingit; Et ideo subdit Auic. Et illud est parum, idest raro contingens. Nec dicendum est, & illud est parum, idest in parua quantitate, quia dixit, non concurrunt nisi phlegma. Tales tumores in hyeme, in senibus, mulieribus, & crapulosis multiplicantur. Dicebat Rasis; Apostema molle, quod digito, cum premitur, cedit, aliquando est ægritudo sola; ali-
- 20 quando comitatur aliam ægritudinem propter debilitatem digestionis. Hic morbus interdum dicitur mollis tumor, interdum laxus tumor, ab aliquibus ydema, œdema, vndimia &c. Determinatur autem vltimum per resolutionem, raro ad saniem deuenit; & quandoque sine dolore cum sanie tenui, & non alba. Terminatur quandoque ad duriciem, malo adhibito regimine, tum in regimine vi-
- æ, tum in localium applicatione.

## De cura œdematis. Cap. II.

- 30 **A**ctiuorum fit in patiente bene dispositio; nam forma non introducit in materia, nisi materia prius fuerit bene disposita, & instructum non patitur à materia, sed materia ab illo. Hinc dicere volo, quod hæc passio est de numero illarum, quæ cum facilitate scirrhotizantur, & indurantur. Nam in habentibus similibus facilis est transitus. Est enim talis materia frigida, inobediens, & cum difficultate digeritur, & præparatur. A medicamento vero non opportuno in qualitatibus propriis, & debito tempore non administrato, ex ipsius phlegmatis subtilium partium resolutione, crasse indurantur: quod sæpe adnotauit Galenus. Hoc igitur animaduertens Auic. in eius cura plurius vitit ingenij; & dicit; Euacuatio quidem, quæ fit cum solutione ventris, & abstinentia ab eo, quod generat phlegma, est res, quæ est necessaria; sed oportet eam loco, & tempore applicare, quæ talem succum resolueret sit potens.

- In primis igitur hæc duæ intentiones celebrandæ sunt: postea ad localia deuenire oportet. De vitæ regime dicebat Rasis; Aeger suū attenuat regimen, & à fastidio se, & aquæ multæ catione custodiat. Sit ergo eius diæta ad caliditatem, & siccitatem tendens; dimittit do pisces, caseum, legumina, olæ, & omnia pituitam multiplicantia, scilicet difficilis coctionis. Carnes vero sint assatæ, facili digestionis, & boni nutrimenti: sicut vituli, hardi, castrati iuuenes. Aues omnes, præter palustres, vt turdi, perdices, fassiani, turtures, & iuuenes pulli: pisces quæ rubei saxatiles, conceduntur. Frigida verò, & cruda dimittantur. Potus sit vini mediocriter potentis, clari, & odoriferi. Aqua non conuenit, nisi apparente febre, aut aliquorum membrorum intrinsecorum euaporantium debilitate.

- De euacuatione dico ex eo, quia talia apostemata sunt de genere chronicarum passionum, ideo concotionem, seu præparationem, seu adæquationem expectant, & euacuationem in tempore debito. Dicit Auic. de mente Gal. In diurnis morbis expectanda est concoctio, non in alijs. Quod hæc passio fit ex diurnis, patet auctoritate Hypp. vbi dicit; Mollis tumor dolorem non inferens, & digito cedens, longiori tempore finitur, sed non ita graue ab eo periculum pendet. Sed notandum vnum est, quod notatur Gal. & Paulus, nempe aliter quoque œdemata provenire, siquidem in pedibus, in subter aquæ affectibus, habitu corporis contabescente, qui phlegma Græcè dicitur, & malo habitu, qui cachexia; atque in illis quidem tumor hic accidens est. De quæ passione hic sermo non erit, sed de œdema, quod ex pituitoso humore in particula influente consistit. In hoc digeratur materia, vt docet Auic. de intentione curæ febrium putredinis, vbi dicit; Intentio in digerendo est æquare substantiam materiei, ita vt fiat præparata ad expulsiōnem facilem. Et subtile imbibitum, & grossum fixum, & viscosum adhaerens, totum illud non est præparatum ad expulsiōnem facilem; imò est necessarium, vt in spissetur subtile, & subtiliter grossum paulatim, & incidatur viscosum. Phlegma enim quoddam spissum, & viscosum est; ideo subtiliatione, & incisione indiget. Ideo dicebat Auic. Apostemata tumida, quæ œdemata vocantur, curantur medicaminibus vim calefactoriā habentibus cum tenui substantia, vt facilius dissoluatur, meatusque exigui dilatentur. Nam horum apostematum tumidorum causa est crassus humor, & status, ac meatuum obstructio. Oportet adhuc studere, vt amoueatur ea materia, quæ vaporem eigne statuosum. Digeratur igitur talis pituita, & laudatur ad hoc syr. acet. Teleniabini zucharinum, bisantinus cum aceto, oximel, mel rosaceum, acetosus de duabus radicibus, acet. diarodon, & similes, cum aqua feniculi, scabiosæ, apij, cichoræ, menthæ, boraginis, &c. Facta digestione, quæ paulatim fit, dicit Princeps; euacuatur materia cum pillulis, quia sunt fortissimæ operationis; sicut sunt pillulæ fætidæ, assaiareth cum æ. aureæ, de euforbio, sine quibus, de hermodacidis, de benedicta, & similes. Aut si opus fuerit, R. cassiæ penè no. ex. 3. x. elect. indi maioris 3. ii. agarici rosc. 3. j.

De Tum. Pituit. Lib. I. Tracl. 4.

F 4 aquarum

3. 4. tracl. 1. c. 3.  
Idem improprie loquendi  
Non est modo  
lone.

7. ad alm. 13.

4. 1. 2. de ani-  
mæ. com. 3. 4.  
Gal. 1. de 6.  
receptis librum  
ex parte febri-  
p. 1. humidi.  
Art. 1. de ani-  
mæ. tra. 2. 5.  
Art. 1. de gen.  
& cor. tra. 14.

7. ad alm. ca. 11.

4. 1. cap. 3.  
1. aphor. 1. 4.  
1. prognostico-  
rum. 3. 8.  
14. methode, &  
2. ad Glau.  
Lib. 4. cap. 17.

4. 1. 1. 1. 2. c. 7.  
Gal. 1. a. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1. 1.  
com. 9.

4. 1. cap. 17.

quarum cythoreę, feniculi an. q.s. Aut R. ellect. lenit. 3.j. Indi maietis, diaprunis fol. an. 3.j. aquarum  
cythoreę, cjabolę an. q.s. Aut R. ellect. de sebestem 4. confectiois hamech 3.j. syr. ros. fol. 3.j. aque  
fumarię, q.s. Confortetur ventriculus, & hepar, ne has multiplices humiditates: quia dicebat Aucr.  
Apottemata molliā, quę sunt de phlegmate non multum grossa, multociens ex hepatis & rore con-  
tingunt. Et si corpus plethoricum apparuerit, basilicum secare non erit absurdum; idque magis in san-  
guineo corpore. Nam aliquo expellitur talis humor motus, quia est multi sanguinis superfluitas.

1. l. j. cap. 31.

Nec Aucr. hoc negat.

De localibus Aucr. secundum temporis diuersitatem diuersas facit consideraciones, & dicit; Cum  
factum fuerit istud, idest euacuatio, oportet, vt sit repercussio eius in principio cum eo, quod aggre-  
gat exsiccationem, & resolutionem. Igitur considerandum est, nunquid materia adhuc fluat, vel iam  
fixa est: quia si fluens est, eam aliquo ingenio retinere debemus, ne tota ad vnum tantum locum con-  
currat; quia sua ponderositate, & frigiditate adeo mēbrum ledere posset, quod innatus calor materiam  
regulare, vel resoluiere non valebit. Hoc opus duobus ingenijs fieri potest. aut apocritico medica-  
mine, cui infusa sit vis, & ficcandi, & resoluendi, vt docet nalis, R. aloes, mirrhę lixi, acathis, sicphy, me-  
nite, ciperi, croci orientalis, boli armeni an. partes equales, & cum aceto fiat linimentum. Hunc etiam  
laudat Aucr. aut cum fascia, membrum totum tumidum inuoluendo; Ideo si membrum tumidum fa-  
ciāci potest, incipiendo à declioli loco, ascendendo cum fascia opportuna, non vberi, quia retinere  
non potest, nec noua, quia dolorem causare solet, locum inuoluere debemus, vt docet Gal. aliquo-  
modo stringendo, ne fiat tristis lenius; nec fortiter stringatur, vt vita ad membrum venire possit. Sic  
erim materia ad diuersas regiones spargi posset, & ab actione tantum naturę resoluā. Hunc modum  
docet Ralis, vbi dicit: Valet ligatura immediatē super apottema fortis contritionis, quę ad vtranque  
tendat partem. Sed Princeps dicit; Et strictura cum ligamēto est confert cū quo non est materia gros-  
sa, & oportet, vt in illa ligatura sit incipio ab inferiore ad superius. Cognoscitur autem, quando ma-  
teria est subtilis, eua cum quiescit arget, videtur resoluā cum autem est grossa, non resoluatur. Cum  
ligamus, ab anteriori parte cum principio ligationis incipere debemus, & ibi magis stricta sit, quā  
successiue procedendo: ligamentum verō totam tumefactionem amplectatur: vnde dicebat Gal. Si in  
aliquo talium membrorum fuerit edema, incipiendo ligaturam in iunx partibus, finire oportet in alio-  
ribus, ad additionem, & compressionem, & vniuersam distributionem faciendo, velut in fractionibus.

7. ad alim. cap. 11.

3. de tra. cap. 3.

14. methodi.

7. ad alim. 11.

8. ad Glauconē.

14. methodi cap. 4.

8. ad Glauconē.

13. conuin.

8. ad Glauconē.

14. methodi.

lib. 4. cap. 37.

Ex lib. de med.

per genera.

Si autem finem desideratum tali medio consequi non possumus: tunc iubet Gal. quod debemus mane-  
bere inurētis rolaeco, membrum diu fricare; aut fortiori fricatione, sicut dicit Aucr. cum mantili, idest  
panno lineo exaspero fricatione dura. Frictio talis sit ad medicinarum in profundo faciliorem penetra-  
tionem, obstantibus porofitatibus membris frictio ob materię viscositatem. In corpore attem fortis  
aut in ignobili membro præcipit Gal. fricare cum aceto, aut oxirodino, & sale. Et Ralis cum lixiuio,  
aceto, sale, & alumne. Quod medicamentum laudatur à Gal. dicente; Mox post fricationem spon-  
giam nouam iustulam in posca superponimus, cui addas aliquid salis, vel aluminis. Et si non habebis  
spongiam nouam (dicebat ipse) accipe quancunq; haberi potest, & ipsam laua cum sapone, lixiuio,  
& vitello oui: aut abluatur ex aphronitro, nitro, & conia stacte, idest lixiuio: sed spongia noua omni-  
no applicetur. Et princeps dicebat; Deinde, idest in augmento administrentur super ipsam exsiccati-  
ua, & non oportet, vt contangat ipsum aqua. Et de illis, quę bona sunt, est, vt administretur super  
ipsum spongia noua infusa in aceto commixto cum baurach, & aqua cineris: in subtiliā enim sp-  
ingie sunt exsiccatio, & resolutio. Dicebat Serapion cap. de spongia marina; Virtus spongię maris prima  
est, quia desiccatur; & ideò Dioscorides dicebat, quod resoluā apottemata phlegmatica. Vnum notat  
Gal. et Paulus, quod si nouę spongię copia non sit, melius est eo, quod vulgus vocat ellychnion, vti,  
idest panno duplicato, aut triplicato id verò ante omnia molle est. Dicit Aucr. & quotiens additur  
egritudo, ponatur acetum, in quo infunditur spongia fortius parum, quia est minus aque permixtum:  
aut cum succo chelidonie, & est glaucum Gal. & Pauli, cum nitro. Aut R. calanthe, origani, abio-  
thij, mentę, florum chamamelis, hypericonis, an. m.j. baurach. 3. j. lixiuij. q.s. fiat decoctum, & sa-  
me spongiam nouam in dicto decocto infusam, & super pone, colliga. Aut R. florum falcis, nenutaria,  
mirthi, an. m.s. farinę ciceturis, fibarum, lupinorum an. 3. j. bulliant omnia in lixiuio vsq; ad coa-  
sumptionē lixiuij, & adde olei de abicinthio, mirthini, rotati an. 3. j. salis m. j. melle, & fiat emplastrum.  
Aut R. cineris cribrati, sulphuris subtilis an. 3. j. pulueris nucum cupressi 3. j. scimini, salis, an. 3. j. lixi-  
uij q.s. bulliant omnia simul; & adde farinę ciceturis, fibarum, an. q.s. pro emplastro. Sequitur Prin-  
ceps; In statu ad vltimam exsiccationem dueniendum est, & ibi laudat spongiam in fortissimo aceto,  
aut in lixiuio facto cum cinere fici, & vitis; & dicit, quod oportet, vt spongia omnia latera tumoris am-  
plectatur, ne materia ad latus aliquid declinet: aut infundatur spongia, aut ellychnion in aqua calcis,  
quia est fortissima operatio. Laudat Gal. emplastrum, ex farina millij, & succo granatorum. Aut  
fortius, R. spongię argenti 3. liij. adipis porci 3. viij. olei vereris 3. liij. radicem alheq. m. j. decoquantur ra-  
dices in vino, & aceto; subactis postea ad las argenti spumam, & agita omnia simul ad emplastri mo-  
dum. Ego verò vtor medicamento ex rutha, melle, & sale, & mirabilem vidi operationem. Aliud,  
R. sulphuris, mui hę, salis an. olei vteris, aceti, an. q. s. pro linimento. Laudatur sterus vaccinæ, &  
valet,



- 10 valer, quia mollis, & resoluir. & Auic. iubet fieri emplastrum ex ipso, cum olibano, sthorace, calamo arom. spica, & abfynthio: & dicit, quod est fortis iuuament. Aliud fortissimæ operationis. R. foliorum iniybi, radicum falicis, asfodillorum, foliorum thamarici, liliorum an. m. i. fermenti, tartari vini, calcis abluæ, sulphuris, an. s. j. olibani, sthoracis, pinguedinis cerui, medullæ crurium virulū an. s. ij. aquæ caulium q. s. bulliant omnia vsque ad ipsitudinem: & adde, olei mirrhini, rutæci q. s. croci parum pro emplastro: Medicamentum in scirrho Galeni, vbi iubet malaxare tumorem cum aceto, in quo extinctus sit lapis, aut in uolendini, aut pirites, idest marchefizæ: deinde in oleo antiquo veteri, agrestis cucumeris, & altheæ radices decoquere, ac locum emplastræ: & ibi fumme laudat acetum: & dicit, quod virtus aceti, si quis ea moderatè, & secundum decens tempus vtatur, iuuat has dispositiones, & dissoluit grossos humores: si verò immoderatus, vel non in tempore decenti, quod subtilius sapiens, reliquum finit lapideum fieri: & dicit, quod nullo modo in locis viatur neurosis. Et Auic. dicebat, cum hoc apostema est in loco neruoso, spisso, aut ligamento, aut corda, permiscatur succus mirthi cum medicinis incidentibus cum lenificatione. Dicit Gal. in antiqua translatione (nam in noua est sententia de scirrho) si verò talis tumor antiquus, & inueteratus scitrosus fecerit, & si penitus sine sensu fuerit, hunc talem moneo relinquo, ne incallum labores, quia insanabilis est. Si verò sentit, vel permodicum, & non penitus est insensibilis, propè lanabilis est: tamen non satis facili ad sanitatem: Vnde si videbitur scirrotizari, R. mucilaginis al. sem. lini, seu græci, pinguedinis gallinæ an feris, medullæ crurum vaccæ, ireos, storum chamæmillæ an. s. ij. sthoracis liquidæ, olei chamæmillini, pulueris mirrhæ, rthuris an. s. j. ceræ q. s. pro cerato. Aut R. assungie porcine, pinguedinis gallinæ an scris, anatis an. s. iij. farinæ fen. græci, sem. lini, an. s. j. bdelij, opoponacis, thuris, an. s. s. dissoluantur
- 30 gumma in aceto, & cum cera fiat vnguentum. Si autem cum tali tumore dolor adfuerit, hoc erit, aut quia ad suppurationem tendit, quod raro contingit: Vnde medici de chyrurgia nullam fecere mentionem, cum dicatur, circa generationem saniei dolores, & febres magis accidunt &c. Quod si sic erit, (quod cognoscitur ex loci rubedine, pulsatione) &c. retineatur calor cum medicina vilcosa, attractiua, & calida: vnde R. malux, branchæ vrsinæ, radicum altheæ, liliorum an. m. j. cepas alb. sub prunis decoctas numero ij. fermenti s. ij. farinæ sem. lini, fen. græci an. s. ij. limacis coctas num. vi. assungie porcine s. iij. milce, & bulliant in decoctione caulium, & pistentur: & adde croci 3. i. Digesta materia, non expectes, vt ex se rumpatur, quia, tardè. Nec ferro incidas, si possibile fuerit, sed porenia li caustico aperiat. Cum enim a ferro inciditur, vulnus facillimè ad fistulam deducitur ob loci malam, frigidamque qualitatem. Cumque facta fuerit loci perforatio, euacuetur materia, & locus tali medicamine mundificetur. R. fucci apij, præsij, absynthij an. s. i. mellis ros. s. ij. theribenting claræ s. ij. bulliant omnia simul, vsque ad succi consumptionem, & adde farinæ hordei s. ij. vnguenti ægyptiaci s. i. misce, & fiat vnguentum. Incarnetur postea cum vnguento basiliconæ, aut citrino, aut aurca, aut R. re rebethine claræ, olei masticini an. s. ij. sepi hircini, calstrati, vaccini an. s. s. centaureæ, consolide maio. & min. mille folij, comarò roris marini, lingue passariæ an. m. i. pistentur omnia, & extrahatur succus: & ad datur mirrhæ, farocollæ, thuris, aloes an. s. s. masticis 3. ij. resine pini 3. ij. bulliant omnia simul lento igne, vsque ad consumationem succi: deinde coletur, & cum cera alba fiat vnguentum secundum artem.
- Aliquando verò dolor accidit propter materiam calidam admixtam, & tunc propter talem distensionem dolor contingit. Et Princeps dicit, Oportet, vt sedetur dolor cum hypospo humida, & sapa cum oleoros. auctore Gal. aut inungatur cum vnguento rosato Mesue. Et si peccauerit sanguis (quod cognoscitur ex signis phlegmonis) R. foliorum malux, violarum an. m. i. radicum lingue bouis, altheæ an. s. iij. seminis cytioniorum s. i. hordei mundi m. ij. bulliant omnia simul in sufficienti aquæ quantitate, vsque ad hordei creperuram: deinde pistentur, & cribelentur, & adde olei rosati, mirrhini, violati an. s. ij. pinguedinis gallinæ, vnguenti ros. Mes. an. s. i. sepi virulini, pinguedinis cerui, ceræ albæ an. s. ij. bulliant iterum ad ignem leui ebullitione, & fiat vnguentum, aut cum farina hordei, & sem. lini fiat emplastrum. Raro equidem dolores ab his causis contingere solent, sed vltimum ad ventositatem, sicut docet Gal. dicens; Crasis verò, humidis, & viscosis humoribus dominantibus, nimia resolutio, & exsiccatio contrariissima existit, & multum eorum vsum custodire oportet in talibus dispositionibus, non tamen dolor aliquis sequitur vehemens hos tales humores solos existentes, sed aliquando complicatur aliquod accedens vaporosum; & vltimum ventositas, quæ non est potens propter
- 60 obstruccionem exire, vehementissimè omnino, quæ ita laborant, corpora dolent. Crassa enim, & viscosa materia ventosum spiritum apta nata est generare. Et talis ventositas aliud non est, quàm improprius humor attenuatus, & sub vaporis formam deductus. Et cum talis appareat dolor, locum embroca cum oleo anetino, chamemillino, de absynthio, & ruta. Aut fac cum his oleis emplastrum, & farina fabarum, absynthio secco, ruta, & parum cimini. Valet locum petijs calidis fricare; & steruus vacuum cum floribus chamemillæ, cimini, & oleo rosato ei superponere. Interdum cucurbitule non scarificata laudantur. Aut R. cimini, calamethi, rutæ an. m. s. sulphuris s. s. puluerizentur omnia, & cum melle fiat emplastrum. Et hæc sine dicta de rumore pituitoso a causa intranea. Si verò hæc passio aliam egritudinem sequitur, vt hydropem, aut pythim, dicit Auic. cura est remotio causæ, idest primæ egritudinis, quanti sententiam potulerunt Serapion, Rafis, Auic. & Gal.

## De nodis. Cap. III.



**N**odus pituitosus est tumor ex non naturali pituita, quæ aut à frigidityte condensante, aut à caliditate resoluente in atre bilis naturam conuersa est. Vnde est tumor sensibilis, albus, durus, absque caliditate, cuius materia proprio continetur chisti, & à subiecto, in quo est, vndeque separatur. Et dicitur nodus, quia vplurimum propè nodos oriri contingit.

Differunt inter se hæc nomina Auic. auctoritate, apostema, dubellet, & exitura: quoniam apostema est nomen determinatum super omnem tumorem diuersum in quanto, & quali; aut à materia calida, aut frigida siue aggreget, vel non aggreget. Dubellet est nomen absolutum super omnem tumorem, in quo materia fuerit coniuncta, & tactus est finis, aut concauitas ab intra, & talis materia aut fuerit putrescibilis, aut non, cuiuscunque speciei. Exitura vero declarat illum tumorem, in quo qualiscunque materia fuerit coniuncta, erit aut putrida, aut cocta, & quærit exitum. Nam dicebat Auic. Cum aggregatur materia, vocatur exitura. Et Gal. ait; Sic autem nominamus abscessus eas dispositiones, in quibus inimice distant, quæ prius se contingebant, corpora. Et sic apostema dici potest de omni tumore in principio, & aug. dubellet in statu, & exitura in declinatione. Nec reprehendendi sunt hi, qui dicunt exituram dici solum de calido apostemate, cum & humores frigidi, dum putridi sunt, aut digesti, petant exitum. Nam omne, quod putrescit, sit calidæ complexionis, vt declarat Gal.

Sepe in nostris corporibus, in extrinsecis locis, pituitosæ aliquæ superfuitates originaliter ex non naturali pituita coniunguntur, & ibi tumorem causant, qui nodus appellari solet. Dicebat Auic. Nodi sunt dubellet phlegmaticæ, comprehendentes humores phlegmaticos, aut generatos à phlegmate. Et hoc dixit propter duritiem, quæ ad tactum in ipsis sentitur. Nam durities, & maxime chronica, fit à melancholicis humoribus, vnde nodi duris tumoribus assimilantur. Nec admirabile esset, si materia talis esset melancholica; nam, vt dicunt Gal. & Princeps. Non est longinquum, quin necessarium faciat eius obuiatio esse melancholia. Verum nos posuimus eam phlegmaticam; quoniam radix illius duri est phlegma, cui accidit, vt descendant grosse partes ipsius phlegmatis: vnde redditur sicut caro, aut sicut pelvis, aut sicut mel, aut aliud, quod omnino est præternaturale. Dicit Paulus, quod hæc materia sortitur nomen à similitudine rerum, quæ in tumoribus continentur; alij quidem ipsorum, veluti pingue quoddam, fædæ adepis, subest, alij mellis simile quippiam, alij quasi tenuis pulicula. Et Cellus ait; Sunt aliqui tumores, qui in qualibet parte nostri corporis possunt eucnire, generati à materia phlegmatica, non naturali, contenta in sua tunica: qui propter maiorem, & minorem adulationem rebus diuersis assimilantur, & ex paruunculo incipiunt, & diu paulatim crescunt. Et Gal. dicit, quod sunt aliqui tumores, qui omnino sunt præter naturam, qui dum diuiduntur, sanè inueniuntur in huiusce modi abscessibus proprietates quædam non pauca, nec humorum modò, sed etiam solidorum quorundam corporum, siquidem vnguum, pilorum, ossum, testarum, lapidum, & pori fragmentorum similia, ac humorum ipsorum, alius veluti lutum, vel cenum, vel olei quidam limus, vel vini fæx; alius adeò grauior olens, vt omnes aduerterentur; verum hæc rarò incidunt. De hac re multa scriptur Acrius. Talis enim pituita omnino est non naturalis, & deuiat à naturali infra terminos sue latitudinis, quos dum transit, non est amplius pituita, sed aliam acquirere substantiam. Transiit autem latitudinem propriam multipliciter, aliquando in propria substantia, dum aquosatur, ventosatur, vel aliquo alio modo attenuatur: aut ingrossatur, & inuisatur, & fit tunc phlegma grossum, aut mucilaginosum, aut gipsum per vltiorem indurationem, aut à frigidityte nimia condensante, aut à caliditate naturali, vel præternaturali resoluente. A tali materia producantur tumores, qui sortiuntur nomina diuersa secundum diuersitatem rei contentæ, auctore Gal. ea sunt Atheromata, Steatomata, & Meliceris. Cellus vero signa proponens dicebat; Atheromati subest quasi tenuis pulicula; Meliceridi liquidior humor, quale mel, ideoque pressum circumfusi; Steathumati, vel adipina, pingue quoddam, quale adepis, aut caro &c. In aliquibus, quale gipsum, vt in podagra, & chylagra, interdum quasi grana panis decocti, vt in natibus, & fauosis tumores.

Talia apostemata sunt dura, & edemati ea comparando; mollia verò, per comparisonem ad scirrhum. Et aliquando sunt de genere melancholicarum. Nec reprehendus est Auic. si inter attrabiliosos tumores nodos enumerauerit, quando dicit; Et illorum quidem apostematum, quæ ex materia sunt melancholica, tria sunt genera, durities, & cancer (quorum plurima sunt acuta) & glandularum genus, ex quibus sunt scrophulæ, & noti. Nam Gal. dicit; Crudi verò, & humidi humores, cum non rectè pertranscuntur, per spatium temporis exsiccantur, & sunt melancholici, & apostemata ex eis orta sunt melancholica. Proprium istorum est, quod proprio continentur chisti, & separantur ab omni parte à mæbro, in quo sunt, nec fixi, aut inbibiti sunt in mæbro, sicut cancer, aut scirrhus, vt optime declarat Auic. Et Rasis dicebat; Isti nodi sunt plurimorum modorum, quibus omnibus cõmunicat, quod separantur à carne corporis, & mouentur cum mouente eos, sicut res in chisti, & tolerant, vt super eos fiat compressio.

Vclica

3. l. 4. cap. 10.

1. d. 1. cap. 5.  
2. ad Glan. cap.  
de uisc. cõstom.4. sim. 5. & 4. me  
thod. 1. & d.  
uiscum 1. & d.  
de febr. venæ c. 3.

3. l. 4. tra. 1. ca. 4.

14. metho. ca. 5.  
in cap. proprio.

Lib. 4. cap. 34.

Lib. 7. cap. 6.

14. metho. cap.  
15. & 17.Lib. 15. cap. 7.  
& 1.

6. l. 1. cap. 5.

14. metho. d.

1. d. 1. cap. 5.  
Dand. 130.

- 10 Vesica verò, aut chistis, membranae, aut panniculus, aut sacculus, vel faliculus, vel tunica, vel vela men, aut callus, aut quocunque modo dicas, talem continens materiam, sic generatur: quia nodorum materia est frigida, & crassa cum viscositate, quae cum sit talis, est apta vniiri, non autem spargi, sicut in ordinare: & de quocunque magis est frigida, tanto magis inspissatur, & vniitur. Agens postea in eam innatus calor, partem exificat extrinsecam, & ipsam magis vniat reddit cum quadam soliditate propter viscositatem, & panniculi naturam acquirunt cum aliqua tenacitate. Materia verò melancholica, quia frigida est, & sicca, cum non habeat viscositatem, ex ea chistis non generatur; ideo scirrhus panniculo non continetur, nec oedema; quia fibrilis est eius causa; forsitan quod naturam sic ordinavit, ut talis passio faciliori ingenio curari possit, quam si ad diuersa loca esset expansa. Dicitur Aulic. quod aliquando accidit, vt nodi neruuli, & assimilantur nodo, & non est de nodis. Et dicitur à nodis per hoc, quod
- 20 non separatur ex omni parte, sicut nodus. Hoc autem contingit, quando duo neruorum extrema ad medium contrahuntur, & pars media eleuatur. Et ideo, vt ibi dicit Aulic. & Rafis, cum compressione, & ligatura partes ad primum esse reducuntur. Et rursum Aulic. Glandulae quidem, & his similia à neruorum districunt nodositate, eo quia nodositas magis fit in suo loco mansura, & eius tactus sentitur nodulosus. Dicit Cornelius; Quaedam ex his dura, ac renitentia: quaedam mollia, cedentiaque sunt; quid intus habeant, vt coniectura praeflagari potest, sic ex toto cognosci, nisi cum uestia sunt, non potest, quia propria non habent accidentia. Haec ferè sine dolore sunt, dicit Celsus. Similiter Gal. Eodem modo sunt (inquit) hi tumores, sicut in renibus lapides, adusto in eis humore crasso, & viscoso. Generantur in locis siccis, dicit Paulus, vt in iuncturis, & concarenationibus, quae ex pituita nutriuntur. Sunt semper per viam paulatinae congectionis, & raro ad exituram deueniunt, nisi qui melius dici
- 30 tur, in quo satis benigna subest materia, & maxime cum secum calidus commiscetur succus, non naturali agente calore.

7. id. alim.  
2. d. 1. d. 1. c. 7

Lib. 7. cap. 4.

14 methodi 4  
Et 7. de comp.  
med. 2. de reles  
naribus.

- De genere horum tumorum enumerantur, specificando, & ea apostematata, quae Natæ, vel Naptæ dicuntur; quae vtpurimum in capite, & alibi oriuntur, & est tumor rotundus, albus, valde eleuatus, dolore carens, nisi forte adeo magnus exiit, vt partes membri trahendo, aliquem dolorem inferat: et ad alteromata spectat. Pari modo & botium, seu, vt dicit Albucasis, hernia gutturis, aut bronchocele, quod in gula nascitur, & scrophulae, & gangilia, & talia apostematata, quae tamen in propriis suis simplicioribus matibus à nodis differre videntur, vt locis proprijs dicam. Nodus ergo tripliciter sumi potest, communiter, proprie, & magis proprie. Communiter enim omnes tumores frigidi ex crassa pituita nodi dici possunt. Proprie autem omne apostema ex phlegmate grosso quodam chisti continetur. Magis
- 40 proprie, tumor pituitosus cum praedictis conditionibus, & signis.

De cura nodi. Cap. IIII,



50

Ab e passio est de macronoxijs; longo enim tempore oriuntur, & breuiter curantur, cum curari possunt. Raro etiam, nisi per chyrurgiam, curantur. Nec medicus in his multum materiam resoluendo, vel emolliendo, aut ad saniam reducendo, defatigari debet; quia non curantur, nisi cum proprio panniculo extrahantur, et si dictum est ab Aulic. quod nodositates triplici medio curantur, aut dissolutione, aut putrefactione, aut incisione: non propter hoc restat, quod etsi partes aliquae interdum diaforentur, quin sit opus ad manuum operam etiam deuenire; quia non datur cura, nisi per extractionem chistis. Vnde dicebat Gal. quod in tentio curæ istorum tumorum est contentarum rerum extractio, vel earum putrefactio, aut tumoris to talis abscissio. Quidam tumores, vt meliceris, in quibus materia ad mellis modum continetur, aut ad milij cocti formam, vt in naribus, interdum per putrefactionem contenti succi, & extractionem curantur: quod fit, quando materia obediens est: tamen longo tempore operantur, quod membris infirmis est molestum, & cruciatum affert; vtpurimum verò sectione, & chistis extractione. Adipinum verò, in quo materia stat ad modum adipis, aut carnis, aut alterius rei similis: & steatomata, in quo materia est omnis praeter naturam, sola manu opera curatur, cum nec putrefacti possit, nec digeri medicamento.

7. coll. cap. 31.

14 metho. cap.  
12. & 13.

- Habent nonnulli horum tumorum, qui sola chyrurgia curantur, actiones proprias, aliqui verò communes; sed qui omnino sunt praeter naturam, oblationem indicant, veluti in steatomatibus, & atheromatibus; ac huius certè generis est, & qui myrmecia Græce vocatur, & qui acorchoron, ac in vesica calculus, & hypochyma &c. Non enim in his putrefactio, nec resolutio expectanda est; quia in ipsis non est dispositio ad putredinem, nec ad resolutionem; Nam quodlibet non agit in quolibet, sed determinatur in determinatum, cum determinatis conditionibus. Haec omnia finaliter, dicebant Gal. & Rafis, extrahere, aut abscindere oportet. Praemissa igitur vniuersali euacuatione secundum indigentiam, ne in corpore pleno, aut ratione doloris, aut propter membri nobilitatem, materia diuersa ad sectum locum concurrere possint, aut cum phlebot. quæ summè conuenit, conditionibus consentientibus, aut pharmaco humores frigidos, grossos, & viscosos purgant, ne transcant in causam coniunctam, vt cum benedicta, hyera, hamoch, elleci, de dactylis &c. aut cum pillulis de ag. de hermodactylis

14. methodi.  
Duo. cap. 13.

lis

Lib. 7. cap. 6. **lib** maioribus, ad tumoris sectionem deuenire oportet; et scindatur cutis ab eis cum facilitate; deinde  
 Lib. 4. cap. 34. **tur** de excoriorum ita, vt egredietur cum chisti sua. Dicit Celsus; Omnia derafa ante, si capillis contegmur,  
 14. meth. 13. **tur** per medium incidere oportet, & chistum extrahere. Et Paulus dicebat; Confluit igitur curatio  
 nis est commune, vt quod tunica illa contineat, discutiatur, aut medicamentis totum exardatur, aut  
 sectione auferatur. Dicebat Gal. quod ad talem perficiendam operationem diuersi requiruntur confi  
 derationes, tum ex temporis curandi breuitate, tum ex curando circa dolorem, tum ex maxime tutē cu  
 rando. Rursus, vt turo cures, tria propria sunt, quibus intentus sis, oportet: vnum, primumque, vt  
 omnino absolutionem operis consequaris; alterum, vt scibi hunc non consequaris, saltem egroran  
 tem non laedas; tertium, vt vitium non facile reuertatur. His considerationibus si optimam curationis  
 7. 4. cap. de tu  
 14. modo. **viam** iudicaueris, inuenientur in omnibus, quae nunc proposuimus, quando potius chyrurgiae, & quan  
 do potius medicamentorum tpe fit curandum. Omnes has intentiones etiam ostendit Auic. Breuita  
 tem quidem temporis, quando dicit; Nodorum, qui sunt glandosi, idest non valde condensato  
 phlegmate, cura est incisio, aut perforatio, & non aliud, idest non restat breuior, aut tutior hac via.  
 Operationem indolorosam autem, quando dicit; Ex cum extenderis tibi cutem bene, tunc seca eam  
 cum facilitate. Certitudinem verò curae, quando dicit; Cum incaperis excoriare, oportet, vt egredia  
 tur chistis sana cum eo, quod est in ventre eius; illud enim est magis certum, quod esse potest. Osten  
 dit deinde, quomodo finem desideratum assequi possimus, dicens; Si in incisione, & excoriatione rema  
 net aliquid de chisti, non incarnes ipsum, donec scias, quod non remanet aliquid de ipso; & si possi  
 bile est extrahere totam chistum cum sua materia, hoc est melius. Tradit etiam, quomodo laborantem  
 nocere non debemus, quando dicit; Ex quando currit ab eo res plurima, tunc oportet, vt custodiatur  
 30. **patiens** cum conseruantibus naturam suam, & conseruetur apud somnum; fortasse enim adueniet ei fin  
 chopis. Manifestat in fine, quo nam modo agritudo non reuertatur, quando dicit; Ex cum perfora  
 tur, oportet, vt auferatur chistis, quae est ei cum complemento sui; & si non cum alio, saltem cum vn  
 cinis; quoniam cum dimittitur, & si minimum sit, redit facilius. Et quia dicebat Gal. quod si opus  
 perici nequeat, labor dimittendus est, ne medicus subeat notam mali viri; Ideo Auic. dicebat; Si no  
 dus fuerit in manu, aut pede, aut in loco coniuncto cū neruis, & cordis, non praesumas extrahere ipsum,  
 quoniam faciet cadere patientem in spasum.

Ingenium operandi in istis passionibus clarē habetur apud Auic. Auer. Celsum, Antillum, & Rasim,  
 dicentes; Extende cutem, quae est super nodum, cum manu sinistra, aut eam extendant ministri, & in  
 eide longitudinaliter cutem totam cum ferro incidente vsque ad chistum & caue, ne eam incidas: quia  
 tunc prohibetur excoriatio. Cum enim inuenieris chistum, quae (vt dicit Celsus) ostendit fse albam, &  
 40. **duram**, excorcia eam à loco eam continente cum gamedin. idest instrumento non multum incidente,  
 extendendo cutem ex omni latere; & excoriando procedas, donec chistum totam cum suo contento  
 extraxeris. In adipino verò, & mellino sis sollicitus, ne chistis rumpatur, quia nodus est satis tenuis,  
 & ideo enumeratur inter exituras. Et ingenia, dicit Auic. vt egredietur cum suo chisti; quia si rumptu  
 50. **ritur**, eius egressio erit difficilis. Hunc operandi modum accepit Princeps ab Albucasi de verbo ad ver  
 bum, vt patet: & ideo credo, quod Antillus, qui saepe à Principe citatur, sit Albucasi. Dicit etiam  
 Auic. Si accidit, vt rumpatur chistis: tunc quare, vt conseruetur, quod remanet intra, cum ligamento,  
 sutura, aut alio ingenio, donec extraxeris totam chistum. Deinde si sanguinis haemorrhagia non appa  
 50. **ruerit**, cautatem vino mellito, aut mellicrato ablues; inde facta loci mundificatione, cum incarnabis.  
 Ex si contingit, vt partes adinuicem sint multum distantes, possunt vniri aut sutura, aut ligamento simul  
 labia aggregante, aut plumaceolis, humiditates contentas in fundo sinus expellendo. Multotiens  
 haec operationes non perficiuntur ob timorem aliqualem, aut ne fecerit res timorosa; aut quia timidus  
 patiens sectionem non admittit; aut eius complexio debilis eam celebrare non permittit; aut tumor est  
 adeo magnus, quod timorem infert: Tunc, dicebant Auic. Anillus, Rasim, & omnes moderni, cus  
 tim, & chistum incide, aut perfora; & eam humoris quantitatē, quam poteris, extrahere, & sic in dies,  
 aliquid euacues; Deinde quod remanet, acuto medicamine remoueabis; aut cum oleo, & butiro cali  
 do fac eam putrefcere; nam chistis putrefcit, & egredietur per se. Dicebat Cornelius; Vbi vel tota tu  
 nica, vel aliquid ex ea relictum est, pus mouentia adhibenda sunt. Et si aliquid ex chisti remanserit,  
 extrahatur, saltem cum vcinis, cuius formam describit Albucasi, & est plurium modorum, scilicet  
 60. **vinus**, & plurium curaturarum, vt habebitur proprio libro.

Et si incisio, aut excoriatio propter aliquam causam opportuna non fuerit, cutis potenciali caustico  
 aperiri potest; & medicus tunc assumat ingenium curae à qualitate, & quantitate morbi; deinde à loco,  
 natura, & compositione patientis membri, cum multa sint loca, ique operam expunt. Sunt igitur  
 caustica duorum modorum, scilicet debilia, & potentia; nam in mellino tumore (cum eius materia fa  
 7. 4. cap. 31. **piat** sanici naturam) debili medicamento rumpi potest, de quibus sermone habuit Auic. vt radices  
 narcissi, aut canne recentes cum melle, & oleo irino. Aut R. ammoniaci 3. vj. gluxinis albotim, sul  
 phuris cirrini, nitti añ. 3. iij. cerē 3. iij. fiat emplastrum. Aut ex medulla granorum corti, nucē ranci  
 dae, fermento, caulibus, & capis decoctis, & sinapis, & simo columbino fiat emplastrum cum melle  
 anacardo. Aut R. salis alchali, calcis non extinctae, añ. quantumlibet submergantur in aqua, & dissol  
 liant,

80 **Haec**, postea colitur; & iterum bulliat haec aqua in caldaria de are, donec aqua co. geletur in salem. R. istius salis 3. iij. salis am. 3. j. mellis anacardi q.s. pro vnguento: Dicit Paulus; Parte timentis prius nutrita, haec imponitur. Vnde Auic. dicebat; De bona autem curatione mellini fauosi est, vt incipiat, & euaporetur cum aliquo calido. Sed in asterothemate, & similibus tumoribus, in quibus & materia, & cutis crassa, & dura est, fortiori medicamine vti oportet. De quibus multae sunt descriptiones apud Paulum, & Principem.

Lib. 4. cap. 34.

Ve R. Tartari nigri adusti, an. 3. ij. Aut R. ellebori, an. 3. ij. Aut R. calcis viuae non lotae 3. ij. nitri, 3. j. arsenici rubei, corticum aris. 3. 4. calcitidis, aut pigmenti, calcis, 3. j. olei rosati. q.s. pro vng. aut pigmenti, an. 3. i. misce. terrae sigillatae. 3. i. s.

80 bulliant omnia in aqua cineris, vsq; ad spissitudinē, & serua in vase plūbeo

Aut R. sem. vrticæ. 3. j. corticis gris. an. 3. s. arsenici olei rosati parum, misce.

Moderni verò aliam viam reperiunt, apud quos multa medicamenta sunt descripta, & valent. R. capi relli, idest primi lixiuij saponis, quod magistra appellatur, lib. j. vitrioli Romani 3. j. sal. am. 3. ij. aluminis rochæ 3. j. s. bulliant omnia simul in caciola aenea, vsque ad spissitudinem lapidis. Aut fortius. R. capitelli lib. j. calcis non laboratae, colcochar, arsenici an. 3. j. bulliant, vt supra. Aliud nobilissimę operationis. R. capitelli fortissimi quantum vis, bulliat in caciola vsque ad spissitudinem, absque villa humiditate, & R. illius lapidis lib. j. salis am. arsenici sublimati an. 3. j. opij. 3. ij. misce, & tritura omnia simul, & serua in vase vitreo in loco siccō. Aliud mirabilissimę operationis, R. aceri albi 3. xx. calcis viuae, cineris vitæ, calcitidis, aluminis plumæ an. 3. j. bulliant omnia, vsque ad consumptionem medietatis aceti, & permittit clarificari. R. de parte clara 3. viij. salis am. salis gemmæ, salis alchali, mellis anacardi an. 3. j. opij 3. ij. bulliant omnia lento igne, donec fiat lapis. Aliud Rafis, R. arsenici citrini tri ti, chali, calcis, zinari an. 3. vj. argenti viui 3. xij. salis am. 3. iij. terantur omnia in aqua, quæ dicitur pri ma, donec mercurium extingatur; exsiccentur postea, & terantur, & ponantur in boccia, ignem sub ea faciendo, donec eleuentur, & sublimentur; & quod ex hac medicina sublimatum est, sumatur in vi trea ampulla, & seruetur. Aliud, quo utebatur Parer meus, qui in hac arte fuit magnus experimenta tor, & est mirabile causticum, R. salis nitri, vitrioli Rom. an. 3. x. & pone in elabico, & primam, ac secundam aquam extrahe; primam abijcies, & secundam serua, in qua dissolvas arsenici albi 3. ij. tartari albi adusti (cuius alie adustio cognoscitur, cū sit niger, deinde albus) argenti sublimati an. 3. j. ponantur om nia in caciola aenea nitida ad lenem ignem, vsque ad totalem exsiccationem, & vtte; aut solo, aut cum pauco saponis nigro fiat vnguentum. Ex nota, quod ab his medicinis eschara causetur, quæ aut peruenit vsque ad chustim, vel non; si peruenit vsque ad chustim, reliquum cum facilitate excoriarı po test; nam redditur locus fere insensibilis: remoueat igitur eschara cum butiro recenti, aut allungia porcina non salita, aut alio ingenio: denique si opus fuerit, reliquum socetur, & operator sit cautus à sanguinis fluxu, qui multoties contingit. Et si ibi fuerint venæ, aut arterie magnæ, eas adligare opor tet. Sciat etiam operator, quod caustica & dolores, & intemperiem adducunt; vnde non est ab re, lo cum custodire cum defensiuo, & cum olei rosati embrocatione confortare. Quod etiam præcipit Pau lus in fine capitis, quando dicit; Quæ ambiunt partes orbiculatam, omnes prius delineto cerulla cum rosaceo. Extrahatur materia; & si pellicula cum aliquali fordicie in fundo cauitatis remanserint, ab stergantur cum vino mellite, & vnguento egyptiaco. Multoties verò, aut quia hic requirit morbi es sencia, aut propter fluxum sanguinis, aut ad dolores sedandos, aut ad loci rectificationem, aut ad pro hibendum reditum egrotudinis, aut ad eradicationem morbi, & loci mundificationem, & ad multa alia accidentia cuianda, caustico actuali, & ferro ignito vti opus est. Præterea notandum est, quod ali qui horum tumorum in radice sua adeo tenuis sunt, & vadeuncque à membro separati, quod tantum ligatura cum serico remoueri possunt, aut abscindi in eorum radice, vt præcipit Auicenna, quando dicit; Et si magnificatur super ipsum plurimum propter compressionem nodi, tunc abscinde radicem eius totam, deinde cura. Generantur aliquando nodi, dicit Auic. & Rafis, in vola manus, & super fron tem, aut inter socilem, & refertur ad auellaneæ quantitatē, aut parum plus, & est sicut glans. Ex dicunt isti, quod si in principio comprimantur, separantur. Sed cum magnificatur, eorum cura est cura nodorum. Igitur cum appareat, debent comprimi; deinde super ipsos, stringatur plumbum, aut aurum grauis stridetur, quoniam digerit ipsos, & preparat ad resolutionem, quæ trullum pergamentæ, vt docet Rafis, cum aloë, bitio, mirra, acaria, & glutine piscis. Hæc sunt, quando palsio est in loco neruorum, arteriarum, vinarum, aut membrorum timoroforum, & nobilium.

7. ad Alu. cap. 15.

Cap. de glandu lis, in distillatione

## De strumis. Cap. V.



**SCROFULA**, aut struma, dicebat Gal. est glandula in scirrhosum affectum mutata. Et rursus alibi dicit; quod est glandula tumefacta, dura, à phlegmate grosso, viscoso, apto chylum generare. Ideo vtplurimum proprio chylis continetur. Et Paulus dicit; Strumæ glandulæ sunt induratae, quæ in ceruice, alis, & in inguinibus maximè nascuntur. Et Hipp. dicebat; Struma est tumor, sub quo concreta quedam ex sanie, & sanguine crasso, quasi glandulæ nascuntur, maximè verò in collo, sub alis, & in inguinibus: sic dicit & Celsus. Struma differt à nodo, quia non mouetur secundum omnem differentiam positionis, sicut nodus, & magis adheret carni. Nam, dicebat Auic. scrofulæ assimilantur nodis, sed differunt ab eis in hoc, quod non sunt separatae, sicut nodi, sed sunt suspensæ in carne. Et ad vltimum scrofulæ sunt glandulæ scirrhosæ. Nonnullæ sunt priuatae dolore, & aliquibus associatur dolor; & sunt difficilis curationis, & maximè quæ materia est diuersa. Raro struma tantum reperitur, sed plures numero, & dicitur scrofula; quia in scrosis sic tumefactæ glandulæ inueniuntur, vel quia multæ istarum glandularum ab una oriuntur, sicut ab vna scrofula multæ producantur. Hæc passio à Græcis dicitur choeradas, auctore Paulo, ut etiam recitat Aetius, à choeradibus petris, pet marinas aquas transparentibus; à Latinis verò struma.

Dicit Gal. tibi, arboris, non excidit, vtpote sepe à nobis monstratum, superuacanea, quæ à valentioribus partibus ob redundantiam, vel qualitatem expelluntur, ea in imbecilliores percumbere, atque hinc accidere, ut glandulæ, quas adenas vocant, facile fluxiones recipiant, & maximè quæ rariores natura sunt, quippe valentius et arthriticarum, & venarum, & neruorum, & muscularum robur; imbecillior verò adenosorum corporum. & si adenas, quæ eleuantur, scirrhosæ, & duræ fiant, & maximè circa collum, secus aures, & in inguinibus, & sub scellis, & egrè sanabiles, strumæ dicuntur. Rarus dicit; Scrofulæ sunt in collo secundum plurimum, & quandoque sunt in inguinibus, & in omnibus locis, in quibus sunt glandes; & eorum signa sunt apostema durum, rotundum, albi coloris, quod mouetur cum mouetur ipsum, & quandoque sunt tres, aut quatuor similes nuci in suo chylis. Et rursus; Scrofulæ in collo sapienter nasci conseruere, quæ plerumque simul existunt, & aliquando sparguntur, vnde cum in hac habitudine locum videris apostematosum, quem tangendo durum inuenies, scias scrofulas esse. Celsus quoque dicit; Struma est tumor, in quo subter concreta quedam ex pure, & sanguine, quasi glandulæ, oriuntur; quæ, vel præcipue facit medicos solent, quoniam & febres mouent, nec vnquam facile maturescunt, & siue ferro, siue medicamento curentur, plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoque post medicamento est opus; quibus id quoque accedit, quod longo spatio detinent. Nascuntur maximè in ceruice, sed etiam in alis, & in inguinibus, & in lateribus pululant. Aliæ dicit, quod assimilantur nodis, & verè assimilantur nodis quod ad materiam causam; quia ex phlegmate grosso solent hæc passiones generari, quod etiam ad formalem, quia in rotunditate, duritie, & colore. sed differunt ratione loci, quia strumæ sunt adenas induratae, & tumefactæ; nec apparent, nisi vbi sunt glandes aptæ tumescere, aut vbi sunt molles carnes; vnde & in mammis reperit strumæ, ut Meges Sidoneus recitat. nodi verò habent totum subiectum commune. Differunt præterea, quia nodi sunt vbique separati; strumæ verò sunt magis annexæ, & carni infixæ. Communicant tamen in hoc, quod omnes isti tumores tunica inuoluuntur, quæ in strumis nervosæ est. Datur & aliud accidens scrofulæ proprium, quo omnino à nodis differunt, quia ex vna scrofula plures solent generari, idest vna apparet, & alia consequuntur, quod in nodis non contingit, & ideo dicebat Auic. quod assimilantur thecæ, idest scrosis. Vnde est autem, quod non vna tantum glandulæ, sed plures intrumescunt. Dico; quod in locis adenosus diuersi reperiuntur adenes, quæ naturaliter sunt paratæ ad rheum suscipiendum; vnde cum ad eas regiones humores diuersi concurrunt, replentur hæc loca; & si materia fuerit multa, diuersi oriuntur tumores. Non enim impetuosa, aut violenta sit hæc materiarum transmissio, ut sit in moribus ceticis, cum hæc passio sit in numero chronicarum, quia eius causa crassa est, & viscosa; vnde per partem post partem fit eius expulsio, & ideo successiue intumescunt adenes, & sic apparet, quod ab vna diuersæ producantur. Ordinatur interdum hæc adenes vna post aliam, & est tanquam cingulus pendens ex collo. Multoties vna permanent, ad modum vuz racemi. Albucasis dicit, quod species harum scrofularum sunt multæ; ex eis enim sunt lapideæ, & ex eis sunt, quæ continent humiditatem; & ex eis sunt malignæ, quæ curationi non obediunt. Corpora ad tales dispositiones parata, dicebat Rasis, sunt corpora pucrorum, & mulierum, quia humida, & gulosæ. Et Hipp. enumerando puerorum ægritudines, ante pubertatis ætatem strumas adducit. Gal. reddens rationem, dicit. In ipsis enim multæ, crassæ, & viscosæ superfluitates generantur. Et Rasis dicebat; Scrofulæ ex digestionis malitia, atque ex fistidito accidunt. Gal. dicit, quod in pueris multum de crudo humore gignitur propter eorum facietatem, & voracitatem; & eorum ventriculi operatio non potest duobus officiis simul iussicere, augendo scilicet, & perfecte alendo. Et Auic. dicebat; Homines vehementius dispositi ad habendas scrofulas in partibus colli, & capitis, sunt curta habentes colla, humidarum complexio-

14. methodi.  
3. aphor. c. 6. 1. 6.  
Lib. 4. cap. 13. 1. 1.  
1. 4. cap. 13. 1. 1.

1. 4. cap. 13. 1. 1.

1. 4. cap. 13. 1. 1.  
Lib. 1. cap. 13. 1. 1.

1. 4. cap. 13. 1. 1.  
Lib. 1. cap. 13. 1. 1.  
1. 4. cap. 13. 1. 1.

Lib. 1. cap. 13. 1. 1.

1. 4. cap. 13. 1. 1.

Lib. 1. cap. 13. 1. 1.  
Struma.

Lib. 1. cap. 13. 1. 1.  
1. 4. cap. 13. 1. 1.

per aphor. 16.  
In commentis.  
ad Al. cap. 13.  
1. 4. cap. 13. 1. 1.



10 plexionum. Salubres scrofulæ sunt, quæ accidunt infantibus; & grauiore earum sunt, quæ accidunt iuuenibus. Ratio est, in pueris humores sunt resolutibiles; quia pori sunt magis aperti, permuanturque eorum habitudines. Strumæ, in quibus dolor reperitur, sunt difficilis curationis; imò Gal. dicit, Omnis struma est difficilis curationis. Dolent strumæ aut propter loci sensationem, aut propter calidiorum humorum admixtionem; unde in eorum cura ad putrefactionem, aut sectionem peruenire oportet, ideo sunt difficilis, idest laboriosæ curationis.

33. methodi.

De strumarum curatione. Cap. VI.

20 **A** VERRORS de scrofulis agens, duplicem eius causam materiale assignat: Vnde in cura diuersæ oriuntur operationes, & dicit; Scrofulæ sunt apostemata dura in carne molli generata; & quæ ex eis sunt ex phlegmate subtili, curari debent cum medicinis resolutiuis, & mollificatiuis: & quæ sunt ex phlegmate grosso, cum medicinis purgatiuis, aperitiuis, causticis, & cum ferro incidenti. Cur autem talis materia non possit resolui, in causa est tum inuolucrum, in quo continetur, tum venarum magnarum absentia, necnon substantia propria, quæ minime est musculo-  
30 fa, sed separata, medicinam inceptam reddens, pro crassa materia resoluenda; Diaphoresis namque resolutio uè, teste Gal. & Auic. fit à medicamento, cuius proprietas est, ut separet humorem, faciendo ipsum vaporem, & extrahat illum à loco, in quo est coniunctus, per partem post partem, donec assiduatione, illius operationis resoluat illum, ad hoc autem conducit, viarum amplitudo, pororum raritas, & humoris dispositio, quæ conditiones in huiusmodi tumoribus non reperiuntur, quare ad tale operationem deueniendum est. hoc autem magna cum præmeditatione est faciendum: Vnde Gal. dicebat, quod strumæ, quæ sunt ex phlegmate duro, non curantur, nisi manuali operatione, & aliquando sunt incurabiles, quæ scilicet sensu, & dolore priuantur. Quæ verò ex subtili pituita, interdum medicinis molli-  
40 lientibus, & resoluentibus sanantur; hæc autem nec sensus, nec doloris inexpertes sunt; & proprio paniculo recluduntur. Et dicit, quod talis pituita innaturalis est, & de membro ad membrum transmittitur. Et quamuis lapsa sit à proprio temperamento, tamen eiusdem naturæ non est cum phlegmate, reperto in nodis, nec acquirit diuersarum rerum formas, sicut illud. Hinc est, quod cum mollientibus, & resoluentibus medicinis passionem ex ipso generatæ curantur. Inuicissimè Francorum reges ex diuino quodam priuilegio, ut recitat Dionysius Coronius in epistola ante Aë & Ioannes Tagualicus in sua dedicatoria, solo Christi signo strumosos omnes, præcipuè die sanctæ passionis Christi, mirabiliter sanant. Auc. verò dicit, quod radix fiduciæ in curatione scrofularum est euacuatio, & subtiliatio regiminis; Et verè euacuatio est necessaria, quia ægritudo est de repletione, & maxime soluendo phlegma grossum. Adhuc regiminis subtiliatio est vera cura, cum hæc passio in humidis corporibus generetur. Dictum est ab Hypp. Corporibus carnes habentibus humidam famem adhibere conuenit. Fames enim corpora siccant. Et Gal. dicit, quod omnia, quæ exsiccant, sunt humidarum passionum cura. Fames enim per accidens corpora siccant. Rasis dicit; Curationis principium est, ut ægrum semper famem pati, & carnem dimittere facias, neque aquam bibere permittas, neque grossa nutriatur die-  
50 ta. Idem voluit in lib. Diuisionum ubi addit; Et fac ipsum vomere, & solue cum eis, quæ educunt phlegma grossum. Vnde Auic. dicebat, quod subtiliatio regiminis est deuicere cibos grossos, & potum aque super eos, & nauetatiuam facietatem, & repletionem; et opus est tolerare famem, quantum potest. Et cauet æger ab omnibus causis caput replentibus, sicut reclus, in quantum potest, etiam dormiendo, nec se super faciem, aut genus prosterнат. A locutione plurima, ira, ac capitis dolore omnino fugiat: quia hæc omnia ad caput materias currere faciunt. Fugiendo est aer humidus, grossus, nebulosus, palustris, & frigidus, nec sub diu standum est, nec sub lunæ lumine. Boreas, & australis status pessimus. Cibaria, quæ in his morbis conceduntur, declarantur infra cap. de cura scyrrhi.

7. coll. cap. 31.

7. de simp. molli-  
dina dist. 4. ca. 9.  
3. canon. tradit.  
1. cap. 4.

3. 1. 4. 2. 3. ca. 10.

7. aphor. 60.  
in com.

7. ad alim. ca. 8.

Cap. 1. 9.

Potus sit vini pauciter, odoriferi, albi, & clari. Euacuatio est necessaria, quæ multipliciter fit. Et Princeps dicit, quod de euacuatione laudabili est vomitus. De tali remedio disputabimus in fine istius curæ.

Cap. prop.

4. 1. 1. cap. de  
venenis.

60 Phleborromia aliquando est iuuatiua, sed non in omni struma, cephalicam secando, ut docet Auic. & felseant dicentes phleborromiam humores incrudare, cum eos magis frigidus reddat; nam in corpore repleto, & in dolentibus scrofulis, cum etherogenea peccat materia, consentiente artate, tempore, & virtute, venæ cephalicæ sectio summe conuenit. In induratis adenibus absque sensu, & dolore dimittenda est hæc via. Cucurbitularum appositio, dicit Auic. est medicina inconveneriens, & reddens rationem dicit, materiam in adenibus coniectam euacuare impossibile est; quia cucurbitula magis quam venæ sectio, partes subcutaneas expurgant, ac magis tenue, quam crassum, extrahunt. Pinguibus tamen corporibus, quæ crassiores linguam obtinent, minus oportuit; quoniam non adducunt sanguinem eorum, ut deceret, sed tenuiorem eius portionem. Strumarum verò materia, crassa est: imò dicit Auic. Cucurbitula trahit ad eas, & ingrossat ipsas, per id, quod extrahit de sanguine subtili. Et intelligere oportet de cucurbitula super tumorem, non autem diuertendo; quod in materia mixta

posset esse opportunum remedium. Ideo, dicit, est inconueniens remedium secundum plurimum. Et quia hæc passio chronica est, ideo digestionem expectat. Talis autem materia longa digestionem præparatur, si præparationem recipit, & tunc cum syr. acet. comp. oximelle, melle ros. de stehados, bilantino, & similibus cum aqua capil. Veneris, fumarie, lux, solatri, scabiosæ, boraginis, lupulorum &c. Digesta materia cucurcut, & R. auctore Auic. (& est med. Ratis) turbith, zinziberis, zuchari añ. p. æqua les. Patiens huius confectionis in mane vique ad 3. ij. cum brodio accipiat, quia euacuat phlegma grossum, non calefaciens, neque rodens intestina, & maxime in infantibus. Aut cucurcut materia cum ellec. lenitio, de scabestem, in do maiori, de d. stilis, aut confect. hamech, cum decocto epithimi Mesue, aut cum decoctione magistrali ad piruitum. Hyera, & benedicta laudantur, pariter diarob cum turbith, cū rheubarbaro & cum ag. Laudantur pillule fetidæ, de euforbio, de hermodactilis, de hyera, de ag. & similes. Celsus dicit; Album veratrum rectè datur. Nec confidendum est in his, sed quotidie, aut sæpè patienti aliquid exhibeatur, vt R. epithimi, euforbij, agaricij, sulphuris añ. q. s. misce, & fiat puluis; & da infirmo de tali puluere in potu cum aqua lactis à 3. j. vique ad duas per quatuor horas antecibum. Aut exhibeatur 3. j. p. pulphuris cum brodio in mane, quia exciscat hanc materiam citò; Aut assumat 3. j. euforbij cum syr. acetoso alternis diebus, per hebdomadam in mane ante cibum; Aut R. radices herbaræ scrofulariæ, seu minoris vrticæ, & subtilissimè incidentur, & cum ovis fiant fritellæ, & per duas horas ante prandium pluries egger vnam comedat. Aut R. ex secretis nature, ralsam, & cliætur, postea ad Solem exciscentur, & fiat puluis; & cum melle albo fiant pillule ad quantitatem ciceris, & exhibeantur tres, aut quinque patienti. Gal. dat theriacam, aut athenasiam, aut ambrosiam. Valet electuarium dialesæ Mes. aut diacalaminta ex 4. de sanitate tuenda.

Ex parte autem egritudinis, idest quò ad localia, dicit Aetius, Paulus, Celsus, & Serapion, quòd his intentionibus curantur, quibus apostema melancholicum. Et Princeps dicebat; Omnia affumilia regimini scirrhij. Et est sententia Gal. quòd eorum cura, quantum quidem in passione, communis est scyrrhis, idest induratis tumoribus, qui in aliqua alia parte sunt. Et rursus; Scrofulæ quidem, aut curantur ea via, quæ & scyrrhis, ergo indigent mollificatione, & resolutione, idest interdum mollire, & interdum resoluerè oportet. Ad hoc laudat Gal. emplastrum ex farina lupinorum, & oximelle. Aliud, stercus capræ in aceto decoctum; & est medicamentum Archigenis.

Aliud Dioscoridis cap. de coriandro, & laudatur à Principe, farina coriandrorum, & sauc cum melle: aut radix lapatij cum vino, aut ficus sicca cum absinthio. Et ibi dicit Gal. quòd ficus digerit scrofulas, & resoluunt. Aut R. calcis, mellis, adipis porci, misce. Aut R. farinæ ireos, & tami columbini, añ. q. s. coquantur in vino. Aliud, assungia veteris, feminis hioficiam, picis, olei antiqui, sthoracis, galbani añ. q. s. misce, & vtere.

Alterum ex Gal. & est de medicinis Socionis. R. dragaganthi, floris chamæmillæ, picis liquidæ, ammoniaci, medullæ cruris vituli; galbani añ. q. s. dissoluatur ammoniacum in aceto antiquo, & vtere ad formam cerati. R. foliorum capparis, ammoniaci, bdelij, capilli Veneris, florum chamæmillæ, medullæ cruris cervi añ. q. s. conficiantur simul ad modum emplastri. Alterum, quò vtor; R. ammoniaci, salis gemmæ, pithetri, succi marubbij, añ. q. s. terantur omnia, & cum modico olei liliorum, & ceræ q. s. fiat vnguentum. Aliud R. sthoracis, radicem lilij, ammoniaci, medullæ cruris vituli, adipis capræ, añ. q. vis terantur, & cum melle fiat emplastrum. Aut R. radicem ireos, asphodillorum, cucumeris agrestis, filicis, ciclamini, ebulli, ficus sicce añ. q. u. omnia in aceto coquantur, & cum assungia vt si, & medulla crurium vituli, & pauca cera fiat ceratum secundum artem. Auic. laudat emplastrum Gal. R. sinapis, feminum vrticæ, sulphuris, spumæ maris, aristolochiæ, bdelij añ. s. i. ammoniaci, olei antiqui, ceræ añ. s. ij. Ego autem addo huic medicamento hyposi cerati s. i. iij. diaquilonis comp. s. i. iiii. soc, & vtere. Hoc medicamentum pluries cum magno honore vltus sum: sed prius inuono tumorem ad modum fontem cum oleo antiquo, calido, in quo decocti sint pori iuuenes. Icesion medicamentum laudatur à Paulo, similiter emplastrum ex radice lanaria, quod diastruthu dicitur. Dicit Auic. De medicinis calefacientibus scrofulas est diaquilon simp. compositum, et si alteratur cum aliquibus rebus, est melius. Et hoc est, quod Rasis dicebat; Emplastretur locus cum diaquilone, & mirra. Describitur diaquilon 7. ad Alm. Alteratur aliquando cum stercore caprarum, ouium, cum nasturtio, cum cucumeris agrestibus, sicibus cadentibus ante maturationem, farina fabarum, amigdalidis amaris; & maxime cum radicibus lilij, vt docet Hypp. aut cum ammoniaco, bitumine, cortice radicis cappari, galbani, ireos, pipere, auellana mda &c. ab Actuario emplastrum è via calce Democriti summe laudatur.

Multa medicamenta ab antiquis in hac re describuntur, vt à Dioscoride, à Gal. à Scribonio, à Celso, & à Plinio, à Rasi, & ab Auic. Modernique valde copiosi in hac re fuere; sed hoc non facit ad curam nam non sumus in re determinata, & multa de nouo emergunt: Opus est ergo assumere ingenium curæ à multis rebus, vt dixi. Ided debemus ex nobis ipsis diuersa medicamina componere, vt requirit morbi essentia, & alia, quæ considerantur circa morbum, nam pueri, mulieres, & iuuenes diuersimodè regi debent, cum eorum complexionem, & ætatem sint diuersæ; & cum loca diuersa curæ diuersitatem adducant. Et verè medic priores, & iuniores defaricati valde sunt, querendo, nunquid his ingenijs hæc passio curam reciperet, emolliendo scilicet & resoluendo, cum dicat Gal. quòd hæc est cura huius

ad Alm. c. 71.

c. 243

14. methodi.

14. methodi.  
cap. 11.  
Lib. de rem. per.  
tactib.  
3. de med. localib.  
cap. de paratib.  
Lib. 3. cap. 1.

Lib. experient.

De med. g. vii. de malis.

Lib. 9. cap. 17.

in diuisione  
cap. 119.  
Et à Paulo 1. 7. c.  
17. de a. Mesur.  
6. simpl. cap. 7.  
de 4. ad. Pater.  
nani cap. 14. 8.  
lib. de rem. fa.  
cilit. paratib.  
cap. 34. de de  
Med. per genera  
cap. 60. & vii. de  
Emplastrib.  
Lib. 30. cap. 7.  
7. ad Alm.  
1. 4. cap. de cu.  
scrofularum.

huius

- huius passionis: attamen veritas est, quod non sanantur his medijs, precipue cum ex toto chistis creata fuerit. Aliquando vero ad manuum operam devenire opus est, & strumas cum suo chisti terreo instrumento extrahere, & maxime dum adeo sunt induratae, quod nullo modo molliori possunt. Et Rasis dicebat: Si autem iam ingrossaverint, aut indurantur, est necesse, ut extrahantur, & non remaneant ex eis aliquid; nam si remanet aliquid, redit iterum, & morbum regenerat. Et si opus fuerit ferro vii, considerandum est, sibi fuerint nervi, aut venae, aut arteriae, & maxime prope gulam, in quo loco nervi reaverint, qui & vocis dicuntur. orti a sexto pari nervorum, reperiuntur. Sunt & venae algeidae quae, siue apoplecticae, quae & somni dicuntur, intrinsec, & extrinsec. Sunt & arteriae multae, & amplae, ortae ab Aorta ascendente, bifurcatae ab utroque latere, quae carotides, foporariae, apoplecticae, & suberit dicuntur, ideo caute procedendum est. Dicit Auic. vnum, quod recitant etiam Gal. & Rasis. Quidam empirici, dum absque anathomiae cognitione manualiter strumas in collo alicuius curare vellent, nervus vocis inciditur, & vocem statim amisit. Si vero contingerit sectio in latere vno, medietas vocis amittitur. Et Auic. dicit: quod si nervus incisus non fuerit, sed ab aere aleratus, hoc etiam contingit. Pari modo si incisa esset aliqua harum venarum, aut arteriarum, magnum incommodum, & periculum sequeretur. Dicit Rasis, quod in erudum struma magnificatur ad modum melonis, & amplectitur collum, & caput; & sunt periculosae: Vnde Auic. dicebat, Et cum scrofulae sunt magnae, tunc plagarii alienant se à curatione earum cum ferro, & medicamine acuto; quia est de illis, quae ducunt ad ulcerationem earum, & ipsarum corruptionem. Est et necessarium vii in istis evacuatione, mundificatione, & cibi substitutione, & administrare medicinas resolutivas super eas cum facilitate, sicut iubet & Rasis, atque Albucahis: vnde Arnaldus de Villa nova dicebat, Scrofularum incisio sapienda est, in quantum possumus: sed cum ad operationem coacti sumus, Albucahim sequimur, qui in hac re rabilius fuit. Dicit autem Albucahis: In illa scrofula, quam ex eis vides bonae dispositionis, in tactu, cuius manifestum est propinquum colori cutis, & mouetur ad omnem partem, & non est annexa cum nervis colli, neque cum glande, neque cum arteria, neque est profunda, oportet, vt feces eam sectio ne superficiali à superiori parte ad inferiorem corporis; & excoria eam ab omni parte; & extende duobus labia cutis cum vincio, aut cum vincinis multis, si indiges illo, sicut diximus in nodo; & extrahe eam paulatim, & sic cautela, vt non incidatur vena, aut nervus. Est si accidit in operatione fluxus sanguinis, sistatur cum testrinentibus sanguinem; deinde ad opus revertere, donec omnis struma, & tota chistis extrahatur: quod sepe cognoscitur per intromissionem indicis digiti. Extracta struma, si partes, seu labia fuerint adinuicem multum separata, vniantur aut futura, vel alio ingenio. Cautas mundificetur cum vino mellite, & egyptiaco, aut apostolorum; deinde cum aridis farcoticis, & medicamen to basilicone incarnetur. Et cum strumae sunt pendentes, & ab omni parte à membro, in quo sunt annexae, separantur, excidentur in radice sua, si nullus aderit timor, quod venam, aut nervum incidere timeamus; aut filo duplicato serico in radice ligentur, donec cadant per se. Et quae de strumis continent humiditatem, ideo est suppurantur, cum materia fuerit mixta, perforetur perforatore superficiali, ubi apparet locus maturitatis, à quo possit conienta materia exire, & administra post perforationem elichinia cum vnguento. Et Auic. summe laudat emplastrum apostolicum, relatum ad Christianos; & credo, quod sit vnguentum apostolorum ex duodecim rebus ex sui descriptione 5. canonis: quod forsitan dici posset esse vnguentum isis, descriptum à Scribonio sub titulo, emplastrum viride Gliconis chyrurgi. Et dicit, emplastrum vini de, quod sui generis meo iudicio superat omnia, & vocatur isis. Istud vnguentum adeo laudatur à Gal. sub titulo, isis Epigoni, quod alterum simile reperiri negat. Reperitur etiam apud Aetnarium in de compositione medicamentorum, sub titulo, isis Epigonos, & ibi dicit Aetnarius, strumas cum cingentibus tunicis celerrime tollit. Istud ergo vnguentum administratur, abluto prius vlcere cum lixiuio, & melle rosato; aut si remanserit aliqua pellicula, cum lixiuio sapa, & aegyptiaco. Et Princeps dicebat: Cum excoriatur, destruat, quod residuum est, cum medicamine acuto, & non perueniat lateri laesio: Aut R. (& est vltimum medicamen) as viride, solatrum, lapatium, aspalthum asi. p. æq. pistentur omnia simul, & cum succo pori, & parum mellis fiat vnguentum. Celebrata mundificatione, incarnetur, &c. Et si contingit, vt sepe aduenit, quod talia vlcera ad cancerositatem perducantur, tunc cura est vlcera, quae sapiunt naturam carcinomatosa, de quibus erit sermo loco proprio.
- Nunc in cura istius passionis aliqua de vomitu dicamus. Dicit Auic. de euacuatione laudabili est vomitus, hic tamen omnibus absolute non est concedendus; quia non omnia corpora, nec omne tempus ad vomitionem apta sunt. Dicebat Hypp. Graciles, & facile vomentes purgato superius, cauens huius mem. Et Gal. dicit, quod graciles sunt biliosae habitudinis: quae autem strumas patiuntur, humida sunt, pituitosa, & gulosa. Et rursus Hypp. Vomentes difficulter, & mediocriter bene carnosos, per inferiora, cauens æritatem. Vomitus vero prodest his, qui facile vomunt; quia (vt dicit Auic.) vomitus pituitam, ac statum bilem euacuat, ventriculumque expurgat. Igitur concedatur facilliter vomentibus nitidi corporis, & non cacochimi, quia trahendo materias ad caput, summe noceret. & Celsus dicebat, Sponte vomere non alienum est, precipue his, quibus in consuetudine fuit; sed neque proinus positum, neque iam inflammatione orta, neque cum in superioribus partibus plaga facta est. Hinc quoque

que Hypp. dicit 4. aphor. 8 Tabidos verò cauentes ad superiores euacuationes. Vomitus per prius ventriculo expurgat, & per posterius caput: idque magis si in debita complexione, ætate, & tempore fuerit celebratus; Nam temperatè materias crassas, & viscosas, propter aliqualem indigestionem genitas, euacuando corpus, ad aliqualem temperiè reducit. Hoc opus fieri solet post vniuersalem euacuationem. Prouocatur autem multis ingentijs, aut digito, penna, aut cum ag. vel japhani decoctio: vel conficiantur flores ginestræ cum melle, & parienti exhibearur ad quietatè fibræ; aut exhibearur pillula de elctro; aut prouocetur cum oximelle, & seminibus atriplicis, vt R. fem. atriplicis subtiliter puluer. 3. j. oximellis simpl. vel comp. aut Iquilitici secundum naturam humoris 5. j. aque sim pl. tepidæ 3. liij. misce.

## OBJECTIONES DE VOMITU.

Et si quis diceret, vomitus est causa augmenti scrofularum, ergo non conuenit, antecedens probando, quia replet caput, & facit materias ad ipsū ascendere, quod est contra Auic. qui dicit; Abhorreat ab omni, quod replet caput. Et alibi; Vomitus est ex eis, in quibus non fit iunamentum in ægritudine capitis. Responde, & dic, quod antecedens est falsum, loquendo de vomitu facto cum condictionibus iam dictis; quia tunc materiam minuit, & reliquum ad caput ascendere non permittit; cum vtpurimum hæc passiones fiant per communicantiam à stomacho; & idcō materię, quę in ventriculo reperiuntur, meliori modo euacuatur per vomitum, iuxta sententiam Gal. Quęcumque secundum superiorem ventrem sunt materię, per vomitum purgantur, quęcumque secundum inferiorem, per subductionem. Vnde sequitur hæc conclusio, vomitus competit, dum caput patitur per communicantiam à stomacho, aliter non. Et si diceret, vomitus est quid præter naturam, igitur non est de intentione

cure; nam dicitur à Gal. Natura est artifex, medicus verò minister. quod etiam retulit Auicenna, & diuinus Melue in de consolatione medicinarū in sermone vniuersali. Antecedēque probetur, vomitus causas ascensum rerum grauium sursum, ergo &c. Præterea ratione instrumenti, quia stomachus mouetur sicut graue sursum; Pariter ratione agentis, quia virtus mouet cum nocumento instrumenti. Responde, & dic, quod vomitus, qui in tali cura laudatur, non est simpliciter præter naturam; nam hoc, quod est simpliciter præter naturam, largius sumitur à medicis, quā à philosophis: medici enim id appellant præter naturam, quod sit à virtute non regulariter operante; sicut patet, cum sit scœcum euacuatio per vomitum in illiaca passione, & dum sit chili euacuatio per secessum in lenteria: modò hic vomitus non est huiusmodi; quia non est graue, ascendere simpliciter, secundum medicos; imò medici appellant hunc motum naturalem, quia sequitur operationem naturalem, naturaliter intentam à virtute regulariter operante propter finem, qui non dicitur naturalis absolutè. Et si diceret, vomitus strumatur materiam non euacuat immediatè, ergo non conuenit, consequentiaque teneat, quia tumorum cura ex 14. Methodi, est contenturum materierum extractio, & euacuatio. Responde, quod vomitus non laudatur, neque enumeratur inter medicinas, quę curant immediatè; sed quia materiam coniunctam, causamque fouentem purgat, idcō laudatur, & est cura conueniens. Et si diceretur, talis materia in ventriculo existens, est magis apta euacuari per secessum, quia grauis, & grossa, ergo non debet euacuari per vomitum; & Gal. dicebat in lib. de plenitudine, & in lib. quibus medicamentis purgare conueniat. quod in euacuationibus ab arte fiendis naturam humorum sequi debemus. Responde, quod si per secessum potest purgari, purgetur; quod melius est, in quantum est grauis, & magis apta descendere; sed quia fit cum maiori arte, & difficultate, idcō vomitus laudatur: qui si in corpore apto ad vomitum pluries prouocatur, efficacissimum remedium est. Et si diceretur, Gal. negat hanc operationem, quando dicit; Neque igitur, cum vel circa sedem, vel aliquam huic vicinam partem, initium phlegmonis incidit, aluum deiciēs; neque cum in vesica, vel colle, vel renibus est cepta, pharmaca, quę vrinam prouocent, bibenda dabis; nec si mulieri in vtero, vel pudendo insedit, menses huic prouocabis; sed ad partes, quę maxime longinquę sunt, semper auertentem facies. Responde, quod ibi Gal. loquitur de ratione diuerendi: tamen cum materia fuerit multa, hanc negat operationem; quia dicit; Si plurima succorum abundantia sit, nec exercitatione, nec balneo sine periculo vitæ: sin exigua sit, licet, & per hæc vacues. Et si quis hanc operationem improbare vellet tali medio, dicens; si vomitus competit, aut ante alias euacuationes vniuersales, aut post: Non ante, quia talis vomitus esset magis agitatius, quā curatius propter materię quantitatem, quā natura non est potens euacuare, sed bene agitare: Nec post, quia aut euacuat totam materiam, aut non: dicendum non est, quod euacuet totam materiam, quia non coniunctam: Nec partem, quia aut magis aptam, aut minus aptam: non est dicendum, quod minus; quia realiter magis resistit: nec magis, quia diuidentius minus aptam noceret, ergo nullo modo conuenit. Respondendum est, in corpore non repleto, cui facilis est vomitus, ante alias euacuationes conuenit, & à tali nulla sit humorum agitatio; immo immediatè pituita, & materia crassa, quę eiusdem est naturę cum causa coniuncta, purgatur, & in hoc nobis opitulatur natura, quę, vt dicit Gal. semper intendit expurgare nocuum, bonum conseruando. Si autem corpus repletum fuerit post alias euacuationes, quia natura facta levis residuum digerit, vt Gal. docet; et tunc materia minus apta magis apta redditur. Præterea clarum est, quod sumus in

63. cap. 39.

3. art. med. 144.

Idē 3. art. med. 196. lib. 1. de ali. inter. cap. 4. 3. m. med. 87. 8. l. 4.

11. methodi d. 2. cap. 3.

Lib. de tumorib. lib. 4. aphor. com. 1.

s. aphor. com. 3.

- 10 labore euacuandi materias crassas in ventriculo existentes, quæ faciliore modo per vomitum, quam per lccellum, aut venæ sectionem, purgantur; nam pilorum, seu portonarius, strictus est ore ventriculi, vnde fit vomitus; idcō faciliore modo, & cum minori agitatione hæc materia per supernas, quam per infernas regiones, euacuantur.

De glandulis. Cap. VII.

- 20 **L**YRANTUR interdum ab aliquali pituitosa humiditate nonnullæ partes nostri corporis, quæ genitæ sunt, vt dicunt Anathomistæ, ad vacuitates replendas, & vti plurimum, vt dicit Auic. super volam manus, & super frontem; et istæ partes dicuntur glandulæ, seu glandulæ: vnde & passio in eis orta, glandula, aut ganglia, seu ganglia dici solet: vulgariter lupic, quia est tumor paruus, rotundus, albus, non transiens quantitatem lupini, aut auellanae, aut nucis, & minus cis. Et non semper continetur chisli, sicut nodus. Et differt à scrofula, quia omnino priuatur colore, & vt plurimum vna tantum reperitur: non autem sic est struma. Et cum glandula comprimitur, separatur, & redit; quia nullam habet radicem, neque principium sui ortus. Nec dicitur glandula, quasi oriatur in locis glandosis, sed propter eius similitudinem cum glande. Horum tumorum aliqui sunt molles, aliqui verò duri; nam aliqui sunt ex phlegmate molles, ex quo nutriuntur membra pituitosa, & iunguntur; aliqui verò sunt duri, cum paries subtiles ipsius phlegmatis resolutæ sunt. Ralis dicitur: Cum in aliqua corporis parte aliqua apparuerit additio, quæ, cum tangitur, & ad latera transponitur, cuti continuari non inuenitur, neque duriter moueri; sed taliter exiliens, ac si à corpore separata foret, neque radicem, neque principium in ea habens, erit glandula. Et dicit, quod aliqua sacculo includuntur, & aliquæ non; & quæ sacculo includuntur, à ciceris quantitate incipientes vsque ad melonis magnitudinem perueniunt. Paulus de quadam passione sermonem habet, quam ipse ganglion vocat, & dicit, quod est quædam nervorum concretio, ex ira, aut lassitudine oboriens, in pluribus quidem corporis partibus, præcipue verò motui dicatis, nempe manu summa, & pedibus. Et hæc est illa passio, quam Auic. in cap. de nodo. appellat nodositatem, vt supra declarauimus.

De glandularum cura. Cap. VIII.

- 40 **D**icit Auicenna, quod hæc passio in principio talis est, quod cum super ipsam fit compressio, separatur, idest resoluatur, & maxime quando materia est benigna, vt in cedemate; deinde redit multoties, & multiplicatur. Hoc contingit in corpore cacochimo, in quo pituita abundat; vnde non est malum, tale corpus à crassis humoribus euacuare, vt dictum est; & fortasse non redit, cum tamen ex toto à longa strictura materia destructa est. Comprimatur igitur, cum appareat glandula, forti compressione; deinde irino, & laurino oleo cum media parte aque ardentis, & tantundem aceti liniatur; de super verò lamina plumbea, lata, & subtilis stringatur graui strictura, quoniam digerit ipsum; & maxime quando liniatur super plumbum epithema digestiui, idest harum materierum incisuum, & resolutiuum. Plumbum facit hoc, quia comprimit ratione suæ ponderositatis, & reprimat, quia habet potentiam frigidā; Eum laudant Ralis, Paulus, & Aetius. resoluunt, quia componitur ex partibus aeris multis, ut docet Gal. idem facit & aurum. Oribasius verò, non subtilem laminam, sed plumbum ampliore ganglio imponebat, & arctissime deligabat, nec amouebat ante nonam, aut decimam diem. Aut hæc medicamentum ex aloë, acaria, mirra, & sarcocolla cum aceto, & albumine oui: aut ficus cadentes ex arbore contriti cum ceruisa, & melle superponantur; aut liniatur cum vnguento de plumbo, & succo dragumihæ. Dicit Ralis: Si autem glandula dimittatur, cum parua est, & eius negligatur cura, augmentatur; vnde postea ad ipsam extrahendam medicus suauiter operans est necessarius. Et idcō Auic. dicebat: Quandoque cura eius est de nodorum curationis genere; & quandoque sufficit, vt coneratur, & comprimatur. Dicit Ralis: Nos tamen, in quibus error contingat, dicemus; & hoc est, quia earum partes in panniculo continentur, qui glandularum sacculus vocatur; quapropter sacculus cum eis ita est extrahendus, ne ex eo ibi aliquid omnino remaneat. Verum cura hæc partes vti plurimum in locis concatenationum reperiantur, summo quidem studio aduertendum est, ne à manuum opera, muscularum capita, quæ ibi terminantur, aliqua lesione afficiantur, vt docet Paulus. Hæc igitur leuis sectio, donec tam inueneris materiam, quam vbique separare opus est, nervos, cordas, arterias, & venas euicando: cumque glandulam extraxeris, locum ab omni pellicula denudare oportet; deinde plagam cum mundificatione de melle, aut de apio abstergetur; impleaturque postea, aut vniatur cum pulueribus, & medicinis carnem producentibus.

# LIBRI PRIMII.

## TRACTATUS QUINTVS.

### De Tumoribus melancholicis.

#### De scirrhis. Cap. I.

30



**SCIRRHVS** tumor est melancholicus, ex naturali, aut faculenta melancholia, magnus, durus valde, totaliter indolorosus, & insensibilis, quietus, coloris aut plumbei, aut cinericii, & talis est exquisitus scyrhus, qui etiā legitimus dici solet. Avic. verò hanc passionem appellat sephiros purum. Hic tumor fit incipiendo, & successiue augmentatur; & talis curam non recipit; & maxime cum illi supereminet pili. Alter tumor atrabilosus reperiri solet, qui fit ex humore lento, crasso, & naturali, aut pituita admixto, & color eius est declinans ad colorem corporis, non omnino insensibilis, ac dolore priuatus. Hic aliquando fit per aduersionem, aut indurationem aliorum humorum, aut sanguinis, aut bilis flauæ, vel pituitæ: & appellatur scyrhus ex permutatione, quia incipiendo non generatur. Hic incurabilis non est, nec facilem curationem admittit, & vocatur à Principio sephiros non purum; sed credo, quòd potius nomen scirrhici tumoris mereatur, quàm scirrhii.

Hic tumor, quem Græci scyrhum, Arabes sephiros, & Latini duriciem appellant, ita membris infigitur, atque insitus loco, ubi cōsederit, esse videtur, vt nullo modo exinde diuelli possit, nec pellicula includitur, sed totaliter annexus, membro infixus, & adherens permanet. Dicebat Gal. Scirrhium nominamus tumorem durum, indolorosum, qui omnino insanabilis est. Et Avic. exponendo hæc verba, dicit: Puris quidem color est color plumbei, & est vehementis tensionis, & duritiei, & fortasse supereminet ei pili; & hoc est illud, cui non est sanitas. Talia accidentia non sequuntur hoc apostema, nisi propter causæ materialis qualitatem, quæ est foex sanguinis, terreæ complexionis, & difficultis resolutionis, & magis, cum in membro debilitas aliqua introducit, & materia facta est æqualis in membro, & virtus in eam pigre agit. Noc curatur talis passio, quia aut materia debet suppurari, aut resolui: si suppurari, indiget medicina valde forti in caliditate, cum & materia, & membri complexio sit frigida, à qua fit attractio: si verò debilis fuerit, non erit in operatione potens. Pari modo si debet resolui, potentem requirit medicinam; ab actore verò potenti in materia ita disposita sit tenuioris partis resolutio, & crassarum induratio, vt docet nos docuit Auer. Priuatur sensu triplici ratione. prima propter oppilationem factam à materia prohibente spiritus transire ad neruos, qui sunt sensus instrumenta. secunda vita stat per calidum, & humidum, & similiter vitæ operationes: materia verò peccans frigida est, & sicca, & opponitur vitæ principiis, & ideo fit sensationis prohibitio. tertia in tali materia calor nec per se, nec per accidens reperitur, & membrum in toto est distemperatum ab humore diuerso, & facta est æqualis complexio membri cum materia peccante. Dicebat Avic.

14. meth. cap. 6. Et 5. Suppl. dub. 2. cap. 6. & de med. per gen. & 2. ad. Glan.

Gal. 14. meth. 17. 7. coll. cap. 37.

Lib. de viciis cor. du. cap. 4.

1. coll. 11.

14. meth. cap. 9.

Lib. de inq. in. temp. cap. 11.

Nullum apprehendens aliquid apprehendit, nisi apud alterationem, sicut in tactu patet: tangibilis enim qualitas tandiu delectatur, quamdiu membrum tactuum permanet diuersæ qualitatis, & patitur ab alterante qualitate: quando ergo fuerit passum ab ea sufficienter, efficitur æqualis complexio membri, & ideo non delectatur ab ea; cum omnis delectatio cum quadam alteratione persistat, & nihil alteretur à semetipso, vt etiam patet in hæcticis. Et Auer. dicebat: Quando mala complexio materialis diminatur super membrum totum, membrum non sentit, aut stupidè sentit. Non doler, quia non adest sensus, dolor verò est sensus nociuius, aut sensus rei nocentis; nec fit subita impressio rei nocentis, si cuius requiritur in dolore producendo, quod ostensum est à nobis supra cap. de phlegmone. Nec aliter credendum est, quàm docuerit Galenus, nempe vnam passionem certissimam scirrhium existere, cui cum alijs accidentibus insensibilitas existit, etiam quòd ibi sit organum cum instrumento debito ad sensum, & quòd debito obiecto approximato, membro naturaliter se habente, naturaliter sensui debeat fieri, cum ibi sit neruus, & insitus calor. Suntque ibi causæ doloris, quia ægritudo est in complexionis, compositionis, & vnitatis; & per consequens sensus, qui est eius obiectum. Iam diximus, quòd à qualitate, & quantitate istius succi nerui opprimuntur, & calor suffocatur. Et quamuis ibi tria morbo non genera reperiantur, & dolorum causæ, non tamen dolor; quia non omnis mala complexio, sed diuersa, auctore Gal. facit dolorem: at in scirrho mala qualitas est facta qualis, & membrum ad humoris naturam deductum, ideo non sentit dispositionem causæ, vt in hæctica videri potest, ac in membro alicuius, qui cum diu in calida aqua tenuerit; cum verò ad aquæ caliditatem perueniret, eius al. e.



10 rationem non cognoscit. Et quanto magis bilis atra sicculeta fuerit, tanto minus & sensum, & dolorem percipit. Et talis tumor est ille, quem antiqui curam recipere, negarunt.

Datur & scirrhus non exactus, illegitimus, & non exquisitus. Hic vix sensibilis est; & (vt dicunt Gal. Rasis, & Auic.) generatur ex bile atra pituita commixta, aut ex sola pituita, quae iam indurata est: & eius color ad corporis colorem declinat, talis non omnino sensu priuatur; non quod sensus sit de sui ratione, sed quia non ex toto disrasiatur particula ab humore diuerso, sicut in exquisito fit. Hic vix sanescit, & incipit apparere paulatim, & additur, cum succi pro membri nutritione ad eum mandati, conuertuntur pro parte in naturam peccantis humoris. Talis tumor denominatur a Principe sephiros non purum, & Gal. dicit, quod potius mereatur nomen tumoris scirrhosis, quam scirrhi.

Interdum talis tumor fit ex conuerso phlegmone, aut erysipelate, vt clare ostenderunt Gal. Paulus, & Auic. cap. de cura phlegmonis. Fit frequenter scirrhus etiam ab indoctis medicis, qui non intelligendo, mox a principio vehementer ea, quae tali humore loca laborant, atque intumescunt, diaforeticis curant medicaminibus, sublataque humoris tenuitate, spissifendo, quae remanet sicculeta, quasi in lapidem coalescit: sic erysipela, & phlegmon vertitur in scirrhum, si nimium stipcis, & frigidis mox a principio perseueranter curentur medicaminibus. Dicit Auic. Et quandoque canceratur lepro, idest deducitur ad dispositionem carcinomatis, scilicet scirrhus non exquisitus, permutatus a materia calida, aut cum quo calida materia admixta est. Et Gal. Apostemata dura (inquit) melancholica omnia sunt de genere cancerum, idque magis si ferro agitantur; & id cognoscitur, cum in eis dolor apparere incipit, sicut apparet in carcinomate, & est tumor sensibilis; nam in cancro, quod sensus destruat, non est necesse, vt dicebat Auic. nisi elongatum fuerit ei tempus, & mortificetur membrum, & destruat eus sensus.

30 Non exquisitus igitur scirrhus ex aduisione bilis flauae est in propinqua dispositione ad cancerum, & hic est ille tumor, de quo dicebat Auic. quod non multum distat, quin differentia inter cancerum, & duriciem existat per accidentia inseparabilia, & non per differentias substantiales. Et Rasis dicit; Cum apostema durum est, tenebrosum, & super ipsum apparent venae rubrae, & est in ipso pulsatio, & aliquantulum caliditas, est cancer, qui non sanatur: differunt tantum haec passio nes in signis, in quorum aliquibus etiam conueniunt, vt dicam cap. de carcinomate. Corpora vero ad talem aegritudinem parata, sunt corpora melancholica non secundum dispositionem naturalem, vt do cet Gal. vbi dicit; Recordare, quia in corpore, quod est molle, crassum, album modice, raro melancholia generatur: & illud, quod est macile, nigrum, & obtusae cutis, & venas habet lanas, conueniens est in hac materia: & possibile est, quibus corpus est nimis rufum, vt complexio eius citat fiat melancholica; & post hos glauci, maxime si eorum corpus habuerit vigilas nimias, solitudines, laborem nimium magis, quam oportuit, cum subtili dietha, aut vlu ciborum melancholicorum. Item ad haec addam, aut si sanguis inferius exire solens, aut de alijs locis, clausus non exeat: aut in mulieribus menstrua.

De cura scirrhi. Cap. II.



50 **A**EGRITUDO ista, quam communiter scirrhum vocamus, vt dictum est, dupliciter consideratur; nam aut est exquisita durities, aut non: exquisita vero quanto magis a medicis pertractatur, tanto magis condensatur, nec digeritur materia talis, & hinc est, quod non recipit curam, vt declarat Gal. Vnde Auic. dicebat; Oporteret, vt de eis apostematibus illud curetur, cui est sensus. Tale enim, dicebat Gal. & Paulus, non exquisitus scirrhus appellatur, cuius curam nunc, Deo fauente, & praeceptorum mente breuiter describam. Quatuor intentiones in hac cura haberi solent. Prima est regimen victus, cum ex inordinato regimine corpora nostra alerentur, & maxime in sex rebus non naturalibus, vt docet Gal. Scirrhus enim est aegritudo chronica. Secunda est, materiam peccantem euacuare, cum hac passio de repletionis sit. Tertia coniunctam causam emollire, & resol uere: si enim procedendum est, vt clare docet Princeps, de mente Gal. in resolutione duarum operationum. Quarta denique intentio est, corpus a noua aegritudine praecautodire; nam, vt dicit Auic. est quoddam ex eo, cuius color est color corporis, & permutatur de membro ad aliud, & nominatur fermos.

60 Prima ergo intentio in victus regimine perficitur, ea omnia cuitando, quae sanguinem crassum, & melancholicum generare possunt, ea vero eligendo, quae sanguinem bonum, calidum, & humidum: complexionis producunt, quae sunt facili coctionis, & boni nutrimenti, vt docet Gal. Panis fit ex tritico, cui pondere, pauca viscositate & durities, coctus, & bene fermentatus, vt docet Rasis. De carni bus, perdicis, & turturis summè laudatur. Et Gal. dicit, Perdicis, & turtures neque summè duras habent carnes, neque indigestibiles; sed durities earum, die vna mortuis feruatis, transcendit facili ter, & sunt fragiles; etenim benignum nutrimentum dant corpori. Aues montanae conceduntur, ex senten tia Gal. quia carnes auium, quae in montibus degunt, calidiores, & sicciores earum sunt, quae in palu stribus, suntque meliores, quia minus de pituita, & viscosa humiditate gignunt. Laudatur vituli ca ro, quia digeritur facili ter, tamen Gal. dicit, quod chimum generat grossum: optima quidem est haedi, pulli, & iuuenam caponum. Ideo, dicebat Auer. Carnes luxuriae sunt meliores vitulinis, quia

r. simpl. med.  
14. Conuictus.  
cap. proprio.

14. metho. & a.  
ad Glm. & 7. de  
med. g. genera.  
Lib. 4. cap. 30.

Lib. de scirrhi  
cap. 7. & 1. de  
placulis. cap. 4.

1. 1. cap. 7.

1. 1. cap. de aegritudinis. cap.  
Diu. cap. 127.

5. de aff. ment.  
cap. 7.

Lib. de scirrhi.  
& 14. scirrhi.  
& 14. de co. op.  
med. cap. de re  
lationibus.

Cap. de cura scirrhi.

1. ad Glauconem.

& 7. de med. per genera.

Lib. 4. cap. 32.

1. 1. de med. 31.

1. de diet. fur. & 1. aphor. com. 2.  
In lib. de preser uand. lapide.  
Lib. de an. vult.  
rac. cap. 8.

Lib. de dissol.  
com. cap. 7.  
7. coll. 12.

quia generant meliores humores : & ibi dicit, quod caro galline iuuenis, sanę, & pinguis mirabilem habet proprietatem in temperando complexionem : & propterea brodium suum leprosis est optima medicina. Et Auic. dicitur : Brodium pullar parue adæquat humores. Oua forbilis dantur, & conceduntur à Principe cap. de cura cancri. & Auerr. dicit, quod nihil superfluum in vitello qui reperitur, & quod tota eius substantia ad nutrimentum perfectum facit. Dicit Gal. Dimittantur alimenta, qualia lens, ostraca, carnes taurorum, hircinę, magis que si salię sunt. Et rursus; Cibaria, quę melancholiam generant, sunt sicut caro caprarum, boum, & magis omnibus asinina, camelina, vulpina, & canina, quia aliqui sunt, qui eam comedunt. Aliqua verò sunt, quę minus his hanc humorem gignant, sicut leporina, porcina siluestris, & omnia venatilia. Porcina caro non est bona; quamvis dicat Gal. quod similis sit carni humane; nam, ut ipse ait, humores grossos, humidos, & difficilis cōctionis generat. Carnes bouinę, etiam quod sunt multi nutrimenti, tamen generant grossum sanguinem. Et dicit Gal. quod si quis fuerit naturaliter melancholicus, ex earum vlu continuo, aliqua melancholica agritudine capitur, sicut est cancer, elephantiasis, scabies, lepra, & febris quartana. Leporinę carnes etiam sunt grossi nutrimenti. Et Auenzoar dicebat; Scias, quod ab aceto est abstinendum in omni agritudine melancholica, & ab omnibus cilis grossis, sicut caules, oliuę, pisces, & carnes bouinę. Gal. dicit; Carnes omnes aliatę, & frictę siccum nutrimentum corpori dant, elix verò temperatiorem. Pisces omnes dimittantur, præter saxatiles, parui, & rubei, tales à Principe laudantur cap. de cura cancri, & à Gal. & meliores sunt, quam qui in stagnis degunt, tales enim humidiores, ac duriores sunt. Calci omnes, & maxime ventres, grossorum humorum causa sunt, ideo mali. Lacticia dimittantur. Fructus omnes, præcipue horarij, quia facillimè corrumpuntur. Conceduntur passulę, & ficus ticcia. Relinquantur legumina omnia, & maxime lentes, quia talis humoris multum generant. De oleis laudatur bletia, borago, endiuia, spinachia, lupulus, apiu, mentha, ruta, & similia. Vinum autem sit album, clarum, odoritū, & pauciflū, aut nigrū clarū substantię tenuis; tale nutrit, confortat, nec humores crassos generat : & si tale non adest, fiat ex passulis, melle, & amygdalis amaris. Aqua verò, nisi in febre, datur. Patiens febriē viuat, & bis in die comedat, hora solita. Aer sit temperatus; dicebat n. Auerr. Aer est de fortioribus rebus nostrū corpus alterantibus. Et Gal. Corpora nostra à calore innato, & ambientis resoluuntur, & à nimia frigidityte condensante, & caliditate resoluente, indurantur. Sicut patiens boni animi, & late viuat; quia, ut dictum est à Gal. Multi gaudiū solum, à malis agritudinibus liberati sunt. Somnus, autem vigilia, veraque, si modum excefferint, malum, auctore Hypp. Et Gal. dicebat; Exercitia ultra mensuram, & angustia, tristitia, & vigilię adiuvant in creando melancholiam. Secunda intentio est materiam peccantem euacuare, quę cum inobediens sit, & crasse substantia, indiget cōcoctione, præparatione, & digestionē, atque, ut relatum est à Principe, in materia melancholica digestiua debent esse subtiliatiua, & incisua : & si fuerit adusta, eam linire, & humectare oportet, eius quantitatem considerando : nam si multa fuerit, non de facili digeritur : si verò pauca, his syrups preparatur, sicut est de fumarie, de epithimo, bifantibus, iclenia, de stecade, acetosis simplicis, & compolitus, de duabus, & de quinque radicibus, & similibus cum aqua fumarie, boraginis, ablinthij, capilli Veneris, lupulorum &c. aut cum eorum decoctis. Præparetur multis diebus; postea, ut dicebat Auic. euacuetur ex ea aliquid, denique residuum decoqui incipiat. Gal. dicebat; Oportet in principio eos purgari frequenter purgatorijs vique illis, quibus melancholicum propriē seīs purgari humorem, ex quo, ut diximus, causa nascitur : & scito id tandū esse faciendum, quandiu minuetur causa, atque purgetur. Et Rasis dicit; Cura sit cum assidue eorum, quę educunt melancholiam, cum permutatione totius sanguinis cum sanguine nouo temperato, per cibos humectantes, laudabiles humoris, & boni. Sunt verò purgatoria ad hæc utilissima, dicebat Gal. quę recipiunt epithimum. Et rursus, euacuare, ait, quidem confestim humorem passionem generantem cum pharmaco bilem atram euacuare, vel per aliquod simplicium, quale est epithimum; cuius multitudinem drachmarum iijj. cum sero lactis, aut melliterio in mane damus. Et Dioscorides dicit; Epithimum cum melle possum, detrahit pituitam, bilemque atram per inferna. Auic. verò laudat de simplicibus folia lauri, stecadæ, abrotanum, squinanthum, chamemelum, fertulum campanā, anctum, hyssopum, rutam, polipodium, fenam, epithimum; & dicit, quod hæc propriē medicamina sunt melancholiz; nam hæc omnia, ultra hoc, quod contrariantur causę agrotare facienti, soluent etiam. Et alibi laudat epithimum, elleborum, lapidem lazuli, armenum, stecadæ, polipodium, & mirabolanos. Dicit etiam Gal. Melancholiam purgat epithimum, polipodium, elleborus niger, & prassij succus. Polipodium laudatur à Dioscoride, à Gal. à Rasi, à Principe, à Mesue cap. proprio. Vnde Auic. dicebat de mente Gal. Hęc omnia facilliter choieram nigram expellunt; similiter etiam fumarie. Cum verò materia fuerit multa, aut cruda, ex his decoctum facere possumus, in quo virtus simul consistat & eam præparandi, & benigne soluendi, ut R. turbith albi. & gummosi, polipodij, fenę, añ. s. iij. epithimi s. iij. fiat de cōctio in aqua fumarie, & boraginis, & patietī bis in hebdomada s. vi. istius decocti cum zucharo exhibeantur : aut R. fenę, thimi, epithimi, cuscute, añ. s. j. polipodij, s. iij. florum boraginis, violarum añ. s. j. prunorum numero xxx. passulorum s. j. s. sem. anisotum, feniculi, petroselinij, apij, añ. s. scopolendrię, capilli Veneris, camedros, luparij, añ. m. j. mīscę, & fiat decoctio in aqua boraginis, & fumarie,

g. coll. cap. 3.  
in lib. de acribi-  
li cap. 4.  
3. de off. inter. 7

g. de alim. hoc  
cap. 1. & 1. oim  
pl. cap. 3.  
7. methodo c. 4.  
3. de alim. hoc  
cap. 1.

lib. 3. ar. j. ca. 3.  
3. de alim. ca. 5

lib. de Euche-  
mia cap. 7. & de  
lib. de viti. int.  
cap. 8.  
1. 1. q. canonic. c.  
de lib. pueria.

g. coll. cap. 3.  
lib. de dist. con-  
tinent.  
lib. de iusu par-  
ue pile.  
a. apbor. 3. & 7.  
apbor. 8. 1.  
3. de off. inter.  
cap. 7.

8. f. j. cap. 1. 9.

2. ad Glaucon.

in similia. 138.

14. metho. 9.

lib. 4. cap. 1. 89.  
1. f. j. cap. 1. 9.

1. f. j. m. f. 1. 11.

lib. de castani-  
ca cap. 1.  
lib. 4. cap. 1. 89.  
1. f. j. cap. 1. 9.  
3. ad alim. c. 1. 9.  
1. 1. q. canonic. c.  
1. 1. q. canonic. c.  
1. 1. q. canonic. c.

- 10 *mariz*, in qua dissoluunt mirabolanorum Indorum *3. iij.* chebulorum, diafene añ. *3. iij.* succi cassie fistule *1. lb.* lapidis lazuli *3. iij.* Item omnia per diem simul, postea colectur, sique eorū dosis, vi requirit infirmi virtus, & exhibetur in auro. Aut fiat syrupus talis. *Re. sene 3. vj.* corticum turberis, dictami albi añ. *3. iij.* ellobori nigri, polipodij, passularum añ. *3. iij.* liquiricie, epithimi, storum bullosie, bora ginis, violarum, añ. *3. s.* aquarum fumarie, lupulorum añ. *q. s.* fiat infusio per horas quatuor, & bul liant, vsque ad tertie partis consumptionem, & colentur, & adde zuchari, mellis añ. *q. s.* fiat syr. Ion gos, & iter, vel quater in hebdomada, aut sicut fuerit opus, propinquetur *3. vj.* illius syr. calidi in auro. Mirabilissima certe est decoctio epithimi Mesue, quæ ab omnibus ita laudatur. Potest etiam materia cum appropriatis electuarijs euacuari, cum lenitio Indo, diacatolic, de dactylis, hamech, & simili bus: Aut cum hyera Archigenis, quæ describitur à Mesue, aut hyera Ruffi ex quinto canonis. Laudan tur pillule de lapide lazuli, quæ à Mesue describuntur, vtpote ex *3. i.* fiant pilule septem. Ego vero exhibeo pillulam assaiereth, vigoratam cum elloboro, aut epithimo ex præcepto Principis. Pillule etiam fatidæ, indæ, aggregatiuæ, & similes sunt opportune. Sed in hac operatione vnum aduertend um est, quod notat Gal. quod omnis euacuatio fundamentum accipit à virtutis fortitudine, & ægritu dinis qualitate, obseruando ea, quæ dicuntur ab Hipp. De phlebotomia, dicit Auic. & fortasse sit mun dificationo corporis cum phlebotomia, si est sanguis plurimæ nigredinis. & Gal. dicit: Cum melancholi cum habet sanguinem totū corpus, principium curæ à phlebot. facere decet; non autem, cum secundum partem, & rursus dicit: Si nihil est, quod obstat, atque impedit, vel prohibeat languinis detractionem, phlebotomia in brachio, & denuo intermissis diebus, purgatorio purgabis. viā hanc laudauit etiam Rasis. Verum est, quod phlebot. est vniuersalis euacuatio tantum, non potens coniunctam materiam euacuare; quia materia talis iam est extra vasa, & in loco non suo, quia in porositatibus carnis: sed in tuat, quia euacuatur de fece languinis; & eo magis in corpore pleno, sanguineo, in quo est sanguis ni gerg, aptus in bilem atram conueri: Et ideo laudat Auic. phlebotomiam cum additione, si fuerit san guis plurimæ nigredinis. Et sic euacuatur materia, quæ fouet tumorem, & suffocat virtutem: vnde po lita virtus est potens super residuum, quod est causa coniuncta. Sed in corpore melancholico, bi do, in tempore hyemis, & ægritudine frigida, dicebat Gal. sanguinem mittere malum est. Fluxus hic morroidarum in melancholicis passionibus præstantissimum præbet iuamentum, quia si natura non fit, fiat ab arte. Et Gal. dicit, quod hæmorrhoidæ summopere à bile atra purgant corpora. Sic Auic. ait: Sanguis hæmorrhoidarum purgat morbum splenis, hoc etiam est laudabile in melancholia. Et si in mulie re conigerit egeritudo, dicebat Gal. ante quinquaginta annorum ætatem, mensura prouocanda sunt; si vero hoc tempus pertransierit, hoc minimè facere poteris.
- 10 Tertia vero intentio est, stare, vt dicit Auic. super Id., quod resoluit simul, & lenit. Auctoritas est Gal. & Paulin. scirrhis, & duris tumoribus nullum eorum, quæ fortiter calefaciant, vel deficiant, pharmacorum, congruum dicit, sed id, quod emollit sufficienter, & euaporat. Princeps exponendo alia verba cap. proprio dicit: Et non curetur cum eo, quod resoluit, & exsiccat tantum, quando illud est vehemens lapiditatis perducit, propter exsiccationem grossi, & resolutione subtilis, quia omne resolutiuū secundum plurimū exsiccat: sed oportet, vt ponantur curationis eius due resolutiones, reuo lutio nempe resolutionis cum lenitate absque plurima exsiccatione, & ut gradus in caliditate ex secun do ad tertium, quod idem voluit Rasis, Serapion, & Auerr. sique alia resolutio leniticans, & sine iste due resolutiones succederet. Dicit Gal. Medicinæ lenientis membrum, in quo scirrhus reperitur, com plexio est pluris caliditatis, quam complexio corporis temperati, sed non fortis caliditatis; & illud, quia tumor durus non incipit, nisi ex materia viscosa, grossa, quæ adhæret, & retinetur in foraminibus, & poris paruis membris, in quo collecta est: quandoque ergo resoluitur, quod est in illa materia de hu miditate etrenui, & subtili, & infrigidatur residuum, quod est in materia illa, & peruenit ad dispositionem similem congelationi, & sic scirrhus. Et rursus dicit: Medicinæ mollificatiuæ non sunt vnus speciei, inio quædam earum mollificant ex via, quia humectant, aut quia leniunt, aut quia euacuare, aut quia destitunt apoplexia, & quædam hoc faciunt secundum combinationem. Modum curandi hanc duri tem accepit Auic. a Gal. in ea parte, vbi laudat ammoniacum solum in aceto, quod ita à Principe laudatur, & maxime quando appareat lenitas, & diebus pluribus vti debet. Dicit autem Gal. Sufficit isto medicamine secundum vnam, vel & secundam diem vtens, redire rursus ad mollificantia: postque illis viis fueris diebus pluribus, redire rursus ad pharmacum, quod per acetum, & ammoniacum fit, deinde ad aliquid mollificatiuorum. Nec oportet offerre aliquid siccorum pharmacorum: nam ap probabit quidem in principio hoc pharmacum, insanabile vero operabitur reliquum dispositionis: Pro cedatur ergo modo leniendo, & modo resoluendo: nam auctore Gal. talia quidem vtique auxilia va riare oportet. Pro tali autem operatione perficienda commédât ipse medicamenta illa, quæ malacifi ca dicuntur, seu malagmata, ita enim scribit Malagmata vocant medici, quæ partes supra naturam in duratas emolliunt, calido omnia temperamento mediocri prædita, non tamen exsiccantia, quæmadmo dum nec manifestè humectant; nam cum exactè malacifica medium quendam ordinem inter humec tantia, siccantiaque fortiantur, indurefcentium substantiarum veluti fusionei quandam molliuntur. Laudat etiam Gal. eas medicinas, quas appellat lenientes pro tali complicata intentione, veluti medul

Lib. de epe. res.  
per sang. aut.  
1. aphr. 3. d. 3.  
p. de aff. m. c. 7

1. 4. methodi cap.  
de diff. ca. 13. lb.  
auic. 1. 3. cap.  
3. 7. de 4. 1. 1. de  
phlebotomia

3. de aff. intir.  
cap. 4.  
Lib. de atra bile.  
cap. 4.  
1. Coniuncte 469

1. ad Glauconem.

1. ad Glau. cap.  
de scirrhis. 8. 14  
metho. cap. 4. de  
7. de med. per  
gen. circa m. m. d.  
Lib. 4. cap. 3. 1.

13. Continencia  
1. coll. cap. 6.  
1. simpli. d. 3.

1. simpli. d. 3. 7

14. methodi 7

1. ad Glauconem  
7. de med. per  
gen. in presc.

14. methodi. cap.  
4. 15. simpli. d.  
5. cap. 4. 8. 1.

1. ad Glancol. lam ceruinam, vitulinam, adipem ex vitulo, taurinum, leoninum, & mel. Adhuc autem cum his am-  
moniacum, masticem, bdellium Siciliensem, storacem humidam, & his similia. Et rursus laudat me-  
dullas, adipemque omnes, & seum; & dicit, quod ex medullis primas partes obtinet ceruinam, deinde  
vitulinam; ex adipibus autem, anserinum in volucrium genere: Leonis vero in pedestrium ceteris prestat:  
at verò qui ex gallina fumitur, anserinum; & qui ex pardo, leoninum sequitur, ac deinde vitulinum,  
atque taurinum: At qui ex capris accipitur & crassior, & siccior prædictis est: idque magis si ab hirco  
capiat, & de volatilibus etiam fasaninum. Idem rursus memorie tradidit, medulla mollificata: po-  
tentior est induratum tumorum patientibus corporibus; Prima (quod semper ego expertus sum) est  
ceruina, & post hanc vitulina. Ex ideo Auic. capite proprio dicebat, Lenticantia quidem, quibus est  
resolutio, sunt, sicut adeps gallinarum, anserum, vitulorum; & breuiter laudat omnia, quæ iam dicta  
sunt à Gal. & debent misceri cum ammoniaco, bdelio, storace, & similibus. Ex vnum addit, quod pin-  
guedines debent esse sine sale; quia sal exsiccat, & indurat: nam scripsit Gal. quod sal exsiccat exsicca  
vna vehementer. Et tandem dicit Auic. (& est doctrina accepta à Gal.) quod horum medicaminum  
operatio in materia scirrhali talis esse debet, qualis actio solis in cera, quæ lenit, & liquefacit eam, & non  
exsiccat. Dicit etiam ibi Auic. In mucilage feno græci, & seminum lini est talis operatio. Gal. verò  
vtebatur radicibus altheæ, & folijs maluæ, folijs cum adipe; quod si fuerit anserinū, aut gallinaceum,  
aut porci, fuerit melius. Scribonius verò laudat radices cucumeris agrestis decoctas in mulla, tritas, &  
superpositas: quas etiam mulorum laudat Galenus, si in Sabino oleo fuerint decoctæ. De oleis laudat  
Auic. oleum vetus, de lilio, de alcanna. Gal. verò Sabinum, & de aneto. Oleum Sabinum est oleum  
vetus, penetratiuum, subitium partium, absque stipticitate, vt melius scirrhosum penetrare possit; & sit  
ex oliuis maturis in regione Sabina apud Romanam. Auic. tamen dicit, eorum meliora sunt, quæ sunt  
minoris antiquitatis, & exsiccationis, & vehementioris humiditatis. De compolis laudat Princeps  
stercus asini cum radicibus hyssici, & storace. Aut fiat emplastrum Ratis cum mucilaginibus altheæ,  
& feno græci, ammoniaco, bdelio, caricis pinguibus, & oleo de ben, & liliorum. Aliud Gal. & dicitur  
malagma primi ordinis, & butiri, resine colotonæ, ceræ albæ añ. q. m. misc. Aliud secundi ordinis, &  
farinæ feno græci, seminum lini, radicum altheæ añ. s. ij. bulliant in aqua mulla, & adde butiri recentis  
s. iij. bdelij, storacis liquidi, ammoniaci añ. s. i. hæc dissoluantur in vino, deinde tunc fiat emplastrum.  
Pro resolutione istius materiei, cum aliquam acquisierit mollificationem, laudat Auic. ea, quæ in de  
cura strumarum dicta sunt. Aliud, & facis acetii, facis olei aniqui añ. lib. s. pulueris marchefire, pin-  
guedinis equi añ. s. iij. farinæ feno græci, seminis lini añ. q. s. acetii parum misce, & fiat emplastrum.  
Vnguentum mirabile, & adipis vulturis, tassi, tarabius, cerui, medullæ crurium vacæ, pinguedinis ana-  
tis, hyssopi humidæ añ. s. i. mucilaginibus feno græci, seminis lini, altheæ añ. s. ij. bdelij, ammoniaci, gal-  
bani, opoponacis añ. s. s. olei chamæmelini, liliorum alborum añ. s. iij. adips vulpis, gatti, leporis, añ.  
s. i. vnguenti marciaton, agrippæ, aragon, dialtheæ, buxii añ. s. i. misce, & fiat vnguentum.
- In istis verò ordinationibus ea notanda sunt, quæ dicuntur à Gal. scilicet vt inspicat medicus, & con-  
sideret, inter ipsa pharmacia alia magis, alia minus emolliet, ideo in primis debili vlu medicamentorum  
vntur: at post vnum, aut alterum diem, siue intendere medicamentum virtutem, siue remittere conueniat,  
intelligit. Præterea induræscencia apostematata, quæ ex methodica, seu rationali arte non curata scir-  
rhum contrahunt, optime curabuntur, si medicus prædict, quantum egri corporis substantia à medio-  
cri humiditate, adsciccat recesserit; quemadmodum si affectus ipsius incrementum inspicat: nam cor-  
pora dura fortia patiuntur medicamina, tenella vero (cuiusmodi habent mulieres, pueri, eunuchi, &  
viri delicatiores, in vmbra, ocio, & effeminati) ad talia apta non sunt. Præterea consideranda sunt mem-  
bra patientia, nam aliqua habent rariores naturas, aliqua verò densiores: nonnulli sunt neruosi &  
stantes, & aliqua musculosi. Vnde necesse est distinguere membri compagine, & medicamenta permu-  
tare. Vnde Princeps ex sententia Gal. dicit: Et medicus tunc fit audaxior in administrando acetum, cū  
apostema est in membro carnosio: in neruoso verò cauere ab acetio est opus, ne eius complexio corrum-  
patur ex Hipp. Verum est, quod in tendonibus, & concatenationibus acetum vntur ex Gal. & Prin-  
cipe, vt dura, & vitiosa materia incidatur. Sed Auic. addit: Ex oportet, vt iterum alluicatio fiat in admi-  
nistratione acetii, vt non separetur subtile, & spissum induret: Ideo ponuntur administrationi eius inter  
pollutiones, in quibus est lenificatio. Verum oportet, dicit Auic. vt sit administratio acetii, & interomis-  
sio eius in medicinis in fine rei, & non in eius principio. nam tunc rarificat, & ampliat poros mem-  
bri densi. Gal. laudat acetum, & dicit, quod si quis eo moderatè, & secundum decens tempus  
vntur, iuuat has dispositiones, & dissoluit grossos humores: si verò immoderatus, vel non in tem-  
pore decenti, subtile resoluens, grossum definit dilapidari. Dicit Auer. Apostematata dura, quæ ex hu-  
more sunt grossa, debent emplastrari cum medicinis emollientibus, sicut cum medulla cruris arietis,  
aut vituli, cum modico ammoniaco &c. Ista & similia vtilia sunt, quia medicinæ multum resolutiuæ  
subtile resoluunt, & grossum petriunt: sed queritur hic compositio, in qua fine resolutiuæ, & præpa-  
ratius, eo quod omnes partes tumoris non recipiunt resolutionem æqualiter secundum vnum modum.  
Ex aliquando cum istis medicinis miscetur medicinæ fortis resolutionis, & melius omnium est acetii,  
quando cum istis temperatè miscetur. Dicit Gal. in tendonibus autem, & colligationibus in acer-  
rimo

10 primo aceto lapidem ignitum extingue. & si possibile esset habere lapidem piritem (i. marchesium, quem aliqui lapidem gagatem appellant, qui in magnis ciuitatibus rarus non est) hoc melius esset: si non autem, accipimus molarem, ex quo mola ad triticum frangendum conficitur, & ignitum in aceto infundimus, & locum durum euaporamus; deinde ad mollificationem pharmacum reuertitur. Aut cum lapis igne excanduerit, acerrimo aceto cum aspergere opus est, ac deinde super lapidem mouere partem affectam, vt ferè potius magicum, quam medicum opus, videretur.

Locus igitur durus sic fruetur, vt nihil de vaporazione lapidis perdat; & postea locum sabino, aut anetino oleo calido foueat. aut cum decoctione althææ, maluz, brancæ vrsinæ, cucumeris agrestis, ser tulæ campanæ, fenu græci, aneti comarum, &c. Et ideo dicebat Auic. cap. primo de curationibus bonis, ad illud est vaporatio ex lapidibus ignitis, scilicet molendini, & melius quo fit vaporatio ab eo cum aceto; & melior, à quo fit vaporatio, est marchesita. Et addit Auic. Oportet, vt ad hanc perueniatur summam in euaporando, & suffumigando, donec appareat sudor: & quandoque linitur cum marchesita trita cum aceto, & confert. Dicit Auic. quod Gal. laudat operationem marchesitæ, quando virtus acetii porrat æqualiter calorem in ipsum membrum, eo quod est in substantia ætæum, & digeritur materia dura à calore acetii æqualiter penetrante: sicut res, quæ maturantur in medio aeris, quæ æqualem recipiunt maturatioem: nec credit Auic. quod hæc operatio fiat ratione lapidis, nec ratione caloris impressi in lapide; nam valent lapides contriti, & duris apostematibus superpositi. Balnea cõmuni omnium opinione damnantur in hoc morbo; quia, vt memoriz mandauit Auicenna, resoluunt subtile, & aggregant spissum, & non perueniunt ad hunc finem, vt leniant spissum. Quod item nobis admonuit Paulus, dicens: À balneo in totum ipsis abstinentum est, aut saltem à frequentia balnea enim partes subtiliores humoris contenti digerunt per halitum; & quæ remanent, duriores, & re belliores sunt, vt monuit Galenus pluribus in locis. Nec de hoc est aliqua dubitatio.

Quarta intentio, scilicet corpus à noua ægritudine custodire, ob hoc in hoc loco proponitur; quoniam cum scyrrus generetur ab humore valde terrestri, & contumaci, earò fit, vt perueniatur ad totalem ipsius eradicationem: sed plerumq; inducias præbens denuò resurgit, atque vel in eadem parte, vel in diuersa, eundem, vel diuersum morbum prognerat. Vt igitur caueamus insidias huius humoris, atque offensiones ipsius obuidamus, perpetua cura adhibenda est, potissimum in sex rebus non naturalibus, vt ea oia fugiantur, quæ melancholicum humorem tum generare, tum gentium excitare possunt. Quæ autem hæc sint, iam diximus ab initio huius capituli, & inferius etià magis demonstrabuntur:

40 Quare tandem huic morbo finem imponamus.

De Cancro, seu Carcinomate.

Cap. III.



ANCA, siue carcinoma, aut (vt aliqui dicunt) carum, tumor est à bile atra genitus, teres, durus, mobilis, addens, lædens, habens radices apparentes, nigras, innexas membro, non totaliter à dolore priuatus, neq; à sensu expoliatus; cuius materia aut est talis per aduersionem cholerae, aut naturalis, cui admixta est bilis sua: non autem à pura feculenta. Hic tumor interdum fit incipiendo, aliquando verò ex alia in hanc permutatur ægritudoem: sæpè etià magnificatur, & nõ vlceraur, & dicitur cancer occultus; & cum vlceraur, manifestus cancer appellatur. Hic tumor dicitur cancer, propter similitudinem, quam habet cum cancro, animali maritimo, in tenacitate sua cum membro, sicut tenacitas cum eo, quod venatur, ac etiam in rotunditate: & venæ in eius circumferentia apparent, sicut apparent pedes cancri animalis in circuiui eius.

50 A cholera nigra due tumorum species generari solent, quarum vna dicitur scyrrus, altera verò cancer nuncupatur. Particulares equidem sunt hæc passi mes per comparisonem ad lepram, & elephantiasim. Sit nunc sermo de cancro, ad quem interdum sæua sequitur accidentia. Dicit Auic. assignando materialem causam istius tumoris, quod est apostema melancholicum ex melancholia aduulsa, à materia cholerica, aut in qua est materia cholerica, cum qua combusta est, non à pura feculenta. Ex hoc essentialiter differentiam demonstrare voluit inter cancerum, & scyrrum habet ei hereticos, & hoc mogena causa: & dicit, quod cancer fit à melancholia aduulsa, à materia cholerica, propter ea, quæ dicta fuerunt à Gal. nempe cum aduulsa fuerit materia cholerica, canceros operatur. Fit talis aduulsi, vt declarabat Auic. quando per vltiorem concoctionem, aut putrefactionem rubor cholerae partes subtile resoluuntur, & crassi remanent aduulsi, & incineratæ. Cinis iste, dicebat Auic. est melancholia, à materia cholerica. Et quia inter dum reperitur melancholia aduulsa ex facie sanguinis, seu melancholia naturalis; quæ, antequam aduratur, admiscetur cum cholera rubra, & simul aduritur; ideo dicitur princeps; Aut in qua est materia cholerica, admixta, cum qua, cholera combusta est (supple) naturalis melancholia, & non à pura feculenta, quia hæc est illa melancholia, quæ fit per aduersionem cholerae nigrae solius naturalis. De qua dicebat Gale. & Auicenna, quod si propiciatur in terram, facit eam ebullire, & fermentari, neque melle voluit eam gustare, sed fugiunt. A tali materia solet

De Tum. Melanch. Tract. 5.

H generari

7. coll. esp. 31.

7. l. 4. 19. de cura Scyrrus.

lib. 4. cap. 32.

2. ad Glenc. ca. 4. & 1. de complex. cap. 7.

3. l. 4. 19. de cura.

lib. de membr. cap. 8. & 1. de humor.

lib. de atra bile, ca. 3. & 4. Melanch. cap. 9. c. 1. princeps.

1. l. 1. c. d. humoribus.



generari durus tumor, cum quo nullum associatur acutum accedens: sed in cancro mala apparent accidentia, ut dicit Paulus, quia eius materia est sic admixta, aut adulla. Dicit Auic. loquendo de cancro non vicerato, inter quem, & scyrrum, difficile est differentiam ponere; nam differentia inter cancrum, & durum apostema existit per accidentia inseparabilia, & non per differentias substantiales: & ponit quinque media, quibus differt scirrhus à cancro, scilicet ab accidenti, à forma, ab origine, à sensu, & à loco.

Ab accidenti, quia in cancro repetitur aliquis dolor; & non solum dolor, sed acuitas, & pulsatio quædam, cum aliqui caliditate, & velocitate additionis: non coningunt huicmodi accidentia, dicit Auic. ob aliam causam, nisi propter multitudinem materiei, & inflammationem. Et propter illud, quod accidit in illa materia de ebullitione, cum ipsa venit ad membrum, propter admixtionem humoris calidi, & sicc. Dicebat Rasis; Est apostema acutum, & quandoq; incipiendo accidit, & quandoque post alia apostemata, quando indurantur. Signa eius sunt, quod incipit apostema simile avelanæ, & minus, deinde augmentatur secundum dies cum duritie vehementi, & tenebrositate in colore, & rotunditate in figura, & aliquantulo caliditatis in tactu; & quando incipit magnificari, apparent in eo venæ virides, & sunt ei radix, & penetratio in corpore.

A forma, dicit Auic. differt ab eo iterum per venas, quas mittit in circuitu suo ad membrum, in quo est, & sunt quasi pedes cancri, & non sunt ruber, sicut in phlegmone, imò declives ad nigredinem, & ossificationem, & viriditatem. Dicebat etiam Gal. Videntur venæ eorum locorum, ubi confederit hic talis humor, plenæ, atque tensæ sanguine corrupto, nigro, atque spisso, qui quorò nigrior, & spissior erit, tantò peior, periculosiorque credendus est, & grauior, atque insanabilior. Et in mamillis quidem sæpe vidimus cancro similem effigiem, atque formam, unde & nomen, & similitudinem accepit; nam sicut illi pedes, ita & huic protuberantiæ venæ ex utraque parte cernuntur; Et ideo hæc passio dicitur cancer propter similitudinem cum animali illo maritimo, qui cancer nominatur, ut docent Gal. & Paulus. Scribit rursus Gal. Impletur vena earum regionum, & tenduntur magis, quàm in phlegmonibus; minus enim egreditur à valis ad eam, quæ in circuitu carnem, propter grossitatem humoris, qui cancrum generat, at verò ruber non sunt, sicut phlegmonis venæ, sed secundum tristitiam humoris. Ratio verò, quare apparent illæ venæ in cancro, & non in scirrho, est quia ut plurimum cancri sunt incipiendo, & talis materia transmittitur per venas, quæ propter eius crassitatem pro parte ibi remanet; & cum ad minimas peruenit, incunetur, & incipit eleuare, & sic colorantur venæ, ut fuisse docuit nobis Gal. Præterea acuitas, & caliditas materiei, cum tali crassitie consculando, reddit venas, & arterias difficiles in suis operationibus, & mouentur cum difficultate ad sui refrigerium; ideo sentitur pulsatio, & venæ apparent protuberantiæ, & magis in cancro non vicerato, quàm in vicerato, cum pro parte hi mali succi in vicerato euacuantur.

Ab origine, dicebat Auic. etiam diuersificatur ab eo; quoniam plurimum aduentus cancri fit incipiendo, & duri fit permutando ex calido. Gal. dicit; Fit sequestrer scirrhus etiam ab indoctis medicis, qui non intelligendo, mox à principio vehementibus ea, quæ tali humore loca laborant, atque in tumescunt, diaforeticis cutaneis medicaminibus, sublataque humoris tenuitate, spissitudo, quæ remansit sæculenta, quasi in lapidem constringitur; sic erysipela, & phlegmon vertitur in scyrrhosum, si nimium stipicis, & frigidis à principio curentur perseveranter medicaminibus. Hoc etiam memorauit Gal. in lib. de tumoribus, & ad Glauconem, dicens; Moneo te, dum aliquid facis, diligenter quotidie attendas, ne locum nimium siccando, scyrrhosum inducas.

A sensu, dicit Princeps, etiam differt à sephitis, supple puro, quoniam est ei sensus, & duri non est sensus omnino. Gal. quoque ait; Dixi vnam passionem scirrhum, cui cum aliis accidentibus insensibilibus coexistit, alios autem tumores, quicunque nondum omnifariam sunt insensibiles, à medicis dupliciter esse vocatos, nempe vel scirrhos, propterea quod generis scirrhorum sunt, vel scirrhosos tumores. ¶ A loco, quia cancer ut plurimum accidit, dicebat Auic. in membris raris, & mollioribus. Galen. autem inquit, ut plurimum diffunditur aut in mamillis, aut in matrice, & dicitur cancer occultus, & maxime in mulieribus, in quibus non fit debita expurgatio. Et Paulus dicebat, quod in qualibet corporis parte oriri consuevit, sed præcipue in feminarum mammis, quoniam natura lungior, & inanes sunt, & venas vndique turgidas habent; & magis mulieribus, quàm viris, contingunt propter earum molliorem; & quia in eis multæ superfluitates superabundant; scirrhus verò in duris, & melancholicis corporibus. Declarat Auic. difficultatem cognitionis istius ægriitudinis in eius principio, & dicit; In primis, cum accidit, est occultæ dispositionis, & est tumor sicut faba parua, durus, fusci coloris, in quo est caliditas quædam, deinde apparent signa eius. Gal. qui omnia dixit, scribit; Symptomata istius passionis aliquando sunt adeo obrosa, & parua, quod multos latent; aliquando verò sunt adeo fortia, & magna, quod etiam pueris sunt nota; incipiente verò tali apostemate, latere decens est multos, quemadmodum & plantæ, quæ ex terra progrediuntur; etenim & hæc à foliis optimis agricolis dignoscuntur. Dicit Rasis; Hæc passio à principio est sicut cicer, & aliquando magnificatur ad modum melonis, & secundum quod tumor magnificatur, ostenduntur accidentia, quæ secundum materiei naturam, remissiora, & squiora sunt. Inter elementa enim ignis est actiuor, & mobilior, terra verò minus mo-

lib. 4. c. 16.  
s. 6. 1. cap. 1.

in diff. c. 11. 8.

s. ad Glaucon.  
d. 3. cap. 10.

s. Metho. c. 5.  
s. ad Glaucon.  
cap. de cancro.  
s. lib. de diff. m.  
dicit. li. 4. c. 16.  
s. lib. 6. c. 4. 1.  
lib. de tum. c. 8.

s. ad Glaucon.  
cap. pro 1.

s. ad Glaucon.  
14. Metho. d.

cap. 10.  
lib. 3. d. 3. c. 7.

14. Metho. c. 9.

s. ad Glaucon.  
idem & Cellus  
lib. 5.  
lib. 4. c. 3. & 6.  
cap. 15.

14. Metho. c. 9.

7. ad Alu. c. 5.

10

10

3

40

50

60



10. bilis; & minus acutus. Et hæc est ratio, quæ mox Auic. dicebat, quod quidam cancer est vehemens doloris, alius verò parui doloris, & quietus. Hæc accidentia humoris qualitatem sequuntur: nã mala species melancholice est illa, quæ fit per adustionem cholere: quod iam Gal. ostenderat, quando dixit, quod quando cholera citrina adurit, est malitiosa, mala, corrodens membra, in quibus aggregatur. Ad hanc sequuntur mala accidentia, quia adhuc tenet aliquod de caliditate, & siccitate. Alia verò melancholia fit per adustionem naturalis melancholie, & hæc propter eius naturam terrefcenti non adducit seu accidentia; & ideo Auic. dicebat: Alius perducit ad vicerationem, quando est ex melancholia, quæ est adustus sanguinis, aut cholere puræ solus: Alius verò est siccus, id est, ex humore melancholico, solo, & non viceratur. Hæc eademmet sententia est Gal. 5 lib. de tumoribus. Quod ad naturam autem peccantis melancholie sequitur diuersa accidentia, vide Principem cap. de signis quartanæ. Dicit Auic. Quandoque permutatur cancer viceratus ad non viceratum, quæ verba male sonant, nam sequeretur, quod eius esset cura: quod non conceditur, nec ab Hipp. nec à Paulo, nec à Gal. &c. nisi intelligamus sic, qui locus non viceratur fit aliquando viceratus propter causam corrodentem, acutam: sed si esset sermo talis: Et quandoque permutatur non viceratus ad viceratum, sententia esset clara; quia sequitur Auic. quod reducit eum viceratum curatio cum ferro, & tunc sunt labia grossiora, & duriora. Rasis dicit: Qui tale apostema ferit incidunt, non plus lucrantur, quàm quod cancrum viceratum faciunt. Et Alpharabius: Cum cancer inciditur, ait, fit vlcus mali coloris, per totum eius circuitum, cum grossitie, & mollitie deforis, & color est viridis, & dicit ex eo puerredine fetida, & quantò magis pertractatur, addit magis in malitiam. Vide Celium, vnde Albucasi dicebat: Cauendum ab eo cum curatione eius cum ferro, ut non viceretur. Et Rasis dicit: Si cancer viceratur, tunc vlcus est turpe, malum valde. habens labia rubra, & viridia, & inuerfa: ex quo currit sanies maligna fetida. Et rursus dicebat: Cancer deterior est, si viceratur: vlcus autem, quod in cancro fit, est tunc, labia habens grossa, & viridia, foris conuersa, quæ non sanantur. Sileant igitur, qui cancrum, tumorem acutum non esse, credere, & si eius materia frigida est, & sicca, ad quam non sequitur acuta accidentia. Diximus enim, quod duplex eius potest esse causa, vel sola atra bilis, & est tumor quietus: vel mixta, & tunc est acutus. Creditur Auic. cancrum fore tumorem acutum, quando breuiter differentiam inter cancrum, & duritiem posuisse videtur, ibi dicit: Durities, siue scirrhus, est apostema quietum, id est, de materia, quæ non permutatur de loco ad locum: cancer verò est mobilis, id est, permutabilis de membro ad membrum, ut sæpe visum est. Scirrhus verò est permanens in eodem statu, id est, in eadem quantitate: & cancer est addens, id est, multiplicans in quantitate. Et si scirrhus est fedatus, id est, non adducens sanæ accidentia, cancer est ledens, id est, maioris accidentium. Et si in duro tumore destruitur sensus, in cancro aliquis sensus reperitur, nisi membrum mortificetur. Et si scirrhus omnino priuatur dolore, cancer est dolorosus. Et hæc sunt inseparabilia simphomata, quæ necessario cum sua ægritudine adsunt, à quibus potest sumi differentia inter carcinoma, & scirrhum, non autem per differentias substantiales, id est, per causam materiem: quia ambo à bile atra producuntur.

De cura Canceri, seu Carcinomatis. Cap. IIII.



50. **D**IFFICILIS est talis ægritudo in sui principio quod ad cognitionem, & facili curæ; sed in eius statu facilis cognitionis, & impossibilis curæ, ut demonstratum est ab Hipp. à Cornelio, à Gal. à Paulo, ab Auenzoar, ab Albucasi, Rasi, & ab Aetio, quem vide tamen lib. 16. cap. 47. 48. 49. & 50. Ideo Auic. dicebat: Confirmatus verò cancer non sanatur, & subdit: Cum incipit, possibile est, ut prohibeatur additio super id, quod est, & præseruetur ab viceratione. Vnde credendum est, quod cancer potius indigeat cura præseruatiua, & paleatiua, quam sanatiua, vel curatiua. Est eo magis, si (ut dicit Rasis) cum eo fuerit caliditas, & pulsatio: Tunc enim oportet, ut blandiendo succurratur, ne viceretur. Est rursus; Postquam creuerit (ait) & ad sui peruenierit perfectionem, non est necesse, nisi ut ei blandientia adhibeantur, ne in ipso vlcus fiat. Cura igitur blandientia in talibus uti bonum est, victum talem insiliendo, qui virtutem non minuat, morboque suppetas non ferat, sed dolores, simphomataque sedet, atque corpus emolliat, ita ut causæ virtuti obnoxie, aut morbum fontes, non augeantur.

60. Dicebat Auic. Accidit in quibusdam horis, ut sanetur incipiens, confirmatus verò non. Hæc propositio duobus modis intelligi potest, scilicet: Accidit in quibusdam horis, id est, in quibusdam regionibus; aut membris; quia sunt aliqua membra, quæ secari possunt. Et sic erit cura, si cura dici potest, secundum quid, ut digitus, manus, pes amputetur: cui aspulatur Rasis in diuisionibus, & Princeps etiam narrat nonnulla membra, in quibus potest fieri sectio, veluti iam dicta; & multa, in quibus non potest, ut hepax, matrix, lien, &c. Vel potest dici: Accidit in quibusdam horis, id est, in principio morbi, quod tamen cum difficultate cognoscitur; & cum incipiunt, dicuntur cancri parui: vnde Auic. dicebat: Et fortasse (sunt) cancri parui sectionem: cum verò sunt magni, aut occulti, nullo modo sunt tangendi. Scripsit etiam Gal. Omnia insanabilia esse quæcumque a postrema à bile

1. f. 1. cap. de humoribus.

2. prognos. 31.

1. f. 4. tract. 5.

7. ad Alm. ca. 8.

In his præter lib. 3. cap. 16.

lib. 3. cap. 17.

Dicit cap. 18.

7. ad Alm. c. 9.

1. f. 1. cap. 5.

6. Aphor. 28. lib. 4. c. de Carcinomate.

14. Meth. c. 13.

Et 1. ad Gluc.

Et 1. c. 13. Et de veritate.

lib. 4. cap. 16. & lib. 4. c. 47.

lib. 2. cap. 27.

lib. 3. c. 17.

7. ad Alm. c. 9.

lib. 4. cap. 18.

1. f. 4. tract. 16.

Dicit cap. 18.

7. ad Alm. c. 8.

lib. de vera bile cap. 7.

- arra causantur, nisi quis vellet appellare sanationem, incisionem totius membri usque ad partem illam, 10  
 quæ sine passione sit. Et rursus ait; Causa quidem mox in principio à nobis cognita, medicamine, & ferro, curanda est, inueterata autem medicamine nullo, vel ferro scio aliquè potuisse sanari. Idem  
 voluerunt Paulus, Rasis, Aetius, Oribasius, & alij. Et magnus Albucasis dicebat; Quando cancer an-  
 tiquatur, & est magnus, non oportet, vt appropinques ei; ego enim non posui sanare ex eis aliquem,  
 neque vidi aliquem ante me, qui perueniret ad illud. Et reddentes rationem Paulus, & Aetius, di-  
 cunt, hoc malum planè propter succi crassitatem non confanescit, vt pote quod nec repelli, nec disci-  
 ti queat, nec totius corporis purgationi cedat, tanquam maleficium: vt mitiora negligens remedia, ve-  
 hementioribus irriteretur, exandescatque. Non quarratur igitur eorum cura, cum cura ægritudinum  
 sit eorum destructio, vt dicebat Gal. quod nil aliud est, quam suæ causæ ablatio. Et Aue. dicebat;  
 Cura ægritudinis est reductio eius qualitatis infirmæ ad temperiem, cum sanitas sit quedam symetria 20  
 ablatio verò causæ istius passionis magna cum difficultate admittitur, vt dicunt Auenzoar, & Galenam  
 medicinz resoluentes, & emollientes non operantur in grossa materia, sicut in subtili; nam si debiles  
 sunt, parum operantur: fortia verò repugnant, & partes tenues ex bile atra dissolunt, & non totum  
 vnde residuum permanens induratur, & id magis cum radices profundas usque ad intrinsecas membri  
 venas tenet, & sit impossibilis eius eradicatio: sed cum incipit, possibile est, vt sanetur. Senectutis est  
 Hipp. Cancros oculos omnes mellius esse non curare; curati enim cito pereunt, non curati verò lon-  
 gius tempus perdurant. Aue. in capite de cura cancri ait, hanc exponendo sententiam; Et multoties  
 quidem accidit cancer interius oculus; & est resectio in eo, vt dixit optimus Hipp. vt non mo-  
 ueatur; quoniam si mouetur, fortasse perducit ad mortem. & si dimittitur, & non curatur, fortasse  
 prolongatur spatium cum salute quadam: & propriè cum resectio eum cibi, qui generant materiam sal- 30  
 uam; vnde per cancerum oculum exponebat Princeps, cancerum in cauitatibus corporum, vt in iecore,  
 matrice, &c. Gal. verò aliam addit expositionem, & ait; Oculos cancos (dixit) vel eos, qui  
 sunt sine vlcratione, vel oculos, idest, non apparentes. Idem rursus scribit; Quando solus in prin-  
 cipio quidem tumorem operatur nigrum, tunc aut desinit in vocatum cancerum, quando acrior fuerit  
 & mordacior, corrosa cute: quando verò sobrior, sine vlcibus, operatur nominatum absconditum  
 cancerum. Et iterum; Aliquando oculus distenditur, aut in mamillis, & dicitur cancer, aut in mat-  
 rice, & dicitur oculus cancer. Sed magis credendum est, quòd cancer oculus sit cancer non vlcera-  
 tus; quia Gal. dixit; Si qua cura est, persequitur cum incisione, & vitione: quæ actiones in interioribus,  
 aut vlcero cancro minimè celebrari possunt. Et hanc expositionem laudat Aetius, vbi dicit; Dux autem  
 cancerum supremæ differentia sunt; nam quidam eorum vlceri carent, quidam exulcerantur: 40  
 qui vlceri carent, ab omnibus fere Antiquis oculi appellantur, præter Philoxenum, qui oculum  
 nominauit, si in vtero, aut iecore contingit. Sed quomodocumque sit, cancer cura palestina, & præ-  
 seruatiua potius, quam alia operatione, indigere videtur. Quod opinè declarauit Cornelius dicen-  
 do; Et quò maior vis adhuc est, eò magis quidam vbi sunt medicamenti adurentibus; quidam ferro  
 adulerunt; quidam scalpello exciderunt, neque vbi inquam medicina profecit, sed adula protinus cõ-  
 citata sunt, & inuenerunt, donec occiderent; Excisa etiam post induram cicatricem tamen reuertun-  
 tur, & causam mortis attulerunt: cum interim plerique nullam vim adhibendo, quæ tollere id ma-  
 lum tentent) sed imponendo tantum leuia medicamenta, quæ quasi blandiantur, quò minus ad vici-  
 mum senectutem perueniant, non prohibetur. Similiter Gal. ait, Multi medici magnæ auctoritatis,  
 neque hos manus opera curari permittunt, neque eos emolliri, & omnino abstinentium consilium: à re 50  
 medijs potentibus in omni natura cancri. Melius est igitur eos non curare, nisi penitus cum radice eos  
 euellere possimus. Et alibi prodidit; Vlceri, quæ contingunt ab atra bile, insanabilia sunt, cum nihil  
 differant à cancro vlcerato. Ideo dicebat Aue. Et fortasse fuerunt cancri parui fæctionem. nã si pos-  
 sibile est, vt destruaturn cum aliquo, tunc non est possibile, vt destruaturn, nisi per incisionem vehemen-  
 tem, vt ex toto assumatur membrum inuadens, quod est in circuitu eius, incidendo ipsum circundan-  
 tem apostema, eradicando omnes venas, quæ insidunt ipsum, ita ut non remaneat de eis aliquid, &  
 currat post eis sanguis plurimus. Et fortasse, dicebat Aue. Indiget post incisionem cauterio; quia in-  
 cidit in pluribus horis addit ei malitiam. Et fortasse erit in cauterio timor magnus, si apostema fuerit  
 propè membra principalia, aut nobilia. sed fac prius (dicebat ipse) antecedere corporis mundificatio-  
 nem, cum solutione ventris à materia mala, aut phlebotomia; deinde in regimine victus gubernetur bo- 60  
 no regimine. Idem docuit Galenus, dicens, Si demum tentabis quandoque per chyrurgiam sanare  
 cancerum, incipiens quidem bilem atram euacuare, circum abscondas omne certissimè quod patitur,  
 & nulla derelinquatur radix, & sine effundi sanguinem, & ne cito detineas, sed stringe eas venas, &  
 quæ in circuitu regiones, exprimes ab eis grossum sanguinem: demum cura similiter cum alijs vlceri-  
 bus. Sed alibi Galenus dicit, quòd hæ actiones periculum inferunt, & reos conficiunt medicos, si  
 hæc omnia non antea prædixerint ventura; Ideo in his passionibus prædictiones malè fiende sunt, etiã  
 quòd Celsus dicat; Non idem periculum carcinoma affert, nisi imprudencia curantis agitur est. In  
 omni igitur operatione considerandus est locus, vt docet Rasis, verum fuerit in loco preparato  
 abscessioni, secundum omne commodum. Item tempus, vtrum sit ægritudo noua, aut antiqua; r

40 non inueterata nullo modo curatur, præterea patientis ætas; nam in senectute difficilis, imò impossibilis, est cura; quoniam ut plurimum senes sunt melancholici. Et Gal. dicebat, quod senectus est mala complexio, frigida, & siccæ: Virtus verò infirmi, & qualitas accidentium semper sint præ oculis Medici. Sciat & Medicus, nunquid aggruendo sit reuerfura, aut permutetur in aliud membrum, si vnus absconditur, quod cognoscitur ex additione ægritudinis, & habitudine, ac corporis repletione. Dicebat Auic. in fine capitis de cura canceri, auctoritate Antiquorum, quod quidam Medicus incidit mamillam cancerosam radicitus, & cancerata est alia. Et addit Auic. hoc fuit, aut quia erat in via cancerandi, aut secundum semitam permutationis. Dicamus igitur, quid sit agendum pro eius præseruatione, ac de blanditiori cura sermonem faciamus. Dicit Gal. Oportet in principio eos purgari frequenter, purgatorijs vtique illis, quibus melancholicum propriè scis purgari humorem, ex quo (vt diximus) causa nascitur; Et scio id tam diu esse faciendum, quam diu minuetur causa, atq; purget. In traductione autem Leonicensi dicitur; Tam diu faciendum est, donec sanitas pristina subsequatur. Hanc euacuationem laudant omnes, quæ proficit, vt diximus in capite de cura scirrh. & de medicinis bonis laudatis a Gal. Paulo, Rasi, & Auic. est epithimum cum aqua calæ. Gal. & Auic. dant aureos quattuor epithimi cum aqua calæ, aut aqua mellis, & in corporibus torribus darieram ellebori. Paulus verò dat epithimum vsq; ad vnciam quatuor cum dimidia, sed est error forsitan impressiois, etiam quod in margine libri sit; Forè drachmis quattuor. Et Paulus dat ieram, quæ nigrum veratrum recipit. In vicijs verò ratione, dicit Gal. succus pulsanæ abundanter exhibendus, & secum lactis, & ex oleis multa, atriplex, & blitum; & quando tempus fuerit, cucurbitis vtendum, & piscibus petrosis, & volatilibus, exceptis palustribus. Et Auic. laudat aqua hordæ, pisces paruos, & vitella ouorum sorbilia. Sed in capite de cura scirrh. narrauimus præseruationem canceri per restitutionem cibarium laudabilius. Secio venæ laudatur à Gal. Paulo, & à Principe cap. de cura canceri. In mulieribus autem ante quinquagesimū annum, menstruari pro uocatione optima est; In viris autem, hæmorrhoidarum ex purgatio, conditionibus consentiendis. Nunc autem de localibus sit sermo. Dicebat Rasis; De foris autem non est spes in resolutione eius, Auic. verò ait; Per medicinas locales ad cancerum requiruntur quatuor intentiones. Prima, est destructio canceri penitus, & hæc difficilis est, de duobus modis potest perfici, aut incisio, vt dictum est, aut ire versus illud, in quo est resolutio eius, quod collectum est de materia mala, & expulso eius, quod præparatum est ad colligendum in membro de ea. Et si fuerit vehementis virtutis, & motionis, tunc dimittatur; nã illud, quod de medicinis forte est, addit cancro malignum. Et similiter oportet, vt alienetur in eis mordicatio; & propter illud sunt medicinæ bonæ, mineralia abluta, sicut tertia cum oleo rosato, &c. Dicit Gal. Post purgationem, cum apparer cancer, oportet intro expellere cum humorem, qui descendit ad particulam, & prohibere eos maior res augeri; sed huiusmodi esse oportet medicamentum, scilicet in virtute euaporante, & expellente, temperate tamen operationis. debilem. non operatur circa grossum humorem, & inobedientem; forte verò, aut mordens propter vehementiam actionis malam morigerationem inducit, & cancer siluestri sit. Igitur cōmoderatis virtute medicaminibus est opus. Et ibi laudat Gal. metallica lota, & vsta. Secunda intentio est, prohibito additioni. Dicebat Auic. Ad id verò, quod prohibet additionem, peruenitur cum abscessione materiei, & refectione cibi, & confortatione membri, & cum medicinis reperijs suis notis, & administratione linimentorum mineralium, sicut linimentum tricationis lapidis molendini, & lapidis corti, id est, molaris. Et debet accipi illa pars mole, quæ attenuata residet, in fundo in ipsa aqua, & conficiatur cum aliquo alio medicamento. Et in vncientis duæ tabule plumbeæ infusul, inter quas continet ponatur osolum rosatum. Aut ducatur rosaceum in plumbæ mortario cū simili pistello sub solaribus radijs, donec nigrescat, & spissum fiat. Aut lyargiri ducat, donec plumbi coloris æquet, vt Gal. docet. Aut ponitur, & tunc ut coriandri. Aut emplastre Incus cū coriandri decoctis in agresta. Dicit Gal. Facta euacuatione, patienti particule succus lolari imponatur; hæc medicamen ad huiusmodi vult est. Quod si non sit agrotans medicamento adeo humido illiniri, cum præsertim domo exit ad confucta negotia peragenda, medicamen ex pompholyge cōstans est imponendum, quod nos vidisti ad cañeros exulceratos. Et si hoc non adit, adhibe alterum medicamentum nostrum, quod ex calcite fit. In veteri traductione reperitur descriptio vnguenti diapompholygos, quod apud nos de uria dicitur, sed Lennæus eam non adduxit. Vnguentum ex calcite, siue diacalciteos, describitur à Gal. quod aliquando appellatur à Principe, & ab alijs vnguentum de calcadi, à Mesue vnguentum palmæ, vel diaphalma, ab aliquibus dyatinicæ, &c. Aut R. olei ros. omphacini violati, succi solatri an. j. pinguedinis viciuli, rassi, tute præparatæ an. s. xv. bulliant omnia vsq; ad aliqualem spissitudinem pro linimento. Aut R. pulueris coriandrorū, tuiar an. j. olei ros. omphacini, succi solatri an. s. deducantur in mortario plumbeo, & fiat linimentum. Valet cinis cancerorum fluuiialium cum coriandris, & cerussa cum rosaceo, aut cerussa cum oleo violaceo deducta in mortario plumbeo. Laudatur vnguentum de plumbæ, rosatum Mesue, cum pauco aceto. Et sic credendum est, quod prohibendo fluxum bilis atræ opus aliqua aliorum humorum admittance, fiat etiam præseruatio ab vlceratione. Et Auic. pro tertia intentione, quæ est prohibito vlcerationis, laudat linimenta, quæ conueniunt in se. Et dicit s. Et illa, quibus queritur prohibito vlcerationis, sunt linimenta prædicta ad prohibendum additionem, cum non fuerit in eis mordicatio, & cum rebus deductis in mortario plumbeo; & ibi

a. de can. sym-  
ptom. cap. 1.

Auic. Idem. 14.  
cancer. 31.

b. ad Glauc.

b. ad Glauc. c.

1. lib. 4. c. 36.

Duic. cap. 11.

3. f. q. tract. 2.

cap. 14.

14. Method.

1. ad Glaucon.

ubi de can. c. 11.

1. de comp. se-

cundum locos

multa acrim. 11.

16. cap. 49.

1. de med. per

gener. & cano-

nis.

1. de med. per

gener. & cano-

nis.

1. de med. per

gener. & cano-

nis.

laudat terram sigillatam, bolum armenum, oleum antiquum, quod a Gal. fabintum vocatur, aut succo solari, aut semperlium, cum cerussa, aut mucilaginem plij cum cerussa, & plumbo. Et hæc est compositio bona. Aut emplastrum ex cancri fluuialibus, & climia. Plumbum summè ab omnibus laudatur secundum omnem modum administrationis. Dicit Auerr. quodd si pissetur in mortario cum aliquibus liquoribus, aut oleis, vt rosaceum, refrigerat, & valet contra cancrum, & habet virtutem dissolutivam, comparando ipsum carni hominis; quamvis dominetur super ipsum frigiditas, & humiditas. Adiuuat huic operationi substantia quædam aërea, subtilis, quæ in eo reperitur, & ideo ferè omnes medicinæ ad cancrum consiuntur in mortario plumbeo. Dicebat Gal. Plumbum in frigiditate est potèntia, habet etiam non solum humidam substantiam multam, sed æream, & parum de terrefactitate participat. Pari modo iuuat metallica omnia lora, in quibus non est mordicatio, sicut plumbum, tutia, lythargium, cerussa, climia, antimonium, marchesia, &c. Sed plumbum (dicit ibi Gal.) valet saniosis viceribus, & càcrosis tumoribus. ipsum per se, aut mixtū cū alijs medicinis, sicut tutia, &c. Modū laudī metallicæ oīa docuit Gal. Specn. dixit, quod metallica prius abluantur, ne mordicerent; quia cancer pp qualitate malum, quā habet ab omni mordicatione malignatur, & citò corruptionem recipit. Notandum est, quod frigidæ medicinæ ab aliquali resolutione exsoluari non debent: Et sic præseruando càcros ab augmento, & corruptione, prolongabitur vita patientis, stando in bono regimine victus, & cōtinuis præparationibus. Addit Rasis; Non permittatur æger dormire super apostema, ne calefaciat ipsū, quia Facilit viceratur, & fit vlcus cacoehe, aut phagedenicum: quod, vt dicit Aetius, ab antiquis maleficum, & serum vocabatur, cancrum quidem, appellatione à cancro animali transumpta, cā. n. i. mala aspera sunt, & periaciter dura: Vnde postea refertur quarra intentio, quæ est, vicerum cancri gubernare, & ad hoc summè aduertendum est, quia ab vnaquaque causa irritantur, & malignantur loca cancrofa, & febres, & dolores. & mala alia symptomata operantur, quæ ægrum de facili ad mortē deducunt. Vnde, cum viceratur (dicebat Rasis, & Gal.) ad virulentiam, aut fordinem abstergendū absq̃ mordicatione solum attendendum est; Et ad hoc summè laudatur lotio aceti rosati, calidi; aut aqua maris, in qua sint codæ lentes, & cancri fluuiales; vt docet Gal. & in corum succo petia insula superponatur. Auic. iubet, vt absidetur pannus lini insusus in aqua solari super eum, & quoties exsiccat, madefat desuper cum dicta aqua; aut lauetur cum aqua agrimoniz, aut plantaginis, aut solari, aut succo pimpinellæ, aut dragumhe, quæ addo à Dioscoride laudatur, aut cum vino albo. Lac verò est mirabilissimæ operationis in cancro. Dicit Dioscorides; Lac generaliter sanat omnia vlcera, quia sedat dolores, & abstergit virulentiam, & valet per se, & cum alio medicamine. Gal. dicit; Manna orientalis mirabiliter præteruat, & curat cancrum.

Pulus bonæ opationis in cancro vicerato. R. Pulueris clororū fluuialitū in furno adustorū, radicū dragumhe exsiccatarū an. s. plūbi viti, tutiæ præparatæ an. s. vulueris lapidū molendini, aut molaris s. f. i. misce, & fiat puluis subtilissimus. Valet, dicit Auicenna sola, aut abluta cō aqua portulacæ. Aut R. f. i. næ tritici, olibanī, cerussæ de plumbo an. s. i. terræ sigillæ, & boli armeni, aloes ablutī an. s. i. i. omnium fiat puluis sicut alcohol, & vetur in cancro vicerato. Aut cum oleo rosato, & succo serpentariæ fiat emplastrum in tumore cancroso. Vel, postquam vlcus fuerit cum aliquo absterfio mundificatum, & cum bō bace siccatum, præparatis elichnijs ex filis nividis ad formam, & quantitatē viceris, super eis extendatur vnguentum diapompholigos, aut pompholigos vel, vt dicimus, de tutia, quod ab omnibus laudatur, & valet: quod recipit ex Gal. puluerem plumbi viti loti, pompholigos, olibanī an. s. i. abinthij s. i. ceræ s. xv. olei rosati s. vj. succi fructus, vni lupinæ, quod sufficit, & vt mos est, fiat vnguentum. Alia descriptio modernorum. R. olei rosati s. x. ceræ albæ s. v. succi granorum solari s. viij. cerussæ lotæ s. iij. plumbi viti, tutiæ an. s. i. i. thuris s. i. puluerizentur, quæ sunt puluerizanda, sicut alcohol, post hæc coqui succum solari cum oleo rosato, vsque ad consumptionem succi, tunc adde eorum cum puluere, & fac inde vnguentum in mortario plumbeo. Emplastrum ex pompholigo Pauli, quod pompholygeron appellatur. pompholigos s. i. j. argenti spumæ s. i. j. leigantur cum succo sem. lini, & adde ceræ s. vj. ad pri asferini, vel gallinæci s. i. j. chamomelini s. vj. vt verò annorauit doctissimus Manardus, oleum debet esse ex floribus chamomeli. Aliud diapompholigos Archi. spumæ argenti cerussæ an. s. i. j. pompholigos, croci, adipis anferis an. s. i. iij. ouorū assatorū, m. a. vini amig, olei ros. an. q. s. Aut vere vnguentum de ce rulla Pauli, quod recipit ceræ trita s. vj. tofaci sex quilibran, argenti spumæ s. i. j. cerussæ rancundem, amili s. i. iij. ouotū quinque quata. Alterū de cerussa Rasis. R. olei rosati s. xx. cerussæ bonæ s. x. ceræ albæ s. vj. camphur s. x. vj. fiat vnguentum secundum artem. Aut vere vnguentum de plumbo. R. plumbi viti loti, lythargij an. s. i. j. cerussæ, antimonij an. s. i. j. olei rosati q. s. pro vnguento. Aliud vnguentū de plumbo. R. antimonij, cerussæ lotæ, lythargij loti, gallarum, sarcocollæ, aluminis combusti, corticum thuris, eris vti an. s. i. j. tutiæ præparatæ, plumbi viti an. vnc. ij. facis olei antiqui lib. 4. ceræ albæ lib. 1. misce, & consociatur vnguentum in mortario plumbeo, bene ducto in Sole tribus diebus. Aut vere vnguentum de cancri fluuialibus Archigeni: de cineribus cancrorum fluuialium recentium vnc. ij. cili mæ auri, plumbi viti an. vnc. s. ceræ, succi solari an. q. s. Laudatur ab antiquis vnguentum diacalcit eois, quod a Paulo in suo Antidotario palmulacum phonicne dicitur, & Principe vnguentum de calcaitis, & Mesue palmæum; Et loco palmæ, quā non habemus, vtimur radicibus canne. Huius medicamēti

10 descriptionem ponam in Antidotario. Medicamentum, quo utor, R. olei lilliorū alborum, succi agri-  
monie, cere albe an. vnc. j. ponantur in caciola ad lentum ignem, donec liqueat cera; deinde adde  
cerullā, camphur, rutie preparatę an. vnc. j. misce, & fiat vnguentum. Aliud Rafis, R. cerullę, rutie  
lorę an. partes æquales, terantur cum succo folatri, & fiat vnguentū. Aur R. succi  
ci hiosciiani, pimpinellę an. vnc. ij. pulueris florum hypericofis, aloes hepatici an. vnc. s. vnguenti de ru-  
tia, rosati Mesue, an. vnc. s. olei rosati omphacini, misce, & fiat vnguentum. Aur R. spumę auri, vnc. ij.  
cerullę vnc. ij. pulueris ciccorum fluuiialium vnc. j. corallorum alborum, & rubr. an. 3. iij. rutie præpa-  
ratę vnc. iij. camphurę vnc. s. sepi hircini, olei omphacini an. vnc. vj. cere albe, quod sufficit, fiat vn-  
guentum in bona forma. super verò omnia medicamenta teneatur lamina plumbi subtilis, quę ample-  
ctatur totam duritiem, vt iubet Dioscorides, & hæc ad laudem omnipotentis Dei dicta sint.

De Inflationibus, siue flatuosis tumoribus. Cap. V.



10 **I**NFLATIONES ventosus, quem Græci emphisema vocant, ex flatuoso spiritu in aliquo  
sini collecto nascitur, vt docent Gal. & Paulus, & Acrius, aliis sub cute, al iis sub  
membranis, quę ossibus circumdantur, aut muscularis, viscerum ve aliquibus, inclu-  
duntur aliquando in ventre, & intestinis, itemq; in medio horum spatio, & mem-  
branę, quę peritonęos dicitur. Dicebat Auic, de apostematibus ventosis aliud  
est, quod sit a vapore leui, mixto ex subtili humore, & venositatē aliqua, & simi-  
larū situationi, aut excitationi, & dematis, & curru cursu eius & aliud est, quod  
fit a vapore venoso, & nominatur inflatio. Star igitur hæc passio sub duplici differentia; nam interdū  
causa materialis est sola ventositas, & aliquando admixta cum subtili pituita. Et hic tumor, cum sit ra-  
lis, differt ab emate, dicit Gal. quia prellus digito vestigium non retinet, & sonum, veluti tympanū,  
reddit. Ex Auic. dicebat, quod differunt ratione causę materialis, & commitionis; & cognoscitur di-  
uerfitas harum passionum, nam in vndimia, non sic prohibitio compressions digiti, sicut fit in eleuatio-  
ne, dicit Auic. capite de apostematibus ventosis. est impulsio, & vicissitudinaria accessio; & fortasse  
percutit percussione manus, & proprię quando inuenis spatium, ad quod aggregatur, sicut stomachus,  
& intestina. Hic tumor interdum est dolorosus, aliquando priuatus dolore. Talis vero dolor aliquan-  
do fit propter multam materiam extendentem, & continuū soluentem, vt docet Auic. aliquando vero,  
etiam quod pauca sit, quia in membro valde sensibili est, causat dolorem; quod etiam contingit fe-  
40 cundum diuerfitatem euaporationis: Dicebat Gal. speciem euaporationis alia est, quę est humida  
in vitriuo, & alia est, quę est sicca in vitriuo, & alia, quę est commixta, & alia, quę non mordicat, & alia  
mordicativa; Mordicat, ne cum nullam habet transpirationem, Et hoc euenit, dicebat Auic. propter  
duas causas, prima propter spissitudinem; aut propter grossitudinem suam; secunda est spissitudo mi-  
brorum cum continentium propter constrictionem potiorum, vt etiam docet Gal. Flatos verò, seu v-  
tositas generatur, vt docet Gal. & Paulus, dum pieuita liquefit, atque dissoluitur, vel talia cibaria; &  
causa, modicus est calor. Et iterum dicit, Spiritum autem vaporosum dicimus in animalium corporib;  
ex humoribus debilitate exaltatis nasci; nam vbi quidem fortis est innatus calor, humiditas particulę  
digeritur finaliter, & vapor subtilis secundum inuoluntariam transpirationem desiliit in altem nos con-  
tinentem; vbi autem innatus calor imbecillior est, aut quod secundum naturam humidum est, & semi-  
50 digestum, & viscosum, & grossum, in vapore conuertitur, cum transpirare non possit, ac porissimū  
sicubi particula ipsa densior est reddita: nonnōquam verò humor, qui in membro continetur, subfrigi-  
dus est, & crassus, & glutinosus, auctior vero calor in halitum eos crassos resoluit; quę res profectō,  
dicebat Gal. magnopere tibi ad curationem estimanda, discernendaq; est. alibi dicitur. Neque in humi-  
da substantia in statuolum aqum sine calore aliquo potest transmutari. Dicebat Aristoteles; Flatos ge-  
neratur ex resolutione subtilium partium substantię frigide, & humide, agente calore dimouit; Cum  
enim ex baluoso spiritu aliquo in membro sit congeries, dimensio quedam non naturalis causatur; &  
fit tumor, seu inflatio turgida, aut clara, resistens tactui, cum quadam luciditate, sonans, dum percutit;  
cum multa fuerit materia, & interdum cum extensiuo dolore; vnde ferē iudicatur ibi sanies reperiri.  
Ex idē Gal. & Auic. dicunt; Et quandoq; existimatur, quod super membrum, sicut genū, fit apostema  
indignens perforationē, quare perforatur. & egreditur ventositas tantum. Innumda interdum talis fla-  
tus in membro, ac si ibi sanies reperiretur, & magis in concatenationibus; Cautē igitur ibi procedatur,  
quia cum difficultate cognoscitur hæc dispositio, Dicit Rafis, quod aliquando tale apostema trans-  
feratur de membro ad membrum, & de loco ad locum, & sæpē assumitur exituris, & inciditur, & non e-  
xit nisi ventus. Et Albucasis, dum status permittitur de loco ad locum, appellat ægritudinem naxis, &  
ibi docet modū curandi.

C V R A.

Flatuosa dispositio, aut est in inferiori ventre, quam Medici tympanum appellant, aut in aliquo par-  
ticulari membrum, quare passio inflatio, siue flatuosis tumor, oncupatur. De prima non fit hic ser-  
mo, de secunda dicamus cum Gal. quod aut corpus plenum est, aut non ita dispositum. si primo modo,

De Tum. Melanch. Tract. 5. H 4 com

14. Metho. cap. 7. & 1. ad Glau-  
conem, cap. de  
sine indur.  
lib. 4. cap. 18.  
lib. 15. cap. 2.  
3. f. 4. a. 18. 2.

3. f. 1. cap. 6.  
3. f. 1. 4. cap. de  
vndimia.

3. f. 1. d. 3. sum.  
3. cap. 6.

3. ad Glau. 2.  
3. cap. 4.

3. de sympho.  
cap. 3. lib. 3.  
cap. 38.  
14. Metho. de  
7.

3. f. 14

3. & 4. lib. Ma-  
theoreum.

4. regim. nut.  
com. 19. ca. de  
apost. vnto. 14.  
14. Comin.  
lib. 1. cap. 55.







De Tumore aquoso. Cap. VI.



**H**YDROPS, non naturalis, cuius materia est aqua, aut subtile phlegma, est ex his, quæ raro contingunt, & maxime in alijs corporis partibus, quam in capitibus puerorum (Hydrocephalon vocant.) vel in inferiori ventre, quam passionem Medici ascitem appellant, aut in regione testium, quam Hydrocelem, vel aquosam ramicem, aut herniam vocant. Ideo Avic. de aquosis, non nisi hæc tria genera, enu-  
merauit, dicens; Aquosa autem apostemata sunt sicut hydrops, hernia aquosa, & aqua  
in capitibus puerorum. Verum autem est, quod hæc in nostra ætate aliqui tumores in

3. l. 1. 40. 8.

30 patientibus morbum Gallicum reperiuntur, ex quibus cultello sectis, non exit nisi aqua, seu valde tenuis pituita, & præcipue cum coaceruantur in regione iuncturarum, aut in panniculis ossa cooperientibus, aut in aliquo membro, qui de sui natura sapit naturam frigiditatis. Possuntque hi tumores reponi in capitulo de aquoso apostemate, sed alia indiget cura. Illi tumores autem non enumerantur inter humores, & generantur per viam deluxus; Flegma enim subtile multoties descendit in rehumatissimis, & priuantur dolore, nam tumor est tactu mollis, concolor, turgidus, & digitis prementibus subdens facile cedit, & rursus assurgit.

C V R A.

30 Cum ex toto hæc humiditas est præter naturam, & aliquo in sinu coniungitur, necessario eget euacuatione, nec sperandum est, vt resoluentibus medicinis euacuari possit, cum attenuationi apta non sit: nec querendum est, vt ad suppurationem perducatur, cum calefactioni rebellis sit. sed quomodo curaque sit, loci sectionem requirit, nisi aliqua fuerit causa impediens. Cum igitur ad incisionem se conferat Medicus, ea seruet, quæ à nobis dicta sunt, vbi de modo aperiendi abscessus disputauimus. Euacuata materia, locus digeratur cum vnguento ethiæco, postea mundificetur cum iside, vltimo incarnetur cum citrino, & basilicone. Et nota, quod post incisionem, si non timueris sanguinis hæmorrhagiam, bonum est tali vti cathaplasmate ad loci refectionem. R. chamomilla, melliloti, stachadis an. m. j. foliorum, & granorum mirthi, rosarum, farinæ fabarum, hordei, nucum cipressi an. m. s. vini nigri optimi q. s. fiat emplastrum secundum artem. Aut decoquantur omnia in lixiuo, & cum spongia laia fiat somentum.

40 Si verò sinus, aut concauitas remanserit, ut in his passionibus contingere solet, locus abstergatur, nam à dispositione huiusmodi humiditatis quandam intemperiem acquirit sinus: ideo lotionibus, & decoctis talis regatur locus, vt puta cum decocto centauris, aut luxiuij, vel aquæ maris cum egiptiaco. Aut

R. centaureæ maioris partem. j. minoris partem. s. mali corij, symphitidis, balaustrarum an. m. s.

decoquantur in vino nigro, vsque ad consumptionem tertie partis, & adde mellis crudi vnc. ij. ziniar. 3. ij. coletur, & vtere locum lauando. Deinde per aliquos dies tali vnguento regatur.

R. vnguenti citrini, apostolorum, an. vnc. j. Egyptiaci vnc. s.

miscet, & vtere. Si verò cognoueris, quod succus talis ex hepatis intemperie

prouenit, cum continuè producitur, & vicinis humidum apparcat,

ad hepatis correctionem deuenire oportet, exhibendo patienti

30 3. j. reupontici in mane cum vino, aut aqua hepaticæ, pul-

uerizati; vt feci cuidam iuueni, qui passus erat per

annum vicus ex tali suppurato tumore, & cum

D. i. auxilio, qui semper sit benedictus,

sanatus est.



## De Excreſcentijs.

## De Polypo. Cap. I.

3. localis. c. 3.  
lib. 6. cap. 3. r.  
lib. 6. cap. 91.  
lib. 6. cap. 8.  
Diuſ. cap. 14.

3. localis med.



5. l. 3. m. a. c. 3.

3. Cauda. 1.

a. 8. morbis. 10.  
de Polypo.

5. f. 3.

1. 1. f. cap. 3.

ad Alim. 39.

**N**ares excreſcentias enumerat Polypus, auctore Gal. Actio, & Celſo, & eſt tu-  
mor præter naturam in naribus oboriens, prohibens anhelitum, & implens canna-  
naſi. Dicebat Raſis; Quandoq; naſcitur in naſo caro mala, opilans locum anhel-  
itus, & implens cannam naſi, ita vt videatur in ipſo groſſities exterius. Et Gal. dice-  
bat; Tumor præter naturam eſt Polypus in naribus ſiens, aſſimilatus ſibi proprietate  
ſubſtantie carnis polipodis, quod eſt animal habens multos pedes. Et Paulus di-  
cebat; Ex marini polypodis ſimilitudine nomē ſortitus eſt, ſu- q; illius carnē rappre-  
ſentet, tum q; ſuo complexu, quemadmodū ille captantes, viciſcitur, nares ipſorū comprehendens; ita  
30 & vitium hoc laborantium nares obſtruit, id efficiens, vt diſſiciliter reſpirent, & ſermonem ægrè expri-  
mant. Gal. cauſam materialem reddere volens, dicit; Maniſteſtum igitur eſt, quoniam craſſorum, &  
viſcoſorum humorum eſt germen hæc paſſio. Formalem autem ait; Fiuſt excretiones, quando natu-  
ra impetum faciens ad optentatū auxilium, non fuit comoderatione dominata. Sunt (dicunt Medi-  
dici) humores, hanc procreantes paſſionem, adeo craſſi, quōd interdum ſiunt melancholici, & paſſio  
ſit cancroſa: Vnde Auic. dicebat, quōd iſte carnes additæ, quandoq; ſiunt molles, albæ, & ſiunt à pi-  
tuita, & non eſt in eis dolor, & ſunt facilis curæ: Et quandoq; ſiunt rubræ, vehementius do-  
40 loris, & ſunt diſſicilis curæ: præcipue cum ex eis currit foetida ſanies: & quandoq; eſt ex eis illud, quod  
eſt cancer, corruptens figuram naſi, & dolorem faciens cum extenſione ſua vehemēti. Et ille eſt fuſ-  
ci coloris, & cura talis eſt blandimentum ſine inſiſſione, & talis paſſio enumeratur inter melancholici-  
cas à Principe. Diuerſas formas iſtius excreſcentie aſſignabat Hipp. dicens; Si Polypus in narib. fiat,  
media cartilagine, tanquam vna hæret: quæ, cum ſpirat, exit, molliſq; eſt; cum reſpirat, regreditur, lo-  
quiturq; patiens non clare: cumq; dormit, ſterit. Polypus alius, caruncula, vel caruncule naſum com-  
plètes, quæ ſi tangantur, duræ ſiunt, ſpiratq; non permittunt per naſum. Polypus verò alius, caruncu-  
la eſt rotunda, tactu molliſ in naſo cartilagini hæret. Polypus alius, durum tuberculum in naſo, ſecun-  
dum cartilaginem, aliqua de cauſa gignitur, quod caro videtur, quam ſi tangas, vt lapillus, ſonat. Po-  
lypus alius eſt quid cancello ſimile cartilaginis ſumma parte, & ex obliquo naſcens. Cognoscitur (di-  
cebat Auic.) hæmorois, ſeu Polypus bonæ naturæ à cancroſo, ratione originis: quoniam caro nara ſi eſt  
poſt ægritudines in capite, & catharras, eſt hæmorois. & ſi non eſt ſecundum illud, imò accidet poſt  
claritatem naſi, & priuationem curſus, eſt cancer; & propriè ſi fuerit ante aduentum eius in cerebro  
ægritudines melancholicæ, & fuerit principium eius, ſicut cicer, aut auellana, & incæperit augmentari,  
& acciderit palato durities, & vt plurimum ab eo non currit ſanies: ſed Polypus quandoq; adeo elon-  
gatur, quōd ex naſo egreditur. Et Celſus dicebat; Polypus eſt caruncula, modò alba, modò ſubru-  
bra, quæ narium oſi inhareret, & modò ad labra pendens narem implet, modò retro per id foramen,  
quo ſpiritus à naribus ad fauces deſcendit, adeo increſcit, vt poſt vnam conſpici poſſit, ſtrangulatq;  
hominem, maximè aſtro, aut euro ſtante, ſereque molliſ eſt, raroq; dura, eaq; magis ſpiritus im-  
pedi- & nares dilatat. Multoties etiam poſt ægritudines capitis præcipitantur catharræ ad nares, qui ſua  
acuitate exulcerant, & ſit vlcus, quod ex continua narium humiditate ſit rebellis, & caro in eo vlcere  
a- igitur, quæ molliſ eſt, ad modum mori, & talis eſt coloris rubei, ſine dolore, & exſiccatur fa-  
ci- iter à quocunq; medicamine ſiccò. Interdum etiam oritur tumor albus, & molliſ ſine dolore, q; quodam  
tenui panniculo includi videtur, & cum partes aliquæ reſoluuntur, magis craſſe indurata remanēt,  
& ſit caruncula dura, penſilis; quæ, niſi malo regimine tractetur, nullum inſert periculum. Multo-  
tiens (dicit Raſis) à bile atra poſt melancholicas diſpoſitiones cauſatur tumor præter naturam in caui-  
taribus naſi, coloris fuſci, doloroſus, ſiccus, qui, dum malignatur, eſt de genere carcinomatis, & ſe-  
ua ſecum adducit accidentia.

De cura polypi. Cap. II.



**D**IVERSAE operationes requiruntur in cura istius passionis; quia (vt docet Hipp. Celsus, & Gal.) secundum huius passionis diuersitatem diuersificantur operationes. Dicebat Gal. Cura communis ozenis, & polypo sit primò, quæ ficcant, & corroborant caput; quoniam manifestum est, propter abundantiam prauorum humorum insili naribus ex eo. Est igitur prima intentio, caput confortare, & eius superfluitates excicare. Et si peccauerit sanguis, sphlebothomia laudatur. Ait Rasis; Cum polypus rubeus est, cephalica prius erit phlebothomanda: si verò pituitosa peccauerit, materia in ipso capite (quod cognoscitur ex signis proprijs) euacuatur, aut purgetur cū caput purgij, & pharmaci educentibus materijs crassas; & agaricus est de bonis medicinis. Laudantur pillulæ scitidæ, de hermodactilis, de hyera, de agarico, & de euforbio. Aut R. agarici troc. ʒ. iij. mirobal. citrin. chebul. an. ʒ. ij. stechadis ʒ. s. pillularum alephanginarum ʒ. iij. masliches, oliban, draganthi, gummi arabici, an. ʒ. s. ligni aloes ʒ. j. diagridij ʒ. s. reformentur pillulæ tres pro ʒ. cum syrup. de stechade, & deaurentur, accipianturq; per horas duas post cenam vnaquæ hebdomoda. Et si materia indigerit præparatione. fiat cum syrupo de stechade, rosato, &c. Stet patiens in bono regimine, omnia caput replentia euitando, & mali status, & cruda, ac frigida. Postea deueniendum est ad rei pternaturalis ablationem. Dicit Gal. vbi de morbo secundum numerum agit; Quibus superabundat caro, hæc refecare oportet, aut ferro, aut igne, aut medicamine, quod vrendi vim habeat. Sed aduerte, quòd illa dispositio, quæ sapit naturam cancri, non tractatur, vt docet Auic. nisi blandimento, sine incisione, & ratione. Dicebat Celsus; Quæ ferè carcinodes est, attingi non debet. Et Paulus ait; Duri igitur polypi, tactui renitentes, liuidi, & maligni, ceu cancri naturam inducentes, attingi non debent. Idem dicit Albucasis. Hoc præcipit Auenzoar, Auerroes, Rasis, & omnes. Dicebat Rasis; Hæc præterea passio quandoque cum ferro curatur, radicitus omnino incidendo; & Medici quandoq; in hoc errant; nam ex eorum cura æger maximum incurrit periculum; in hoc namq; loco cancer plerumq; exorditur. Verum cancer quando in hoc nascitur loco, neq; acutus tolerat medicinas, neq; incisionem, q̄ sit cum ferro: imò indiget, vt suauiter tractetur, & medicaminibus lenientibus, & phlebothomia, & ventris solutione curetur. De tali regimine dixi, vbi de carcinomate. Polypus autem, qui non sapit naturam cancri, alter quidem curatur, vt dicit Gal. eò quia passio sit à malis humoribus, propter hoc permittitur medicinis, hæc quidem, vt stipicer, hæc, vt incidat, & subtilis, hæc autem vt diaforet, & ficcet. Quidam igitur his medicinis caritur. Alter verò indiget manuali opere, vt docent Hipp. Celsus, Paulus, Albucasis, & Auic. Hipp. dicebat; Aliquando in naso reperiuntur carunculae, i. carnes additæ, quæ duræ sunt, & non permittunt spīrare; quæ cum sic se habent, extra ducantur, & incidantur; deinde de fistula intro data, candentibus ferramentis tribus, quatuorue vīto, deinde cura vlcærum curato: Princeps verò in principio cap. de cura Polypi dicebat; Quicunq; illorum sunt ex diuisione prima, inciduntur cum cultello paruo, deinde raduntur cum rasorio multum. Polypus verò primæ diuisionis erat caro addita, alba, mollis, sine dolore. Et cum polypus rubeus est, secundæ diuisionis, aut fusci coloris, vehementis doloris, melius est vt coquatur aut igne, aut cauterio paruo, subtili, & incidatur cū rasorio, extrahendo quod in naso est ex additionibus, & superfluitatibus. Polypus verò, qui est tuberculus, apud cartilaginem generatus, magnus, durus, & sonat vt lapillus; cū sic se habet, dicebant Hippoc. & Celsus, nam ex ea parte secato, purgato, & superurito; deinde narem consueto, vlcusq; curato. Dicit Celsus; Cum polypus ferro curatur, adhibere diligentiam oportet, ne infra cartilago lædatur, in qua difficilis curatio est: sed curatur ferramento acuto in modum spathe facto. Vbi verò abscissus est, vñco ferramento extrahendus est; Deinde linimento, aut alio medicamento, quo sanguis suppressumatur, vtendum est, eoq; narcs leniter implendæ. Sanguine suppresso, vulnus purgandum est; deniq; cicatrix inducat, & ex toto sanescat. Dicebat Auic. Caro addita, dura, rectius est, vt curetur cura manus, & illud quiddē post diminutionē repletionis à corpore, & capite. Instrumēta verò p tali operatione sunt diuersa; nam quandoque est sicut rasorium ad formam lunæ, aliquando sicut embula, interdum ad modū spatulæ parui, de quibus omnibus suo loco fusè loquemur, quemadmodū & alibi polliciti sumus. Dicit Albucasis (& est modus acceptus à Paulo de verbo ad verbum) Cū vis curare carnem lenē, non fraudulentem, neq; cancerosam, oportet vt facias federe infirmum inter manus tuas, oppositū soli, & aperi narcs eius, & projice vñcum in illas carnes; deinde trahæ eas ad exteriora, & incide, quod comprehendisti ex eis cum spatulamine subtili, acuto à parte vna, donec scias, quòd caro tota iam ablata est; Quòd si remaneret aliquid ex ea, cuius abscissio non est possibilis, tunc rade illud cum vno instrumentorum subeili cum facilitate, donec non remaneat ex eo aliquid. Si autem sanguis tibi dominetur, præcepto Pauli, Auic. & omnium, impone spongiam, aceto, & aqua insulam, & liniatur nasos aqua frigida, & luto, aut sanguine draconis, vel intromittatur tenta ex lana adusta, & calcantho nostro, aut aduratur. Si autem acciderit apostema calidum, oppone ei, per id, quod conuenit, deinde cura vlcus. Paulus verò dicebat; Malignos, & peruicaces polypos candentibus ferramentis adurere, consiliū ē,

a. de morbia.  
lib. 6. cap. 8.  
g. localis, quæ  
in loco.

9. ad Alm. c. 39.

De his a. ut  
mod.

p. ut. mod. cap.  
p.

p. c. p. v. a. a.  
lib. 6. cap. 17.

lib. 1. cap. 24.  
p. ad Alm.

1. locum. ca.  
de Polypo.

a. de morbia.  
lib. 7. cap. 10.  
lib. 6. cap. 17.  
lib. 1. cap. 14.  
p. c. p.

lib. 7. cap. 10.

lib. 1. cap. 24.  
lib. 6. cap. 17.

inde remedijs vñioni dicatis vti. Et credo, q̄ hac sit vera via curãdi hãc pãssione; nec tũc de accidentib. 10  
aut sanguine timendũ est. Alterũ modũ remouedi hãc superflua carnẽ docet Hipp. Paul. Albuc. & Auic.  
administrando filum in modum ferrẽ; qui modus difficilis est, nec alicui Medico hoc facere vidi. Et  
lib. 7. cap. 11.  
Celsus dicit, quod si hac pãssio medicinis non curatur, quemadmodum manu curandum esset, apud  
magnos Chyrurgos non reperi, credo quia rarò ad sanitatem res satis perficitur, cum aliquod ad ipsam  
curacionem tormenti habeat. Et verè loquebatur Celsus de hac operatione; de qua dicit Auic. Modus  
est, vt sumantur fila ex capillis, aut feta, & ligentur ita, vt ligatura illa fiat, sicut terra habens dentes.  
Hipp. verò laudat filum egipetum, durum. Et Albucasis dicit, quod debet esse filum lini, cui aliqua  
grossitudo, & noda in eo nodos multos, & pone inter omnem nodum quantitatem digiti, aut minimi.  
Dequitur Auic. Et immittatur in acu de plumbo, incuruata, innotmittendo per nasum, donec egrediatur  
ad palatum; deinde ferretur cum ea teludum carnis, extrahendo eam ex duobus lateribus, sicut fit cũ  
ferra. Deinde accipe embulam ex plumbo, aut ex penna, & volue super eam pannum, & pulueriza su-  
per eam medicinas de cartis, aut andarõn; & penna remaneat in naso, vt locus anhelitus stet apertus.  
Hipp. dicebat; Cum sanguis amplius non manabit, linimentum ex melle, & flore æris ponas in naso;  
Cumq; vulnus iam coalescit, plũbeam lamellam, melle tinctam, donec sanescat, super vlcus teneto.  
Post omnem operationem (dicebat Auic.) sternuteri patiens, vt destruatúr omnis putredo. Dicebat  
Albucasis; Administra ferraturam carnis cum nodis, qui sunt in filo, & fac illud, donec scias amputatã  
esse carnem; Deinde extrahere filum, & pone in nasum post sanguinis absterisionem ellichnium, qđ imbi-  
bisti in vnguento ægyptiaco, & fac illud tribus diebus, aut plus, donec vnguentum corrodatur totum, qđ  
remaneat ex carnib. Deinde pone in fine rei in nasum canulam de plũbo diebus aliquot, donec sanetur.

Rarò equidem his medijs curatur hac pãssio, sed benè eo modo, quo docet Gale. à quo normam 30  
ceperunt omnes scribentes. Dicebat ipse, quod talis caro alia tenuis est, quæ debili medicina curatur;  
alia verò dura. & hæc fortiori indiget medicamine: Vnde Auic. dicebat; Medicinã verò, quibus curan-  
tur ille, quæ ex eis leues sunt, sunt, sicut tenta facta ex cortice granati, contrito cum aqua; & admini-  
stretur sine cessatione; est enim expertum, sed est tardi iuuamenti: Aut tenta ex pulpa colloquintidis, &  
nulla, ibi dicit Auic. quæ arbitror esse nullius momenti. Verum est, quod laudat infusationem ex æ-  
fenico, & calcantho, contritis cum aceto, quæ exsiccat; sed chronica pãssio curatur cum medicinis, si-  
cut pulueres, & vnguenta facta ex eis, quæ sunt sicut alumen, & myrrha, & æs vitum, & cortices æris,  
& radix lilij albi, & calcanthũ, & colcothar, & atramentum, & nigrum; & super eum vino, aut aqua  
ozimi, aut granatorum fit vnguentum. Aut sine his sufficit. Vñimò laudat troiscos alchaidicos, de quib.  
vñimò fuit sermo vbi de cura gangrenæ. Ibiq; recitat Auic. medicamentum Gal. quod fit ex tribus malis  
granatis, sine aut æqualia & numero, & magnitudine, ex tribus diuersis naturis assumpta, quardam n. co-  
rum sunt austeria, & quardam dulcia, & quardam acida. Incidere oportet ea recentia, & matura, & cõ-  
stringere diligenter, vt exprimi possit succus ex eis, quem reponere oportet in vase plumbi, & custodi-  
re, parum coquendo ipsum, si fortè apparet humidior de ecente, quod verò relinquatur ex eis solidum,  
& crassum, incidere rursus diligenter oportet: vt possit, postquam incisum fuerit, conteri in mortario,  
& fieri simile collirijs, seu ellichnjs commoderatis pro nære eius, qui curatur; Immittatur n. in porum  
nasi, in quo est polypus absq; mordicatione, & pãssione, quam operantur acra pharmaca. Si verò hu-  
midior, & mollior videtur tibi polypus, plus pone de malis granatis austeris: si verò durior, de aci-  
dis. Hæc omnia oportet frequenter facere, vt nunquã desit patienti particulæ pharmaci.

Aut ex ellichnium infusum in aqua granatorum, aut ardenti, super quem puluerizetur ex calcadis, 50  
& colcothar, & flore æris, & alumine secundum æqualitatem. Aut R. ex Gal. vitriolum, & cum aceto fiat  
linimentum. Aut R. corticum granatorũ 3. xvj. felis tauri, anomij, myrrhæ, calamenthũ. prasij. an. 3. viij.  
croci 3. ij. ellebori albi 3. j. misce, & pistentur in mortario, & fiat puluis. Aut R. aluminis, myrrhæ an. 3. j.  
colcothar, gallarum, an. 3. s. misce, & cum aqua ardenti fiat linimentum. Rasis fumos extollit vnguen-  
tum ægyptiacum suæ descriptionis. R. puri zinari, mellis an. vñq. 3. fareo collas, ammoniaci an. vñq. s. ace-  
ti, quod sufficit. Et si hoc non valet, laudat troiscos alchaidicos, seu calidicon, aut troiscos andarõn,  
aut passibul musæ, aut andronij. Aliud Asclepiad. R. aluminis scissi 3. ij. zinziberis 3. iij. fandaracæ  
tantundem, galbani, æris vñq. an. 3. j. tere subtiliter, & facta lotionem cum vino odorifero, pone remediũ.  
Hæc fortia medicamina sunt, & interdũ dolores, febres, & phlegmones adducunt; ideo dicebat Auic.  
Hæc dimittantur, donec quiescant accidentia. Sæpe etiam post istius additamenti amputationem, aut  
excisionem propter loci humiditatem remanet vlcus, quod curari debet istĩ medicamentum, aut dia-  
calcidie, aut diapompholigos, aut aliquo alio medicamine ad ozenam ex libris de compositione medi-  
camentorum. sic enim appellantur vlcera narium: sed in patiente bene disposito nil velocius, securius,  
aut cum minori dolore fieri potest in omni genere polypij, quã cãdenti, & incidenti instrumento ipsam  
excrefcentiam amputare; deniq; vlcus, sicut cetera ozena, gubernare, aut cum pastillis cicatricem indu-  
centibus, & plumbæam canulam naribus, si opus sit, per totam curam accommodare.

De Poris, & Verrucis. Cap. III.



**A**PHROMATA valde crasso, & albo nonnullæ producuntur & crescentiæ, quæ (vt di-  
cit Auenzoar) verrucæ, & pori dicuntur, & eorum species diuersæ sunt: nam aliqui  
pori sunt adeo infusi, quod nullo modo extirpari possunt, & aliqui sic debiles, quod  
maxima cum facilitate euelluntur: nec multum ekuantur à cuti, sed infusi, & adhe-  
rentes sunt, in figura rotundi, & in qualitate duri; in quantitate verò raro lupini  
quantitatem excedunt. Verrucæ verò extra eminent à cuti, & interdum perpendi-  
culariter cadunt, sic quod ad medijs indicis quantitate apparent, in figura teretes,

lib. 2. tit. 7. cap. 9

in qualitate molles, in colore albæ, aut rubæ, aut subrubæ, interdum cinericiæ. Verrucæ a Gal. acro-  
chordones vocantur, dicit enim; Verrucarum genus, quod Græci acrochordonas vocant. Et Hipp. ait.  
Verrucæ, quas Græci acrochordonas vocant. Vnde Paulus dicebat: At verruca, quæ acrochordon Græcè  
dicitur, exigua cutis eminentia est, doloris expers, callosa, rotunda, plurima parte basim habet angu-  
stam, vt suspensa esse videatur. Nominata verò sic est, quod chordæ nexui respondeat. Et rursus; Verruca,  
quam Græci acrochordon vocant, angustior, & pensilis est, vt chordæ nexu suspensa pendere videat.  
Dicebat item Gal. Acrochordon est carnis supercrescētia, per angustum transitum habens exitum. Et  
rursus; Acrochordona, siue pensile verrucam Græci vocant, quod summâ occupat cutem Pori verò à  
Gal. dicunt myrmecia, seu myrmices. Et Paul. dicebat; Myrmecia cutis tuberculum est exiguum, callosum,  
rotundum, & crassum, ad basim indens, & ad frigora sensum, formicarum moribus similem, excitat.  
Hæc quoque passio totum corpus, præfertim talem manus, infestat. Dicit Celsus; Acrochordona Græ-  
ci vocant, vbi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius, coloris eiusdem; infra tenue, ad  
cutem latius, idque modicum est; quia raro fabæ magnitudinem excedit, vix vnum tantum eodem tem-  
pore nascitur, sed ferè plura, maximè que in pueris.

lib. 2. tit. 7. cap. 9

lib. 2. tit. 7. cap. 9

lib. 2. tit. 7. cap. 9

lib. 2. tit. 7. cap. 9

lib. 2. tit. 7. cap. 9

lib. 2. tit. 7. cap. 9

lib. 2. tit. 7. cap. 9

lib. 2. tit. 7. cap. 9

lib. 2. tit. 7. cap. 9

lib. 2. tit. 7. cap. 9

lib. 2. tit. 7. cap. 9

Et pori diuersi sunt; nam aliqui sunt in superficie, asperi, quasi quod habeant radices inuertas, & vi-  
dentur pilosi; Et dicuntur vulgari sermone pori inerssi, & asimilantur floribus thymi, ideo thymion  
vocantur. Vnde Cornelius dicebat; Arthymion nominatur, quod super corpus, quasi verrucula, emi-  
net, ad cutem tenue, supra latius, subduri, & in summo perasperum, idque summum colore floribus  
thymi representat, vt etiam scribit Dioscorides; vnde ei nomen est, ibique faciliè finditur, & eruentur; nec  
nonnunquam aliquantulum sanguis fundit, ferèque circa magnitudinem fabæ Aegyptiæ est, raro ma-  
ius, interdum perexiguum: modò vnum, modò autem plura nascuntur, vel in talis, vel palmarum, vel infe-  
rioribus pedum partibus: pessima tamen in obscenis sunt, maximè quæ vbi sanguinem iundunt.

lib. 3. cap. de thi

lib. 3. cap. de thi

lib. 3. cap. de thi

lib. 3. cap. de thi

lib. 3. cap. de thi

lib. 3. cap. de thi

lib. 3. cap. de thi

lib. 3. cap. de thi

lib. 3. cap. de thi

lib. 3. cap. de thi

Pori verò, qui neque pilosi, neque asperi videntur, myrmecia vocantur. Dicit Cornelius; Sunt bre-  
uiora thymio, duriora que, quæ radices altius exigunt, maioremque dolorem mouent: infra lani, su-  
per autem tenuia, minus sanguinis mittunt, magnitudinè vix vniquam lupini modum excedunt.  
Nascuntur ea quoque, aut in manibus, aut in partibus pedum. Interdum hæc passio formica vocatur,  
vt patet ex Paulo, vbi dicit; Formica, quæ Græcè myrmecion dicitur, latiore basi, & sessilis est, similem  
mordentis formicæ sensum induit. Interdum verò formica dicitur myrmix; Et ideo deceptus est Auic.  
in cap. de cura formicæ, quando laudat in cura formicæ modum curandi poros cum embusa pennæ, quæ  
admodum superius notatum fuit à nobis. Causæ harum passionum sunt humores pituitosi, grossi,  
vel melancholici, quibus pituita admiscetur: nam Auic. enumerat verrucas inter passionem melancholi-  
cas, Phlegma. n. quamuis sit naturaliter humidum, tamen per admisionem melancholice conuertitur ad  
naturam melancholicæ, & siccitatis.

lib. 4. cap. 15.

lib. 4. cap. 15.

lib. 4. cap. 15.

lib. 4. cap. 15.

lib. 4. cap. 15.

lib. 4. cap. 15.

lib. 4. cap. 15.

lib. 4. cap. 15.

lib. 4. cap. 15.

lib. 4. cap. 15.

Sunt etiam ex sanguine conculcato, & ingrossato, vel à sanguine siccato, coaceruato à stipticitate con-  
stringente. Auic. dicit; Causa efficiens est expulsiuæ nature; & materialis est humor grossus, melancholi-  
cus, & quandoque conuertitur melancholia à phlegmate siccato valde, quando multiplicat in sanguine, &  
quidoque accidit ipsi sanguini, propterea quod ipse coarctatur, & multiplicatur; & propter priuationem cau-  
sarum putrefactionis, vt conuertat ad stictitatem, & frigus, & proprio in venis paruis, in quarum simili-  
bus nō putrescit sanguis propter suam paruitatem, & propinquitatē ad causas extrinsecas, quæ sūt ad hoc  
vt exsiccet, velociores, quā ad hoc, vt putrefaciāt; scilicet cū sanguis nō valde est calidus in substantia sua.

cap. de formi-

cap. de formi-

cap. de formi-

cap. de formi-

cap. de formi-

cap. de formi-

cap. de formi-

cap. de formi-

cap. de formi-

cap. de formi-

**De Verrucarum, et Pororum cura. Cap. IIII.**



**R**OXOR quidem ad mirandum sanguinem, & ad euacuandum melancholiam  
altres, quæ est necessarias. Et quando multiplicatur ægritudo, iteretur phlebotomia.  
Similiter regimen generat bonum chinum. Hæc Auic. & maxime in verrucis. Auen-  
zoar autem dicit, quod cura harum passionum est specialiter purgare phlegma grossissim-  
um, & terrestre. Et laudat hoc medicamentum R. aloes, an. polipodi, medullæ  
carambi, feminis viticæ, succi liquoriciæ, interioris colloquintidæ, ante pondus granorū  
hordel. ij. fucci cucumeris alutini, vel fucci foliorum eius, pondus grani. i. & dimidij pistent quolibet  
De Excrec. Lib. I. Tract. 6

lib. 4. tit. 7. cap. 9

lib. 4. tit. 7. cap. 9

lib. 4. tit. 7. cap. 9

lib. 4. tit. 7. cap. 9

lib. 4. tit. 7. cap. 9

lib. 4. tit. 7. cap. 9

lib. 4. tit. 7. cap. 9

lib. 4. tit. 7. cap. 9

lib. 4. tit. 7. cap. 9

lib. 4. tit. 7. cap. 9

per ſe præter colloquintidam, quæ incidenda eſt cum forficibus minutim, & incorpora omnia ſimul cum oleo de ſereg. & cum aureo vno grani ſiſticorum, vel amigdalarum dulcium, & tantundem de guma arabi- 10  
ca, & conficetorum cum melle roſato, & da infirmo de tali confectiōe aureos iij. & regatur, ſicut  
in alijs laxatijs. Et regatur cum regimine victus ordinato. Et Raſis ait, cum verrucæ multiplicentur in

Diuiſio: 144

homine, neceſſarium eſt extrahere ſanguinem, & ſolvere ventrem: Cum eis, quæ educunt melancholia-  
m, & adhibere regimen, quod generat ſanguine bonum, & humectet corpus, & vinum ſubtile plu-  
rimæ commiſſionis. Dicit Gal. Plurima namque inveniuntur hodieq; quæ apud maiores noſtros non  
fuerunt inuenta; veluti nunc Romæ quidam excogitavit, quemadmodum acrochordonas, & myrme-  
cias ore ſanct. Verum (dicit Gal.) de prioribus ideſt de verrucis, vt pote ab ipſa cute exantibus, mi-  
nus eſt mirum. de myrmecijs verò i. poris, potiſſimum quæ cum ſumma cute proſus ſunt æquales, mi-  
rum videbitur. Verumtamen has quoque myrmecias, certa primum laborum applicatione, ceu ſuccu, 20  
ad ſe traxit, atque à radice euulſit, deinde primoribus apprehenſas dentibus rotas ſimul exemit. Do-  
cet etiam Galenus modum, quo manuali opere hæc paſſiones ſolent curari, & ibi deſcribit instru-  
mentum phlebotomandi, & dicit: Sed & ſcalpro ad mirthacæ folij ſpeciem formato, & ſerramento  
eo, quod ſcolopomacherion Greci vocant (& eſt idem, quod enſis curvus) quiſpiam manibus exer-  
citatus, facile eas excidat, cum proprijs lineamentis à circumpoſita cute circumſcripta diſcernatur.

lib. 6. cap. 87.  
lib. 2. cap. 87.  
ſ. 1. 3. 4. 5. cap.  
13.

Declarat & alium modum Gal. qui laudatur à Paulo. ab Albuc. & à Principe, & dicit: Acque vero, &  
valente aliqua penna, circulo myrmecia impoſita, ipſam educimus: debet porro penna ſiſtula eſſe  
myrmecij craſſitudini par, vt eam vndique proſus conſtingat; quæ poſtea circumacta, ac ſimul de-  
orſum impulſa, celerrimè ita myrmeciam, etiam cum ipſa radice, totam educet. Conſtat verò, &  
q. ſiſis ipſe penna, quæ eſt circulo ſecabit, nō tenuis modo, ſed etiam acutus, & firmus eſſe debet. Ita 30  
que tum galli veteris penna, tum vel magis aquilæ ad hunc uſum eſt accommodata. Et verè pluries vidi  
hunc modum reſuſcitæ, porum cum propria radice extirpando. Et loco pennæ ſit cannula aut ænea,  
aut argentea. Et aliquos vidi, qui ante hanc operationem myrmeciam lineabant aliquo linimento, aut  
cum lacte titimali, aut ſucco cheliſidoniæ, aut ſele hirci, aut melle anacardino, etc. Ego verò eos pluries  
extirpaui proprijs vnguibus, ſed prius porum inungebam oleo meo de vitriolo. Et non ſolum poros, &  
verrucas, ſed omnes excreſcentias tali ingenio curavi. Et eſt ſecretum mirabile ad omnem carnem ma-  
lam abſque dolore incidendam. Et debet fieri cum magna diligentia, & ſeruari, vt aurū. R. calcicidis, ideſt  
exterioris partis vitrioli Romani, mundi ab omni ſorditie, quantum volueris, & ponatur in olla noua,  
& carbonibus accenſis circum apoſitus. tam diu in ea detineatur, vt omnis ab eo reſoluatur humiditas.  
reſolutionis autem ſignū eſt, quod efficitur rubeūtic extrahatur, & ponatur in diſtillatorio, vitreo, vt in  
fra, & cum igne forti, & continuo ab eo oleum extrahatur. Et ipſum in vaſe vitreo ſtriſti oriſcij, & be- 40  
ne obturati conſeruetur. Et cum volueris eo vti, fac ex ligno oliuæ inciſorium ſubtile ad formam gla-  
dij, hoc modo:



Et in ipſo oleo intincto gladio, incidet ad libitum. uſa diſtillatoria ſunt  
in hunc modum, & optime obturentur.



lib. 6.

Tali ingenio verrucas ſæpe ſecavi abſque ferro. Aut potes, ſicut docet Paulus, cum lino, aut pilo  
eas deligare. Et Albucasiſ laudat filum ſericum, donec cadat. Debet igitur ligari in radice ſua, & quo  
tidie magis ſtringatur, donec cadat. Et vlcus ſemel tantum poteſt adiri: Noui pleroſque, dicit Pau-  
lus, has excreſcentias ſerramento ignito conſumpſiſſe. Sic iubet & Raſis in diuiſionibus. Poſſimus etiā  
verrucas, quas Albucasiſ thelil vocat, aliquo medicaminum acutorum remouere. Dicit Scribonius  
Largus, ſi quando nō exulceratas eminentias tollere ſine ferro volueris, vt verrucas, neuos, aliaue eius  
generis, hoc medicamento vitmur: Calcis viuæ. 3 iij. ſerulæ, viari viſi an. 3 xv. hæc terere oportet cum  
luſiuo cineris capitiſci, donec temperetur, deinde in patella ſiſtici cum modica cera coquere ad ſpiſſi  
tudinem, deinde in vaſe plumbeo reponere. Eius uſus eſt talis, quod deſtinatum erit tollere, id ipſum  
ſpecillo intincto oblinetur.

de comp. med.  
s. 1. 2. 3.

de 109

1

de 109

Dici:



10 Dicit etiam Scribonius; Triphon chyrurgus eminentias tali medicamento compescerat, aris floribus 3. v. calcididis vsq; nisi vsq; aris vsq; an. 3. iij. hoc acie est, & quasi cateterium, crustam altam facit, & corruptionem prohibet, & omnem sanguinis eruptionem, veluti cateterium, sistit. Ad verrucas ex Actuario, sulphuris ighem non experti, sandarachae, futorij aramenti, an. clareij paræ mediam, & cum aceto fiat linimentum. Et valet ad fessiles, & pensiles verrucas. Et nota; quod ante applicationem alicuius medicamenti à cuti bonum est, cum multis acubus simul ligatis, aut granis bordicporum, aut verrucam pûgere, vel cum vrtica fricare, donec sanguis mittat. Notat Auic. quod si tangit eas medicamentum acutum, & infestat, auferatur, & superponatur butirum coctum, & dimittatur; parumpe, deinde iteretur donec compleatur eorum calus.

30 De Ficu, siue Moro. Cap. V.



Te 17 Auic. 9 in carne rara, & locis humidis, tumor quidam ex carne addita molli oriri solet, vt in pene, ano, vulua, & alijs similibus membris, qui tumor morum dici solet, à Græcis autem thimos, vt à Gal. & Paulo propter similitudinem, quâ habet cum flore thimi, seu epithimi. A Principe autem dicitur alhalce, seu halce, & est flos stecchadis, et alibi barum. Ab Albucafi verò albiher appellatur. Dicitur autem morum, quia moro Celsi in figura, & colore assimilatur. Eius materia est sanguis malus, conuersus in substantiam carnis rari, exsiccatu extra poros cutis, sicut caro pulmonis, euidem fere substantie, coloris, & molicie; figurâ rotundâ, interdum oblonga. Aliquando vna tantum caro generatur, multotiens diuersa. Et cum in ano multiplicatur, aut circa eius orificium, ficus appellatur, siue porus ficus. Et cum in mulierum vuluis gignuntur, & hamoroidibus, quæ in ano sunt, correspondent, ab antiquis condylomata vocantur, à neotericis verò hemoroides, vt patet ex Principe. Dicitur rursus Auic. quod quandoque est saluum, & quandoque est malignum, & dolorosum, quod saluum est, nullum sentit dolorem, & tale sanguineu est ex sanguine crasso, & viscoso, & ad magnam multiplicatur quantitatem, & facilliter curatur. Quod autem malignum est, sapit atra bilis naturam, & interdum sua adducit accidentia. Et si male agitur, ad carcinomatis naturam pruenire solet. exulceratur, inflammationem adducit, ac phagedenicum vlcus causat. Et talis caro nigra, aut viridis, aut cinerici coloris est, nec ad magnam venit amplitudinem, sed dura, & dolorosa permanet.

40 De cura Mori. Cap. VI.



VELLEM curâ mori posset Auic, sed solum dicit, quod quandoque est saluum, & est illud, quod fit à sanguine puro, qui est materia carnis, & quandoque est dolorosum, & malignum, & talis fit à sanguine melancholico, & est de genere cancerum. Cum verò hæc passio nullam sapit malignitatem, his tribus modis curatur, primò corpus competenti dietetur dietha, omnia euuando, quæ sanguinem generare possunt, salsa similitur, & acuta, pingua, oleosa, & quæ multi nutrimentum sunt. Euacuetur secundo corpus, & si consenserint pleboromiae conditiones, secetur vena; hoc verè potissimum remedium est, cum a gritudine à sanguinis abundantiâ proveniat. Tertio, vt Paulus docet, & Auic. tollitur hæc caro medicamentis, quæ valenter exsiccant, & quantum magis sunt maiores exsiccationis, tam o sunt meliora. Et Gal. dicit, quod mineralia summè commendantur, & magis post eorum ablationem, & aduersionem: nam ab eis resoluuntur partes acutæ, & venenose. Multa medicamina ab antiquis laudantur, aut sub forma loionis, aut linimenti, aut vnguenti, aut aridi medicamenti, aut pastilli. De loionibus aqua maris laudatissima est medicina, cui interdu addimus de gallas, & malcorium, & balaustias, & glandium tegmina. Ex his fiat decoctum, & abluatur (sepe talis excrescentia: cui postea superponatur aliquod siccum medicamentum, sicut diphryges inspersum, squama zris, omniaque stæcea cõbuita. Et Actius ad carnẽ supercrecentem in vlcerebus fõnula medicamentã describit, quæ in his passionibus efscet mirabilissimæ operationis, quale est aridum illud Hercules, quod recipit aris squamæ, mistos, calcididis vsq; aramenti futorij, aluminis scissilis, an. qu. misce, & vtere. Troscisci andaron descriptione Auic. sunt mirabilissimæ operationis. Hi recipient capium granatorum 3. x. aluminis iameti, myr: hæ an. 3. iij. oliban 3. vij. calcadis, aragaganthi, aristol. an. 3. xij. confice cum aqua mellis, & sic troscifos. Laudantur troscifici descriptione Rasis; hi sic componuntur, & dicuntur de aphrodisiis, succi radicum asphodelorum 3. s. calcis viuar 3. ij. auri pigmenti 3. j. conficiantur cum viuo albo, & exsiccentur in sole sub canicularibus. Troscifici et calcadicon in lib. experimentoũ Gal. fortisimi sunt. Eorum mixtio talis est. R. calcis viuar 3. j. auri pigmenti rubei, & citrini, salis alchaacaij. an. 3. i. conficiantur cum aqua cineris de stipibus tabarum. Postum hi troscifici vti per se, aut sub forma lotionis cum aliquo decocto, aut cum aqua maris, aut cum aqua viar: aut ad maiorem loci confortationem, cum malarico, & aceto. Ego verò has excrescentias tollere solius sum hoc remedio, hæ eorum ablatio cum aceto, aqua viar, & parum salis. Exsurgent postea, & eis superponatur de puluere prepara-

ti Mercurij, deſuper autem iſidis, aut ceraſeos medicamentum. Et ſic per partē poſt partem omnis ſol-  
letur excreſcentia. Aliud medicamentum.

Re. Calcia viuz.  
vnguē. ceruſſe. } an. ſ. f.  
propolis.  
litarg. argentei. 3 iij.  
corticum oſtrea-  
bucinatorum. } an. 3 ij.  
ſepiz.  
hęc adurantur &c.

[Al. Re. corticum gran-  
gallarum.  
cop. Glandium.  
mirrhæ.  
aloes.  
& ſiat puluis ſubtiliſſimus.

[Al. Re. aluminis liquidi.  
calentidis.  
beurach.  
auri pigmenti.  
acacie.  
eris ſquamæ.  
opij.

1 j.

Aque cineris, aut vini ſublimati q. ſ. ſiat vnguentum ſub tenui forma.

Cum verò talis eſt, quòd ligari poſſit, bonum eſt has excreſcentias in earum radice cum filo ſerico  
crudo alligare, & ſubſicire quotidie aliquantulum ſtringere, donec cadant. laudat hanc operationem  
Aui. Reliqui verò, quod remanet, acuto aliquo medicamēto conſumere. Interdū talia ſiſt huiusmodi  
additamentum, quòd ſecure cum ſero aut ignito, aut non ignito ſecari poſſunt, Quæd verò reſidet, vſq;  
ad totalem conſumptionē actuali cauſtico aduratur, ſic iubet Raſus, & eſt cura Pauli dicentis; Miores  
thimi ſcapelli acie deradere cōuenit, & chalcidē iſtis inſpergere, eo, quod vitiaſi eſt, exciſio, aduſione  
vitendum. Alij forſice ipſos euellentes, equino pilo deligatos curabant. Multi ferro cadenti eos deaurant.  
Celfus lib. 6. cap. de vlcere fungo ſimili in ano, poſteaſque cerato ex mirro, ſquamma, fuligine, &  
calce vſus eſt, ait, ferro adurantur. laudat hanc operationem Albucaliſ. Verū, cum iſtæ paſſiones ſapi-  
naturam attrax bilis, magna cum animaduerſione præſtari debent, nam ſæua, & perniciōſa ſolent  
adducere accidentia. Cognōſcitur eiſeſſentia, quā eiſeſſentia color cinericiſ eſt, aut ſulcus, ſanguis, qui  
ab eo reſudat, nigerimus eſt; regioque talis, dolor adeſt, tumor etiam circa eum locum. Irritatur hic  
morbus, dum ab acuto medicamēto pertrahatur. Rebellis eſt hic humor digeſtioni, quemadmodum in  
cap. de cancro ad amuſſum oſtenſum fuit.

## De clauo ſiue callo. Cap. VII.

**S**OLENT produci nonnullæ duræ nodofitates, vtp̄larimum in digitis manuum, &  
pedum, & alibi, quæ ſilo Græce dicuntur. Et Gal. laudando medicamentum catag-  
maticum Moſchionis, ponit hanc paſſionem inter excreſcentias. & dicit, quòd  
medicamen illud tollit pedum, manuumque calloſas excreſcentias, quas clauos vo-  
camus. Et ruruſ dicit; Callus eſt ſubſtantiſſima lapidoſa, & rigida, rotunda, vtp̄larimū  
eveniē in planta pedis. Dicit Paulus; Eſt chamæretes figura, callus, colore cæcidus  
clauorum capiti ſimilis, toto corpore; ſed pedum ſolo, digitique præcipue na-  
ſcens, quem dolor ſequitur, & inceſſus impedimentum. Idem etiam dicit Albucaliſ, & eam paſſionem  
Aui. vocat almafina, & ſcribit, quòd eſt nodus rotundus, albus, ſimilis capiti clauī, unde forſitan  
ſic dicitur. Idem vocat hanc paſſionē almafina, & almafina, aut dicitur clauus, vt dicit Gal. quia  
patientī clauum infixum habere videtur. Dicebat Celfus; Clauus nonnunquam quidem etiam alibi, ſed  
in pedibus tamen maxime naſcitur, præcipue tamen ex conuulſo, quanuis interdum aliter. Solēt fieri hę  
durities in pedibus propter nimium motum in ambulatione, aut ex nimis laboribus, aut ex forti con-  
preſſione calcamentorum. Fiunt etiam, vt docet Gal. in articulatibus membrīs, & alibi, cum humi-  
ditas aliqua viſcoſa, & crāſſa locum obſedet, vnde ab ea tenui parte diſciſſa, crāſſaque, ac viſcoſa re-  
tenta induratur. Hac ratione in morbis articulatibus calli proueniunt, & in renum vitio calculi. De hac paſ-  
ſione loquitur eſt Paulus, & Aui. dicētes; Et plurimū quidē accidit ex percusſiōe, & poſt exiurus, & poſt  
curationē carū. Et accidit in pedibus, & digitis pedū, & inferioribus. & lēdit in tālī, q̄ prohibet inceſſū.

## De Cura Clauī. Cap. VIII.

**C**URATUR hac paſſio interdum opere manuali, vt docent omnes præcitantē; ali-  
quando malacitiſis medicinis. Oportet, dicebat Aui. vt ſectio fiat ſuper ipſum, &  
extrahatur. Et Albucaliſ dicebat; Oportet vt ſecetur, quòd eſt in circuitu clauī,  
& teneatur cum forſicibus, aut cū vincino, & eradicetur ex radice ſua, deinde cura  
illud; Et ſi viſ, caucriza illud, ſecundum quòd indiget. Paulus dicebat; Circum  
ſcarificans, ſpectilloque apprehenſus, ſcalpro acuto acies, aut quo venę ſcinduntur,  
radicatus eximitur. Nonnulli, ne ruruſ ſuccreſcant, cadenti ferro vtuntur; ſed  
ſtat; ale opus a p̄ſento melior; nam, cum nō curatur hac paſſio, dicit Aui. ſit cancer. Et qui clauos in  
cide & querit, tot in oſſiat, vnde malus decodis cum aſſungia, aut ammoniacō, aceto ſoluto.  
Alorum modum dicit Cornelius, & dicit; Clauum ſubinde deradere commodiſſimum eſt; nam ſine  
vlla vi ſic emolitur, ac ſi ſanguis quoque aliquid emiſſum eſt, ſæpe emoritur. Tollitur etiam, ſi quis  
eum

10 cum primo circuli expurgat, deinde imponit resinam, cui lapidis molaris pulvis contritus admiscetur. Et Dioscorides dicit, quod farinaceum fermentum priuatim callos, & clauos pedum extenuat. Et rursus, Cinis corticis salicis aceto misto illinitur, clauos, & callos tollit. Ad clauos, siue callos ex Lucio Kratere, R. ammoniaci, viridis aris, an. 3. thauri pigmenti 3. j. dissoluatur ammoniacum in aceto, & cum pauca cera fiat medicamentum. Aliud Asclepiadis, R. picis Græcæ navalis, bd. elij. scirpini, ammoniaci, ceræ nouæ an. 3. ij. hythargiri 3. v. olei ros. q. s. misce pro cerato.

De Hernia Carnosa. Cap. IX.

10 **R**AMIX hæc inter excrescentias enumerari potest, cum sit additamentum ex toto preternaturale, nec illi insunt signa apostematis, sed tantum est caro, quæ circa scrotum, aut epididymum generari solet. Vnde Paulus lib. 6. cap. 63. dicebat; Caro in parte aliquæ corporum, quæ scrotum implicat, succrescens, carnosum tamen producit. Producit hæc caro secundum quid, non autem simpliciter (nā in folis laceris vera caro reperit) ex sanguinis superfluitate, quæ ad testiculos descendit, & ibi coacta naturæ, si forti testium caliditate condensatur, & ad quandam carnis duriciæ, gravis, cui non est tenus, substantiam permittatur. Paulus verò dicebat; Nascentur autem ex causa latente, testiculorum fluxione experto, induratoque, aut ex ictu, ut etiam dicit Albucasis, aut ex impericia post curationem alterius ramici. Eius color fulcus est, augetur continuè, sic, quod ego in quodam nobili Raguso in palatio serenissimi Andree Gritti, Venetiarum integerrimi Principis, ramicem carnosam ad pondus 30 librarum xxij. vidi, ad cuius curam fui & pater meus. Augetur hic tumor, sicut aliæ excrescentiæ, quæ à sanguine gignuntur. Includitur propria tunica, & cooperitur seroto. Inter dum hæc caro est circa inuolutionem didimali quando verò ex toto separatur ab eo, stat tamen in oculo; hincinde mouetur, dum tangitur, nec secum mala adducit accidentia.

DE CVRA HERNIÆ CARNOSE.

Celsus ait, Caro quoque, si quædò inter tunicas testiculorum concreuit, nihil dubij est, quin eximenda sit, sed id, ipso seroto inciso, fieri, cōmodius esse credimus. Modum verò hanc perficiendi operationem declarabo in fine lib. 3. ubi de differentia Ramicem agam: quo in loco etiam medicamenta morbo, conferentia ad hoc propositum.

De sexto digito, & similibus Excrescentijs Cap. X.

10 **A**D NASCENTIA digiti in manu, tunc prope maiores digitos, nunc prope exiguos, raro autem visi sunt iuxta aliorum aliquem: quod Paulus etiam docet. Eorum vero, qui adnascuntur, alij per totum carnosus sunt, alij ossa in se continere, nonnulli quam etiā vngues. Ossa habentium hi ab articulo procedunt, cuius commissuræ ad teri digito comunicant: illi ex naturalium digitorum fissura oriuntur, atque huiusmodi de perpetuo sunt immobiles, reliqui mouentur nonnunquam.

DE CVRA.

10 Carnosorum, dicebat Paulus, expedita cura est præcisio; nam scalpello, quod super vacuum est, vna vice tollimus. Cæterum eorum, qui ab articulo prodeunt, difficilior est tractatio, illis, qui à digitorum fissura originem traxerunt. Primum autem caro orbiculatim vsque ad os excinditur, ipsomque excisum, aut crassius aufertur. Verùm intersecurandum radimus, indeque cicatricem obducimus. Non verò cum talem excrescentiam auferimus, statim post sectionem locum thebæntina multum calidè cauterizamus, quod facit ad sanguinis fluxum, & ad conuulsionis cautelam statimque super locum de ipso glutine applicamus adu calido: præseruamusque membrum a dolore cum embrocatione facia cum oleo rosato, & de chamomilla. Prope autem manus concatenationem defensionem applicare non inconuenit: at post sectionem; cuius extremitates ad inuicem sutura vnire commodum est: tunc n. partes citius vniuntur; & si sanguis fluxerit, cum oui albumine, aut pulueribus sanguinem sistens custodire, opus est. Procedendumque est cū glutine ipso vsque ad saniei productionem. Inde cum mundificatio de sarcocolla regatur vlcus, vsque ad perfectam mundificationem; inde posita incarnetur, si opus fuerit, cum basilicone, aut regali, siue citrino medicamento, & pulueribus siccis. Vt. sigilletur cetero de minio, aut triapharmaco, aut alio opportuno, & consimili auxilio. Et hæc de superexcrescentibus tumoribus satis pro proposito dicta sint.

## Digreſſio De Tumoribus Adenofis. Cap. XI



**V** MORA, qui in glandoſis locis oriuntur, aut ſunt venenoſi, de quibus diximus, ubi de antraxe, aut chronici, pendentes à pituita, aut cauſa etherogenea, quemadmodum declarauimus, ubi de ſtrumate, aut ſunt ſalui, de quibus dicit Gal. 2. partu laxarum, quas medici adenae vocant, tumores ſunt in triplici differencia, ſcilicet bubo, phima, & phigeton, vt etiam expoſcebat Paulus. Bubo quidem inflammatio eſt, ſeu phlegmon, in quo omnia phlegmonis ſigna reperiuntur. Phima eſt tumor, qui ſtatim augetur, atque ad ſuppurationem ſeſcinat. Phigeton vero eſt id, quod cryſtallus, particeps inflammationis, aut inflammatio eryſipelatis, nominatur. Vnde Celſus dicebat: Phigethlon eſt tumor non alius, latus, in quo quædam pulſura ſimilime ſunt, dolor, diſtentioneque vehemens eſt, & maior, quâ pro magnitudine tumoris cõueniret, interdum etiam febricula: idque rar de mureſcentia, neque magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in vertice, aut in alijs, aut in inguinibus. Fiunt hæ paſſiones, dicit Cornelius, poſt febres, aut poſt dolores partis alicuius, maximeque eos, qui ventrẽ inſeſtarunt. Et Auic. dicebat: A poſtemata glandoſa, quæ non incedunt via aranguſtij. Althobon, aut antracis, ſiue apoſtematum venoſorum, quandoque accidunt caſu expulſionis à membris radicalibus, & fortaſſe attrahunt ea vlcera, & apoſtemata alia ſuper extrema, ad que currunt materie, in vijs quarum incedunt carnes illæ: quare inuoluuntur cum eis, ſicut accidit inguini, & ſubſcellæ ex apoſtatione amporum in eo, qui habet ſcabiem, aut vicia ſuper pedes, aut manus. Nam huiusmodi adenæ, dicebat Gal. ſunt valde paratæ ad ſuſcipiendum rhuma, & maxime quæ raræ nature ſunt, nã que eorum viſus expulſiua ſatis debilis eſt. cum igitur ex aliquo influxu tumefcunt hæ partes, talis tumor cõmuniter bubo appellari ſolet. Verum bubo proprie tumor eſt, qui inguinum regionem moleſta re conſuecit. Vnde autem dicatur bubo, credo ſit, vt nonnulli dicunt, propter ſimilitudinem, quam habet hic tumor, in eius longitudine, & groſſitudine, cum nocturno illo animali, qui bubo vocatur. Curatur talis tumor, vt Aetius docet, quando inguina, corpore exiſtente plethora, ſine alia manifeſta cauſa intumuerint, conſuſio humorum circa glandulas oritur, nili ergo quidpiam obſtiterit, cubiti vena ſecunda eſt, tantumque ſanguinis euacuandum, quantum plenitudo indicauerit. Loco vero inflammato, & ante venæ ſectiõem, & in ipſo ſectiõis tempore, adſtringentia, & repellentia medicamenta ſunt apponenda. Sed poſtea euacuata ab vniuerſo corpore plenitudine, ad ea, quæ diſcutere poſſint, quod inſiſſit, tranſire oportet. At ſi vlcus in crure exiſtens ad aſſectiõis conſenſum inguen perduxerit, ſicut ex digitorum pedis offenſu fieri conſuevit, glandulæ inſanari incipientem, ſtatim in principio lana, calido oleo madaſſa, mitigare oportebit, non quidem adieſto ſale, dicit Aetius, ſicut non nulli faciunt. & reddens rationem dicit: Sal. n. tenuiores partes conſectum diſcutiens, reliquum calloſum, curatu difficile, ac ſæpe immedicabile omittit. Vbi vero inflammatio quieſcit, à mitigandi pradijs abſtinebimus, & diſcuſſorij vtentur. Paulus vero dicebat: Verum cum hi tumores veneni naturam non ſapiunt, quemadmodum inflammatio quælibet, auxilijs repellantur, quæ reſigerant, adſtringunt que, vel ſpongij ex poſca impoſitis, vel ſanijs oleo crudo, vinoque, imbutis, vel roſacco, vel nielino, vel leniſſimo, vel mirtheo: deinde his, quæ digerunt, vtendum. Laudatur repercuſio in omni phlegmone, vt declarauit cap. de phlegmone, de mente Gal. & omnium, præter quam in expulſo per viam criſis, aut cū materia eſt venenoſa, aut dum tumor eſt prope primaria membra, &c. Verum ſi ex remeatione tumor alius adſit, vt Paulus docet, ſi nihil prohibet, nempe vt etas, aut virtus, ſanguis prius è cubito dimittetur, quemadmodum etiã docet Aetius. Vnde Auic. dicebat: Timor in expulſiuis eſt reſidui materici ad membra principalia: ſed euacuatio ſecurat ex nouimento. Et in eodem capite dicebat: Si inueneris corporis repletionem, non adminiſtres repercuſionem, imò euacuatio per phlebotomiam, & ſolutoiõem ventris, & illud quidem eſt neceſſarium. Si vero fuerit bubo propter multitudinem, repletionis, tunc euacuatio eſt radiæ, & minoratio cibi, & ſubſtitutio. Minoratur autem cibum in quantitate, & ſubſtituitur in qualitate. Et multi medici, vt Celſus, & Raſis, vinum in bubonibus prohibere videntur; & credo, ne ab eius caſtigatione febris ſuperueniat. Nã Hipp. dicebat: Ex inguinũ tumoribus febres omnes malæ præter diarias. Et Gal. videtur velle, quòd aliæ febres præter vnius diei, in tumoribus inguinum ſint ex inflammatione vlcærum. Verum male ſunt febres, quæ vñ cū tumore incipiunt, non autem quæ ſuccedunt, quæ dicitur 2. Aphor. Dum pus conſiſcit, dolores, & febres magis accidunt, quàm iam cõſectio. hi tumores vplurimum ſuppurantur, Et quia non ingrata conſideratio eſt de venæ ſectiõis in hoc morbo, iocirco de tali opere nonnulla examinanda ſunt. Habent hi tumores determinata loca, & ideo ſermo hic verus eſt. Adenoſa loca hæc ſunt, poſt aures, ſub alis, & in inguinibus. Nec dubium eſt in via Gal. Pauli, & aliorum, quòd hæ partes à rhumatismis & fluxionibus intumeſcant. Igitur cum incipiunt aut dolore, aut in colore alterari, & dubium eſt de ſumo phlegmone, materiam diuertere opus eſt. Fit autem diſſectio à parte longinqua diametraliter, vnde ſi tumor poſt aures oriri miniatur, cephalicam, aut cõmunem in brachio eiũdem lateris ſecare oportet: aut cucurbitulas ſcarificatas in ſpaulis applicare conuenit; namque hæc eſt melior diſſectio, quæ fieri poteſt. Nam ſi ex alio loco ſanguinem mittis, aut non iuſtat, aut tarde. Si autem bubo ſub ala dextera contingit, baſilicam ſiniſtri ſerias; ſi vero in inguinibus, baſili-

1. ad Glas co-  
nem.  
lib. 4. cap. 15.

lib. 7. cap. de  
phigethlo

3. 4. et 5. cap.  
19.

19. Methodi  
de 2. cap. 3. & 5.  
de comp. med.  
locutioni cu p.  
3. vbi de paroti  
de & inſubſeſe  
de. vnde ſum. 3.  
cap.  
de de pot. nat.  
lib. 14. cap. 29.

2. 2. 2. 2.

lib. 4. cap. 15.

cap. 2. 2. 2.

lib. 14. cap. 19.  
3. 4. et 5. cap. 19.

aphor. 2. 2.  
in pot.  
aphor. 4. 7.

baſili-

10 basilicam illius lateris. sed cum pro parte iam fluxa est materia, & adhuc fuit, eam diuertere, quæ fluxit, & quæ fluxa est, euacuare oportet. Et ideo venam semper eiusdem lateris secamus. In inueterato vero phlegmone, cum ex toto fluxa est, & facta est causa coniuncta, propinquire venam, quam habere possumus, incidere conuenit. Dicebat Gal. Incipientes phlegmones reuulsu euacuare oportet: quæ uero inueterate iam sunt, ex ipsis, si fieri potest, affectis partibus: quod si nequeat, saltem ex vicinis. Etenim in incipientibus auertere quod influit, expedit: in inueteratis autem ipsum tantum, quod affectæ parti influit, euacuare. Euacuabitur porro id optime per venas diductas ab ijs, quæ in partibus ipsis sunt fixæ.

a ad Gim. cap. de inflam. & 13. Methodi. & in lib. de cure per sangu. m.

Digressio de Tumoribus Mamillarum. Cap. XII.

10 **M**AMILLA est membrum creatum ad generandum lac. & est corpus compositum ex venis, & arterijs, & neruis: inter quæ exiit vacuitas, quæ caro replet glandosa, cui non est sensus, albi coloris. Hæc pars est valde parata ad recipiendum rheuma, & multis modis in ea tumor generari potest: nam ab unoquoque humore, à lacte etiā more casei coagulato, vt docent Pau. & Auic. fieri solet, aut pp caliditatem exsiccatiuam, aut propter frigiditatem cōgelariuam. Hic tumor vtrique humori est de genere phlegmonis, & si peccat lac, dico, quod lac est sanguis in mamilla dealbatus, vt docet Auic. & ideo ad talē tumorem phlegmonis accidentia consequuntur. De calido tumore habetur hic sermo. Eius causa potest esse corporis repletio, interdum extrinseca, vt percussio, aut casus, & quod sepe aduenit, indumentorum pressura. Cumque ad mammam sanguis fluere cepit, venam secare oportet, basilicā scilicet lateris contrarij, vt fiat reuulsio antecedentis causæ. Verum si in sanguinea muliere hoc acciderit, sapientiam eiusdem lateris pungere non inconuenit, idque magis, si iam mēstura defecerit. Et si aliquod hoc impeditur, scarificatis cucurbitulis super nates applicare laudatur. Inde postea aut. palmas, aut aliquod debile solutium calidare opus est. Adequare humores cum sirupis summe conuenit: nec non in subtili diæta usque ad morbi consistentiam permanere iubent medici. Scdā operatio est, materiā apocruistica medicinis impellere, dummodo via significationis tumor causatus non fuerit. Vnde Paulus dicebat, Vtendum est per initia spongia molli, posca gelida imbuta, expressaque, loco fasciæ superaccommodatur: vel palmulæ cum pane, & posca cōtrita, vel ouo toto vtendum est cum rosaceo &c. Vnde Auic. dicebat: In principio quidem eorum administrantur repercutiua cognita in hac cura, & milcecum cum eis parum de subtilarijs, & illud quidem efficitur euaporatio cum aceto vini, aqua calida, & oleo rosato, aut farina fabarum cum oximelle, folijs solatri, & oleo rosato. Nec laudantur fortis emolumenta in hoc casu, cum tale membrum ab unaquaque forti operatione irritetur, in eoque lac à fortis frigiditate de facili coagulet. Et ideo Auic. iubet, vt subtiliatia, applicetur, quasi dicat, q̄ resolutiua admisceri debeant. Verum embrocacio facta cum oleo violato, aut rosato, aut de nenufæ faris conuenit. At si uehemens apparuerit dolor, cum aliquo domestico euaporante procedendum est. Fit igitur decoctum ex chamomilla, ferula, violis, maluis, hordeo; & parietaria, & locus spongia, aut petia in tepido decocto infusa, foveatur. Paulus iubet, vt fortis sit ex decocto fenugreci, althææ, & sem. apij aut, si grauitatem non tolerat, lana dulci oleo calente madefacta applicetur. Et ibi Paulus dicit: Ceterum lactare cautio est: nam maior per exustionem materies illos circabitur. Si autem tumor resolutionem querit, R. furfuris tritici tritirati, m. ij. pulueris melliloi m. j. chamomillæ m. s. farinæ fabarū s. ij. hordei. s. j. iola rosati

Vide Edm. lib. 16. cap. 40.

lib. 1. cap. 17. 15. j. cap. 4. 1. 1. j. cap. 10. m.

30 violati an. 3. r. chamomillini s. s. a. ob. mellis an. q. s. pro emplastro. Aut R. pulpe papie cōtrite. s. ij. farinæ hordei, fabarum an. s. j. fenugreci s. s. pulu. chamomillæ, meliloti. an. s. j. pinguedinis gallio, cerui. an. s. s. olei rosati s. ij. vitelli ouorum n. a. mirrhæ 3. ij. troci 3. s. rob. q. s. milce secundum artem pro emplastro. Sed aduertendum est, dicebat Auic. ne partes resoluantur subiles. quod autem remanet, ad laxis naturam conuertatur: ideo cum resoluentibus emollientia sunt admiscenda. Verum vtrique humori hæc materia, quia calida, & humida est, in loco calido, & humido, ad suppuracionem tendit. Quod facillimè cognoscitur. nam rubet locus, & dolet, vt alias declarauimus. Et Paulus dicebat in fine capitis, Cū tumor in abscessum vertitur, his vtendum est, que in parotidibus comprehensa sunt. Et Auic. dicebat: Quis dō accidet mamillæ apostema faciens collectionē, tunc ex medicinis bonis in maturacione eius est, vt lussatur feminis lini, & silami, & radici lilij, & storacis, & stercoreis caprini, & stercoreis columbini, & nitri, & gummi pini an. partes æquales, & fiat linimentum cum oleo de alkeiri, & medulla eruris vaccini; & si vis, pone in ipso rob. Quod si indiges perforatione, fac. Veruntamen ab unoquoque medica mento, cui aliquid sit infusa virtus poros cutis opilandi, vt citius innatus calor, cum extraneo, in eam contentam materiam agere possit, tumor ad putredinem vertitur. Conuenit autem a vaccino lacte, & triticeo pane, aut à tritici farina, oliuarum oleo maturo, & comuni aqua, in pulvis formā redacta, opus hoc perficatur. Verè tamen interdum fortiori operatione querere debemus, nam non solum circa generationem sanæ doloris, & febres contingunt, sed & alienationes propter fumos ascendentes, eleuatos à materia putrida. Vnde R. foliorū maluarū, violarū, an. m. j. caricarum pinguium, passularum enucleatarum, radicū althææ mundarū, an. s. ij. decoquantur omnia in brodio, & pistentur, & cribentur. Et adde farinæ tritici s. ij. pinguedinis porci accensis, butiri. an. s. xv. vitelli ouorum n. ij. troci 3. s. &

15. j. cap. 4.

lib. 1. cap. 17. 15. j. cap. 4. 1. 1. j. cap. 10. m.

40 rofato, aut farina fabarum cum oximelle, folijs solatri, & oleo rosato. Nec laudantur fortis emolumenta in hoc casu, cum tale membrum ab unaquaque forti operatione irritetur, in eoque lac à fortis frigiditate de facili coagulet. Et ideo Auic. iubet, vt subtiliatia, applicetur, quasi dicat, q̄ resolutiua admisceri debeant. Verum embrocacio facta cum oleo violato, aut rosato, aut de nenufæ faris conuenit. At si uehemens apparuerit dolor, cum aliquo domestico euaporante procedendum est. Fit igitur decoctum ex chamomilla, ferula, violis, maluis, hordeo; & parietaria, & locus spongia, aut petia in tepido decocto infusa, foveatur. Paulus iubet, vt fortis sit ex decocto fenugreci, althææ, & sem. apij aut, si grauitatem non tolerat, lana dulci oleo calente madefacta applicetur. Et ibi Paulus dicit: Ceterum lactare cautio est: nam maior per exustionem materies illos circabitur. Si autem tumor resolutionem querit, R. furfuris tritici tritirati, m. ij. pulueris melliloi m. j. chamomillæ m. s. farinæ fabarū s. ij. hordei. s. j. iola rosati

15. j. cap. 4. 15. j. cap. 4. 1. 1. j. cap. 10. m.

30 violati an. 3. r. chamomillini s. s. a. ob. mellis an. q. s. pro emplastro. Aut R. pulpe papie cōtrite. s. ij. farinæ hordei, fabarum an. s. j. fenugreci s. s. pulu. chamomillæ, meliloti. an. s. j. pinguedinis gallio, cerui. an. s. s. olei rosati s. ij. vitelli ouorum n. a. mirrhæ 3. ij. troci 3. s. rob. q. s. milce secundum artem pro emplastro. Sed aduertendum est, dicebat Auic. ne partes resoluantur subiles. quod autem remanet, ad laxis naturam conuertatur: ideo cum resoluentibus emollientia sunt admiscenda. Verum vtrique humori hæc materia, quia calida, & humida est, in loco calido, & humido, ad suppuracionem tendit. Quod facillimè cognoscitur. nam rubet locus, & dolet, vt alias declarauimus. Et Paulus dicebat in fine capitis, Cū tumor in abscessum vertitur, his vtendum est, que in parotidibus comprehensa sunt. Et Auic. dicebat: Quis dō accidet mamillæ apostema faciens collectionē, tunc ex medicinis bonis in maturacione eius est, vt lussatur feminis lini, & silami, & radici lilij, & storacis, & stercoreis caprini, & stercoreis columbini, & nitri, & gummi pini an. partes æquales, & fiat linimentum cum oleo de alkeiri, & medulla eruris vaccini; & si vis, pone in ipso rob. Quod si indiges perforatione, fac. Veruntamen ab unoquoque medica mento, cui aliquid sit infusa virtus poros cutis opilandi, vt citius innatus calor, cum extraneo, in eam contentam materiam agere possit, tumor ad putredinem vertitur. Conuenit autem a vaccino lacte, & triticeo pane, aut à tritici farina, oliuarum oleo maturo, & comuni aqua, in pulvis formā redacta, opus hoc perficatur. Verè tamen interdum fortiori operatione querere debemus, nam non solum circa generationem sanæ doloris, & febres contingunt, sed & alienationes propter fumos ascendentes, eleuatos à materia putrida. Vnde R. foliorū maluarū, violarū, an. m. j. caricarum pinguium, passularum enucleatarum, radicū althææ mundarū, an. s. ij. decoquantur omnia in brodio, & pistentur, & cribentur. Et adde farinæ tritici s. ij. pinguedinis porci accensis, butiri. an. s. xv. vitelli ouorum n. ij. troci 3. s. &

15. j. cap. 4.

60 tri, & gummi pini an. partes æquales, & fiat linimentum cum oleo de alkeiri, & medulla eruris vaccini; & si vis, pone in ipso rob. Quod si indiges perforatione, fac. Veruntamen ab unoquoque medica mento, cui aliquid sit infusa virtus poros cutis opilandi, vt citius innatus calor, cum extraneo, in eam contentam materiam agere possit, tumor ad putredinem vertitur. Conuenit autem a vaccino lacte, & triticeo pane, aut à tritici farina, oliuarum oleo maturo, & comuni aqua, in pulvis formā redacta, opus hoc perficatur. Verè tamen interdum fortiori operatione querere debemus, nam non solum circa generationem sanæ doloris, & febres contingunt, sed & alienationes propter fumos ascendentes, eleuatos à materia putrida. Vnde R. foliorū maluarū, violarū, an. m. j. caricarum pinguium, passularum enucleatarum, radicū althææ mundarū, an. s. ij. decoquantur omnia in brodio, & pistentur, & cribentur. Et adde farinæ tritici s. ij. pinguedinis porci accensis, butiri. an. s. xv. vitelli ouorum n. ij. troci 3. s. &

15. j. cap. 4. 15. j. cap. 4. 1. 1. j. cap. 10. m.



eum prædicta decoctione fiat emplastrum. Cumque tumor maturaverit, fectur, servatis conditionibus, ut ubi de abscessibus dixi. Et si qua in tumoris regione durities remanserit, desister dum non est à medicamento emolliente, ut cum oleo sisamino, de violis, amigdalorum dulcium, pinguedine galling, & medulla crurum vituli; aut cum emplastro ex medulla panis infusa in decocto altheæ, addito oleo rosato, & chamomillino cum vitello oui, & parum croci: Fiat cum digerente medicamento viciis optima digestio; deinde cum mundificatio a mordicatione expoliato, locus mundificetur. Viximo incipit cum sicco medicamento, quod non multum excedat primum gradum exsiccationis, & sigilletur. Notandum, quod in operatione tua interea sit, nec nimis longa, nec dolorem inferat, nec grolla, ut sanies exire possit. Et si post sigillationem aliqua remanserit durities, sine dubio medicamento diaquilon eam remouebit.

Erysipela verò mammis occurrente, curabit præmissa venæ sectione, si fuerit opus, aut evacuatione cum pharmaco cholera educentibus, sicut reubarbarum, sir. ros. sol. &c. cum applicatione vnguenti rosati Mes. aut de lythargio crudo. Aut R. olei violati .i. iij. cerussa plumbi, lythargij, arg. an. .i. s. lacris mulieris .i. j. misce, & ducatur in mortario plumbeo vsque ad limentum consistentiam, & vteretur. Frigidi vero tumores, qui in mamillis contingunt, magna cum diligentia regi debentur de facili, & in pueris si sunt, ad bissem argram, & duritiam conuertentur. Cum igitur laxitas, & grauedo cum molli alio, de sine dolore, tumore apparuerit, sit de ratione victus prima consideratio; nam hic non bis interduum chronicus est igitur regimen victus sit talis, ut eum descripti cap. de cura cedentis. Eadem autem, que putantur generare possunt, uti olera, pisces, legumina, lacticia, & grossa carnes. Dicta sit tenuis, & que hanc incidat materiam, nam fames corpora faciat. Vinum clarum, album, & lypharum concedit. Evacuatur materia, si potest, cum pharmaco puritatem educentibus, sicut est pulvis lena; polipodii, epithimium, agaricus, & similia. Aut cum compotis, sicut est ellebarius lenissimus, de doctis, indus maior, diatrybitus, hamch, hiera, &c. Vomitus etiam laudatur, sed in his, qui de facili vomunt, in multis etiam, quibus ætas, & alia, venæ sectionem admittit, phlebotomia laudari solet. In terribili ex exhibent; que vrinam ciunt. Ut autem humor iam collectus per halitum digeratur, & discurratur, in primis celebrata inunctione cum oleo de chamomilla, ancuto, de lilio, de sem. lini, de amigdal. dulcibus, cum lincion. dulci, & pauco sale; quo medicamento inuncta manu locus aliquantulū fricetur, inde postea succida, tam loca, lana cooperiatur. At si fortiori egerit medicamentum, novam spongiam in stas, ætæro, & sale macis, de facili, & expressam superponito. Aut saltem tali vror cerato. R. radicis altheæ deebatari, & eribellatari .i. iij. olei camph. antici an. .i. de lilio .i. xv. diaquilonis, albi gômatis .i. ij. modullæ erudi vituli, pinguedinis cerui an. .i. s. ceræ q. s. & ad ignem sin. art. fiat coratū medie forme. Aut vere emplastrum de milio croci.

Si vero carcinomatis naturam sapit hic tumor, quemadmodum scripsimus accendere solet; ut in mulieribus, quibus deficiunt menses, &c. prout dixi cap. de carcinomate, & eius cognouerit incipium, in præmissa corporis evacuatione, etiam venam secando, aut hemorrhoidas aperiendo, prout expedit; aut pharmaco crassum, & melancholicum humorem purgante, quod per initium forte non fit, præparato postea, quo residet, humore, fortiori pharmaco iterum euacuetur. Nam, ut multoties dixit Gal. hunc humorem oportet partim digerere, & partim euacuare. At si mēstrua nō apparuerint, & tritionibus, & cucurbitulis euocanda sunt, & hoc maxime ante annum quinquagesimum. Cum verò corpus purgatum fuerit, remedia afficet parti, quibus pellendi vis infusa sit, digerendi que abique mordicatione adhibeantur, que sunt, que laudant à Gal. ex succo solari, aut ex medicamento diaspompholigis, aut ex dicalcheos, aut quale recitat Gal. de merce Apollonci. R. olei rosati omphacini .i. xv. de tandiu sub Sole in mortario plumbeo, pila plumbea agitur, donec crascescat, & adde litarg. arg. cerussa an. .i. vj. & iterum ad instigul omnia admisceantur, donec fiat unguetū cōsistentia. Et quia multa in hac materia me dicta sunt, hæc sufficiant. Verum si cancer exulceratur, opus est, ut blandiendo succurratur, quia eger cura palcativa, & eo magis, cum aliqua apparuerit inflammatio, ut ad plenū dictū est cap. de carcinomate, & eius cura.

## De Tumoribus testium, & cura. Cap. XII.



B vnoquoque humore in seroto, aut osseo tumor non naturalis contingere potest, sæpe etiam ab aqua, unde fit ramix aquosa, que hydrocele dicitur; multoties ex intestinorum descensu inmiscunt, & fit hernia intestinalis, que Enterocoele dicitur; multoties ex carne addita, ut supra sermo habitus est; nonnunquam ex varice, unde fit varicosus ramix, quod vitium circocele nuncupatur; sæpe à stansiosa dispositione, que passio venosa ramix vocatur; aliquando etiam, dum zirus, seu onenatum in serotum descendit, fit ramix, que zibalis denominatur; de quibus passionibus locus huius multa dicenda sunt. Nunc de tumoribus ab vnoquoque humore provenientibus sermo sit. Si sanguis multus per venas amplas, inde per minores, postea per minimas ad hanc regionem descendit, & tumor apparet cum simphomantibus phlegmonis, & aggruado est in fieri, ac phlebotomia cōditiones admittunt, ut Auenzoar dicebat, phlebotomia parientem à basilica ex opposita parte aggrudinis, id est à directo aggrudinis, que pars (credo) sit directa aggrudinis secundū rectitudinem; Nā ad quid statim tumor in extero latere, & pro parte materia est fluxa, vnde secare in brachio sinistro? Nā & Aui. dicebat



cebat, & quadoq; post phlebotomiā basilicē, fiat phlebotomia de saphena, & oportet, vt attēdaſ latus do-  
loris, & fiat phlebotomia ex latere eius. Celsus vero ait: In testiculis si qua inflāmatio sine icthi orta est, san-  
guis ex talo mittendus est, & a cibo abstinendum. Similiter & Paulus dicebat: Ita, que testiculorum inflā-  
tationibus proprie cōuenit. Siquis ex talo dimissus. Aleuietur cibus, dicebat Auic. & dimittat eumq; &  
quæ sunt ei similia, & regat regimine subtili. Quiescat pātiens, & habeat vtriusq; beneficium, si nō a natura,  
saltem ab arte. Et Auic dicebat: Cum administratur suppositoria, cōfert magnificē; quia attrahitur mate-  
ria ad anū. De localibus Auic. dicebat: & administretur in primis super membrum pannus inhibitus in  
aceto, & aqua rosarum, & mucilagibus, & succis infigidantibus. Et Auenzoar dicebat: Vnge locum  
cum oleo rosato, & lacto semperuux, & acetosam hanc inunctio valet. Desuper verō applicetur empla-  
strum ex farina hordei, & succo memite, & farina orobi, an. partes æquales, seminum rosarum, flori  
chamomillæ an. partem mediam, quæ terenda sunt, zere, & misce cum aceto, & aqua rosarum. Flori  
incipit, augmentari, dicebat Auic. administrantur epithimata, aut emplāstra cum aqua solati, aut cucur-  
bitæ, aut canne humidæ, aut endiuizæ, cum farina hordei, aut fabarum, & aliquantulum croci, & oleo  
rosato, aut folia alkekienij, cum farina hordei, & lentium, aut folia canne cum farina fabarum, &  
oleo rosato. Aut fiat emplāstrum, & est expertum, R. alk. kengi, farina hordei, lētium, fabarum, pulueris  
violarum in. partes æquales, & cum oleo rosato, aut sapa, fiat emplāstrum. Huic addimus interdum  
& puluerem chamomillæ, melliloci, & furfuris tritici. Verum, dicit Princeps, si in hoc tumoris termino  
magna caliditas, & vehemens dolor apparuerit, admisceantur cum repercussis folia hiosciam albi. Et  
hoc est, qđ Paulus dicebat: Si multus intestat dolor, folijs al. croci cū ritica farina, aut ciceris, delinū ur.  
vel calami folijs, vel cucurbitæ succis. Si verō, dicit Auic. apparuerit durities, & pertransit terminū prin-  
cipij, & augmenti manifeste, tunc oportebit, vt regatur cum eis, in quibus est maturatio. Fiat igitur  
tunc medicamentū ex farina fabarum, & chamomilla, & althea, & mucilage sem. lini, & rob. Aut ex fa-  
rina hordei cum aqua, & melle. Aut ex folijs caulium cum farina tritici, & vitellis ouorum, & oleo ro-  
sato. Aut fiat emplāstrum macedonicum ex farina tritici communi oleo, & aqua. Cumque suppurau-  
erit hic tumor, aperiat, caute tamen, ne aut didimus, aut neruus, aut vena, siue arteria ledatur. & Auic.  
dicebat: Oportet, vt fiat apertio apud oscum, & non conceditur, vt aperiat illud, quod sequitur anū,  
ne fiat fistula mala, imō præserua talē locum ab apertione cum farina tritici, & bolo armeno. Euacuata ma-  
teria, quod imbibitum remanet, digeretur cum chilosco medicamento. Mundificet postea cū melle ro-  
sato, aut damasceno vnguentum. Vltimō incarnet, cura aureo, aut basilicone, siue citrino medicamine.

Si verō, dicit Auenzoar, apostema fuerit ex cholera, aut in eo prædominauerit cholera, & virtus fuerit  
fortis, purga cum his, quæ cholera educunt, sicut cum sero caprino, coagularo cum lacte fici, &  
quantam partem auri de scamonea, cū duabus s. syr. de mōst. De localibus nihil dixere medicī nam  
euacuato corpore, de facili hic tumor resoluitur, stando in frigido, & humido victu, sine vino, & motu.  
Aut si oportuerint localia, vnguentum rosatum Mes. est de melioribus. Aut R. spumæ argenti s. j. cerus  
fz s. s. olei violati s. iij. misce in mortario plumbeo, donec ad consistētiā limicini redigatur.

Cum verō à pituita hæc producat dispositiones, & sit tumor laxus, mollis, albus, & sine dolore, vt  
in catheticis, aut hydropicis accidere solent, cum difficultate curant. nisi prius remoto malo corporis  
habitu, vt dicam loco suo. At, cū sine hac dispositione apostema contigit, præmissa veng pectene, si cor-  
pus fuerit sanguinis multo, aut repletū diuersis humoribus, qđ de ratione sui victus, & ex pulsū, & vniū  
haberi potest: aut si in eo multa abūdauerit pituita, talis purganda est cū pillulis, aut ellectuarijs: aut

siat confectio ex zucchero, turbiā, agarico, zinzibere an. partes æquales, de qua assumat infirmus 3. ij.  
in mane. Et quia ægritudo inducias expectat, præparet materia, quia cruda, cum syrups, aut decoctis,  
inde postea euacuet. Auenzoar dicebat in istis apostematibus phlegmaticis vttere emplāstrum, factū ex fa-  
rina hordei, cinere lentifici, & aceto. De sortibus, dicebat Auic. est, vt sumat ex farina ciceris, & fabarum,  
& ciminum, & adeps renum capræ, & chamomilla, & mellilotum, & cera, & fiat vnguentum; aut dis-  
soluat in bdelium in rob, & cum oleo sambucino administretur. Sed si tumor durus fuerit, & in eo bilis  
atra peccauerit, & color sit niger, scias, dicit Auenzoar, quod multiplicabitur, quia sic manere non potest.  
Et si volueris eum medicare cum sortibus medicinis, fortificabitur ægritudo; sed sufficit corpus euacua-  
re à melancholia cum polipodio, lapide lazuli, & epithimo an. partes æquales, florum nucularis, violarum an.  
partem mediam, & eleboris nigri quartam partem vnus, pisenē quæ libet per se, & cribelen-  
tū, & rotenē cum auro vno olei amygdalarum dulcium, & incorpora cum syrupo squinzibidi, id est, ace-  
roso. et da istius medicamenti aurens. v. in mane stomacho ieiuno, cum aqua tepida, diebus pluribus. sit  
vero spatium inter vnā, & aliam assumptionem tot dierum, quot vices affecituri pātiens, iterumq;  
dabis: Nam vnā tātum euacuatione hic humor non purgatur. At si lubet, intermissis diebus materiam  
præpara cum syr. bifantino, de epithimo, de fumaria, &c. Aut, si videbit tibi, alio medio hanc purga ma-  
teriam. De localibus, dicebant Celsus, & Paulus: Si vetustior est morbus cum duritie, cucumeris suc-  
cus, vel radix in mulla cocta, leuigataq; cum loli farina admouet. Item hoc efficax est remedium Pauli,  
& laudatur à Principe, vuarum, quibus acini sunt exempti s. v. cucumeris subserueturum sequencia,  
cimini s. j. sulfuris s. viij. nitris s. iij. resine s. iij. a. corrica omnia cū melle in cataplasmatibus formam digrētis  
vitor. Multa alia, ibi dicit Paulus, & fuerant ad hunc scopum opportuna, quæ vide.

10. f. m. 2. a.  
s. de mor. 10  
lib. 4. cap. de  
mor. testicu-  
larib.  
lib. 4. cap. 14.

1. f. m. cap. 3.

lib. 3. cap. 14.  
ut 3. lib. 3.  
cap. 4.

## De Tumoribus manuum, &amp; pedum.

## Cap. XIII.



**S**OLENT in aliquibus corporibus, & magis in eorum extremitatibus, vt in calca-  
ncia, & digitis pedum, ac manuum, in maximis frigoribus, & vtpurimum puer-  
rorum, tumores quidam euenire, qui buginæ dici solent. Græci autem chime-  
thia vocant: Paulus verò perniones appellat, & dicit: Perniones vlcera sunt,  
quæ ex frigore hyberno in digitis manuum, pedumq; contrahuntur. Accidit in-  
primis tumor quidam sine valde eleuata dimensione, cum dolore intenso; cui in-  
terdum associatur rubedo quædam, & durities. Scinditur ex se tumor hac absq;  
sanæ productione, & apparet fissuræ cum quadam siccitate, & albedine, propter frigidam, & sic-  
cam loci complexionem; et interdum ad loci exulcerationem perducitur hæc passio. Et sunt vlcera  
mala, dolorosa, innato priuata calore, sicca, absq; vlla digestionē.

Datur præseruatio huius passionis, antequam appareat, præcipue in his, qui soliti sunt in ingenti ge-  
lu hos pati tumores. vt docuerunt Cellus, & Aetius, si custodiantur extrema à tali frigore, cum pel-  
libus, & rebus innam calorem præseruantibus. Lauentur pedes cum decoctione parietaria, aut  
fertulæ campanæ, aut fœnu graci, aut graminis. Et si aliquis dolor apparere incipit, iungatur cum  
oleo nardino, aut de pinipero, aut de piretro, aut supercalestiat locus cum cinere, milio, & sale, quæ  
omnia prius sint bene calésfacta. Aut, si haberi potest rapa, decoquatur sub cineribus, & cum ea do-  
lens locus ter, aut quater tangatur. Cum verò tumor apparet, lauetur membrum, vt Paulus doc-  
et, cum aqua maris, aut salita, aut cum decocto blezæ, aut erul, aut radice draguncule,  
aut fiat emplastrum ex lenticula; sicu, & rapa; hæc omnia vino decoquantur, & oleo leuigantur;  
aut alia oleo fricta, cum pauca cerâ, superponantur. Rapa multum à Dioscoride laudatur; elixetur  
rapa, & radices ciclamini, & pistentur cum sulphure igne non experto, & parum olei antiqui, &  
cerâ. Ex Paulo (& dicitur Marcëllinum) Rapæ satiuæ radice excavata, conijctur in capacitatem ipsius  
ceræ sextans, olei lenticulni. q. s. decoquatur in lebetæ æneo, cum marina aqua, aut decocto Iupino-  
rum, & cum tali decocto locus abluatur: deinde ceratum in rapa liquefactum frigidum imponatur.  
Et cum adfuerit fissura, locus tepida aqua irroretur, donec aliquantulum mollescat, deinde aut lana,  
aut tepido panno excisetur, & tale superponatur medicamentum, thuris, aluminis scissi, minij, tere-  
benthinæ añ. q. u. & cum suilo adipe diluta inducantur. Et si qua apparet inflammatio, q. olei anti-  
qui vnc. viij. adipis taurini, testis añ. lib. j. argenti spumæ vnc. vj. colophoniz vnc. iij. mellis vnc. vj.  
misce, & fiat medicamentum. Aut q. calcei viuz 3. x. cerullæ 3. xx. ceræ tantundem, pinguedinis  
porcinæ recentis vnc. vij. colophoniz vnc. viij. succi sem. lini vnc. xv. olei dulcis vnc. xxxx. fiat medi-  
camentum secundum artem. Et cum vlcera apparent, mundificentur cum apostolorum medicamen-  
to, aut cerascos, aut isidis, deinde regatur cum vnguento de solatro. q. cerullæ vnc. vj. lythargij  
vnc. viij. hæc abluantur in aqua plantaginis, aut solatri, & adde olei rosati lib. j. succi solatri, planta-  
ginis añ. vnc. vj. bulliant vsq; ad perfectam cocturam, & adde ceræ albæ vnc. iij. misce, & fiat vnguen-  
tum. Aut fiat vnguentum ex sepo arietino, oleo rosato omphacino, sarcocolla, mastiche, & thure.  
Dicit Celsus: Fiunt ex frigore hyberno vlcera, maxime in pueris, & præcipue pedibus, digitisq; eo-  
rum, nonnunquam etiam manibus, & rubor cum inflammatione mediocri est, interdum pustulæ oriun-  
tur, deinde exulceratio, dolor autem modicus, prurigo maior est; nonnunquam humor erit, sed non  
multus, qui ferre vel pos, vel saniem videtur. Eius cura est, vt in primis foueatur cum aqua calida,  
in qua sit decocta rapa, aut si ea non est, verberna. Si nondum adaperitum vlcus est, quàm maxime ca-  
lidum qui pati potest, ad mouendum est: si iam est exulceratio, imponi debet alumen æqua portione  
cum thure contritum, adiecto vino: aut malicorium aqua decoctum, & contritum.

## De perforatione ventris in Asciti, atque de alijs Tum. hydropicorum. Cap. XIV.



**I**N omni hydropē ventris tumor apparere solet; in aliquibus verò cedematā in po-  
dibus, & manibus contingunt, vt Gal. docet his verbis: Apotematis pedum est  
res, quæ communicat omnibus speciebus hydropis. ratio, causæque est in prom-  
ptu: nam patitur hepar in tali morbo, & eius diminuitur operatio, quæ est, san-  
guinem producere frigidæ, & humidæ complexionis generare: ob eius verò malam qualita-  
tem producit frigidæ, & humidæ complexionis, & talis puuitofus est, cum pitui-  
da sit sanguis diminutæ decoctus. Solent apparere tumores extremitatum in  
anasarca, in ea scilicet, in qua multa viget pituita in timpania verò solus status  
consuetur: de quibus tumoribus paucus sermo hic habendus est: sed principalis oratio sit de ascite,  
in qua ventris tumor magnus apparer, in quo aqua multa, & tenuis contineri solet, vt placuit Gal. &  
Auenenna. Nam solet interdum hæc humiditas a manuum operatione euacuari, ideo de tali opere  
aliquid dicendum est. Dicebat Albucasis, & Paulus, Ex hydropē illa, quæ curatur cum ferro, non est  
nisi

Lib. 4. cap. 73.

Lib. 4. cap. de vl-  
cerib. ex frigore  
lib. 4. cap. 74.Lib. 4. cap. de vl-  
ceribus ex frigore  
in pedibus.  
804.V de Aetium  
de mor. cap. 101. Prognost.  
com. 1.Auc. 1. l. 1. cap.  
de tumoribus.De tumorib. ca.  
10 14 l. 3. 124.  
cap. 4.  
lib. 4. cap. 54.  
lib. 4. cap. 50.

- 10 nisi species alscitis sola. Nec approximandum est cum ferro speciei timpanitis, neq; speciei hypofar-  
chæ penitus; nam illud mortale est. Quando igitur fueris medicatus speciem alscitis cum medicinis, &  
non contulit: tunc considera, si infirmo iam consecuta est debilitas, aut est cum eo infirmitas alia præ-  
ter hydropem, sicut tussis, aut ventris solutio, aut difficultas anhelitus, & si illa illis, tuncq; caue  
ab operatione manus; quoniam est timor magnus. Et Avic. dicebat; De incisione verò mirach, scias,  
quòd parum proficit, nisi in corpore valde forti, dum potens est tolerare exercitium temperarum, &  
sitim, & minoracionem cibi, &c. Sed quia (vt Celsus dicit) aquam his, qui hydropici sunt, emitti  
oportet; igitur ante hanc operationem, sectiois conditionibus consentientibus, idest, si infirmus  
fuerit exuberantis virtutis, dicit Albucasis, neq; est cum eo agritudo præter hydropem, & non est  
puer, neq; senex, & boni animi, hæc consideranda sunt. Primò modum generationis tumorum, &  
eius causam, idest, nunquid ex iccoris mala dispositione, aut lienis intemperie, aut intestinorum diver-  
sa qualitate hoc contigerit. Secundò locum, in quo sectio perficienda est, inspicere oportet. Tertiò  
instrumenti qualitatem. Quartò incisionis quantitatem. Quintò evacuationis aquæ proportionem.  
Sextò cannulæ substantiam, & formam. Septimò modum evacuationis. Octavò, & vltimò reificatio-  
nem membrorum. Causam tumoris considerare opus est, necnon locum, in quo aquæ maior pars  
contenta est; nam iubent antiqui, vt sectio celebretur in opposita parte loci patientis; Id eò, dicebant  
Albucasis, Paulus, & Avic. Considera, si est generatio hydropis ex parte intestinorū; tunc enim opor-  
tet, vt clungeris cum sectione ab umbilico, quantitate trium digitorum, ad inferiora, in directio eius,  
supra pectinem: si verò propter agriudinem hepatis, tunc sit sectio tua sinistra, ab umbilico tribus di-  
gitis. Et si generatio eius est propter splenem, tunc sit sectio in latere dextero. Et non oportet (dicunt  
Medici) vt sit sectio in latere, super quod vult iacere infirmus, ne currant superfluitates ad illum lo-  
cum debilem, sic iubet Paulus. Celsus tamen dicebat, quòd aliqui vbi umbilico, ferè quatuor inter-  
positis digitis à sinistra parte, quidam ipso umbilico perforato, hoc facere consueverunt. Cum verò  
ad sectionem perveneris, sint instrumenta apud re, ad hoc idonea. Et Albucasis describens hoc instru-  
mentum ait; Sit duarum partium acutarum, idest, sit incisors ab utroque latere, longum, acutè extre-  
mitatibus, sicut spatulæ, aut phlebotomum, aut lanceta, & est instrumentum, quo venæ secantur.  
Cuius forma in officina delineabitur.

14 1. 084. cap. 13.

Lib. 7. cap. 27.

Lib. 4. cap. 10.

Lib. 7. cap. 15.

- De quantitate verò incisionis, dicebat Albucasis, sit quantitas, quæ excoriatur, quantitas vnguis,  
aut circiter illud. Et Celsus dicebat; Id instrumentum tale esse debet, vt ferè tertium digitum partem la-  
titudinis mucronis impleat; sitq; preparata cannula, seu fistula, aut aurea, aut argentea, siue plumbea, aut  
40 ænea, grossitudinis minus aricularis digiti, sitq; vt eam describit Celsus, quando dicit; Tum plum-  
bea, aut ænea fistula coniungenda est, vel recurvatis in exterioriorem partem labris, vel in media circum  
surgente quadam mota, ne tota intrus delabi possit. Huius ea pars, quæ intra, paulò longior esse de-  
bet, quàm quæ extra; vt vltiorem membranam præcedat; per hanc effundendus humor est.  
Forma cannulæ Celsi & ipsa in officina describetur.

- Albucasis verò alteram fistulam describit, & credo, quòd hæc sit eius forma. Nam ipse dicit; In-  
tromitte in foramen instrumentum, cuius forma est similis cannulæ, & sit ex argento, aut ære, & lenè,  
terfium; cui in inferiori parte sui est foramen parvum, & in lateribus eius sunt tria foramina, duo ab vna  
parte, & vnum à parte altera, & facta est extremitas alia incisa secundum incisionem calami. Cum n.  
instrumentum pervenit ad aquam, tunc ipsa descendit statim per instrumentum. Simile est instru-  
50 to, quo clistera imponi solent, cuius figura in officina reperietur.

- Cumq; hæc preparata fuerint, rectus homo statuitur: sin minus, in sedili collocatur. Addit Pau-  
lus; Sine hoc quidem fieri potest, attingi non debet, cum adeò sit inutilis. Stante recto homine,  
miniftris retrò assistentibus, iubebimus, vt tumorem ad pubem mambus premant, depellantq; dein  
de perfora cutem totam; & si dicat Celsus; Quidam cute primum adusta, deinde interiore abdomi-  
ne inciso, quia quod per ignem diuisum est, minus celeriter coit, inde ferramentum demittitur, ma-  
gna cura habita, ne qua vena incidatur. At cute, quæ superiacet, acie instrumenti excoriata, carno-  
siorem partem musculi fecare oportet, cauendo eorum extremitates, vnde multi tendones originem  
trahunt, membranam peritoneo, seu siphac diuidere opus est, quousq; scalpellum inanità penetraue-  
rit. Hæc est cura Veterum. Addit verò Avic. Sit foramen mirach inferius foramine siphac, quatenus  
60 cum egredietur canna, cooperiatur illud, & retineatur aqua propter diversitatem duorum foraminum.  
Et Albucasis dicebat; Perfora cutem totam, deinde intromitte in illam sectionem, & eleua manum  
tuam cum spatulæ inter cutem, & siphac, quasi tu excories ipsum; deinde perfora siphac, donec ve-  
niam ad locum vacuum, & est locus aquæ. Dum autem ibi perveneris, instrumentum extrahe; & per  
foramen illius membranam fistulam demitte, donec mediam extraxeris aquam in ea hora, & non plus,  
dicit Albucasis; quoniam si euacues ex ea plus, quàm oportet, fortasse moritur ager propter resolu-  
tionem spiritus animalis, aut accidit ei synopsis, quæ appropinquat morti. Et Paulus dicebat; Fistu-  
la imponenda est, per quam humor effundendus est pro cuiusq; virium ratione, quam ex pulsus tactu  
deprehendemus; deinde exempta fistula, humor sisti debet, sistetur autem statim vicissim incisa linea:  
At nos securitatis gratia (dicit Paulus) linamentum tortile per solam abdominis diuisionem dimittimus

14 1. 084. cap. 13.

14 1. 084. cap. 13.

14 1. 084. cap. 13.

14 1. 084. cap. 13.

timos. Cellus verò cannulam non extrahit, ſed air; Vbi maior pars aquæ euacuata eſt, claudenda de  
miſſo lincolo fiſtula eſt, & in vulnere, ſi id vſum non eſt, relinquenda. Quidam tamen (ipſe dicit)  
non vita cute, proſtrius hiſtulam recipiunt, & ſuper vulnus ſpongiam ex preſſam deligant; deinde poſte  
ro die rursus hiſtulam demittunt, quod recens vulnus paulum diductum patitur, vt ſi quid humo  
ris ſuperſit, emittatur: idque bis ita ſeciſſe contenti ſunt. Aegro recumbente, recreatoq; per in  
ſequentiem diem rursus momentum humoris, quantum virtus exigit, fiſtula euacuabimus; atq; ita dein  
ceps faciendum eſt, quoſque minimū humoris ſuperſit; ita tamen (dicitur Cellus, Albucasi, Pau  
lus, & Auic.) vt vbique ſubſtant, vniuerſamque euacuationem viemus: multi ſiquidem imperite ma  
nuum admoſui, vnā cum humore vitali, etiam ſpiritu euacuat, ſubito hominem iugulante. Sed, di  
cit Paulus; Qui ſecurius rem agunt, modico humore educito, vt virtus magno leuaretur pondere, reli  
quum medicamenti aquam ducentibus, & cibis deſiccantibus, & ſiti, & ſole, conſumpſerunt. Fiat  
inde aut hepatis, aut peccantis membri rectificatio, vel cum reubarbaro, aut reſponſorio: de eo exhi  
bendo omni mane 3. i. cum vino maluatico, aut cum ſyr. de cicorea Nicolai, aut ſimili alio medica  
mento. Apparent ordinata in patientibus hypofarcam, quod ſymptoma eſt, & accidens, aliſ ſuper  
ueniens morbo. Igitur quia præceſſit victus ratio, alia medicamenta, quæ diſcutiunt, & ſine moleſtia de  
ſiccant, adhibeto: vnde tumentia membra oxirrodino, aut oximelite, aut cum oleo, ſtaſte, ſale, &  
aceto perſicato: vel ſpongiam nouam, aut aliam claro lixiuio ablutam ſuperligabis, & ligamentum  
ab interiori parte ad ſuperiorem ducto, & conſtringito. At ſi maiorem quæris reſolutionem, & ex  
ſiccationem cum aliquā incifione, in poſca cum alumine, & ſale ſpongiam maderis. At cum aqua  
euacuata ſuerit, & virtus fortis facta eſt, de ſacili hi euaneſcunt tumores; quia iecinoris correctæ com  
plexio illis non opūlarur: Nam qui de nouo ſanguis generatur, optimus eſt, & non pituiſoſus.

## De Tophis in Podagra, &amp; Chiragra contingentibus. Cap. XV.



ODAGRA, chiragra; morbus ſatis notus eſt, cuius cauſa licet ſubobſcura eſſe  
videatur, cum à diuerſis humoribus originem ducat, hanc tamen ad duo potiſſi  
mum principia reduciſſe viſus eſt Gal. quorum alterum eſt inordinatum victus  
regimen in 6. rebus non naturalibus, in coituq; præcipue; alterum verò ad articu  
lorū imbecillitā: & perinet, vnde hæc paſſio hereditaria ſpiſſime reperitur. huius  
cura vniuerſalis, licet diſſicilis admodum ſit, non tamen impoſſibilis eſt, præcipue  
in principio, ſi debito modo, debitoq; tempore, quæ humores craſſos atque enuē  
t, euacuent, articuloſq; corroborent, medicamenta exhibeantur, cuiusmodi ſunt, quæ in cap. de edemate  
propoſuimus, nunquam tamen ab Aermodaſtilis deſiſtendum eſt: Particularis autem cura nec ipſa fa  
cilis eſt, eoq; præcipue, quæ circa Tophos verſatur, de qua nunc pertractare intendimus. Suppoſito igitur  
cum Gal. fieri Tophos, noduſe, quando vel ab intemperie partis nimis calida, vel à medicamentis ap  
plicatis, quæ reſoluendi admodum, non autem emolliendi, ac attenuandi virtute pollicant, & enuores par  
tes reſoluuntur, craſſioribus magis in craſſatis, hi autem vel omnino indurati & lapideſi ſunt, vel in via;  
vt lapideſi ſiunt, quæ non omnino ſunt indurati, à nobis cum Auic. cum hiſ, quæ emolire, tanſilperq;  
digerere poſſunt, erunt curandi, vnde ad hoc propoſitum maxime facere videbuntur embrocationes  
ex capitis Caſtratorum, cum alia, malua, violis, & huiusmodi, ad d. ris etiam oleis, & pinguedinibus,  
vt ol. ex ſem. lini, pinguedine anſeri, gallinæ, viſi, & huiusmodi. Cetæra, vt ea, quæ gummata emol  
lientia recipiunt, laudat ſummo opere Gal. ammoniacum & emplaſtrum ſacrum, ad hæc multa deſcri  
bit Paulus. Plurimum etiam poſſunt ſuſumigia ex aceto piriſhidi lapidi conſperſo, luta etiam Therma  
rum ſancti Petri in agro Parauano, & S. Helene. Valent vltimo Medicamenta, quæ in ſuſpa parantur,  
Si autem adeo indurati ſint, vt hiſce medicamentis cedere nequeant, tunc ad cauteria deueniendum eſt,  
hoc Hipp. conſulente, Gal. & Principe; huiusmodi enim medicamentum ſuente materiam compe  
ſcit, fluxum euacuat, partemq; corroborat. Tempus autem, vtendi hoc medicamenti genere, eſt; quan  
do alia non valet auxilia, & quando articuli propter materie multitudine excidunt. Modus autem  
ad Albucasi demonſtratur; iubet enim, vt ſuper dolen em locum tres lineæ tranſuerſales atramento de  
canari, & ſuper vnaquaq; linea quinq; cauteria inſigantur: Hipp. autem & decem, & quindecim aſſig  
ni in hac tamen operatione & materie modum, & quantitatem, & egrotantis virtutem inſpicere oportet,  
Poſſunt diuerſis modis aſſualia cauteria parari, quos deſcripſit Auic. loco citato. potent ita poſſunt  
etiam fieri; laudantur tamen magis aſſualia, quæ quantum heri poſſet, debent aperta detineri, vt pan  
no albero, ſoye æris, vel eleboro pigro, vt tota materia expurgetur; deinde medicamentis conſoli  
dantibus conſolidentur, & hæc de Tophis in podagra ſaxis ſunt dicta.

FINIS.

# IOANNIS ANDREAE A CRUCE, VENETI MEDICI,

## Tractatus Secundus. De vulneribus.

### LIBER PRIMVS.



#### De Cranij Anatome. Cap. Primum.



RATIFICIS rationalis munus est, ac vniuscuiusque interest, qui de nobili re subiecta sermocinatur sit, ac de illa praesertim, quae non levis negotij existat, quemadmodum illam esse arbitramur, quae in nostris Chirurgicis enarrationibus perpendenda venit, antequam sermones particulares aggrediatur, rem prius, de qua locuturus, & in qua operaturus est, ponderare; quemadmodum liquis aliquod morbi genus tractare intendis, primò affectus partis naturam, & compositionem explicare tenetur. Quapropter operæ pretium nos facituros duximus, si, ne in his defecisse videamur, subiectum prius perlibrauerimus, ut faciliori quodam modo curatiuam partem auspicari inde valeamus ea methodo, & praxi à nobis assidua iam lectione, ac diuturno experimento comparata, quam nunc Deo optimo maximo annuente Chirurgiæ studiosis impartiri decreuimus; siquidem id agendum esse, ratio exigit, atque idem in facultatibus vniuersis priscos omnes, qui methodicè quidquam tradiderunt, perpetuò egisse constat: Dicamus itaque. Caput, quod nunc eam partem tantum, quae pilis seu capillis, aut crinibus regitur, vna cum fronte intelligimus, Græcè Cephas, & Arabicè Ras, & Latine supremum ventrem vocatum, nostrorum sermonum ac operationum subiectum esse, membrum quippe organicum, ex similibus partibus constructum, quarum aliquæ exterius tantum continentur sunt, aliae continentur, ac simul contentæ, & quamplurimæ contentæ solum. Dimissis igitur capillis (sunt quidem capitis decus, atque ab iniurijs exterioribus turela quædam, ex fuliginosis excrementis sursum elatis) quod primum obuium venit, cutis est, ob exoriationis aptitudinem Dermo Græcè appellata, cui capilli radicibus inhaerent, dura, densa, crassa, sicciorisq; naturæ, quæ caput totum ambit: huic vndiq; membrana illa, quæ panniculus carnosus, musculus membraneus, totius corporis inuolucrum, & membrana carnea nuncupatur, subest; quæ quidem in capite pinguedine destituta haud exiguo labore à cuti euelli potest, nec non & alijs partibus, ut temporibus, fronte, occipiti, musculi adfunt substantia, & forma differentes, adeo ut quidam eos in fronte panniculi carnosius partem potius existiment, quam exquisitos musculos, hoc est nostri corporis partem instrumentalem, qua arbitrario motu, & iuxta voluntatem propriam mouemur, propterea quibusdam ipsos substantias musculosas appellare libuit: at tamen in fronte duo satis confusi adesse videntur, qui obliquè descendentes à capillorum ortu versus internos oculorum angulos superciliorum locum occupant, & illius sedis eleuatione, oculorumq; ad-

Tract. 2. De vuln. A aperture

ἀποκαταστή. apertioni vsui sunt: At temporum insculi, crotaphites Græci vocant, sensibus expositi, magni, nō-  
 tabiles, ac multi sensus existunt, adeo vt, si detecti tangantur, conuulsiones facillimè exsint. Parti-  
 bus his vndiq; panniculus ille subest, communiter voce Græcæ Periostios, in capite verò Pericranion,  
 Arabicè almocatin, & Latine membrana adnata, & circuncranialis denominatur, substantiæ nerueæ,  
 acutiq; sculis à crassa meninge subingente per Cranij futuras originem trahens, quo fit, vt vulneratus  
 medico quandoque negotium, aegroto verò mortis periculum afferat; subsequitur inde capitis os, Cra-  
 nion Græcè, Techa Arabicè, cerebri Galea Latine, idest munimentum aut custodia, & calua, aut Cal-  
 varia, hoc est emineus os, communiter Græcæ vocem cranion, idest concavum, & continens vocitant;  
 nam vniuersa Cranij cauitas ad cerebrum excipendū destinata est, laminibus duabus firmis, durisq;  
 contextum, & quam plurimis ossibus fabricatum, quæ varijs futuris insimul committitur, vt per  
 eas dura meninx ossi capitis alligetur; harum laminum superior inferiore maiorem duritiem conse-  
 quuta est. interponitur autem ipsarum substantia quedam rara, porosa, & medullæ instar, quæ omnia  
 membra dicta his vocibus designantur, nempe parii exteriori, Cranij nomen indium est, mediæ  
 verò ossis spongiosi, medullaris, & medullij, minimarum caruncularum, ac venarum exuberantis,  
 partibus alijs nutrimentum afferentium; inferiori pariter ambiens, ac internas tunicas setuanti, diploi-  
 dis Græcè, vitreæ Latine, & vulgo secundæ tabulæ nomen assignatum est, sub quæ crassa tunica, Græcè  
 meninx, Latine tunica subcingens, cerebri velamen, aut involucreum, & vulgo dura mater, colloca-  
 tur, membrum quidem feminale, duabus tunicis constans, exterius aspera, interius verò lenis, sub-  
 stantiæ nerueæ, à cerebro seiuncta, sed eius propugnaculum est. Hæc, dum cerebrum attollitur, &  
 submittitur, cum perpetuo moueatur, continuè pullat. Subsequitur immediatè aliter mollis tunica,  
 tenuisfimaque Græcè choros, & choriiformis, ab Auicennæ interprete secundina, communiter seruati-  
 ua, & vulgo Pia mater dicitur; namque immediata quadam contiguitate cerebrum ab ipsa tangitur,  
 vt non modò amplectatur, verum etiam in eius profundum sese vna cum dura meninge insinuet; natu-  
 ra enim inter cranium & cerebrum (quia substantijs multum discrepant) vtraque meningis posui-  
 se videtur, sub hac cerebrum statim exponitur Græcè ratione situs, quia in capite locatur, Enceph-  
 los dictum, vniuersam caluariam replens, mollis substantiæ, coloris albi, superficiè cuiusdam inæ-  
 qualitatis; iuxta medium rectam diuisionem in longitudine consecutum, posterior ad latitudinem,  
 vbi cerebellū, Græcè parencephalos dictum, repositum est, anteriùs verò vbi tora cerebri moles repe-  
 ritur frigidi, laxioris, cæteris partibus, ex se penitus sensus & motus expertis, & si per acciden-  
 teriarum copia moueatur, & tanquam aggregatū instrumentum, affectiones proprias, & alienas sen-  
 tiat, animæ ratiocinatricis domicilium, neruorumq; mollium omnium propago est, ac omnes imagi-  
 nationes, & intellectus complectitur: Ossa capitis pro natura se habentis octo numero esse demon-  
 strat anatome: sed quæ noscenda, ac perpendenda nunc veniunt, sex tantum fore statuiunt, futuræ ve-  
 rô cæ diuidentes à Latinis veræ & legitimæ, à Græcis Raphes, ab Arabicis adorem, & vulgo commif-  
 suræ dicte, tres sunt; due oblique, anteriùs & posterius caluariam segregantes; tertiæ rectæ ab amba-  
 bus prædictis ad longitudinem ipsam separant, omisso tamen duabus petrosi à lateribus sitis, Græcè,  
 quia petræ speciem referunt, lithoides, & lapidoides, & Latine ratione situs temporales, & à piscium  
 squammarum similitudine squamosæ, & squammatormes vocantur. verum quoniam oblique in-  
 terius penetrare videntur, mendose vulgo dicuntur; sunt & adhuc aliæ in superficie sitæ, sensum pro-  
 pmodum latentes, nulliusq; momenti, quæ Rimæ & harmoniæ rectius, quam futuræ, & anatomicis  
 vocitantur. Hæc omnia capitis ossa differunt inter se nomine, substantia, figura, magnitudine, & situ.  
 namque frontis os, quod eam inferius partem denotat, quæ superiorem oculorum sedum regionem  
 constituit, superius verò cui terminus coronalis sutura est, vbi pars anterior cerebri reconditur. Græ-  
 cè metopon, Arabicè hezem hamezec, Latine frons, sinciput, os coronale, pars inuerecunda, prora,  
 & os sensus communis appellatur, in pluribus continuum, vniuersæ substantiæ penes supercilii cauz,  
 duriusculæ ve, in aliquibus verò in duas partes rectas scdum ob sagittæ similis figuræ vinculum ad na-  
 si terminum vsque, vbi os illud reperitur, à Græcis ilthmoides dictum, & hac parte cognoscens animæ  
 potentia, phantasia, communisq; sensus reponitur, à os istud debile, ac subtile est, magis tenue vertice,  
 & occipiti, eiusq; vulnera quandoque salubria attestat experimentum, cum sedis occasione facili  
 per quam plurima vasa, ac diuersos mentis expurgari valeat, formaq; sua orbiculari telorum generibus  
 omnibus obliata, quamuis secus crediderit Hippocrates; At summa pars vertex, & cacumen, ossa pa-  
 rietalia, & temporū à Latinis, à Græcis Bregma, & Corypha, ab Arabicis Alema, & Zeudech nuncupa-  
 tur, futuræ in sagittæ morem rectitudinem, finditur, sedes discursus, seu componentis, ac diuidentis ani-  
 mæ facultatis, vt aiunt, integumentum; figura est tetragona duarum laminum, soliditatis non exqui-  
 sitæ, interdum admodum debiles, tennes, & cauz, vt in nuper natis videre expedit, qui in respira-  
 tione, ac lactis succione eam partem potissimum mouent, quæ vulgo molamen vocitantur. ibique cum  
 nusquam futuræ laxis hæreant, & capitis pars tenuissima sit, cauteria vel candescens ferro, vel auro,  
 vel adurente quopiam medicamine pro alieius effectus ratione, sed parò turo interdū, exiguaq; adeo vt  
 li-rate nonnulli adhibet. circumscribantur autē anteriùs à frōtis offe futura coronali media, posterius ve-  
 rò à collostolæ offe seu occipiti, futura lambdali mediæ, à lateribus quoque squamosis illis futuris  
 qua



- 29 qua parte solidiora existunt, uti posterioris ob ossium crassiorum, solidiorumque contemnum. Huius sedis vulnera non levis labor negotij, praesertim si inter frontem, & verticem occurrant, nam hic paucissima, tenuissimaque carne tegitur, atque ibi suturae laxae sunt, & plurimum cerebri subest: Posterior capitis locus, Graecè, inioi, & opisthocranium, Arabicè hezen haboreph, Latine os occipitis, occipitij, lambdæ, puppis, pixis, & os memoriæ appellatur, cui cerebellum supponitur, fons, & origo spinalis medullæ, ac nervorum omnium solidorum initium, corpori vniuerso sensum, motumque deferrentium; ubi etiam recordandis, ac rerum compositionem, & diuisionem seruandis facultas viget: vnicum quidem est hoc os, quod signatur sutura lambdoide, intimum, crassius, cæterisq; maius, solidissimum, & inaequale, ut partem valde nobilem tueatur, ac ut posterior, deficiente oculorum vîu, tutius in noxarum generibus se habeat; quapropter quæ huic cucunant vulnera, minus lethalia esse creduntur:
- 30 laterales partes penes oculorum angulos externos, Graecè crotaphites, & lapidoides, Latine ossa temporum, & tempora. Arabicè hezendachin, quæ squammosas commissuras ambiunt, subtilia, inaequalia, sed solida ossa sunt; cæterum solutiones contusi huic parti occurrentes, lethales iudicantur, ubi dolores, & convulsiones ob musculi illius sedis nimium sensum, ac arteriarum, venarum, & nervorum copiam, saepe patientem infestant, contigua ossibus petrosi existunt: Nec ossa lateralia, eminentia, Graeci zygomatica, Latine paria, & iugalia ob id appellata, quod boum iugis comparantur, contemni debent; namque eorum initij fracturae penes angulum externum oculi, temporalis ossis inferiori parti coherentes, cum insignes fuerint, ob eorum alligationem, & consensum cum inferiore maxilla, & quia temporum muscularis idoneo propugnaculo sunt, periculo, ac ambiguitate haudquaquam vacant: Verumtamen, ut quæ hæcenus dicta sunt, lucidiora reddantur, typis exculptas capitis figuras in-
- 31 spiciamus, aptissimas (nostra quidem sententia) praedictorum sermonum explanationi. Ossium igitur sex numero quantitates, formam, & situm, characteribus grandiusculis signatorum, prima ostendit figura, quorum omnium nomina in margine impressa leguntur: In secunda, suturas tri: ferratas, nobiliores, verasque descripsimus, quæ in crano naturalem figuram seruante, coeunte hanc effigiem C—C propemodum formant, aut fortasse (ut aliqui credunt) simillimam literæ Graecæ X, sed potius talem C—C verius tamen latinam nostram maiusculam H. pariter etiam duas laterum notas, mendo fas, aut squammosas, delineauimus; singulatim verò quæ in sede anteriori apparet, oblique procedēs versus angulos oculorum externos, ubi coronæ locantur, Graecè à rotunditate stephanica, Arabicè haciliij, Latine coronalis dicitur, quamcum ab arcus effigie vulgo arcuata, arcualis, & sutura proræ nuncupatur: At recta, lata, Graecè obeliza, Arabicè zeudech, Latine media & recta, ac ob talem for-
- 32 mam latiore vocabulo sagittalis dicta, partem Caluarie dextram à sinistra seungit: Quæ posterioris locatur, à litera Graecæ A, imagine lambdoideis, & hiplyloideis nomine pronuntiatur, Arabicè lamdi, & Latine lambda, lambdalis, & voce corrupta lauda, & puppis: Reliquæ verò commissurae, quarum una ab infima lambdæ fede sursum ascendens, quasi in l'ar feniciculi supra aures ad coronalis suturae terminum perripit, à Graecis crotaphig, à Latinis lapideæ, & vulgo parosæ dictæ sunt, ac ob soliditatem forsitan squammarum subintrantium, quibus inuicem compingitur. Hippocrates futurarum nomen ab eis auferre videtur, & à squammarum similitudine squammosas conglutinationes appellat: Tertia sagittalem suturam per foris medium ad supercilia, & nisi summum vsque, descendere in quibusdam caluarijs tum virorum, tum mulierum commōstrat, quæ pariter in pueris ad septimum vsque annum manifestè dignoscitur. Huiusmodi enim suturae in naturali capite annorantur, verum in aliquibus grandiores, ac laxiores, in alijs exiliores, & magis compactæ videntur. Capita autem naturalia vocamus sphaerica, cum ad iniurias repellendas figura talis idonea sit, paulò vtrinque depressa, posteriùs aliquantulum prominentia, in vertice plana, ut in prima figura patet, quæ madmodum in secunda suture ipsæ delineatæ inspicere possunt: Hæc euariant in capitibus per accidens alteratis, ut Genuensium, Græcorum, & Turcarum, modò à naturalibus plurimum non delectant; In capitibus verò ab hac forma euariantibus, quæ non naturalia censentur, quatuor varias formas, siue futurarum imagines, & si rarò eas spectare contingat, annorauimus, quasi Hippocrates tantum meminisse videtur, dum inquit, hominum capita in nihil inter se simile habent, neque suturae in omnibus eodè modo consistunt: verum quilibet ex priore capitis parte prominentiam habet, ut in quarta figura, ex sagittali & coronali formatur, obiectiue intuenti litera talis J, deficiente tuberositate posteriori, deducta nimirum à coronali sagittali ipsa vsque ad ceruicem; contra verò cū anterior prominentia perit, posteriori leuata, ut in quinta figura, eodè suturae in formam literæ T se habent, adeò ut iam coronali deleta, sagittalis à lambdoide orta recta feratur vsque ad nasi summum: quod si prominentia vtrique iam deperdita sit, vertex elatus, his coronali, & lambdoide obliterata, iuxta medium efformatur: Ex sagittali cranium secundum longitudinem signante, & ex altera transversa interfecante, ut sexta figura notatur, & Theriis caput ostendebat. Quartam non naturalis capitis figuram addidit Hippocrates, in qua anterior, & posterior sedes extuberat media abolita. hæc oblongiora existunt, ut septima figura obseruat, in quibus cum cerebri operationes quædam depræuenter, vita haud quaquam seruari potest: Sunt qui capita in latera ad vtranque aurem insigniora, quam in anteriori, posteriori que sede, prominere autem, ut Indorum ex Peru, quod octaua figura percipitur, quorum sutura, valde differentes, inordinatas effi-

gies seruant: quæ quoniam animo concipi possunt, & re vera non inueniuntur, fuerunt ab Hippo-  
 crate silentio prætermisissæ: Capita etiam valde magna respectu vniuersi corporis visa sunt, vt Nicoma-  
 chi caput fuisse fertur, innumeraque formarum genera à naturalibus sub diuerso cœlo sunt perspecta,  
 quæ tanquam môstrosa omittenda videntur. Nos verò nusquam huiusmodi futurarum varias species,  
 (quantquam capita môstrosa diuersa, & cimiterijs, & anatomicis administrationibus pernotauerimus)  
 inuenire potuimus, sed ferè semper naturales, aut naturalibus non admodum absumiles perspeximus.  
 Nona quidem figura membranz crassæ subcingentis, vulgo dura mater dictæ, à qua nerua tunica ex-  
 terius caluariam cingens, emanat, formam, & situm inspicere poterimus. Decima vero est, in qua  
 superfici ei forma, ac cerebri magnitudo, & situs apparet, animæ ratiocinatricis domicilium, nervorū,  
 & sensus omnis, motusq; voluntarij principium; sed quia tunica seruans, Siphac, secundina, & pia  
 mater vulgo dicta, adeo tenuis, vt sit vel araneorum tunicis debilior, adamusum delineari non potest,  
 propterea eius effigiem prætermisimus, nitantur igitur anatomes studiosi ipsam re ipsa cognoscere;  
 Nec ab re factum hoc putamus, dum caput formarum, futurarumq; in his nostris enarrationibus  
 de vulneribus capitis, & caluariæ curatione differentias scrutari volumus; nam eò tendimus, vt Chi-  
 rurgi caluariam ferreis instrumentis trañtantes, tutò, ac quàm minime cum strepitu, & dolore, opere-  
 rur, has varias figuras diligenter animaduertentes, & caput conditiones diuersas considerantes,  
 quarum meminit Hippocrates libro de caluariæ curatione, & libro quinto, & septimo de Morbis po-  
 pularibus, Aristoteles libro primo de historia animalium, capite decimo sexto, Celsus libro octauo  
 cap. primo, Galenus libro de ossibus capite primo, libro nono de vñu partium, capite decimo septimo,  
 & commentario primo libri sexti epidemiarum, commeto trigesimo septimo, & Auicenna prima pri-  
 mi, Doctrina quinta, capite secundo, & prima tertij, tractatu tertio, capite vñdecimo, & hæc à nobis diu-  
 turno vñu, & longa experientia sunt obseruata.

## CRANIORVM IMAGINES, QVORVM HISTORIA SVPERIVS ENARRATVR.

I.

- A. Os frontis vñdici, metrop-  
 pon Græcè Latine coronale,  
 & vulgò pœra vocatur.  
 B. Os duo Bregmatica Græcè,  
 concipua Latine, & vulgò parietalia.  
 C. Os duo ab infigij duri-  
 tie Græcè lachryales, Latine  
 lapidosa, & vulgò petro-  
 trofa.  
 D. Os duo imbecilla, & re-  
 mis, Græcè crotaphites,  
 Latine temporum, & vulgò  
 le tempes.  
 E. Os occiput vñicum, dèssimum, & fermisimum, vulgò la coppa  
 F. Os duo zigides Græcè, & Latine iugalia, sive paria.

PRIMA.



SECUNDA.



II.

- A. Sutura stephagina Græcè,  
 coronalis Latine, & vulgò  
 acuta.  
 B. Sutura obelica Græcè, re-  
 dia Latine, & vulgò sagi-  
 talis.  
 C. Sutura lambdoidea Græcè,  
 Latine lambda, & vulgò  
 londa.  
 D. Sutura crotaphica Græcè,  
 mendola Latine, & vulgò  
 lapidosa dicta, re-  
 dictum tamen suum mola  
 conputatio eadè appellat-  
 londa.

III.

Caluaria, in qua sagittalis fu-  
 tura in aliquibus per me-  
 diam frontem vsque ad na-  
 si sinu mî descendere vi-  
 detur, & frousem ipsam  
 secum inter superficiali-  
 tates.

TERTIA.



QVARTA.



IIII.

Caluaria anteciori vñtima,  
 postioris depressa, in qua  
 ex coronali, & sagittali fu-  
 tura efformatur 2. lona  
 adueria similia, lambdo-  
 de obelica.

V.

Caluaria, in qua anteciori  
 emittitur prota, feruina  
 postiorum, & coronalis fu-  
 tura aboleatur, serua lib-  
 da, qua cum sagittali T  
 lona imaginem refert.

QVINTA.



SEXTA.



VI.

Caluaria anteciori, postioris  
 riq; emittitur concisa,  
 vertice paulò subleuata,  
 in qua bina quæ videntur,  
 ferunt ad rectos angulos  
 se inuicem interficiẽ li-  
 teram X repræsentant.



De essentia Vulnerum capitis, ac fracturarum calvariae, earumque differentijs. Cap. II.

40 **A** P P T nobilissimum quidem, ac supremum humani corporis membrum, cum se nullo propugnaculi genere tueatur, ab una quavis evidenti causa, & quae extrinsecus venit, Graece procatartica dicta, facillime affligi potest, nempe vulneribus, contusionibus, & fracturis, quemadmodum etiam ab internis, ortis nimirum in eo inflammationibus, aut cum ab humorum acuitate, eius ossa tumore, aut terredine molestantur, vel dum ab ex magna vaporosa humiditatis copia, vel crassi status abundantia sub calvaria, aut in eius cavitatibus contenta, ex vehementi motu virtutis ex pultrici, ossa ipsa i cistis, aut futuris disjuncte appareant, aegritudo sane permittosa, quam subsequuntur postea affectus, aut nunquam, aut difficillime sanabiles, de quibus instituti nostri non est, in praesentia sermonem habere: verum ut amicis nostris gratificemur, ac multorum salutis, omnibus profecto caducis rebus praeposenda, consulamus, nec non etiam utilitatem quandam, commodumque ex his institutionibus, qualescunque sint, Chirurgiae incumbentes consequantur, has lucubrations nostras in lucem edimus. Cum itaque de humani capitis vulneribus, ac calvariae fracturis fermocinacuri sumus, cumque etiam praedictorum affectuum naturam, quam isti essentiam vocant, curationesque describere intendamus, prius quidem, quot vulnerum, & fracturarum genera multifariam, variisque causis caput ipsum insuadant, haud ignorare necesse est. Postmodum, quoniam pacto inuicem differant, ac quibus vocibus ab antiquis designata sint; deinde quibus indicij, rationibusque mortem, aut vitam praefigere conveniat. Postremo horum affectuum curationem tum vniuersalem, tum etiam particularem ostendimus, atque terminis non tis antiquorum operationes, medicamenta, & instrumenta, necnon a recentioribus sedulo, & studioso inventa in ordine redigemus. Auicenna principis curatiuas indicationes, Hippocratis, & Celsi, ac Galei testimonij comprobantes: Quod autem ad fracturam capitis diuersitatem attinet, dicimus s omne vulnus aut exteriorem duntaxat partem extra calvariam, cutim scilicet, offendere, quo simplex incisio, aut sola contusio, vel punctura, vel abrasio, aut substantiae diminutio quaedam efficiatur: aut paniculatum carnosum, vel musculorum substantiam (& si nullibi, praeterquam in temporibus, isti essentia late pateat, adeo ut vix percipiatur) afficere: vel etiam penitus delatum calvariae involuorum pericranion dictum opprimere, vel adhuc calvariam leuiter corripere, interdum etiam ad medullaris substantiae sedem vsque figi, vel inferiorem calvariae partem, diploidem scilicet, laedere, saepe etiam calvariam subingrediens, tunicam crassam vna cum membrana tenuissima, cerebrumque, excruciare. Ex quo mortem languentes oppetere necessarium est. At si corpus aliquid solidum, graue, & obtusum

capiti obesse contingat, frangitur interdum os, & passio talis Græcè catagma, & spasma, Latine con-  
 fusio dicitur, sed potius, quia affectus ossis est, a fractura vocari debet: Porro fracturarum variz forme,  
 ac differentiæ occurrere solent; nam fiuntur sepe, ac comprimuntur ossa caluarie absque vlla appa-  
 rente fractura, aut rima, vt in pueris contingere solet; quandoque, etsi raro, secundum partem secun-  
 dū, & altera parte franguntur, interdum etiam inuicem attulerunt, vti quotidie explorat chirurgus ma-  
 nus. Cæterum b cum ea vulnera, quæ cutem tantum offendent, simplicissima sint, nec medico, nec medi-  
 camentorum ope egeant, silentio hic prætereunda videntur; & ea pariter, quæ ad pericranium vsque  
 descendunt (quia ob eorum facilem curationem simplicia identidem creduntur) breui oratione transi-  
 genda sunt, siquidem c Scopos noster, & finis est de capitis vulneribus compositis, ac caluarie  
 fracturis sermonem habere; Et cum ex medicorum d omnium sententia, morbi vniuscuiusque curatio-  
 nis initium ab eius morbi essentia sumendum sit, neminem latere debet, bifariam vulnura, ac fractura-  
 rum essentiam Chirurgum speculari, vel quò ad eorum simplicitatem & compositionem, & hæc penes  
 vulneris dispositiones attenduntur, vel quò ad partem ipsam vulnus suscipientem: Porro e simplex vul-  
 nus illud est, quod nec motibus alter, vt inflammatio, aut fractura, nec symptoma diuersum, vt intempe-  
 ries, aut dolor, nec propria causa, vt telorum genus aliquod, nempe lapis, sagitta, aut quid simile comi-  
 tatur: contra verò illud compositum est, quod horū aliquid associatur. Denuo f vulnus illud simplex  
 est, quod simplicem, seu similem particulam solum afficit, ac dum curatur vno simplici tantum medio,  
 cura absoluitur; Compositum verò, quod organicum membrum ex simplicioribus cōcretum occupat,  
 adeo vt simul variæ corporis partes actionibus diuersis influentibus lædantur, intentiones multiplices  
 in eorum curatione requirentes. Etenim g vulnus sic definitum est, vt sit morbus in vnitatem, simpliciū,  
 & compositorum membrorum communis, ab extrinseca causa continuū soluentē productus, quan-  
 quam elegantius fortassis peritus Chirurgus vulnura essentiam iuxta eius simplicitatem, & composi-  
 tionem perpendat, methodum, seu curandi rationem ab huiusmodi consideratione assumens, quem-  
 admodum in sequentiis, dum circa fractam caluariam versabimur, cognoscere poterimus. Caluarie  
 itaque fracturæ a formarum differentia nomina sibi diuersa fortiuntur, vt ordine quodam formarum  
 copiam, & varias fracturarum species seniores medici describere. Nos verò multas tanquam superua-  
 canas dimittimus, illas duntaxat enumerantes, quæ frequentius occurrunt, ac Chirurgo maius nego-  
 tium facillimè in hoc Hippocrate imitati, qui à nominum ceterua in fracta caluarie abstinuit, quem  
 secutus est pariter Gal. & ad ternarium numerum, nempe ad fissuram, contusionem, & fracturam ea  
 omnia redegit, quasi partes ad genera, aut quasi cōposita ad simplicia, ætamè quinquē tanquam magis  
 acceptas, & notabiliore his vocibus appellatas assumemus: FISSURAM, siue SEDM, RIMAM,  
 RELEVATIONEM, COLLISIONEM, ET OPPOSITIONEM, si quidem caluarie os pro teli ictus,  
 atq; ossis varietate variè frangi solet, suntq; vniuscuiusque modi species plures; & vt à prima, vt pote  
 simpliciore, angustiori, leuioriq; exordiamur, cum ab acuta exactè teli acie fractura in osse imprima-  
 tur, ac sensus visus ferè effugiat, & tantum vestigium eorum, quibus inficta plaga est, apparet, à Græcis  
 Rhogme, ab Arabibus Ragamia, & à Latinis fissura, incisio, & sedes dicitur. potissimum verò sedes  
 vocatur, vbi osse in suo statu manente, qua parte telum infuderit, videre licet, quamvis semper sensui  
 angusta appareat, namque sedes ex Galeni h sententia recta, & angusta superficiē ossis intercisio est, &  
 Paulo i Aegineta auctore, Rhogme leuis caluarie incisio est, in qua nequaquam os vitiatum foras emo-  
 uetur, sed remanet in sua natura: Huic à capillorum imagine capillationem, seu capillarem fracturam  
 Albucasis interpret, & ipsum sequitur Chirurgorum recentium turba nomen imposuit. Hæc, dum intima  
 petit, aut diploem ledit, Trichismos Græcè vocatur, quam Paulus artificissimam Rhogmè esse asser-  
 mat, qua ob sui angustiam, & altitudinem sepe sensus decipitur, quò fit, vt obstructa grauissimorū sym-  
 ptomatū, mortisq; causa existat. Hæc fracturarum caluarie vna species est, secundum magis, & minus  
 varietatem suscipiens: nam & tenuiores, & tenuissimæ, & longiores, & breuiore, & rectiores, & curuio-  
 res, & magis, & minus profundæ ossis sunt ruptiones & fissuræ, quæ nec statim post percussione, neq;  
 in his diebus, quibus labori auxiliū adesse potest, apparent: Secundà fractura species, Rimam dictā,  
 quæ semper contusioni adiuncta est, quadrifariam rimari possumus, vel enim à corpore graui,  
 obuso, non incidente, os frangitur, quò fit vt Rima tantum appareat, aut in plures partes os atteratur,  
 & suū non seruat naturā, cō detruditur intro, vel extruditur extra, & ob id sepe meningē internè afficiū-  
 tur, Græcè k Ecrip sine, quasi compressio seu citraffio, Arabicè Antica, Latine Rima, fissio, & fractio  
 vocatur, hoc in adultis cuenire solet, & vbi caluarie induruerit. At si Rima in osse duro, diuiso, seu fra-  
 ctio quædam tenuis sit, circumquaq; obusione aliqua circumdata, sicut interdū exterior lamina tantū, qñq;  
 interior, sæpe vtraq; Rimā, præsertim in sinipite, cōtrahat, & in hos affectus secunda lamina à prima hiat,  
 & iuxta mediū meningis cōprimens nocumenta grauiā inferat, potissimū dum exteriorē laminā inco-  
 lumē arbitrati, internā perennē magis credimus, & paulo post languētes dies suos claudunt, Græci h hæc  
 fracturā Engisfoma, & Engisfomata, quasi inhaerentia, seu corporum appropinquatio, Arabes Manus,  
 & Monelis, & Latini diffractionem, & separationem nominant, potissimum vbi os percellum ita in-  
 fra sanum subsidet, vt membranam cerebri contingat; ob id Paulus dicebat, engisfoma caluæ, ictus est, in  
 quo os vitiatum ad interiorem cerebri membranam descenderit; negantibus autem hanc fracturā spe-  
 ciam,

a Gale lib. de  
 Hippo. de frag.  
 com. lib. de cō-  
 si. m. cap. 6.  
 lib. aris par. m.  
 cap. 9. lib. a. de  
 mor. cap. ca. vi.  
 & q. m. h. c. 1.  
 Pauli 6. ca. 19.  
 Aul. 1. c. 4. et  
 7. 4. tra. s. 1.  
 b Gale 3. met.  
 cap. 2.  
 c Gale 3. met.  
 cap. 6. & lib. de  
 sectis. cap. 1.  
 d Hippo. lib. 1.  
 de morbis, Cel-  
 sus in suo pro-  
 hemio. Gale. 4.  
 meth. c. 1. Aul.  
 1. cap. 1.  
 e Gale lib. ar.  
 par. m. ca. 50. 1.  
 meth. c. 4. Aul.  
 2. 1. cap. 3.  
 f Gale 3. lib. ar.  
 par. m. ca. 50. 4.  
 met. cap. 1.  
 g Gale lib. ar.  
 par. m. ca. 50. 1.  
 de mor. diff. ca.  
 3. 1. de mor. &  
 sym. cap. 3. 3.  
 meth. c. 4. Aul.  
 2. 1. cap. 3.

h Gale 3. meth. c. 4.  
 & lib. de medi-  
 ca diff. m.  
 i Gale lib. ca. 50.

k Gale lib. ca. 50.

l Gale lib. de  
 diff. m. lib. a. de  
 mor. cau. in fine  
 Pauli 6. ca. 50.

m Gale lib. de  
 diff. m. lib. a. de  
 mor. cau. in fine  
 Pauli 6. ca. 50.

10

20

30

40

50

60

- 10 ciem, respondemus \* capitis ossa internè molliora esse, externè verò in vtraque superficie duriora; & hinc efficitur <sup>b</sup>, vt quandoque findantur, interdum vt desinant, si quidem externa superficies in eodem ictu in se ipsam cedere potest, interna verò non, sed Rimam contrahit. Alia lateralis fractura illa est, cum ex ictu vehementi à telo graui, & obtuso ossa caluariae proprijs futuris disjunguntur, aut frustatim diuisi, inuicem compinguntur, vt insigniori fractura, diplois ipsa à prima lamina afficitur, vnde postea, & cauitates, & sinus inaequales in ea apparent, & membranae internae raro noxam euadere possunt. nam teste Hippocrate futurae, quae nudato osse in plaga conspicitur, quacunque parte capitis vulneratur, telum sursum inferedit, ad resistendū & ictui, & telo intrinsecus est, præcipuè coronalis, quae inter frontem & verticem situatur, vbi caput infirmisimum esse demonstrat anatome: \* Graecè talis fractura Camarosis, & Camaromata, vbi ossa in testudinis formā, & quasi camerata videntur, Arabicè curamoros, Latine cameratio, & absconfio dicitur. de hac (quia raro occurrit) nullum verbum protulit Hippocrates, quæ tamē interdum sensibus dignoscitur, interdum etiam omnino latitat. Tertia fracturae species nimirum ad eundem modum in triplici differentia se habet: nam telum secans, vel cranij superficiem signat, frustulum ossis diuidens, quod vndique eleuatur, & recedit à proprio loco, Graecè Apocseparnimos, Arabicè Alberia, Latine rimularis fractura nuncupatur, quæ angustissima Rima est totum os secans; vel à telo ossis superficies exciditur, sed non vndique separatur, & alicui parti adhæret, Graecè 4 Encope, & Dia-cope, Arabicè Angin, Albucasi ecce pro, cui libui Klaham ipsam nominare, Latine excisio, & eleuatio vocatur; vt etiam profundius telum imprimitur, & os sic eleuatur, vt membranae, cerebri inuolucri pateat, Graecè eadem voce Apocseparnimos, Arabicè apostatimos, Latine comminutio, & more Albucasis Afialis fractura nuncupatur, ab effectus fortasse similitudine instrumenti securis Aficie, vocari in lignorum superficie. Quarta fracturae species, quæ semper sensibus occultatur, pariter sub tribus modis videri solet, & si in eadē causa cōsistente conueniant, quorum primus immeritò fracturae nomen adeptus est, cum in eo nullam continui solutionem dignosci fas sit, sed os duntaxat inleuatur, sed non ruptum, in sua substantia molli contracta appareat, quippe necessarium est, quod id, quod cōtunditur, si molle fuerit, vt loco cedat corpori contudenti, & comprimitur in sua substantia absque fractura, si verò durum, vt recedat à proprio loco, & ibi Rima adsit aut manifesta, aut occulta. Hoc, teste Hippocrate, puerorum capita, ossa; mollia, ac natura humida ostendunt. quod à Galeno \* sub his verbis declarat. Collisio magna ex parte accidit in carne, quamquam nonnumquam & in osse euenire videtur, idq; maxime in pueris, siquidē oportet, vt in se cogatur omnino id, quod colliditur, atque ita sit molle, vt absolutam duritiem non assequatur. similem quandā imaginem huiusmodi collisionis vasa
- 40 aenea, aut plumbea referunt, dum à solidiori corpore violentia quadam impinguntur. nam absque fractura, contusa pars decidit, ibiq; cauitas quadam percipitur, quia os in interiora desecit. cum hac igitur humane caluariae accidit Graecè Tlasmā, & Tlasis; Arabicè Alchafad, Latine collisio, impulsio, & inflexio vocari solet. Itaque hanc intelligens Hippocrates ait, ossa contusa saepe in sui ipsius natura remanent, verum fracturae speciem nullam oculis inueniunt agnoscere datur, quali nam specie, & quanta magnitudine existat. Secunda differentia est, dum vnā cum collisione fissura, aut Rima conspicitur, diglascantur, vel lateres in ipsa sola diploide introcedunt, Graecè Entlasis, Arabicè Hessema, Latine infractio dicta est, quæ ad mentem Hippocratis cum maiori, & minori ossis parte introcedere potest, & magis, ac deorsum profundius, & minus, ac magis in superficie: verum in singulis modis plures species hinc inam squammā iuxta longitudinem, breuitatem, crassitiem, & tenuitatem, varietatem suspiciunt, prout etiam teli figura, ac magnitudo fuerit: porro telum non modò id, quod alterū percutit, aut vulnerat, sed quod super hominem cadit, vel super quod ipse incidit, intelligi debet. idē si graue erit, caluariae deprimit orbiculari compressione, adeo vt vndiq; à parte sana compressa segregatur, quandoque verò secundū partem sano adhæret, quippe etiam comprimi contingit, & à sano parum in parte disjungitur, quæ omnes fracturae perpetuò cum contusione à validis causis imprimuntur. Tertia istarum collisionum differentia sit, dum superior lamina sine oculata fractura comprimitur, inferiore fracturam manifestant patiente, in qua ossa à sui ipsius natura recedere dixit Hippocrates, & ipsum nondum nomen proprium huic indicasse asserit Galenus, sed tantum compositam fracturam esse, fuisse attestatum. nam ex Hippocrate ipso caluariae fracturae, quæ sex sunt, sub duplici modo formantur, quarum tres simplices sunt, veluti scđio, dum os à telo leui non acuminato secatur, & ibi sedes remanet, aut tantum colliditur absq; Rima. Tertia est simplex Rima, quæ interdum latitat, interdum apertè dignoscitur: Compositæ verò illæ sunt, quæ præter ossis fracturā, aliud morbi genus continent videntur, nempe id sit, ubi vnū os in parte à propria sede, aut eleuatur, aut deprimitur, aut ex toto dimouetur, aut dum in plures partes artitur: calamitosa verò, ac letalis fractura illa est, quam Graeci Apocchema, & Latini oppositiōnem, hoc est oppositæ partis lationem, appellant, cum caluaria violenter percutitur, & alia parte, dum non nimis distans à percussione, aut opposita (quod raro contingit) rumpitur, & ibi rima tantum adest, & non sedes, aut contusio, quamquā secus crediderit Paulus, & qui Sorano alludens, cuius de fractura caluariae commentarij extant, inquit. Sicut qui his differentijs Apocchema, quasi dicas ac echo responsionem addiderunt: ea est à contraria ictus parte facta caluariae fractura: at falluntur hi, inquit Paulus, quoniam non fit in hominis calua, quemadmodum in vitreis vasculis, vt illi credunt; & addit, illa siquidē

a Hipp. lib. de calua. cont. Celib. l. ca. 4. b Celib. l. ca. 4.

c Gal. de morbo. cap. vi. & 8. de v. part.

d 9. de cas. morborum ca. vi.

e 9. de cas. morborum cap. vi.

f Gal. de cas. morbo. ca. 11. & lib. de diff. med.

g lib. de c. 90.

dem vacua sunt, idcirco id paritur, calta autē hominis vndique plena, & alioquin solida est. hæc est Pa-  
 li ratio aduersus Soranum, cui nonnulli recentiorum <sup>a</sup> suffragantur, addentes, futurarum vilitatem fru-  
 strari, si à contraria ietus parte fractura concedatur. namque <sup>b</sup> capitis ossa in futuris contigua, non autē  
 continua sunt, vt vasa vitrea substantia fragili, eò enim in futuris confutandis natura tendit, vt si par-  
 te aliqua ossis noxa occurrerit, reliqua indemnitas seruetur, effectus lesionis terminus futura ipsa quocir-  
 ca non dari transiunt, nec alibi os frangi posse, minusque parte opposita autem: negat adhuc cucur-  
 bitæ edificare exemplū, quæ leuiter quadam parte icta opposita frangitur sensibilis effectus collatione  
 cum sint cucurbitæ corpora continua, & non plena, sicut calua, atque ex forti percussione extrinseca per-  
 cipitur impetus, & agitatio in aere, & substantia spiritu abundante in eius cavitare contenta, quæ exhalare  
 nequit, & ex tali motu se reflectente ipsius aeris in cucurbita, contingit fractura alibi, quam vbi icta  
 est, aut in parte opposita: Nos autē veritatē incumbentes, testimonijs scriptorum freti, experimento; <sup>19</sup>  
 sensibili confirmati. Pauli, ac cum sequentium pace, contrarium ostendens nitentur: acque primò Hip-  
 pocratis auctoritas <sup>c</sup> nos in hac sententiā confirmat, dum inquit. Frangitur caluaria sub vulnere alia par-  
 te, quam vbi plaga est, & hic quinius fracturæ modus est, quod infortunij vbi accidit, nihil est quod iuu-  
 re possit, quoniam vbi hoc malum sit, nulla via deprehendere licet, homo ne id patiatur, & qua parte  
 caluariae. Idem Soranus <sup>d</sup> post Hippocratem sentire apertissimè videtur, dum cucurbitam siccam, bae-  
 tecum, vasa vitrea, & tabulam aridam in exemplum adduxit, quæ omnia dum streuē aliquā parte per-  
 cutiuntur, alibi, vel in opposita franguntur. Huic inhaeret sententiæ Latinus Hippocrates Cornelius Cel-  
 sus, <sup>e</sup> cum dicit. Solet etiam eueneri, vt altera parte fuerit ictus, & os altera solum sit; itaque si grauius  
 aliquis percussus est, si mala indiciā subsecuta sunt, neque ea parte, qua cutis secunda est, rima reperitur, non  
 incommode est partem alteram considerare, nunquid locus mollior sit, & tumeat, eumque aperire, si  
 quidem ibi os solum reperitur, nec tamen magno negotio curis sanatur, etiā si infra dilecta est: equi-  
 dem hæc testimonia grauissima sunt, & luce ipsa clariora, quibus ad fatendum oppositionis fracturam,  
 aut saltem alia parte, quam vbi ictus accidit, præsertim si vehemens fuerit, inducimur: Hoc Galenus si-  
 bi euenisse <sup>f</sup> bis, veris similibus attestatur. Nouimus aliquandoincipis os fractum, quod autē huic  
 ossi protinus succedit, temporis os vocatur, in quo ipsas squammatim compactas commissuras esse acci-  
 dit, in eo luentiora fractura longissimè pertinebat, quam ipse equidem minime contigens, sed tantum  
 incipit os exicidens, hominem sanauit, quod si incipit os os quoque dimissimè, putruisset potius, quæ  
 illi suberat cerebri membrana, quam callum fractura duxisset. præterea nec Auenienna <sup>g</sup> ab hoc dissen-  
 tit, asserens sæpe eueneri, vt caluaria findatur cute ipsa illa, ubique inflammatio oritur, quam secare ne  
 cessarium sit, vt ossis fractura curari possit, & ne humores interceptiur quoad tunc fueris de additione  
 apoplematiz, aut illud ruptum inueniatis, & appareat fractura vna, quidque enim inde accidit error  
 magnus, dum putatur, quod non sit fractura, nisi illa. Ex quibus verbis patet, Auenientem intentionem fuisse,  
 ossa etiam alibi, quam vbi icta sunt, frangi posse, cum ex singulis ictibus plures fracturas dari contingat,  
 non longè autem à plaga modò in hanc, modò in illam partem os frangitur: Recentiorum <sup>h</sup> verò  
 plorimi, qui sedulo Chirurgie incubuerunt, hoc pluries se vidisse, testantur, præsertim de Rima; non  
 autem de fede, aut contusione verba habentes; quod & si rarò contingit, tamen impossibile saltem nō  
 est. At rationibus Pauli, & eorum, qui eum sequuntur, sic respondemus, facientes quidem caluariæ  
 continuam non esse, hoc est vnus integræ substantiæ, quamquam Herodotus, Aristoteles <sup>i</sup> & Celsus <sup>k</sup>  
 sine futuris capita visa fuisse, asserunt, præsertim in regionibus æstuosis: Nos verò Galenum <sup>l</sup> sectan-  
 tes, eiusque rationibus moti, diu secus arbitrati sumus, attamen caluariam sine futuris apud Franciscū  
 Stabilem Neapolitanum, Philosophum, & medicum excellentissimum perspeximus, in simili enim hoc  
 eueneri facillimum est: in quibusdam verò cranij futura substantia contigua est, contiguatque adeo cō-  
 pacta, vt omnino continua appareat, ac difficillimè separabilis, vt in quorundam senum capitibus vide-  
 re est, in quibus ossa caluariæ, præterquam in temporibus, ita in superficie inferuntur, & propemodum  
 vniantur, vt vnum tantum esse credatur, quemadmodum in cimiterijs, relictisque in anatomicis admini-  
 strationibus, cum ossa admodum exsiccata non sint, inspicere potest. nostrares etiam attestantur anatomi-  
 ci <sup>m</sup> multoies caluarias futuris sensum effugientibus, ac cūctis mifis, vt, vix agnosci, ac diuelli possint,  
 munitas, se inspersisse. Non ne & Hippocrates, <sup>n</sup> dum caluariam cerebrare vellet, ob futurarum angus-  
 tiam se fuisse deceptum, fatetur? Præterea haud ab re est, vt caluariæ membro quidem licco, ex vehemē-  
 ti motu reflexio, illud eueneri contingat, quod vitreis vasculis, arido ligno, cucurbitæ sicce, & cam-  
 panæ, quæ alibi, quam vbi icta sunt, franguntur. nec mirum, si ex ingenti ictu ossa interne desiliant, vide  
 mus enim vetusta moenia bellicis tormentis concussa quandoque interius, aut propinquius findi, præ-  
 terquam quod æt in inclusis relectur, aut halitus spiritu plenus latet. Quod verò ad futurarū vñus per-  
 tinet, non ob id sic eas formatas à natura credimus, vt facilius caluaria, & ietus, & noxas euaderet, namq;  
 si vnico osse constaret, tutius se haberet, quam si ex pluribus, inter quæ meninga ipsa dura suspenditur,  
 discrimenque futurarum vulnerum haud quisquam subiret, quæ vulnera profectò, vt experientia docet,  
 valde letalis sunt, rationabilisque credimus futuras duræ membranae elevationi inscurrere, ne cerebrū  
 illius crassitie comprimitur, ac vt pericranion ab ipsa ortum, & per ipsam transiens caluariam vndique  
 ambire possit, magis vt vapores in corpore aduicti, cū natura sublimia petat, inde exhalare, ac dissi-  
 ri

a <sup>9</sup> Magon  
 Guido de Can-  
 tino, Celeberr  
 Vnus Vitru  
 Florentinus.  
 Excellent Gab-  
 riel Falopius,  
 Murmensis.  
 b <sup>9</sup> Gal. 9. de v-  
 bi part. cap. 17.

c <sup>9</sup> Li. de calua-  
 riæ.

d <sup>9</sup> Lib. 8. de af-  
 fect. cap. 6. 4.

e <sup>9</sup> Lib. 8. ca. 4.

f <sup>9</sup> 6. meth. ca.  
 vic.

g <sup>9</sup> 1. 4. meth. 3.  
 cap.

h <sup>9</sup> Nicola<sup>9</sup> Flo-  
 rentinus.  
 Gentilis de Vul-  
 neribus.  
 Jacobus Carpen-  
 tis.  
 Ioannes de Vico  
 i <sup>9</sup> Lib. de natu-  
 ra m. cap. 7. &  
 lib. 1. cap. 7.  
 k <sup>9</sup> Lib. 8. ca. 1.  
 l <sup>9</sup> 9. de vñu  
 part. cap. 17.

m <sup>9</sup> Mirabilis  
 Andreæ Vesal-  
 ius.  
 Diligen Real-  
 dū Columbus.  
 Sordius Gab-  
 riel Falopius.  
 n <sup>9</sup> Lib. 1. & 7.  
 epidemiarum.









motuam aut nervorum resolutionem, aut tremor, aut stupor, aut distensionem subsequitur, quæ symptomata capitis posteriorum partem malè se habere declarant, hæc pariter quandoque omnia simul apparent, interdum unum, aut duo, aut plura, sæpe etiam nec ulum manifestatur, & moritur æger, variant quæ velocitate euentus citius, siquidem in mollia corpora, ac nobilia, præsertim si aliqua plenitudine redundant, inuadunt: si secus uerò si robustiora, minus timida, & minus plena: varia ac diuersa ab Antiquis: ac symptomata descripta sunt, quæ Caluarie fracturarum, ac internarum læsionum naturam, & quantitatem ostendunt, nempe CASVS, VOMITVS, VERTIGO, ORSCACATIO, SANGVINIS ORE, AVERTVS, AUT NARIBVS EMANATIO, OBMUTESCENTIA, STVPOS, RIGOR, FEBRIS, PALATVS, APOPLEXIA, EPILEPSIA, CONVULSIO, DELIRIVM, SOMNVS SVPERFLVVS, MEMBRANÆ DENIGRATIO, ET VVNERIS SICCITAS EXIMA, quorum enarrationes, & causas hucusque distulimus, quæ quidem perpetuò, vel quod fit aliqua inflammatio, vel iam facta sit, apparere solent.

CASVS euenit, si internæ partes afficiuntur; nam motus omnes arbitrarij musculorum, ac tendonum muncere fiunt, & ea ratione mouetur, quia nervorum sunt participes, nempe à cerebro, & nucha emanant, virtute in eos à cerebro delata: quo fit, ut dum coactè violentia quadam à causa exteriori quis cadar, iam deprauato standi motu, vt potè voluntario, non ab re censendò, moticis facultatis instrumentis affici per consensum à cerebro ipso affectio, ipsius facultatis fonte, vires recipientia.

VOMITVS biliosus, si fracta caluaria permanens fuerit, lethale symptoma iudicatur, cū dicat Hippocrates. [ Quibus cerebrum dissectum fuerit, his necesse est scibrem, & bilis vomitum accedere, qui ubi voluntarius non est, vel protinus ut percussus quis est, vel dum inflammatio manet, magnum malum portendit, in his duntaxat, quorum partes nervosæ scæte sunt. ] Vomitus siquidem ventriculi expultricis facultatis prauus motus est, quo ea, quæ in eius capacitate, seu latiore spatio continentur, ac ipsum contristant, & in se fluitant, quam citissimè per stomachum rejicit, ad quem nervorum pars haud mediocriter à sexta cerebri coniugatione defertur, ac disseminatur, conterritæ quæ maxime eo eius, quocirca compati ventriculum in cerebri affectibus mirum non est ob litorum nervorum assensitum, per quos etiam sensus huic particula, quam vlli reliquarum corporis acutior est, ob id cranij fracturam, cum ad membranas usque perveniunt, biliosus vomitus conitatur.

VERTIGO, dinos Græcè dicta, quæ, quod caput circumferatur, seu vertatur, imaginatio quædam est, seu tenebrosa vertigo, scotodinos Græcè, scotomia communiter vocatur, dum quæ conspicuntur, circumagere videntur, ac simul repetitè visus pereat, ob inordinatam, turbulentem, ac inæqualem spiritus statuosum motum oritur, ex quo animalis etiam spiritus in opticis nervis, ac cerebro consiliens evertitur, ut propterea, sicuti decet, non valeat ordinatè ad propria loca distribuì; in vulneribus autem, aut caluarie fracturis ex vehementi ictu spiritum ipsum concuti, ac perturbari contingit, præsertim si membranae, aut cerebrum noxam suscipiant, quod, dum occurrit, interitum mortis indicium est, ut in formosa Nerci filia euenisse attestat Hippocrates, quæ à muliercula eius amica semel lata manu in sincipite percussa, ac vertigine capta, nona die mortua est.

ORSCACATIO in fracta caluaria internam affectionem ostendit, cum nervi ipsi visorij optici, optici Græcè dicti, quia visui inferuiunt, à cerebri prima nervorū coniugatione orti obstructionem, vel lacerationem, aut contractionem patiuntur, ij quidem magni, crassi, & molles sunt, ipsi soli poros sensibiles habent, oculis videndi facultatem transferrentes, quæ à cerebro tanquam imperante cristalloïdi de legatur, inde ad ragoydis foramen, pupilla appellata, specierum imagines suscipit, ut intra ad communè sensum ferantur, qui rerum differentiis ponit, cuius sedes cerebrum est: quapropter necessariò affici ce rebri, dum caput percutitur, verisimile est, si hie sensus deperdat, & nulla in eius organo noxa videatur, & hinc efficitur, quod oculi propter visorij facultatis imbecillitatem, cerebro leuiter affecto, lumen aduerfentur, ut videndi potentiam amittant.

SANGVINIS fluxus ex naribus, ore, & auribus, percussio capite, admodum lethale indicium est, etenim omnes hæ partes cerebro subserviunt, nam perpetuò, ac in internis affectibus per eas purgatur, quod si ex forti ictu sanguis erumpat, ad has partes transmitti solet, & affectæ membranae, aut læsi cerebri argumentum est, propterea dicebat Celsus. [ Si cerebrum, aut tunica vulnegrata, sanguis ore, & auribus effluxerit, vomitu bilioso accedente, febre, & delirio, moriuntur. ]

OMUTVS in percussione capitis, maius indicium portendit; nanque dictum est, quibus cerebrum ex aliqua causa concussum fuerit, eos statim voce priuari, necesse est. contrahitur enim vis animæ in se ipsam in talibus dispositionibus à motu vehementi molesta, propter hoc quiescit. Cui igitur offensus, aut casus aduenit, aut aliud, & absconditur sermo eius, & inclinatur caput, & ære sic anhelitus, & sudar frons, moritur statim. qui verò in caput suum concidunt, sæpè voce priuantur: quod si usque ad tertium diem non permueratur, septimum expectare oportet, nec ægrum aliquo modo mouere; etenim euenit nonnumquam, ut naturæ robur cerebri affectus uincat, & inde ægri valetudinem consequantur: ut cunctæ autem Hippocratis sententia enucleanda sit, quæ dicit. [ Quibus cerebrum syphacelatum est, in tribus diebus percussus verò hos euasere, sani fiunt, sic interpretari nobis visum est. ]

STVPOS, id est imperfecta quadam nervorum resolutione, seu repentina insensibilitas, atque immobilitas

10 mobilitas corporis totius, aut solius partis, non nisi affectio cerebro accidere contingit; artefacturque ipsam iam passum esse, aut citi tunicas noxam subire. Hac ratione malum legitum est, lique<sup>1</sup> (inquit Hippocrates), \* in capitis ic<sup>2</sup>tu obstupefcit malum, cum manifestum sit \* hac omnia cerebro partiē, ena sci, cumque in eo animæ principatus consistat, dignoscitur \* enim, quando patietes neque aliquid dicūt, neque agunt, fed apertis oculis quieti manent, similes his, qui ex timore sunt attoniti. Pereunt <sup>4</sup> quando que hi ante septimam in ætate, in hyme verò ante decimam quartam. Quibusdam stupor etiam aduenit (ait Hippocrates) mulculis temporū affectis, et causā \* frigidus, crassus, ac omnino viscosus humor effluerum calvaria fracta, compresso, aut punctura, aut laceratio id efflicere solet.

R 1008, hoc est inqualis vniuersi corporis cōcussio, quassatiove, in qua expultricis facultatis motus validus notatur, cum liquentes vix se continere valeant; & (vt ait Hippocrates) dolore plena quedam nūculorum refrigeratio percipitur, si fracta caluaria euerit, potissimum inordinate, aut circa iudicarij dies novam cerebro collatam indicat: namque facultas ipsa nostrum corpus regens contra ea aduersatur, & certaq; molesta sunt, donec radicibus euellantur; ad quia in intimo corpore coactura vehementes facit incurfiones, magna caloris vi ipsam inuadit; propterea nihil miri, si acri quopiam humore membranam rodente, seu cerebri substantia inflammationem patiente, rigores appareant. contrahitur enim calor ad intima, & partes, quae foris sunt, eo priuantur, unde oritur rigor, & frigiditas sensus, quoniam raro alia subsequitur febris: & hinc fit, quod rigore correpti plumbeam, aut cinericiam faciem praeficerant; praeterea lethale accidens, ac semper non creditur, nisi mala alia symptomata simul inuadit, ac virtutis imbecillitas adsit vna cum vulneris siccitate, & in die critica: contra verò rigor ille magni estimatur momenti, qui tarde, aut diebus significationis occurrit. Caterum si rigores, qui prauis succis p<sup>er</sup>cutim currentibus, dum violento motu à natura expulsi oriuntur, in vasis, aut extra putredinem afflic-  
tis, calore subsequitur febris, aut continuus aut inter-polaris, praeterea timoris anam minime praebent,  
vtpote! causam diuersam extra caput habentes; similes vt plurimum in corporibus humidioribus cacochymia, aut plethora redundantibus, sunt: Hac ratione rigores exacte diuolce di sunt, nè Chirurgi in  
cerdum decipiantur, remeareque ac frustra non sine ægrotantis iactura cerebrationes aggrediantur, iudi-  
cantiè rigores omnes, tanquam formidabiles, arbitri.

Febris assidua, vel per se, vel alijs adiuncta symptomatibus capiti vulnerato superueniens vt plurimum internorum affectuum significatiua est: quemadmodum enim cetera nobilia membra vulnus, aut noxam quampiam passu, ora in eis inflammatione, accersit; sic & cerebrum nobilissimum quidem membrum si praecidit, aut tunicarum aliquae, accenditur, affectusque is cordi communis efficitur maxi-  
40 mo confortij lege, quare mirum non est, si ex materia sub crano putrescente, vel inflammatione aliqua inchoante febris continus gignatur, & malum portendat indicium; siquidem, dicebat Hippocrates 1.  
[ Quibusunque praecidit cerebrum, necesse est febrem, & bilis vomitum supercurrere, quae = perniciosa sit iudicatur, si decretorius diebus oriat, vel = ultra tempus inflammationis perducatur, aut leui vulnere superuenierit, delirium mouet, vel si neruorum rigor, aut distensio, quae ex vulnere orta est, eam non  
finit] 2. alio uero humore comite febris causam aliamus, quam ex cerebri, aut meningiarum inflam-  
matione, fieri, vel factam esse siquidem = ex humoribus putrescentibus in intra, vel extra venas fe-  
bris a rigore superueniente soluitur: Scriptum est ab Auicenna. P[ Si in capitis dolore ex ictu febris ac-  
cenditur, & mentis perturbatio adest, iam in capite inflammationem fieri, manifestum est, quae si ad stadi-  
deuenierit, nunquam sanatur.]

30 PARALYSIS Græcè, Latine nervorum resolutio, aut mollificatio, cum motus privatione non quidem totius corporis, sed vel lateris vnius duntaxat, vel priusæ particulæ præsertim fedis vulnerata, et ex calvaria 9 fractura accidit, cerebri aut membranarum affectuum indicium est, nam vel eo contritus est cerebrum, vel viarum spirituum occlusionem, vel facultatis animalis delationem impedimentum oritur, quò fit, ut per eam late aliquid evanesceat, compressioem potissimum, aut ipsius cerebri inflammationem, ob quam viæ arctantur, et animalis facultas impeditur: diagnosciur autem, cum iam subleata causa, impotentia motus tollitur, et pars affecta in pristinum reuertitur, propterea quibusdam visum esse paralytism à causa externa, facile sanabilem esse: secus verò quam crassa, ac viscida materia gignit, propter modum sanatu impossibilem: atque Rasis opinio est, quòd qui ex ictu, aut causa paralytism confecti incedit, nunquam sanetur, sed quæ paulatim fit, curationem recipiat: quemadmodum Romæ Galeno con-  
60 tigit, dum Pausaniam Sophistam curaret, cui, dum ex vehiculo cecidisset, duo sinistræ manus digiti resoluti erant, attamen sanitati restitutus fuit.

**A**PROPEXIA<sup>1</sup> loci corporis sensus, & motus, præterquam anhelitus, priuatio est, ac proprietas patientis cerebri accidens. fit etenim<sup>2</sup> uirtute animali, ad partes infra caput constitutas defluere non potest, quæ propter diffidensium aliquam inflammationem similem, quæ in iplo cerebro constituta sit, aut in eius ventriculis compressis, aut humore pituitoso oppletis, verum causæ magnitudinis, palsonis magnitudinem consequitur; quod si fraus cranco euenit, cerebrum aut punctione, aut vehementi compressione afficiat deo, vt ventriculi eius laxentur, manifestum est, sique tunc, vt corpus, & mens stupet, omni denique motu, & sensu priuetur, ac tanquam mortui patientes viuunt, & oculis clausis, ac si dormiant, et dormiant, & c.

Tract. 2. De vuln. B prudentia









- 10 eis affectus nullus appareat: insuper Hippocratem ita loquentem audiamus, si modò verba illa sunt Hippocratis, vt arborumnam in quàm plurimis antiquissimis codicibus ita sonant [ Nullum capitis vulnus facile contemni debet, saepe enim cutis sola confusa ferri, aut alia aliqua re, si non diligenter, & cautione quadam curetur, veluti si sanguis concretus non expurgeretur, aut aliud quiddam neglegatur, vlcus inrudescens non parum molestiæ exhibet, & aliquando etiam febrem inducit, & medico quidem negotium, ægro vero periculum non minus affert. ] ergo hæc multò magis contingere possent, cerebrò, aut membranis disruptis: Quæ si non singula hæc diligenter medicus curauerit, sæpe mortis causa existit, si quidem <sup>a</sup> ad cutem capitis nerui multi sensibiles a ceruice propagantur, cerebro patiente <sup>b</sup> patitur necessariò simul & diaphragma, ac reliquæ partes cordi, ac respiratori insensientes; quò fit, vt ipsius cordis temperamentum destruat, & mors inde occurrat. Quarto à capitis parte læsa quandoque indicium finitur. iam ab Hippocrate dictù est, prima medici consideratio est locus affectus, affectio, & affectionis conditio: naturaliter ossa caluarie imbecilla sunt ratione contingentium; carnem enim habent ea vestiente tenuissimam: ratione contentorù, quidem immediatè sub ea meningæ, & cerebrum conseruantur: ratione annexorumnam nerui omnes, venæ, & arteriæ multæ, & nucha illi annexæ sunt: singularin verò scincipitis ossa percussa admodum periculosa sunt, cum tenuiora, ac debiliora cæteris partibus existant, ac minima carne contexta, plurimumque cerebri sub hac parte cõtinetur: ac magis, & minus efficitur malum, iuxta teli genus, pondus, magnitudinem, ac paruitatē, necnò iuxta percutientis robur, & voluntatem. Quæ <sup>c</sup> verò temporibus accidunt, magni timoris iudicantur, ob temporis ipsius musculi naturā, in quo venæ, arteriæ, & nerui multi desinant, est acuti sensus, & ibi sunt etiam debilissima reperiantur, ac maxilla inferior illi parti alligatur, cui etiam auditis meatus infertur, quapropter scincipitis, ac temporum chirurgiæ ab Hippocrate, & Galeno reprobatur, cum hæc sedes doloribus, inflammationibus, ac conuulsionibus facillimè subiciantur. Sutarum pariter omnium vulnera, ac contusiones verendæ sunt: cranij enim imbecillitates augent, cum per eas dura meninx transiens pericranio alligetur, & suspendatur, sicuti non admodum periculosa, quæ posteriori capitis parti infinguntur, cum os ibi crassum, ac durum, cerebellumque subit, paulò solidioris substantiæ, quò fit, vt qui hac partem plagam subeunt, facilius mortem euadant, quàm qui in anteriori, aut lateralibus partibus vulnerantur. Ex <sup>d</sup> animalium quoque naturalium, & vitalium operationum qualitatibus iudicium finitur. nam quiescere, ac mente consistere, somnum capere, facile spirare, sui non confici, cibum non fastidire, non dolere, si fibracula sui, ea vacare, itemque habere pus album, lenè, æquale, non foetidi odoris, quantitatis conuenientis, optimi præfagij causæ sunt, et si vulnus magnum fuerit, secus verò si huiusmodi res vehementer urgeant, ac extra debitum tempus apparuerint. Rursus si excrementa naturalia iuxta modum fuerint, & qualitate, ac quantitate conuenienti se habeant, salutes spes afferunt: contra verò timorem adducunt, quod ex Hippocrate <sup>e</sup> habetur, cum dicitur Quibuscumque ex vulneribus extenuatis nigra bilis, sive sanguis niger de pulvere exierit, posttridè moriuntur, & à nobis verè obseruatum est, eos, quibus diarrhæa, aut dysenteria spontè superuenerit, ferè omnes periclitasse, ac quamplures etiam, qui pollutione vexantur: Vrinæ quoque perturbatæ, quales iumentorum, & quæ subinguales vocantur, cum maximam humorum corruptionem ostendunt, necnon alba, & perspicua, vt potè indicantes fluxu bilis copii ad caput solidiora, rapina mala signa sunt: præterea pulsus extensus, & durus nervosarum partium inflammationem, durus verò & inæqualis conuulsionem, languidus autem, si de accidentia praua identidem consequantur, mortem propinquam minatur. Percutit plerique, quibus dolor, aut inflammatio oculis oboritur, nam à Galeno dictum est <sup>f</sup> Quibus dispositio intra caluariam est, his ad oculorum radices dolores perueniunt, eo quòd oculorum nerui à cerebro, & tunica à membranis originem ducunt. Hæc omnia magis timenda sunt, si patientis caput calidum naturaliter præter modum fuerit, aut destillationibus, vel Erisipelatosis affectibus obnoxium. Optimum salutis indicium est ægri facies, si similis beneuolentis sit, atque sui potissimum. si verò quàm maximè contraria fuerit, exitiosissimum est. nasus enim compressus, oculi concanij, alitèrta tempora, aures frigidae, contractæque, corporis totius color viridis, aut niger, mala, ac lethalia signa sunt: ex opposito verò <sup>g</sup> speciem certam faciunt membrana mollis, mobilis, ac suis coloris, caro inæcreta rubicunda, ac ceruicis, & maxillæ quietus, ac facilis motus. Epilogando itaque dicere expedit, præfagiendi modum sumi debere in vniuersum à virium robore, à morbi magnitudine, & à malorum symptomatum natura, & quantitate: verumtamen quàm plurima sæua accidentia in varijs caluarie fracturarum formis visa sunt, nec vulnèrati perire: quod prouenire potuisset aut magni Dei voluntate, aut periti medici solerti curatione, aut quia virtus omnia agens, valida quidem, ea correxit, ac profligauit, aut quia aliunde, quàm à caluarie fractura, causam traxerunt, ad quæ omnia, maximè etiam patientis quies, atque constantia, conculisse visa est.

a Gal. de e. lib. 1. c. 1. b Gal. de nec. loc. 1. c

d Hipp. lib. de Cal. curat. Gal. de e. lib. 1. c. 1. e Gal. de e. lib. 1. c. 1. f Gal. de e. lib. 1. c. 1. g Gal. de e. lib. 1. c. 1.

h Hipp. de e. lib. 1. c. 1. i Gal. de e. lib. 1. c. 1. j Gal. de e. lib. 1. c. 1. k Gal. de e. lib. 1. c. 1.

l Gal. de e. lib. 1. c. 1.

m Gal. de e. lib. 1. c. 1. n Gal. de e. lib. 1. c. 1. o Gal. de e. lib. 1. c. 1.

p Gal. de e. lib. 1. c. 1. q Gal. de e. lib. 1. c. 1. r Gal. de e. lib. 1. c. 1.

s Gal. de e. lib. 1. c. 1.

## De regimine Fracturarum Caluariæ in sex rebus non naturalibus. Cap. VI.



**Q**UAMPRIMUM medicus ad ægrum accesserit, illico capillos circa vulnus abradere faciat, postmodum tria mente reuoluat, vt operis finem, & quod deceat, assequi possit, vulnus nempè ac fracturæ essentiam, capitis affectum partem, ac præterita, et quæ deinde apparent, accidentia: postmodum vbi quiddam præter naturam in vulnere continetur (vt lapidis frustulum, aut ligni, aut ferri, aut ossis ex fractura, aut capillorum copia, aut quid simile) illud proprijs digitis, aut Volsella, aut alio in strumento tutò, atque eleganter extrahere nitatur. Denique si caluariæ depressio, aut leperatio talis percipiatur, vt faciliè atroli, aut remoueri possit, illud fiat, & si aliud quid tunc temporis vulnus exigit, veluti si cutis sectio non satis pateat, ampliori diuisione aperienda est, vt suo loco vberius admonituri sumus: si sanguis fluat, cui albumine, aut aliquo puluere ipsum cohibente, ac fasciatum necu supprimatur: æger intera tectum loco obscuro, & sub molli cucurta se se continere, promissagie illi salute, ad quietem, patientiam, obedientiam, ac animi hilaritatem adhortetur, assidentibus verò assensibus, & amicis veritas à iudicio recepta patefiat, inde prudens medicus ad non naturalium rerum regimen intentionem dirigat. Cum enim humanum corpus in ambientem aerem per cutis poros continua resolutione dissipetur, necesse est subiectam materiam minui, & alterari, nisi aliquid tanquam fomentum perpetuò infuset, vt id, quod deperditum est, refarciatur, & hinc efficitur, vt partibus cui subiacentibus inanitis ob eorum infitum vim attractiuam, vicinæ partes pariter inaniantur, mox illæ rursus ex sibi vicinis alliciant, vt id, quod inane erat, repleatur, ita ex proxima quaque parte factò semper celeri tractu, perinde quasi in choro, siue ordine quopiam, tandem venæ ad ventriculum productæ inanes euadunt, quæ & conuenerunt, & possunt cibum ex ventriculo ad se conuellerè, veluti stirpium radices in terram demissæ. Siccirò aer, & ciborum, & potus genera, & somnus atque vigilia, & motus, & quies, & animi accidentia, vt pote non nihil ad concoctionis perfectionem attinentia, consideranda sunt. Dicuntur porro non naturales: quoniam non necessariò corporis humani constitutionem ingrediuntur, quanquam ipsum alterare possint, cautè igitur in his procedatur, nam ex incongruo harum rerum regimine accidentia mala interdum, & mors subsecuta est, dicant quicquid velint Empirici, qui contrarium sentire videntur, atque indidit enter, vt egrys obsequantur, ordinem pervertunt, in initio, & in crenitis vulneribus carnes, ossa, casum, ac vinum concedentes, atque huiusmodi crassiores victum insitunt, hac imprudentia dum sibi, virtutem perpetuò optimo alimento, veluti omnium operatricem, corroborandam esse, omnes humorum fluxiones ad defatigata loca pauperdentes, ac inflammationis facilem ortum ex victu tali prouenire negligentes: si vero victum adeò tenuem insitunt, vt vix pisanam exhibere permittant, quò fit, vt corpora voraciora, ac laboribus dedita noxam incurram, & ob id accidentia varia, atque timenda oriantur.

## DE AERE.



**A**B aere itaque exorsit, vt pote ambiente, & in quo vitam ducimus, & à quò necessariò alteramur, dicimus eum in capitis vulneribus, & caluariæ fracturis temperie calidum, & siccum requiri: qui si natura talis non fuerit, arte muretur. frigidus enim aer, veluti & cætera corpora frigida actu, dum circa fracturas versamur, abigendum, siquidem frigidum è inimicum ossibus, dentibus, neruis, cerebro, spinali medullæ est, calidum vero vtile: hinc Auicenna in qualibet cranij fractura etiam gestiuo tempore frigidum cauere iubet, & Hippocrates ait, cerebrum, & quæ ab eo proueniunt, frigidis afficiuntur, quemadmodum calidis gaudent, & si natura frigidum sit: propterea quòd idam visum est, frigidum actu tantum cerebro inimicum, non autem potentia, cum interdum frigidò, vbi sanguis fluit, aut ad præseruandum, aut ad tollendam inflammationem vitetur, & magis potentia, quippe cuius meminit Hippocrates, dicēs, frigidu actu scilicet, hæc mala affert, conuulsiones, distensiones, liuores, ac rigores febriles, viceribus è quidè mordax, cutè obdurat, ac do loces intolerabiles facit, nec dubitandum, quin cerebrum frigidis afficiatur. Galen⁹ quidem sententia est, quòd cerebrum maximè à frigore lædatur, ac communi opinionione tenetur, cerebrum inflammationem potissimam causam frigus esse: quapropter ægri in domicilijs, ac cubiculis paruis vincti, oculos, & calidioribus detineantur, vt aer frigidus, crassus, turbidus, aut nebulosus, aut valdè subtilis, seu quouis alio modo alteratus vitetur, quippe in corporibus à nostris facillimè agere solet: locus ergo luminis oppositus necessariò requiritur, qui multum languentibus prodest, nam di recte Hippocrates libro de Medico. Primum quidem locum domus habere oportet, qui sanè talis sit, vt neque ventus aut ipsum accedens molestus sit, neque sol, neque splendor infestet; lux enim splendida me dētibus quidem non est molesta, non similiter autem ægrotantibus: itaque talem splendorem penitus fugere oportet, nec propterea calidissimus probatur, cum febrim accutire possit, ac aliunde materias capiti attrahere: quapropter temperatus exigitur, quem probauit Hippocrates, in ossium fracturis nudis præcipue, & his maximè, quæ in capite sunt, quò fit, vt Chirurgi valdè decipiantur, & aberrant, dum prodest

a Hipp. lib. de humis. vbi ibi. 1. de fract. de 7. aphor. 18. Celsi lib. 1. cap. 9.

b 1. Reg. ad. 14. de de humis. vbi de 7. aphor. 17. c 9 Hipp. lib. de vulneribus lib. de humis. vbi 5. aphor. 4. c 9. 8. de vitiis. 4. p. c 9 Gal. 1. de reg. in valens. de Crit. cap. 3. de 3. meth. cap. 14.

f 1. Lib. de humis. vbi ibi. de fract. de 7. aphor. 18.

- 10 prodesse credunt plurima lineamenta, fascias, stupas, pellem, & calorem adaugentia, aut medicamenta admodum calida, aut terras regulas accensas, aut simile aliquid apponentes capiti, oneribus non assueo, & quod natura a calido laeditur, quod inuit Hippocrates \* cum dicit[ur] fasciis munda, leues, molles, tenues, ne viriat locus oneretur, neve malorum vaporum transpiratio prohibeatur, & calor augeatur ] & ob id si malorum symptomatum timor aderat, nec fasciis caput aduolebat. Ad eundem modum & humidus aer virandus, rheumatismum siquidem, ac putredinis causa esse solet. Siccus nimis pariter obest, dolores astringit, & locum inflammatum facile reddit. Autumno igitur, ac Hyeme ignis ex lunipero, Cyperisso, aut Fago accendatur, nec cerebrum afficiatur, vti ex carbonibus, à quibus stupores, sternutamenta, & quicquid existat sternutamentum. Ergo, vt temperatus aer reddatur, aut aliquantisper calidior, humi-  
20 iusmodi ignis accendatur, atque ab agro, quam possit, longinquius. Obscuritas adhuc confert, ne ab obiectis exterioribus plurimi spiritus moueantur, atque resoluantur. tenebræ enim & ad animi quietem probatur. nam (vt dictum est) \* lux splendida medentibus quidem molesta non est, ægrotantibus verò non si-  
30 militer; itaque & talem splendorem penitus fugere oportet, per quem oculus ægrotare contingit: quod citra ob-  
scuro conclaue habipare, & lecto valde molli quiescere, diuque quietem sustinere, & quam minimè proicere, ac se se iactare, tracta calidius, maximè iuuat. Sub Cane verò, ac tempore magni æstus, & calidiori constitutione aer & ad temperiem per contrariam dispositionem reducat, flores scilicet, & germina, quæ frigide sint facultatis, per aream, & thalamum proiciendo, modò vulnus non in crudeat, & æger noxam percipiat. Hæc itaque de aere particulari dicti sunt: quod autem ad regiones attinet, meridionalis calidior existit, sicut borealis frigidior; inna loca, & vallota, calidiora, montana verò frigidiora  
40 experimento iudicantur. iuxta etiam anni tempus. Ver saluberrimum est; Aestas medio modo se habet, Autumnus, & Hyems, periculosus. Chirurgorum quorundam sententia est, quòd aer natura crassior sub-  
liori salubrior existat; & hinc forsitan euenit, quòd Venetijs, Ferrarijs, & similibus ciuitatibus, & locis, in-  
50 gnia capitis vulnera mirum in modum sanitati reddantur: secus verò Florentijs, Perusijs, & locis monta-  
nis, in quibus admodum subtilis aer spirare solet. Siquis tamen anceps esset in capitis plaga de aeris na-  
tura, ac dubitaret, nunquid magis calidus, aut frigidus aer competat, cum Hippocrates & in vulnere can-  
pitis curatione calidum magis probauerit, & alibi <sup>b</sup> dicit, in Hyeme diutius tempore viuere hominem,  
quam in æstate, ob id igitur tempus frigidum magis probatur, insuper <sup>c</sup> eius sic verba sonant, plerisque  
60 viceribus tempus calidius commodius est hyeme, exceptis his, quæ in capite sunt, & ventre, magis verò  
æquinoctium. His respondet ambiens & coelum, in quo viuimus, & præsidiorum numero vnum habet-  
ur, si contrariam morbo temperiem habet, gaudetque <sup>d</sup> medicus, si cum ijs, quæ morbus facienda sua  
deret, est concors: talis enim iuuat, veluti contrariis aduersatur. Frigidus itaque aer, in quantum est frigi-  
70 dus, præferat, & humiditates à putredine arceat, quæ in capite, ac thorace, vt potè partibus cauis, abun-  
dare solent, atque illis detrimentum afferunt, ac in eis facillimè corruptionumpunt, si expurgari nequeant,  
aux à natura, aut aliquo instrumento, aut deligationum industria, quamuis in articulis, aut alibi in-  
terdum competere videantur; præterea ex partium externarum ob frigus stipatione, calor ad intima  
fertur, nec dissipatur, vt in æstate, validiorq; efficitur intus, & benè concoquit, vbi manus adhiberi nò po-  
test. Hippocrates <sup>e</sup> hac ratione adductus dixit [Est autem vbi in distentione sine vlceratione, iuueni-  
80 bus, necque in omnibus capitis vlcerebus, sed in aliquibus, varijs symptomatibus adiunctis, nec omne  
frigus, sed temperatum, vi in Acquinoctio, quod frigidum est respectu magni æstus, in quo ex victus ra-  
tione, & fructuum horariorum via, putredines, & bilis copia augetur, ac humores liquefacti facillimè  
destruuntur, & defragata loca desiliunt; Quapropter frigidum nunquam, sed calidum temperatum, probandum es-  
se existimamus.

DE CIBO, ET POTV, AC MODO NVTRITIONIS.



**A**NONVM profectò in omni morbo auxilium est, cibis, tempore, modo, & qualitatibus oppor-  
tunis, exhibitus; Celfo autore, initia morborum famem, & sitim desiderant, hac ratione modum  
90 rit, quod Celsus \* elegantissimè approbat, dicens [Quod ad abstinentiam, & primos, vltioresque cibos,  
porionesque pertinet, eadem, quæ in vlcerebus præcipi, seruanda sunt, eò magis, quò periculosius hæc  
pars afficiatur] præcepit <sup>a</sup> siquidem, cum ante dixisset abstinerere, quantum vires patiuntur, ante inflam-  
mationem à cibo debet bibere, donec sitim finiat, aquam calidam, ad eam tamen nihil perpetuum est, sed  
semper pro viribus corporis æstimandum, nanque imbecillitas, ætas, consuetudo tenemus, ac exiguum ci-  
bum non sustinet: quò sit, vt procius (medicorum communi \* sententia) vltioribus cibis interdum exhibea-  
tur, atque ante vltimam curationem, si opus est, vino agri rescitatur, quod alioquin inimicissimum vulneri  
est: porro \* quoridianum experimentum attestatur, plerosque tenui victu, & longa inedia syncopam, ac  
capitis dolores incurrisse, atque eos præsertim, quorù ventriculi concoquens facultas valida fuerit, quæ  
Tract. 2. De vuln.

a Lib. de Offi-  
cina med. lib. 2.  
de fract. 2. lib.  
de Cal. curat.

b Lib. 2. cap. 4.

c Celsus 3. c. 4.

d Hipp. lib. de  
Medico.  
e Hipp. 1. de ac.  
40.

f Gal. lib. 1.  
par. med. 2. 17.

g Lib. de humi-  
di. vlt. 1. aphor.  
1. & 2. 1.  
h Lib. de Calu-  
curat. Celsus 3. c.  
16.

i Lib. de humi-  
di. vlt. 1. aphor.  
1. & 2. 1.  
k Gal. 1. de  
cap. 8. & 1. ad  
Glauc. vbi de  
febre cont.  
l Gal. 3. de  
c. 4.

m Lib. de humi-  
di. vlt. 1. aphor.  
1. & 2. 1.  
n Lib. 2. cap. 7.

o Hipp. lib. de  
vlt. 1. aphor.  
1. & 2. 1.  
p Lib. 2. cap. 4.

q Hippo. 1. de  
ac. 1. c. 1. & 1. aphor.  
1. 17. Celsus 3. c. 16.  
r Lib. 2. cap. 4.

s Lib. 2. cap. 4.





- 10 naturali calore in alimentum maturè vertatur, inde vaporum, ac spirituum auctio fiat, quò fit, vt cerebrũ patiatur, & facultates animę, quarum ipsum sedes est, deprauentur. Aqua itaque simpliciter cocta illis sit potus, vel cùm qua coriandri ebullierint, licet à quibusdam damnetur, vt potè imbecillo ventriculo aduer-  
santes, quorum etiam nimius vñs, Dioscoride \* teste, nocere solet, ac in \* venenorum seminum gene-  
re enumerantur, ipsi tamen præparati interdum vñmur, prohibentibus nimirum \* vaporum ascensum  
ad caput, ac \* huiusmodi præparati omni noxa destituiunt, interdum parũ quid admiscentes iuleb-  
30 vel syrupsu rosati, ventriculũ resciunt. nam cum corroborant, adhuc interim ad sitim extinguendũ,  
temperatura biliosa existente, aut æstiuã constitutione, vinum granatorum infundimus: sunt qui hordæ-  
cam aquam commendunt, quæ, haudquaquam vitio vacare aliqui \* contendunt, cùm in ventriculo fa-  
cilè acestat, & corruptatur, ac status perire non sit, verum ad tenuium humorum acrimoniam tollen-  
dam, caluaria fracta, in potu commendatur. Quod autem apud nos magis probatur, est aqua simpliciter,  
aut sceniculi seminis percella, ac, vt frigus, aut halitus, si quis in ipsa est, abluatur, sacchari, aut cinnamomi,  
nem compellat, veluti si virtus imbecilla fuerit, aut sanguinis nimia copia effluerit, aut vehementissimi,  
ac diuturni dolores præcellerint, aut ventriculũ, frigidus sit, aut corpus cachecticum, & mala habitudi-  
nem affectum, aut si mulier vtero laborauerit, illud aquosum, fluuim, & prorsus inodoratum existat, quod  
Hippocrates \* probatur, atque in eius potione aquæ exiguum superbibendum, si quidem hoc modo vñ-  
ni potentia caput, mentemque vñs tentabit, vel ad quorundam mentem, cui panis portio infusa fuerit, vt  
tenuiores, halitusque plenæ partes, absumantur: tunc enim nec capi, neque necrui substantia obest. Vi-  
num sanè modice, cùm caro recens gignitur, nanque \* virtuti robur, & sanguini temperies additur, præ-  
30 serum si modicè affluatur.

DE PLENITVDINE, ET EVACVATIONE.



**I** si vulnera, fracturæve per se materiales morbi, aut ex plenitudine non sint, attamen corpori-  
bus æthlicis, plethoricis, aut cacochymis vñplurimum occurrentes, opportunas euacuationes  
expolcunt, si magnitudinis nomen allequantur: Nam \* in huiusmodi corporibus, & quæ leuia  
sunt vulnera ob humorum copiam, accidentia quandoque valida comitantur, ac verissime est maiora  
in magnis fieri, in quibus corporis vñuiferi depurationem approbat Hippocrates, \* quãuis nullum ple-  
nitudinis indicium appareat: Magna quippe capitis vulnera dici possunt, vel propter affectus partis præ-  
stantiam, vel dùm seuã vrgent accitèdia, vel propterea quia in amplum extenduntur, addamus euacua-  
40 tionem fore necessariam in omnibus vulneribus, in quibus aut sectio, aut dilatatio, aut ossis abratio, op-  
portuna fuerit, & morbus vehemens imminet, & causæ adfunt indicantes periculũ fluxionis. Quapropter  
in his vñuiferis euacuatio primò emolendi est, nempe si nihil obstitit venam secando, vt virum im-  
becillitas, ætas infancie, aut senectutis, malus corporis habitus, temporis constitutio, & similia, vt diuer-  
tendo, humorum ascensum prohibeamus, ne \* inde dolores, ac inflammationes suboriantur, quæ à succo  
bilioso, seu tenuiori sanguine, caput natura petente, vt plurimum procreantur, nec obstat, si caput in cor-  
poris sublimiori parte situerit, aut in aliqua operatione atroci dolore fuerit vexatum, aut ab eo copio-  
sus effluerit sanguis, nam ex Hippocrate pro confesso habetur, omnem caluarię fracturam ab idu vehe-  
menti produci, vnde ne interna aliqua fortis cõfussio facta sit, vereri oportet, ad quam inflammatio se-  
qui solet, ob id in curandis partibus vulneratis, propositum est, vt omnino ab inflammatione defendan-  
70 tur, hoc autem fiet, si nullus humor ad eas concurret, quæ omnia à præcautione potius, quàm à curatiue  
facultate indiciantur: sanguis enim aliorum humorum pater est, cuius copiam primis diebus, pethora exi-  
stente, ab opposito latere à nigra, aut capitali vena extrahere iustum est, in iunioribus, aut consilientibus  
abundè, nisi è vulnere copiosè effluerit, omni \* namque recenti vulnere, nisi in ventre sit, expedit ex ip-  
so statim sanguinem plus, minusve effluere, quippe phlegmone minus tentabitur tunc vulnus ipsum, tum  
quæ circumposita loca sunt: quod si è vulnere parce emanauerit, doloribus inuadentibus, in inflammati-  
onibus, apparentibus, liberaliter educendus est, mittendus ex brachio vique est, si corpus iuuenile, robu-  
stem, & exercitatum fuerit, nulli odq; magis, si id vulnus ebrietas præcessit, sanguis in corpore abundet,  
& multum tempus absque euacuatione præerit, sin minus, cephalica eiusdem lateris aperiatur, nec  
propterea illico accepto vulnere sanguis mittendus est, tunc enim humores vñuiferi, bilis præsertim, spi-  
ritusque, in motu, & alteratione existunt, ac post quandam corporis, ac animi quietem, si quis sanguis iuxta  
virtutis, ætatis, & exercitij mensuram, nec non anni tempus, accidentiumque naturam extrahatur. Præstat  
etiam id fieri post absolutam cibi concoctionem, eaz matred præmissa, vt excrementorum cõmunis eua-  
cuatio ex intestinis explicetur. Quod si brachij vena secari nequit, aut per cucurbitulas dorso applicatas,  
aut per Ani venas, quas hæmorrhoidales vocant, sanguinem mittere licet, nam & hæ sanguinem à capite  
evertunt, idq; pariter faciendum in vtero gerentibus, instante causa à quarto \* menis vique ad septi-  
mum, nec non conuenit bis, ac ter ad mentem Rasis robustis, & exercitatis corporibus, vrgente necessita-  
te, phlebotomia reiterare, idq; magis, vt corpora sicca seruentur, ad quod facit insumpere sanguinis mi-  
nus. Præterea si adhuc alicuius plenitudinis suspicio aderit, medicamento purgare corpus inuare opor-  
tet, & si nullum quidem verbum de hac intentione fecerit Celsus, nam \* purgatio ventris deorsum flu-  
ribus

a<sup>o</sup> Lib. 3. c. 499  
b<sup>o</sup> Dioscori l. 6. cap. 4.  
c<sup>o</sup> Aulic. a. Ca-  
no cap. 144.  
d<sup>o</sup> Aulic. 6. 4.  
sup. a. tract. 1.  
cap. 1.  
e<sup>o</sup> Aulic. a. Ca-  
no cap. 134.  
f<sup>o</sup> Cel. lib. 5. ca.  
de ru. 22. vñ-  
mora.  
g<sup>o</sup> J. reg. aulic.  
41.  
h<sup>o</sup> Gale. 2. de  
mor. 4. sympt. 3.  
Aulic. lib. de  
mir. cor cap. 3.  
i<sup>o</sup> Gal. 4. meth.  
c. 6. 5. meth. 3.  
de 3. de compo-  
med. secundum  
loc. cap. de dolo-  
re cap. de plaga.  
K. L. de Calu.  
curat.  
Lib. de Vulneri-  
bus.  
Lib. de fracturis  
& l. de 3. de cõ-  
muni Gal. 4. de  
22. meth. c. 10.  
16. 8. 4. meth.  
1. Gal. 20. 4.  
lib. de vñuiferis  
3. meth. cap. 3.  
Rasin 7. ad Alu.  
cap. 3.  
m<sup>o</sup> Hipp. lib. de  
Vñuiferis. Cel.  
lib. 5. ca. de omni  
inflam. max. vñ-  
li cap. de Sano.  
Gal. 4. meth. ca.  
6. Aulic. 4. 4. 7.  
n<sup>o</sup> Hipp. 4. 3. 4.  
n. l. 1. de 3. 4. 10.  
o<sup>o</sup> Hipp. lib. de  
Vñuiferis. Gal.  
4. meth. cap. 3.  
Paul. lib. 6. c. 90.



a<sup>9</sup> Hipp. 1. apho-  
rismi 4 apho 3.  
h. de medic. pur-  
gant. & d. Epilep-  
si 2. am. Gal. 4.  
m. ed. c. 1. Aut.  
3. p. de cura lo-  
d. 1. periculis  
d. 4. cap. de cura  
calidis 3. a. cap.  
de coll. fruct. rps.  
4. 4. cap. de cura  
vltic. 3. c. 1. b.

ribus vlcibus confert, & vulneribus, quæ sunt in capite, & in ventre, & articulis, quæ propter humorem ille euacuandus est, qui superabundare videtur, ac facilius ad caput ascendere potest, qualis est bilis, ac tenuior sanguis, nec obstat si caluaria fracta non doleat, aut non sit affectus materialis, ab humore aut fluxu, aut fluente productus, & quod medicamenta purgantia calefiant, corpora, & humores commoueant, ac infaniam faciant, nam quæ in simili affectu probantur pharmaca, tantum lenientia esse debent, & non robusta, seu eradicaantia, siquidem huiusmodi indicatio à præcautrice potius, quam à curatrice facultate sumitur, igitur in hac præcautione lenientia medicamenta sint, & non fortia & robusta. Erit igitur accommodatum pharmacum mirbalanorum omne genus, Cassia, Manna, Rheubarbarum, Tamarindus, aut Symplicium violatum, aut rosatum solutius, in robustis, & qui plethora abundant: Elixirium rosatum Mesuæ, aut de succo rosarum, & id genus alia, admixta Cassia, & Mirbalanorum decocto, ut ventriculus, ac intestina leui euacuatione exonerentur, & caput vaporibus obnoxium minime reddatur. Sunt qui hoc opus libentius enæ matibus, quam pharmaco, aggregant, quod magis euacuandum, vapores etiam retrahant, quidam statim deligato vulnere chlystere imponunt, ac possidide venam secant, nihil aliud agentibus, quamvis explicite nullum verbum quidem de sanguinis missione proferat Hippocrates, non ab re autem nos arbitramur quotidie summo mane syrupum rosatum, ex imbybo, lupulis, aut ex betonica, aqua Endiuæ, oxalidis, cichorijs, betonica rotatum exhibere, ut calor, si quis est, aut febrilis, aut ex animi affectibus, remittatur, perspecta perpetuo temperatura cum totius, tum partis affectu. Sic igitur procedatur, donec accidentia misceant. Enema etiam quotidianum vsum habeatur, si sponte, & à natura alius non expurgatur, aut saltem glandium benedictum ex melle, aut sapone, aut blitis radice cognoscatur, ne in magnis vulneribus corpus nimis dimoueat. De cæteris autem euacuationum generibus, quæ vomitu, lotionis copia, sudore, purgatione, ac aurium expurgatione, semineque sunt, hic obiter dicamus. Vomitus præscripti sub cane, aut hyeme, nisi à natura proueniat, & in facile vomentibus, improbatum nam caluarie fracturæ obesse compertum est, irrahitur siquidem vi quadam ventriculus, præter naturam modum, ad superiora, humores & Chylus in eo agitantur, & sublatis vaporibus cerebrum infestant. Vomitus est ex eis, in quibus non fit iuuamentum in curis agendum capitis, nisi fiat lege confortij à ventriculo. Lotium emittere quotidie capedit, quod si superminatur, causas expressionis inquirere oportet, ut remotæ, lotium ad naturalem statum reducat. Sudor nempe copiosus, si crisco modo, id est, via iudicationis ob humiditatem copiam à natura moueatur, nequaquam occludendus, verum si ob cubili calidioris aeris statum id eueniat, aer ad temperiem deducatur, nam huiusmodi sudores abundantia virtutem relaxant, & corpus languidum reddit. Sputum, quamquam capitis expurgationi confert, cerebro tamen vehementer affecto, eo quod ab ossis fractio comprimitur, aut purgatur, nequaquam prouocetur. E naribus, oculis, auribusque excrementorum effusio iuuat, ob id, quod cerebrum commode internum sic expurgatur. Nature enim moribus minime obstitendum est, potissimum si per convenientia loca, oppositæque motus fiant. Seminis demum profusio, tanquam perniciofa, vitare debet, cum semine sit ultimi nutrimenti vitilis superfluitas, nec, sicut sudor, aut vrina, inutile, sed humana speciei conservatrix, ac Hippocratis sententia à cerebro, & capite maiori ex parte decidit, cui venarum post aures peritæ sunt: licet cõ nervis, oculis, ventriculo, ac cerebro venis inimicatur, humores rugidos reddat, vires proferat, & corpus refrigerat, quare omni ratione tanquam corporis destructus relinquatur. Et omnia hæc à præcautrice potius, quam à curatrice facultate, indicantur.

b<sup>9</sup> Li. de Calu.  
druis.

c<sup>9</sup> Anic. 1. 3. c.  
28.

stent Vomitus est ex eis, in quibus non fit iuuamentum in curis agendum capitis, nisi fiat lege confortij à ventriculo. Lotium emittere quotidie capedit, quod si superminatur, causas expressionis inquirere oportet, ut remotæ, lotium ad naturalem statum reducat. Sudor nempe copiosus, si crisco modo, id est, via iudicationis ob humiditatem copiam à natura moueatur, nequaquam occludendus, verum si ob cubili calidioris aeris statum id eueniat, aer ad temperiem deducatur, nam huiusmodi sudores abundantia virtutem relaxant, & corpus languidum reddit. Sputum, quamquam capitis expurgationi confert, cerebro tamen vehementer affecto, eo quod ab ossis fractio comprimitur, aut purgatur, nequaquam prouocetur. E naribus, oculis, auribusque excrementorum effusio iuuat, ob id, quod cerebrum commode internum sic expurgatur. Nature enim moribus minime obstitendum est, potissimum si per convenientia loca, oppositæque motus fiant. Seminis demum profusio, tanquam perniciofa, vitare debet, cum semine sit ultimi nutrimenti vitilis superfluitas, nec, sicut sudor, aut vrina, inutile, sed humana speciei conservatrix, ac Hippocratis sententia à cerebro, & capite maiori ex parte decidit, cui venarum post aures peritæ sunt: licet cõ nervis, oculis, ventriculo, ac cerebro venis inimicatur, humores rugidos reddat, vires proferat, & corpus refrigerat, quare omni ratione tanquam corporis destructus relinquatur. Et omnia hæc à præcautrice potius, quam à curatrice facultate, indicantur.

d<sup>9</sup> Li. de geni-  
tione.

## DE SOMNO, ET VIGILIA.

e<sup>9</sup> Hipp. 1. apho-  
rismi 1. 2. apho. d.  
Gal. 3. apho. c. 6.

Omni, si nature convenientem modum excederit, caluaria fracta, malum signum est, & causa indicat enim, cerebrum frigida temperie laborare: vigilia etiam multæ inflammationem eiusdem portendunt, ut causa verò, diuturnus somnus malus est, nam ex nimia caloris innati concen- tratione in longo somno, cibum in ventriculo aduri possibile est, vel quandam alterationem pati, adeo, ut inde vapores caput petentes fodam, hoc est capitis vniuersi dolere, mouere valeant, contra vero in vigilijs superfluis concordes interturbantur, balneis idem dem ascendere, & corpus resoluere compertum est. Vtque igitur cauendum & corrigendus diurnus etiam somnus, & statim assumptio cibo, improbat, nisi nox vigilijs, aut iniqua præcellerit. Cæterum vigilijs somnus est, si nocte debitis horis conciliatur: tunc enim animalis facultas quiescit, & naturalis validius agere videtur, unde cibum non solum in ventriculo, verum etiam per vniuersi corporis ambitum optime præparatur, in super capiti vulnerato addo conferte videtur, ut pus optimum perpetuo gignatur. Secus verò in vigilijs apparet, in quibus nulla datur occasio, quin cerebrum moueatur, & in somno quiescit, in quo etiam, si moderatus est, dolores omnes mirè sedantur, nam somnus, dum retrahit spiritum, sopita facultate sentiendo, dolores mitigat: & calor is innati ope vulnera omnia rectè disponunt, & accidentia proligant. Cubabit ergo egrotus, quia par minus dolebit, donec pus sit genitum, tunc enim, ut facilius pus effluat, affecta parte cubet, nisi dolor id prohibeat.

f<sup>9</sup> Hien. 2. reg-  
nari 1. li. Gal.  
in commento.

g<sup>9</sup> Gal. 4. de  
mor. cap. 14.

h<sup>9</sup> Anic. 1. 4.  
30.

DE MOTV, ET QUIETE.

10



**N**IVERSI corporis quales sint motus, tum mentales, tum arbitarii, licet minimi fuerint, ingen-  
ti existente calvarie fractura, agendi sunt, veluti in rigore contingit. siquidem, dum quiescit  
homo, solum interdum inaequalitatem sentit, dum mouetur, horroremque verò exercitatur, ri-  
gorem, quamobrem sic affectus medici experientia docti consulant, vt ab omni motu se se abstineant, ne  
humores ad loca vulnerata, vt pote imbecilla, transferantur. Quies ergo, tanquam ad curationem ne-  
cessaria, praefertim si magna sint vulnera, conferre videtur, optimum enim illis, inquit Celsus, medicame-  
tum quies est; moueri enim, & ambulare alienum. & Galenus dicebat. Quicquid in corpore diffectum  
est, quod exquiritur, integram se ipsam postulat requiem: quae non solum cor pori vniuerso, sed oculis etiam im-  
peranda est, qui ex nimio motu, & copioso lumine multum agitantur, & spiritus resoluuntur. Quiescat  
igitur, vt dictum est, aeger in lecto valde molli, ac humili, & coctui obscuro; Vulnera verò estate bis, hyeme  
verò semel pro cura moueantur, eger parcius loquatur, sermo naque prolixus, & capitis inclinatio, risus,  
& clamor his affectibus mirifice obuiat arcenda sunt, quae sternutamenta cient, fumus nepe, odores ma-  
li, foetidi, aut acuti, & vomitus, qui vulnerato capiti aduersatur. Vulnera in ima semper, & declini parte  
quiescat, praeter illud, si magnum fuerit, quod in lateribus infigitur, ne quandoque cerebrum procidere  
posset. reliqua verò talem situm exposcunt, vt excrementa, purulentiaque materia facilius expungatur. At  
exercitij loco vt vapores auersionis gratia remeantur, leues frictiones, & his partibus, quae longius a vul-  
nere absunt, ante cibum, & euacuato ventre commodeantur: pariter interdum cucurbitularum spariis, ac  
que dorso absque scarificatione applicatio, vilis admodum creditur.

¶ Gal. 4. apho.  
coen. 33.  
¶ Hipp. lib. de  
Venerib. Gal.  
6. apho. coen. 6.  
¶ 6. meth. ca. 3.  
¶ 6. meth. ca. 3.  
¶ 6. meth. ca. 3.  
¶ 6. meth. ca. 3.  
¶ 6. meth. ca. 3.  
¶ 6. meth. ca. 3.  
¶ 6. meth. ca. 3.

30

DE ANIMI AFFECTIBVS.



**E**GORIA, & cogitationes, sollicitudines, ira, furores, clamores, timores, tristitia, & omnes vehe-  
mentes animi motus, & huiusmodi reliqua, quae corpus alterare, & a naturali statu peruertere  
possunt, cranio fracto aduersantur, & obnoxia iudicantur: quapropter omnino a similibus absti-  
nere oportet. siquidem dictum est, levari mente in omni morbo bonum, plerumque etiam praeter gaudium du-  
taxat magno ab acutis, & chronicis passionibus euasere: porro ex congruis remedijs, quae in quolibet  
morbo conferre possunt, illud est, quod vires validas reddit animales, & vitales, sicut laetitia, & gaudium,  
attamen nec cantus, nec instrumentorum harmonia, & sonitus, nec ludus probatur, nec mulierum illece-  
brae laudantur: nam sanguinem mouent, risum excitant, & in longum sermones protrahunt, quae omnia,  
calvaria fracta, inimicissima sunt. Qui itaque partes capitis affectas parit, motus omnes, tum menta-  
les, tum corporales dimittat, quiescat, & hilaris sit, ac quicquid, ipso audiente, profertur, latum omni-  
no esse debet, & perpetuo ad eius indubitatum salutem, iuuat: nempae grum sermonibus, aut veris, aut  
hictis oblectare. Strepitus omnes amoueantur, & quae horrorem inducere solent, vt pumicum simul, aut  
ferri cum ferro frictiones, & huiusmodi visui, & auditui valde molesta. Ceterum ante omnia aeger medi-  
co confidat. nam plures sanant, in quo plures confidunt, & ob id languentibus gratum, humanum, affabi-  
lem se praestare studeat Medicus, maturam, indubitataque salutem promittendo. Haec omnia dilige-  
ter obseruanda sunt, etsi magis ad partem, & methodum praeseruariam, quam ad curatiuum, videtur  
tur pertinere.

¶ Gale. lib. art.  
par. med. ca. 81.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor.  
¶ 1. Hipp. lib. de  
audo parit  
quira.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor.

50

De leui, ac simplici capitis vulnere, & eius curatione. Cap. VII.



**V**LNVS quodcumque cecidit, aut punctum leuiter caput attingens, ad pericranion  
visque deducum absque substantiae detrimento, omnique symptomate prorsus de-  
stitutum, sane simplex vocitari debet, nec curatione alia exposcit, si corpori prauis  
succis (satis non euenerit, quam abrasis capillis partium disidentium vnionem,  
ac postmodum partes fix vnitas seruare laqueo, aut sutura, aut deceti ligatura, si de-  
cet, vinculo scilicet duobus inijs circumdato: coeunt nempae ex se mollia membra,  
ac viscosa humido proprio, ac elementari, dum in vnum adducuntur, agente natu-  
ra per se absque medio. dura vero per accedens medio eterogeneo, poro nempe sarcoide, siue alrosboti;  
in similibus enim vulneribus partu carnosarum, vt ora ipsa se cum coalescant, atque agglutinentur. cer-  
te sola natura, & calor naturae causa est, qui aut ipsamet natura est, aut eius proximum instrumentu. Equi-  
dem dictum est, coalescere facit ea, quae inuicem distant, ac pristinam restituunt vnitate ipsa natu-  
ra. Ceterum tria requiruntur ad hoc, primum partes vnire, vt iam dictum est. Secundum, indicatione  
sumpta a causis, prohibere, ne quid labijs vulneris intercadat, quonia saepe vsu venit, vt pulvis, pilli, aut  
oleum, siue quaevis alia humiditas interueniens, earum, quae copulandae sunt, partium vnitate impediunt.  
Tertium prauidere, ne aliquod accidens vulnere superueniat. Et haec absoluta simplicium, leuiumque capi-  
tis vulnere curatio est, si temperatis, atque valentibus corporibus occurrant. Quod si fortis hac prima  
intentione, operationis finis frustratur: tunc indicatione sumpta a vulnere, sicis medicamentis vtitur,  
aridis

¶ Gale. lib. art.  
par. med. ca. 80.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor. ca. 3.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor. ca. 1.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor. ca. 1.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor. ca. 1.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor. ca. 1.  
¶ 1. Hipp. lib. a.  
de mor. ca. 1.

aridis nempe cephalicis, veluti ex Indis, Aloe, Olibano, Aristolochia, & Orobi farina. omnis nanque medicina, quæ temperatè exsiccat, ac leuiter sine dolore abstergit, his omnibus vulneribus conueniens est. dictum liquidum est, vulnera duobus modis sanari, vel per agglutinationem partium, vel per carnis concretionem. Verum cum corpora ea optima temperatura media desituantur, ac eucraton corpus inueniri non permittatur, interdum in similibus diuersas nancisci operationes necessum est, cum ex futura ipsa, aut laqueo inconueniens aliquod multoties oriri videatur, veluti sanie collectio, dolor, & inflammatio, nec vindique, ac æque medicamenta partes omnes attingere possunt, alia verò vulnera capitis chirurgorum nostratum usus est non conseruere, tum ob cutis duritiem, tum vt facilius abstergi possint. attamen \* cum ampla fuerint, & habia latiori spacio dissident, absque timore sui possunt, licet perique hoc opus assiatum in capite improbetur expurgato igitur vulnere, illud conseruere oportet, præterquam in temporibus, præsertim si vasa, quæ ibi locantur, sunt affecta, quæ enim laqueis id constringere licet, aut relicto musculo, corium suere, ne aliquod sequatur in commodum: porro <sup>b</sup> scire licet, quæcunque cute conteguntur, si nuda sunt, proprio velamento delectari, cæterisque omnibus lædi. at nuda caro, si sine cure relinquatur, ægrè ad cicatricem perducitur, & quæ vicus purgant ob detergendi facultatem mordent: ubi verò pars, à quæ detraeta cutis est, eadem contegatur, nullo modo afficitur. ex his patet etiam os quodlibet innata cure contengendum esse: Huiusmodi enim vulnera interdum simplicium genus pertranseunt, & ab ambiente, ac medicamenti actu frigidis ea non confusa alterari contingit. nam stipantur humiditates in labijs, & oritur eruditio, quò fit, vt maiori præparatione, seu concoctione postea indigemus, quousque pus optimum appareat, alioquin facultate operatrice impedita, sanguis, qui ad partem alicquam ab ea potentia, quæ nostrum regit corpus, demandatur, assimilari non potest, nec partes diffusas agglutinare. At si ad hæc necessitate vrgente non impellamur, haud ab re factum est, veluti in his vulneribus nonnulli faciunt, licet non conseruis, vt, saltem primis diebus, puluissis, siue linamentis, aut lichinijs ex lino carpentato, aut lenissima stupa paratis, recentis rosaceo omphacitide prius madidis, ac tepidis, & circa vulnus in orbem eodem oleo iungere, inde molli linteo duplicato madefacto operire, ac superaddita molli stupa caput leuiter fascijs inuoluere. Sunt & <sup>c</sup> alij, qui, vt suppurantem citius molliantur, ethiopes medicamentum, quod digestiuum vocant, admouent. fit nempe ex rosaceo, & oui luteo: verum detecto pericraneo, resina lentiscinam addunt, tali vtente medicamento vsque quò pus optimè appareat, inde <sup>d</sup> cephalica remedia administrant ad integrum vsque curis æqualitatem, emplastrum demum ex betonica, aut palmularum, aut tripharmacum pro cicatrice inducenda superimponunt, & hæc est probabilis, & laudata cura. Si autem necessitas ad futuram impellat, & vulnus tali medio coierit, sic & oleum, & suppurantia omnia abigenda sunt, sed liccioribus insitendum, tùm vt futura vitra seruetur, tùm etiã vt putredines arcantur, & cutis natura, quæ in capite dimissa vola manus, aut pedis planta omni alia, & durior, & siccor est, conseruetur. Sumito igitur Aloes, Sarcocollæ, Thuris corticum, Boliarme ni ana. ex quibus paretur pulvis subtilissimus pro molli corpore; in duriori ac exercitato, Alibucasis calcem viuam, aut ridis radicem addere solitus erat. Cum verò pericraneum scissum fuerit, cum sit membrana nervica, ac per fururas duræ meningi annexum, diligentem curationem exigit, indicatione ab affecta parte sumptam, nam neglecta eius vulnera dolores, febres, inflammationes, ac conuulsiones accersunt: quapropter præter rerum non naturalium obseruationem, & conuenientes euacuationes, vulnus iuxta opportunitatem regatur, vt poto dolore quodam inuadente, rosaceum oleum, quod completum vocant, aut ex terebenthina, aut ex virescibus ouorum adhibendo, donec dolor leuetur, pars affecta sic foueatur vsque quò laudabile pus gigni possit. Si autem vulnus dolore vacet, ab aridis cephalicis discedendum non est. hæc enim leuium capitis vulnere communis curatio est, in quibus, si aliqua substantiæ depeditio appareat, aut labra multum dissideant, aliquo sarcotico medicamento vti possumus, nempè illo à resina ingressu, resino, aut à citri colore, citrino nuncupato, basilicone minori, aut perichlymeno, quod ex matrefylva appellatur, nam hæc præstantia medicamenta sunt, quamquam ne verbum quidem vilius Theophrastus, aut Dioscorides ad capitis vulnera valere fecerint, quemadmodum de betonica dixit: quare medicamentum ex betonica summopere probatur, illud pariter, quod ex gummi ellenia, quam elemi dicunt, paratur, & illud Galeni, quod nigrum appellatur, aut ex Lino Morsus, quod Auenenna approbavit; quorum omnium descriptiones in cake huius primi libri videri poterunt. Vnum vterius scire etiam oportet, quod in his simplicibus vulneribus consolidandis deligandi modus summè necessarius est, igitur danda est opera, vt vitato omni incommodo, deligaturam ex fascia lintea, quæ huic operi aptissima est, nec ardeat, nec remittere debemus, sed eius terminus sit bona laborantis tolerantia, ac partium vnitarum conseruatio. cæterum extrema fasciæ acutiuscula sunt, nam nodus multum lædit, & dolores in ferre solet.

De capitis contusione absque cutis solutione, aut cranij manifesta fractura. Cap. VIII.



**V**bi caput a graui quodam corpore obtuso, & aequali, quod extrinsecus superincide-  
rit, contunditur, venaeque exiguae indidem diuortium experientur, sanguis, ut solet,  
cum tunica venarum transcolat, profunditur, cute inquit, & externa facie integra,  
& tumor tactu mollis, cedens, liuidus, magna ex parte indolens oritur, & fit passio,  
quam Graeci ecchymoma, & Latini simplicem contusionem vocant, statimque gemi-  
niz curationis indicationes nascuntur. Eo igitur animo primo tendimus, ne ad  
affectam partem aliene humiditates procumbat, demum, ut extra venas progressu  
sanguinem, qui in laesa sede continetur, dissipemus, atque confestim, antequam nigruerit. Vix enim fieri  
potest in contusis, quominus humores aggregentur; qui crebro putredine corripuntur; iccirco non  
immerito eas medici quamprimum curare accelerant, priusquam alterentur, eo sane curationis consilium  
dirigentes, ut eas absumant, non ignari aegre discuti posse, si iam in cumulos coierint, & altè conlisterint.  
Per hanc enim in his affectibus nonnulli ex astringentibus ijs, quae digerunt, admiscere oportet, eo quod  
venarum tunicae contusae densationem requirunt, inde ad sola medicamenta digerentia deuenire tem-  
pestiuum est. Quapropter caput à capillis derauam rosaceo immaturo, quod methopion, & omphacine  
vocat, inungatur, aut & oxyrodino, aut & rosaceo myrtino admixto, deinde oui candidum, quod albumè  
appellant, aliquandiu agatur, & leni stupa exceptum admoceatur, quod ad secundam tantum diem  
sat erit, postmodum decoctum excipieudum ex vino nigro, austero, tepido, in quo rosae, myrti, betonicae,  
camomilla bullierint, vel oxyrodinum oui albumine admixtum, denique sic per diem quiescat; & si do-  
lor aliquis appareat, bis in die medicamenta permutare conducit, & rosaceo maturo tepido caput totum  
irrorare, ac lanam co imbutam superponere verumtamen, si resolutioni magis vacare debeat, puluis hic  
aspergetur ex rosis, myrtis, betonica, & calamento, ac desuper lara plena decocto prædicto ma-  
defacta, ac expressa apponantur, siquidem leues contusiones sic quietè curari solent. Præstat etiam  
nonnulli fasciarum obuolutionis modus; arctatio enim modica fluxiones arceat, & immaturo calamen-  
to seruatur, nè à copia humiditatum vincatur; quò fit, ut etiam validior reddatur ad ducendum om-  
ne, quod præter naturam coniunctum fuerit, verum & huiusmodi deligationis usus, antequam pars in tu-  
morem attollatur, competere videtur; pars enim tumida æqualem exigit ligaturam, sitque eius initium,  
vbi sedes contusa est, & vergat quò fluxio accedere minatur; fasciam autem, qualis esse debeat, postea di-  
cemus. Si verò vehemens fuerit ictus, ac ex intenso dolore fluxio ingens consilium oborta sit, tunc  
parte capitis contusa, percussione modo, teli genere, distantia, ac percussoris robore sedulo perspecto,  
reliquis accidentibus, si quæ præcesserint, aut adsint, neglectis, scrutandus est, nonquid caluarie ali-  
quid contigerit, sæpe enim, ut dictum est, frangitur caluaria, cuti illa, cuius curationis modum suo dicemus  
loco. Quòd si cranium noxam effugerit, contusionis duntaxat, ac tumoris habita ratione, ad curis sectio-  
nem illico deuenire non licet, sed illico venam secare expedit, si nihil impediat corpus pharmaco bilem  
educente mouere, & tenuem vitum instituire, ac omni studio fluxionem auertere, porro si quierem  
expetimus, enematum siletem quotidianus usus sit, cum plurimum ad auersionem conferant, sed de hoc satis;  
superfluum erit abundè dictum est. Localia verò medicamenta, indicatione à dolore sumpta, ea sint, quæ  
affectæ partis innatum calorem foueant, & doloris causam absumant, iccirco lana dulci oleo calente ma-  
dida probatur, aut rhodium, & sapa, aut rosaceum, & oui luteum per vices adhibitur, & si hæc parum  
prodesse videntur, locum decocto Altheæ, seminum lini, fenugraeci, & betonicae fouere non dedecet,  
canonicè tamén magis operantur (inquit Auicenna) qui ad sedandos hos dolores oleis tepidis solum  
vtuntur. Quapropter nostrates Chirurghi rosaceo, myrtino, camomellino, & liliorum alborum dilathi cor-  
de, ac turo vtuntur; alij verò galinacem, aut asnerinam auxungiam addunt, alij vnguentum Hialiarum  
aut alabastrinum. nam hæc omnia dolores mulcent, & contentos humores dissipant. Leuato aliquanti  
spect dolore, discutionem valentius aggredi possumus, nè quod in tumore relinquitur, suppuracionem  
experiat, quare facius fuerit resolutionem, præterquam in crisi, vel in materia valde putri diligenter  
molliri; quocirca Auicenna & calamentum, farinam hordeacæ, ac hyssopum humidum summpere ex-  
tollit: à nobis verò tale probatur medicamentum. Accipio cimaram Absynthij m. ij. rosarum rubearum  
storum Camomillæ, Betonicae, Sertulæ campanæ singulorum m. j. bulliant omnia in vino nigro, postea  
contundito, & addito farinæ hordei, fabarumque an. vnc. iij. Cimini vnc. s. rosæ, quantum sat sit pro ca-  
taplasmare, vel humido Resinæ laricinæ vnc. ij. Hyssopi humide vnc. ij. Betonicae, singulorum  
vnc. j. Cimini vnc. s. olei masticæ, camomillini singulorum vnc. ij. farinæ hordei, ac seminum lini singulo-  
rum vnc. j. miscebo, & fiat emplastrum, cuius administratio, ut materia discutatur, post diem quartam  
probat, quidam verò ad hoc opus tantum emplastro ex betonica, aut de gummi elemi, aut illo mirabi-  
li humano Iacobi Carpentis perpetuò vtuntur. At si quis fluxerit humor pituitosus solus, aut erogo-  
neus, eiusque noxæ sint tumor mollis, indolens, decoloratus, & frigidus, corpore prius euacuato, aut Aga-

Tract. 2. De vuln. C. rico,

a Gal. meth. cap. 7.  
Arch. 14. ca. 69.  
Paul. lib. 4. ca. 30.  
Ausc. 4. 4. tract. 3. ca. 30.  
b Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
c Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
d Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
e Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
f Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
g Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
h Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
i Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
j Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
k Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
l Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
m Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
n Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
o Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
p Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
q Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
r Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
s Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
t Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
u Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
v Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
w Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
x Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
y Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.  
z Gal. 1. 9. meth. 3. ca. 30.

rico, aut catapotiis cochis, fumarur Camomilla, melilotus, stoechas, absinthium, androssemum, betonica, calaminta, calamus aromaticus, sapa, mel, oleum lilorum, & camomelinum, & formetur cataplasma. Hæc & similia auxilia in communem usum veniunt, semper a veluti suppositum accipientes, quod dispo-

89 Gale. 3. de  
comp. med. secū  
dum loc. vbi de  
cataplasma sita.

sitro, siue affectus nobis præsidia sobinducant, mensuram verò vniuersiuique, & particularem in materijs suggerit pars affecta, ægrotantis temperamentum, robur præterea, denique ætas circumscribens, tem-  
pores anni tempus, & consuetudo viuendi; Bilioso succo iam defluxo, corpus purgare oportet medicamē-  
to, vt iubet Hippocrates, cologogon inde locus inflammatus violaceo, ac rosaceo olco, aut vnguento  
rosato Mellicis inungatur; porro in his percussionibus occurrere solent, dum tenuiores succi partes infelsi  
biliter euauerint, vt crassiorum reliqua, quæ quoquomodo adhuc superfine, in duritiem aliquam con-  
uertantur, quam postmodum tollit tuto emplastrum ex succis Andromachi; siue diachilon Mefues, aut  
apostolicum Chirurum Damocratis, aut ex pyrite Galeni, aut ex calce Actij, aut aliud simile emollēs,  
ac materiam per halitum digerēs, Ceterum cum ob corporis plenitudinem, aut mentium angustiam, aut  
humoris copiam vel crassitatem, ac calor innoti suffocariorem nihil discissum fuerit, & apostema ad fla-

90 Gale. 3. de  
comp. med. secū  
dum loc. vbi de  
cataplasma sita.

tum deuenit, superante calore præternaturali, supurationem expectare oportet, tunc igitur præstō ef-  
fic debemus, ne innotus calor dissipetur, vt valentius in concoquendo se habeat, hoc præsidium tanquam  
præstantissimo viuentes, fomento nempe ex oleo dulci tepido, aut decocto maluarum alhæ, & carica-  
rum pinguium in iure salem non experto, vel horum substantiam sic paratam accipito, ipsamque contu-  
sam, ac per cribrum transfusam, farina triticea vnc. iij. adipis Gallinæ vnc. ij. olei communis, quod suffi-  
cit, vitellos ouorum num. ij. & cataplasma conficito. pariter ad pus mouendum administrabis, & idoneū

91 Gale. 3. de  
comp. med. secū  
dum loc. vbi de  
cataplasma sita.

ab omnibus probatur emplastrum macedonicum, siue triapharmacum, quo continuo ad phlegmones  
concoquendas vitur, constat quippe ex olei dulcis parte vna, aquæ communis duabus partibus, & tri-  
ticea farina, quod satis fit, huic addunt nonnulli vitellos ouorum, ac thuris cortices; cumque in abscessu,  
quem Arabes dubeler, & Græci apostema vocant, materiam in saniem conuerfam contineri ex notis ad-  
tactū, ex dolore, & febre, nouerimus, ac inundare sub digitis perceperimus, ipsam extrahere necesse est,  
ne alterato pericrano, & quæ sibi colligantur, interiore membrana cerebrum ambiente, aliquid acci-  
dat incommodum, quod quando absolutur sectione facta, annuente Hippocrate, in parte tenuiori, ac de-  
cliuori ad prolapsum opportuna, instrumēto nimirum idoneo, quod à semilunari, siue curua forma Græ-  
cè « scopolomacherion, Arabicè « Gamedin, Latine « sparum curuam, vulgò « Gamau, vel Gamau  
dicitur, vel altero instrumēto buic non abssimili, quo in fistularū sectione vitur, à Græcis « ob fistulas, quas  
syringas appellant, syringoœonum, ab Arabibus Embula, & Caiada, & à Latinis « Manubrioli, vocitator,  
quorum imagines in officina cernuntur.

92 Gale. 3. de  
comp. med. secū  
dum loc. vbi de  
cataplasma sita.

Porro accommodata sunt huiusmodi instrumēta, si tumor depressus, & nō extuberans appareat,  
cutisque dura, & aspera fuerit, quod si eleuatus, eminens, & in mucronem tendat, culter reclusus, acutus, &  
vtrinque secans magis probatur, qui duplici modo formatur, vel enim myrti folij imaginem refert, aut  
oliuarum folijs assimilatur, propterea & myrtinus, & oliuaris culter vocitatur. Et quia ad venæ sectio-  
nem, quam phlebotomia vocant, valere omnes consistunt, phlebotomum ferè semper nuncupatur;  
quidam calpros Chirurgos, & alij ob sagittæ formam sagittellas & vulgares lancettas vocant. Fiant hæc  
instrumēta hoc modo, sed variant in latitudine, & acumine, quorum vtilitas, vt sanguis crassus, aut sub-  
tilis à venâ euacuetur secundum opportunitatem, celebrari debet. In officina formam videas.

93 Gale. 3. de  
comp. med. secū  
dum loc. vbi de  
cataplasma sita.

Dissecro abscessu, atque euacuata, vt decet, materia, si sanguis emanauerit, vitello ac oui abso-  
rpto confuso, & leni stupra excepto supprimatur, inde sanici generationem accelerare oportet, adhibitis me-  
dicamentis, quæ, quia pus mouent, digestiua nuncupantur. siquidem à Galeno dictum est, ex præsidij  
in ipso vlcer, quæ lintæ excipiuntur, primum ea sunt, quæ pus mouent, deinceps expurgant, postea, si  
quæ sint cauitates, quæ implant, vltimò quæ cicatricem inducant, adhibenda veniunt; prima à Græcis  
septipia, secunda catartica, & rhapica, etia farcotica, & quarta epulotica. At quia in calce huius libri pri-  
mi, qualia sint hæc medicamenta, copiosè explicabimus, ac quibus indicationibus hi abscessus regantur,  
de ipsis hæcenus dictum sit satis.

94 Gale. 3. de  
comp. med. secū  
dum loc. vbi de  
cataplasma sita.

De contusis capitis vulneribus absq; caluarie nocumento. Cap. IX.

Imperu aliquo in capite fiat ictus, telo obtuso, graui, inæquali, & non incidente, 60  
curum, panniculum membraneum, & si qua est, musculosa substantia abrupti contin-  
git, læpè etiam pericranion, cranio integro permanente; interdum verò læuato  
impio pericranio, externarum partium fit continui solutio confusa, quæ, & si non sit  
tū, paulò post vlcus profundum, & latum producit, & curationem huiusmodi  
expolcit. Quamprimū igitur ægrotantem adiecerim, sedulo inspiciendum est, si  
quid in vulnere præter naturam contineatur, vt lapillus, festuca, capilli, vel aliud  
quid simile, illudque auferendum, atque iam nullam adesse Caluarie fracturam certiores redditi, abra-  
sis capillis per vulneris ambitum, si sanguis immodicus fluat, pulueribus ad hoc præparatis, aut his cō-  
bulsis, aut oui candido supprimatur, decensque ligatura caput aduoluatur: quod si circumposita loca  
dolore



Imperu aliquo in capite fiat ictus, telo obtuso, graui, inæquali, & non incidente, 60  
curum, panniculum membraneum, & si qua est, musculosa substantia abrupti contin-  
git, læpè etiam pericranion, cranio integro permanente; interdum verò læuato  
impio pericranio, externarum partium fit continui solutio confusa, quæ, & si non sit  
tū, paulò post vlcus profundum, & latum producit, & curationem huiusmodi  
expolcit. Quamprimū igitur ægrotantem adiecerim, sedulo inspiciendum est, si  
quid in vulnere præter naturam contineatur, vt lapillus, festuca, capilli, vel aliud  
quid simile, illudque auferendum, atque iam nullam adesse Caluarie fracturam certiores redditi, abra-  
sis capillis per vulneris ambitum, si sanguis immodicus fluat, pulueribus ad hoc præparatis, aut his cō-  
bulsis, aut oui candido supprimatur, decensque ligatura caput aduoluatur: quod si circumposita loca  
dolore

- 10 dolore, aut inflammatione afficiantur, propria eius effectus sanatio inueniendi est, illud pro certo habentes, fieri non posse, ut vulnus sanetur, nisi sedes, in qua constitit, iuxta temperis se habeat. Tunc igitur præmissa euacuatione tum per venæ sectionem, tum per medicamenta purgantia, ut fluxiones auertantur, tenuisque victus ratione instituta, quæ omnia ab omnibus medicis commendantur, licet corpus nec sanguine, nec villo succorum vitio redundet, detestabilem illam reiiciendo methodum, ut refert Rasis, qua crassum vitus regimen, carnes inquam, caseus, oua, vinumque permittuntur, vulnus per initia regatur in ambitu, ut leuatur dolor, rosacei, aut myrtini illinitio, intus ea admouendo, quæ pus mouent, communiter digestiua appellata, donec symptomatum præterierit suspicio. necesse est enim (inquit Hippocrates) contusas carnes putrefcere, & in pus verti incumbendum igitur est, ut hu iussimodi contusiones quam celerrime supparent, minus nanque phlegmone tentabitur vulnus, ac ex
- 20 sedatione doloris robur affectæ parti additur, fluxionesque prohibentur. ab his denique medicamentis vulneris labia præparantur iam ab ambiente, ac medicamentorum frigiditate dissipata, alterataque, in quibus ichoris copia continetur, adeo vt tumida fiant. hæc nempe cruditas illa est, cuius meminit Hippocrates, cum dixit [Vulnus in crudeles non parum molestiam exhibet, aliquando etiam febrem inducit, & medico quidem negotia. ægroto vero periculum non minus affert.] quocirca medicamentis in calido, & humido temperie plurimum non excedentibus vtendum, vt vigore capiente in nato calore, concoctio partis inualeat, alioquin vulnus huiusmodi curationem non facilem admittit. nanque concocta medicari oportet; & hinc est, quod princeps Auicenna dixerit, omne vlcus exsiccatione indigere, præter attritum aut confusum, illud enim humectari, & mollicari expostulat. Amplius dictum est, & confusum vulnus ad cicatricem nequit deduci, nisi optima præcelleret concoctio, absterfio
- 30 ve. Hæc itaque seriatim seruanda sunt, vt confusum vulnus prius coctionem experiatur, deinde non dolorosam absterfionem, postea nouæ carnis productionem vsque ad cicatricem æqualem. In his igitur per initia rosaceo solo, veluti efficacissimo, ac præstantissimo remedio, vt debemus, in mollioribus præfertim, delicatisque, ac acuti sensus corporibus, cum in eo requiritur omnes conditiones reperiantur, vt alibi fufius enarratur sumus, & eo vtendum est, vel simplici, maturo, vel cui luteo admixto, quousque pus optimum apparuerit, atque magis pericranio illæso. In durioribus vero corporibus, ac humidis vulneribus, resina larinica addito oui luteo, ac rosaceo probatur; siue quouis alio pus mouente medicamento, vt picato Galeni ex pice, rosaceo, & cera, quod etiam triapharmacum vocant, aut tetrapharmaco ex pice colophonia, cera, adipæ taurina, aut vitulina: Nos autem probamus illud, quod felici eventu vsi sumus, & vitmur. constat nempe ex oleo rosato completo, resina terebinthina, singulorum
- 40 vnc. iij. ceræ vnc. i. croci scrup. 5. quod si aliqua inflammationis suspicio adsit, ablatur resina aqua betonice, addaturque farina hordei vnc. ij. & vt sarcoticum, id est carnis productum, euadat, drac. ij. pulveris corticum thuris, & drac. j. aloes admiscere oportet, ex quo filamentis ex panno lineo molli, ac fibrillis illitis, vulnus imbuatur, in ambitu vero ex rosaceo optimo inunctio fiat, ampliusque lineum eo dem oleo mediū regionem omnem induat: quidam etiam indicatione a dolore sumpta anodinum aliquod admittunt, & si perueratur intentio, accipientes tritice panis medullam, hordei farinam, rosaceum, & oui lutea, ex quibus cataplasma paratur, quod exterius apponitur, alij maluarum folia sumunt, violarumque, ac scutellæ campanæ flores singulorum m. j. radicem althææ vnc. ij. omnia in iure salsæ non experto bulliunt, postea contundunt, & per cribrum transmittunt, inde addunt farinæ hordei vnc. iij. rosacei, ac violacei singulorum vnc. ij. ouorum lutea nume. i. croci scrup. j. & cataplasma
- 50 componunt, & super alia medicamenta applicant. Si vero affecta pars, vt in confusis sæpe cœnit, pituitæ copia redundet, & tumor aliquis cedematofus oritur, vt in corporibus cacochimis, ac cruditate repletis oriri contingit, curatur, vt in præcedenti capite dictum est: vnum autem prætereundum minimè censemus, quod ex humorum medicamentorum vlti diuturno noxa in affectis temporum musculis, ac magni cruciatus nascuntur; quapropter humida euadenda sunt, & iuxta requisitam intentionem in lacerantium, & tendonum vulneribus corrigantur. Concoctione iam se ostendente, vulnus leuiter abstergetur, quod præstat syrupus rosatus simplex, rhodomel, farina hordei, succus apii, aut terebinthina leta, & similia, aut per se, aut aliquo ex prædictis digestiuis admixta: & si fortior requiratur absterfio, id facit isidis addita portiuncula, adeo vt nulla erosio percipiatur, sic enim procedere oportet, donec vulnus flori coloris, & visidi appareat, & dum leuiter tangitur, doleat. Mox purgato, vt decet, vulnere, ad ea, quæ nouam pignunt carnem, transire oportet, & hæc in curandis istis vulneribus confusis se cunda erat intentio, humida prorsus omnia medicamenta dimittendo. Ea igitur sumenda sunt, quæ pri mum, aut secundum humiditatis gradum non excedunt, & arida cephalica vocatur, ex quibus tenuissimus pulvis paratur, quo caua vlcera repleantur: aut si decet, aliquo est vtendum vnguento, nempe ex matresylua, aut resino, aut basilicon minori, aut de gummi elemi, aut eo, quod a nobis in magnis sectionibus probatur. Sumito artemisiam, scabiosam, valerianam, betoniam, hipparim, verbernam, pimpinellam singulorum m. j. contundantur, & succus extrahatur, cuius vnc. vj. accipio, olei rosati, mastice, myrtini singulorum vnc. ij. bulliant simul, donec succus evanescat, inde relinquo transiit addito, myrrhæ, aloes, thuris, mastices, sanguinis draconis singulorum drac. ij. ceræ citrinæ, quantum sufficit, pro vnguento extensibili, quo vitmur, turundas indices imminuendo, sic enim carnem modo, quo supra di-

a Hipp. lib. de facie. Gal. lib. 1. c. 10. & 11. Gal. 4. meth. c. 1. & 2. de comp. m. fecit di. p. vi. de Soda a percussione. Rasis. ad Alm. cap. vlt. & 7. ad Al. cap. 1. Antic. 1. c. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

b Li. de Cal. curat. in prin.

c Hipp. lib. de hum. c. 1. & 2. ap. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

d Li. de Cal. curat. in prin.


e Li. de Cal. curat. in prin.



ximus, naturæ auxilio generare opus est. Cicatrix postremò emplastro palmeo, aut græco, aut cæ beto  
nica, aut simili obducatur.

At si in affectibus capitis contusis calvarie os fuerit detractum, an lisionem aliquam patiatur, diligen-  
ter inquirere oportet. occurrit enim interdù, vt contundatur ipsa calvaria ad cutis confusionē, nulla au-  
rima, aut sedes aut fractura existente; siquidē paulò post maculis, & punctis subrubcis repletur, aut eius  
color inter album, & rubrum permuat. exanguis, & arida inde fit, & multa incommoda sequuntur.  
nam temporis intervallo sanguis in ea corrumpitur, & tunc colorem, aut liquidum, & pallidum, aut cine-  
ricum acquirit; postremò, quia non nutritur, emoritur, & fit atri coloris, nec amplius membrana exte-  
rior, pericranion dicta, secum vniri potest, nec minus caro super eam gignitur: Hac quippe ratione Ga-  
lenus iubebat, vt Calvaria superficies abraderetur, aut profunda, aut debili, vt decet, abrase, donec  
sanguis ille ycorosus efflueret, & humida eius appareat substantia, potissimum verò in adultis, senibus,  
& lictis corporibus. Secus verò in pueris, cum eorum ossa mollia, & tenuia, ac sanguinea existant, igitur  
abratione raro egent; & si egent, terminus abraseionis erit, co liquet rubescit color denotetur, aut lan-  
guis effluat, perinde ac quæ essent lacrimæ rubæ; postmodum, si opus fuerit, vulneris labra vniantur, aut  
futura, si vulnus magnum fuerit, aut alio ingenio, & agglutinantia adhibeant præsidia: si verò cruditas  
aliqua apparuerit, indicationem sumere oportet à natura vulneris contusi.

## DIGRESSIO.

 **A**STRUM si quis fortè in huiusmodi vulneribus medicamenta pus mouentia improbare, vt  
potè humiditates, ac putredines adaugentia, quæ quidem rationali methodo videntur repu-  
gnare, necnò vt venena homini inimica potius, quam congrua medicamenta, damnarēt, atque  
magis, quia dolores, febres, aut promouent, omnino abigenda esse, vel tanquam superflua reprob-  
anda; quandoquidē coctio naturæ, & non medicamentorū sit opus; insuper retina, cum oblit coctio-  
improbum medicamentum censetur, obest nempe vulneribus ob nrosalem, & acrem quandam eius  
siccitatem, quæ coctioni omnino aduersatur; nam humida esse debent, quæ pus mouent. Huic pro-  
fectiō sic respondens, nullo modo medicamenta putrefaciencia probantur (plurimum enim intercellit  
inter pus mouentia, & putrefaciencia) sed illa duntaxat, quæ partis affectu innatum calorem, ac propo-  
modum à soluta conuinitate contusa extinctum fouere, & augere possint, ac vt in sanguine, & humido  
partis iam alteratæ, coctionis actio fiat, quod huiusmodi medicamenta præstant, vt latius inferius de-  
monstrabitur. Porro dictum est, in animalium corporibus triplicem fieri alterationem, vnam nempe  
exquisite secundum naturam, & sic à calore naturali in iuuatui, & materia admodum familiari, in qua ve-  
rè dominatur natura, & calor ingentis superans, vt in ventriculi concoctione, aut iecoris sanguificatio-  
ne apparet; altera huic aduersatur, & planè præter naturam existit, cuius actor calor putrefaciens est,  
agens in materia inutili, aut diuersa, vt in omnibus putrescentibus, dum talis obida, ac ceno similis appa-  
ret, siquidem putredo mutatio est totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelam à calido ex-  
traneo in humido suo. Tertia inter has medium locum tenet, & veluti mixta ex naturali, & præter natu-  
ram agente, scilicet calore naturali, & non naturali, vt in abscessibus, & bonæ sanie generatione digno  
scitur: Ad veram igitur coctionem duo requiruntur, calor naturalis temperatus, & materia benigna &  
familiaris ad putrefactionem verò calor alienus alteratus, & omnino præter naturam, & materia inutilis  
calida & humida, putredini obnoxia; putredo enim est via corruptionis, ad mediam alterationem innatam  
calor vincens, addito non naturali, & aduentitio in materia, nec ex toto benigna, nec ex omni parte  
mala sub prohibita transpiratione occlusa, aut in porositate carnis impacta, vt sanguis est, qui extra  
vasa propria, aliam acquirit naturam, & seminalam qualitatem adipiscitur, præsertim si in loco minus  
transpirabili detineatur; vt hæc vltima fiat alteratio, siue concoctio, aut (vt isti dicunt) in vulneribus  
contusis digestio; ea omnia remouenda sunt, quæ innatum calorem suffocant, conseruant; suffocatur  
enim à valida confusione à nimia frigiditate, aut aeris ambientis, aut topicorum medicaminum, à fortis  
confusione, & a copiosa materia, ideo ab Hippocrate ea probantur, quæ temperata caliditate naturæ  
calorem adaugēt, eum emolliunt, ac extenuant, & dolores sedant: Hippocratis autem propositio in ab-  
scessibus intelligenda vt plurimum est, non autem in vulneribus, vt passionis in diuortio sunt; quinim-  
mo, vbi vulnera coctionem ostendunt, ægri à symptomatibus custodiuntur, & velocitatem crisi, & fe-  
cunditatem sanationis promittunt, quapropter in vulneribus contusis, vt simus adminiculo naturæ, quæ  
nisi impediatur, pus optimum molliuit, vtinam medicamentis, quibus affectus sedis obstruunt aperien-  
di, necnon dolores sedandi vis infusa sit; secus autem in abscessibus siquidem ea medicamenta empla-  
stica esse debent, & hinc dicebat Auicenna. In contusis vulneribus dolores sedantur medicamentis pus  
mouentibus, membri temperem conseruantibus, ac humores in labijs vulnerum congestos attenuan-  
tibus; hæc ratione in his vulneribus, vt optima producat concoctio, naturæ auxilium præstare, iustum  
est: Porro medicamenta huiusmodi temperatæ caliditatis, paucae humiditatis absque vlla obstru-  
ctione, sed alieuius absterfionis esse debent, talis nempe caliditas illius sit conditionis, quam descripsit Hippocra-  
tes in vlcere suppuratione valere, cum dicit Calidū suppuratorium in omni vlcere, excepto putrido,  
aut phagedenico magnum ad securitatem indicium, eum molli, extenuat, dolores sedat, rigores, conuul-  
siones,

¶ Hipp. aphro-  
n. 47.

¶ Gale. 5. de  
simp. med. fac.  
c. 4.

¶ Gal. 1. de  
tib.

¶ Auicenna. 1. 4.  
tract. 3. cap. 41.

¶ 1. 4. aphro. 33.

¶ Hippo. lib. de  
Veneribus.

¶ 1. 4. 4. tract. 1.  
cap. 3.

¶ Lib. de  
medic. vlt. 2.  
5. aphro. 3. Gale.  
5. de simp. med. fac.  
cap. 8.

- 30 siones, & distensiones mitigat, & ex his, quæ ad caput attinent, eius soluit gravitatem plurimum etiã confort osium fracturis, sed nudis præcipuè, eorumque maximè, qui in capite vlcera habent: quæ autem caliditas temperamentum excedit, incommoda plurima affert: quapropter opinantes sanien ex medicamẽtorum calidorum, ac diuersarum rerum applicatione, in vulneribus produci, decipiuntur, nam ex tali mendendi modo materie quàm plurimè, præsertim subtiles, ac biliosæ ad caput transfuntur, vnde & apparentes, & internæ inflammationes sæpe giuntur. quod annotauit Hippocrates, dum de hoc verabatur. nam nec tantum fascias applicare aulus erat, afferens hunc errorem inter manifestos enumerari posse. Opinantibus verò terebinthinam improbũ medicamentũ esse, respondemus, & si ea in passibus qualitatibus sicca existat, à qua digestio talis, quæ in his vulneribus decet, provenire non solet, sed b à caliditate, & humiditate, opportuno tamen, ac conueniens præsidium esse, ac in continuo vñ herbi, necnon pro prium homini medicamentum, partium præsertim neruofarum, veluti pecticanem est, communiter as firmatur. Præseruat quidè resina ipsa membra omnia contusa à putredine, & corruptione, à medicis sem per in omni attritione, & magnis contusionibus verenda, ea corroborat, obliuiscens aperit, dolores sedat, & vlcera pura reddit, & si in ea, qua resina est, nitrositas aliqua adsit, ea tollit, ait Galenus, & ablu tione in æstate facta, vt decet, cum aqua beionice, aut consolida, aut vino albo tenui, & vt pariter ea de bilis acuitas contemperetur, humiditas quedam admiscenda est, quæ ab oui luteo, & rosaceo modico ex pectatur, atque de ipsa agens Galenus dixit. Terebinthina resina simul cum detergẽdis, discutienti quibus, facultatem habet etiam concoquendi, ac pus mouendi, quapropter optimum, ac opportunum medicamen tum censei oportet, longè quæ experimẽto comprobatur, scire etiam oportet, quod digestiuorum continuus vsus, etiam in contulis non admodum laudatur: fat enim est ipsis vti, donec pus optimum ap paruerit, dictum siquidem ab Hippocrate est. Primis diebus contusa vlcera irritare non conuenit: sed operam dare, vt vicus quàm minimò inflammatione tentetur, & quàm maximè sup purer, atque vbi septẽ dies, vel paulò plures transierint, si febris non sit, atque vicus inflammatione vacet, ad exciscantia tran sferantur. Occurrit interdum in magnis istis contusionibus, vt in his, qui ab alto concidunt, quod nec cutis, nec os frangitur, attamen varia subsequuntur accidentia, vt obmutescencia, stupor, paralysis, conuul sio, & similia, quæ præsidij, ac indicationibus, vt in eorum curatione dicturi sumus, corriguntur, ac proliguntur.

a 1. de off. me  
dico lib. de Cal.  
cour. lib. de tra  
ctura.  
b 1. Gal. 4. meth.  
c. 1. & 1. meth.  
cap. 1.

e 1. de comp.  
m. secundum ge  
nera.  
d 1. 1. Kugeni  
vbi de m. her.  
e 1. de simp. m.  
lac. cap. 1.

e 1. de tra  
ctura.

De caluariæ angusta fractura non detecta, nec læsa mem brana. Cap. X.

40



AEDIYR multoties caluaria, ad intima fractura non descendente, vulnerata tan tum prima tabella, aut etiam mediotullo, nonnunquam & diploide ipsa, seu vitrea, quam isti secundam tabellam vocant, qui quidem affectus omnes maximè timendi sunt, quanquam ad meningas non deuenierint, perpetuò tamen medicis anceps de eorum quiditate, & progressu permanet. quippe breui temporis tractu, ignota pene tratione perniciofa adducunt symptomata: aperiuntur interdum arteriarum, aut ve nularum nonnullæ ex his, quæ per Caluariam ob eius nutritionem disseminantur, quod ex anatome, ac in cranei terebratione, apertissimè dignoscitur, dum eam sanguinis copiam effuunt, vt operator, nè clarè quod operatur, appareat, impediri solet: exit sanguis à venis, & extrà pro pria vasa continetur, à natura non regularur, & qualitatibus malis afficitur, vnde pessima subnascentur ac cidentia. nam ex ruptis capitis ossibus, ait Hippocrates, difficillima cognitu sunt ea, quæ circa suturas rumpuntur. rumpuntur autem maximò à grauib, & contundentibus telis, & ab his, quæ ex subcontrario asseruntur. Solent etiam hæ fracturæ ad intima penetrare, quæ tamen notescunt, quanuis angustæ, vel humiditate diuersa ad meningas effluente, vel sanguine percolato, qui postmodum non expurgatus putrescit. vnde varia sequuntur incommoda, & mors, quapropter Caluariæ vniuerse fracturæ, & diligen tem operatorem, & regiminè victus conueniens requirunt. Medicus ergo prudens, cum primum calua riam detectam adinuenerit, accuratissimè eius statum perquirat, & primò querendum est (ait Hippocra tes) an caro ab osse denudetur, & si qua in eo adest fractura, ac sensu visus percipiat, nec non quantæ, & qualis fuerit, inuestigare oportet. indè quibus medijs, siue indicationibus curari valeat; si verò oculus id agere nequit, specillo vtaris, & si eo agente certus non fueris, ab ijs, quæ præcesserunt, & præsentibus symptomatibus veritatè adipiscaris. Dimissus igitur primò capillis, & vulnere ab eis amplè denudato, dili gentia adhibita, queratur, si in eo capillorum portianculæ inferantur, inde qua capitis parte, & num in debitori vulnus sit receptum, & capilli circa ipsum inspiciantur, an à telo dissecati sint, & intus in vulne re residant; quod si adfint, periculum imminet, os carne denudatum esse iaque dicere oportet, os ali quam lesionem à telo habuisse, atque longè prius considerasse, ac dixisse oportet, antequam hominem attingat, operatorem. Qui si caluariæ aliquam portionem ex toto separatam, vt in alicui fractura con tingit, ac ipsi corio adnatà inuenierit, siue magna, siue parua ipsa particula fuerit, eã auferendā pars ossis emortua cū ea, quæ viua adhuc est, vniari denuo nequit: verum vt vulnere vicinos pilos abraadat, Notacula

vitur, Raforius, siue culter excisorius vocitatur, aut illo instrumento, quod etiam ad hoc creditur oportuissimum, forceps vulgo forficula dicitur, quorum imagines suo loco in officina cōperies.

POSTOQUAM caput à capillis circa vulnus vndeque denudatum fuerit, danda est opera, vt, an os sit nudatum, percipi possit, aut fractum, apertè percipiatur. quòd si aliqua in eo fractura reperitur, quod dignoscitur, si oculis non pateat, vbi digitus immittitur est, qui in caluarie fracturis certissimum præstat indicium, siue vbi id non licet, specillo o nudatum, aut fractum esse significatur: specillo enim confiderandum est, quantum sit malum in ossis, & quam operam exigat. Specilli tamen ad motum, an tale quid mali os passum sit, non indicat, & an habeat quid in seipso, aut non passum sit, sed sedem teli indicat specillum, & an intro cesserit os ex natura sua, & an vehementer fractum sit, quæ etiam oculis conspicua videtur cognoscere debent. Diuerfarum formarum huiusmodi instrumenta parantur, sed quæ huic operi adaptatior magis, nec nimis plena, nec nimis tenuia esse debent, rationibus superius adductis. Chirurgi dedecus magnum est (ait Hippocrates \*) si specillo capiti ad moto, os fractum adesse non nouerit. quo factum est, vt qui illis vtitur intrumetis, illa diuersimodè vocitarint, antiqui .n. specillum, & radiolum, alij astilla tectoriam, aliqui stylum, nonnulli expertorem, & exploratorem vocant, & non immerito; nam sapè istarum fracturarum cognitio, & experientia eorum auxilio acquiritur. verè enim occultatur, & quæ sensibus non subiiciuntur, passilum, explorator & iudex est, veluti internam terebrum, syringarum, vlcetum cauernosorum, & diuersorum anfractuum; cuius materia aut argentea, aut ænea, aut plumbea communiter esse solet, & sub formis effingitur, de quibus in officina.

CONITA fractura, videndum est, ne quid ex ipsa membrana, quæ sub cuti caluariam iungit, super os relinquatur, siquidem hæc scalp pro, cerebris ve lacerata vehementes febres cum inflammatione excitat. eà itaque commodius, & ex toto diduci debet, illa tantum separatione, quæ opportunè operatori id præstet commodi, vt finem assequatur; siquidem multa incommoda ex amplis sectionibus pericranieli, & cutis sequi solent. nam membrana neruea est à dura meninge orta; quare doloress, inflammationes, & conuulsiones facillimè commouet, & caro, ac locus affectus imbecillius reddiatur, quod in his curationibus maxime verendum est; hac ratione experti Chirurgi operando instrumentum aciem obtusam ex altera parte habentem, ex altera verò bene secantem, aut spatam, seu ea latiori parte vellellæ vtuntur, quam in continuo vsu ad varia comoda circumferunt; porrò ad muka facit, nam tutò periosteos, siue pericranion, quam tuncam Arabes almocatim vocant, in caluarie fracta ab ipsa diuellit, sepe etià fracta ossa, aut depressa eleuat, aptè medicamenta extendit; & cum opposita, ac duplicata parte, ossicula, aut (vt Arabes dicunt) tartagias, pilosue, ac minima huiusmodi corpora à vulneribus, & cauernis eripit. communiter verò lichina, pagelas, ac turundas à plagis extrahit, vocitatur ab antiquis vellella, vullilla, & vullella, ab Arabibus gestli. communiter pincta, pincigiarola, & apud nos molettina, & sub triplici forma paratur, cuius imagines in officina inspicui possunt.

FACTA cutis dilatatione, accuratè inquiratur, si qua ossis depressio, aut fractura appareat, aut eius portio aliqua vbique separatur, sic vt digitis quicquè subleuari, aut euelli possit, aut saltem vellellæ, aut alteri simili opportuno instrumento; si verò sano sic adhæserit, vt tutò extrahi nequeat, eo dimoueatur instrumentum, quod Græci ostagram, Latini vellellam, & vulgares ab eius operatione leuam, siue eleuatorium vocant; diuersimodè formatur, & simile habent nostri Chirurgi, ad varia comoda perpetuò paratum, & eoque depressa ossa, aut quæ ferè tota excisa sunt, & iam labant, attollunt, ac vna cerebri membranam custodiunt; eo Galenus utebatur in fractura camarolis, & engisliomæsti enim lamina ter rea angusta, longitudinis digiti, ex ferro Indo, aut ex calibe optimo fabricata, lenis, sed angustior in ea parte, qua os tangit; aspera, & conuexa ab altera, non recta, sed duabus extremitatibus recuruata. similia instrumenta ob eorum varietatem varia sortiuntur nomina; nam interdum latiora ex vna parte, angustiora ex altera sunt, & hæc terna habeantur, aut etiam plura, vt ad opus aptissima sint. quibus demissis, ossa eodem penè momento, quo intenduntur, impellenda, ac eleuanda sunt, non aliter, quam si vectis ad lapidem, vel lignum attollendum admoeretur. sint ergo organa hæc, quantum fieri potest, fortissima, ne fluctentur; siquidem opus hoc magni momenti esse solet, & longo eger experimèto: tutum tamen erit, si idonea instrumenta adint, & impulsus conueniens adhibeatur.

CUMPRIMUM medicus sibi opportuno præparauerit locum, ac extractis ossium squillis, filis nitidis vulnus totum impleat sic, vt & vulneris labia, & pericranion aliquantisper distent, & fractura eadem pateat, & os nudatum appareat, quod interdum iniuriam paritur, quanquam iniolatum videatur: altera die, quanta, & qualis fuerit ipsa fractura, diligenter inquirat; quæ si scissilis, aut rimularis, aut (vt dicit Auicenna) non fuerit nisi cortex, aliquo ex prædictis instrumentis corticem absolvere poterit, inde vulnus curare, ac si os incolume reperiat; remanente verò in ea aliqua scissura, & nequam ad incima penetrante, eam radere conetur, donec eius vestigiū, aut signum non remanserit, & ve iubet Hippocrates, primò super os aliquod nigri coloris medicamentum, quod liquidum sit, induendum est, & vulnus aridis lichinis repleatur, ac desuper cataplasma, quod do dolores leniet, adhibere oportet: postmodò vero soluto, ac purgato vulnere, os deradere expedit, quod si sanum non fuerit, sed fissum, aut contusum, reliquum, quod rasum erit, albu inuenietur; fissura verò, quæ nigrum medicamentum eliquarum in se ipsam susceperit, in reliquo ossis albo nigra conspicitur: verum si vna vice tantum negotium

Hipp. M. de Cal.  
curat. libro. 1. de  
morbo. & lib. de  
medico. & lib. de  
fractura. Cal. li. 9.  
cap. 4. Cal. li. de  
tort. Hipp. cō. 9.  
de 6. de anat. ad  
m. cap. 10.  
Paul. lib. 6. cap. 9.  
de 77. Auic. 4. 1.  
c. 37. & 3. 4. c.  
39. Ab lib. 2. c.  
46.  
Hipp. lib. de me.  
dico. Cel. lib. 7.  
c. 13. & 30. Gal.  
Hippo. de med.  
vul. com. 1. Pau.  
lib. 6. c. 90. Ab.  
lib. 3. cap. 6.  
Hipp. lib. de Cal.  
curat. Gal. de m.  
th. cap. 6. Cel. li.  
8. cap. 4. Paul. li.  
6. cap. 90.

negotium expediretur, sat esset. sin autem iterum quoque rima, quam nigram intrueris, alè radenda est, ita vt ex toto deliteſcat, & os sub rima totum album appareat: porro vel si deliteſcat, vel ita alè descendat, vt ſcalpro detrahi nequeat, tunc quidem terebro opus perfici debet, nè ſanies ſuper cerebri membranas colligatur, quæ non, nili extractio offe, cijci poteſt, hac ratione os, vel ſerra, vel ſcalpris, vel terebris, vel modiolis detrahitur: ſi verò telum altius oon deſcenderit, rima tantùm radenda eſt, donec ex toto euaneſcat: vnde Auicenna dicebat. Magis rectum eſt, iterum vt frices illud, vſque quòd noo remaneat de ſciſſura aliquid; & ſi amas, vt ſeſtines cum eſſuſione humiditatis nigre, donec vehemens fiat apparitio ſciſſuræ, per eam fac, & frica, donec non remaneat veſtigium. Hac omnium medicorum eſt vera praxis, quæ loco huius nigræ humiditatis ſcriptorio atramento vtuntur. At quia apud eos inſtrumenta variæ formæ ad has fricationes accommodatæ reperitur, de eis aliquod conſiderare expedir. Apud antiquiores nonnulla aderant inſtrumenta, quæ concaui, ſeu ſemilunaris ſcalpri formam præſerebant. his nempe ſimilia, quibus lignarij fabri paruū aliquod lignum excavaunt à Græcis cyclica, & chylifica, à Latinis ſcalpra exciſoria cauū dicuntur. quòd autem eorum imago talis extat, id aſſerere eorum vſus nos cogit; nam dicebat Galenus. Operatio, quæ per terebrum fungitur, paruū tuta eſt, propterea quòd, dum audacius eam tractamus, duram membranam, quæ oſi ſubſternitur, nõ raro violamus. quod verò per cyclicos opus adminiſtratur, nè id quidem omninò vitio caret, cum quæ tui modice caput, quod potius quietem poſtulat. Ad eundem modum & Paulus, cum id explicaret, inquit. Si verò os imbecillum aut natura, aut fracturæ vitio fuerit, id ſcalpris exciſorijs cauus, quos Græci cyclicos vocant, à latiori incipientes, mox anguſtioribus, deinde ſpecilli modo anguſtis, malleolo ſenſim adactis, ad capitis conſuſionem vtuntur. Hinc Auicenna, dum huius inſtrumenti vtilitatem offe deret, ait. Et adminiſtra facilitatè in percuſſione parua, & magna, vt non laedatur caput, & inquietet oſ ſum. Hoc illud inſtrumentum ſine dubio eſt, quòd à Celſo ſcalper lunatus dicitur, qui literæ C imaginem præſert; ac ima parte, qua acies continetur in canaliculi ſpeciem vtineque à lateribus ſinuatâ, ſic enim & cauum eſt, & ad ſemicirculi figurâ accedit, dum uè operatur, eius decliuis pars ſuper fracturâ, & cornua ſuper os ſanum apparent. Eſt pariter ſine dubio ſcalper exciſorius cauus Pauli, qui acies incuruatas inter ſe, conſeruat. Ergo vera delineatio horum inſtrumentorum ea eſt, quæ in officina deſcribitur, veruntamen aliqua recta, & aliqua curua formantur.

Non deſunt alia ſcalpra, quibus Hippocrates os radi iuſſit, cuiuſmodi autem fuerint, non ſatis cõſtat: illud tamen per certo eſt, quòd veteres his non ſolum ad os radendum utebantur, ſed etiam ad excidendum. offe enim in ambitu per terebrum perforato huiuſmodi ſcalpris nonnulli ab vno foramine ad alterum malleolo adactis id ſolum, quòd reſtabat inter foramina, prædicebant: id ſcalper, à Celſo auctore, cum planus admouetur, radi; cum in latus conuertitur, excidit. cauendum tamen eſt excidendo, nè angulo ſcalpri membrana cerebri violetur; verum quia ad modum tuta eius operatio oon iudicatur, qualis phacoti credetur, reprobat, radi enim inquietè, & ſi carnem attingit, eâ lacerat, & dolores mouet, ſi mediis recuratur, vbi viſ facile ſiſtitur: ſi rectus eſt, vix continetur, quominus delabatur. Formam in officina videbis.

SCALPRA hæc omnia citra malleoli operam nullius momenti ſunt, mouentur neceſſariò malleolo adacto, præfertim in rimis, quæ ad diploidem vſque pertingunt. excavaunt totum os, forti adhibita percuſſione, noo tutò, ſed incommode. hac ratione eius vſus non probatur, ſiquidem tutiora, ac magis prona inſtrumenta his diebus apud nos extant: atramen eius operatio à Galeno, adiecto phacoto aut alicuius offis ſeparatione, aut diuiſione, laudatur, vt infra dicemus. Malleolus hic eſt, & eius materia aut lignea, aut plumbea eſſe debet.

OPENANTUR oonnulli, quòd Cyclicus, cuius imago in officina delineata eſt, illud ſit inſtrumentum, quo recentiores in Caluarie rimis perperuò vtuntur, quod ab re eſt, illud nempe à multis re probatur, hoc autem ſecurè, commodè, ac ſeſtinè operatur, nec malleolo eget, nec caput commouet; rectum eſt: ac ſerè vniuſ palmi longitudinem implet, in imo recuratur ſic, vt paruū ſinum in orbè offe dato: æ autem, quæ vtinque à lateribus ſunt, aciem acutam habent: in ipſo autem vſu ſerramentum in latus vertitur, & ima ſui parte os attingit, dum ve vna tantùm manu digitis partim ſubiectis, partim ſuperpoſitis ducitur, id radi: hoc ad omnes fracturæ modos noſtrates vtuntur, vbi cumque diuidendum, aut radendum oſ eſt, vt quicquid iunx cerebri membranas laſerit, exitum præbeat. Nonnulli hoc ſolo ſerramenti genere contenti ſunt, ne ſcalpro, adacto malleolo, cerebrum conſuuant, aut terebra hoc ſu crone membranâ lædant; eſt enim (ait Hippocrates) & ad perforationem, & ad raſionem facile, ac expediri: ob id in operatio, cum ad imam offis partem deueniunt, ſcalprum imprimendo leniter procedunt, tuncque maxime offum vnuetur, quàm plures nimirum, & latiores, & anguſtiores habentes penes ſe; ſiquis ergo manu ſtroua ſit, & exercitatus fuerit, celerrimè hoc ſolo ſcalpro omne opus perficiet, ad Hippocrate raſorius ſcalper, à Paulo ſcalper arcuatus, à Celſo ſcalper adunctus communi voce, quia raſpando, ſine fricando offum ſedes, & rimas delere ſolet. raſpator, & fricator, & ab aliquibus curator nuncupatur: verè hæc inſtrumenta ſicuti latitudine, ita numero, & magnitudine, diuerſa eſſe debent. Cyclica profectò non ſunt, vt aliqui imaginantur, quod ex operatione, & ex forma dignoſcitur, quæ in officina deſcribitur.

**T**RIA apud antiquos scalprorum genera reperiuntur, vnum cautum, alterum lenticulatum, tertium latum, vnum quodque quidem radendo idoneum: quæ omnia ignoramus, quæ ratione à medicis nostræ ætatis reprobentur, cum dicant (decepti tamen) securiora, ac magis commoda inuenisse. Hæc quæ drifariæ præferunt formam, totidemque nomina sibi vendicant, acuta nempe ab acurie, plana a planitie, spherica à rotunditate, amygdalina ab amygdalæ effigie, & in excavandis, ac explanandis ossibus fissuris, rationem obtinent, quæ per cauos scalpros administratur, vitio omnino carent, & scalpra rasiloria dicuntur: videamus (quisso) formarum diuersitatem, ac legamus nomina, quibus designantur, in officina.

**P**RÆDICTORVM scalprorum aliqui proprio manico, siue manubrio ita inferuntur, quod inde euelli nequeant; alij, & si quam plures videntur, vno tantum egent manico, in cuius imo torculatum foramen inferitur, vbi scalprum caudæ ex opposito pariter torculatæ sub eadem forma, & quantitate adaptari, facillimè extrahi, & commodè permolari possint: Manicus verò interdum plenus, interdum inanis formatur, vt intus scalpros omnes conseruare valeat, in fundo tamen efformatum torculi habet, vt scalprum caudam recipiat, quorum effigies extat in officina.

## P R A X I S.

**O**PERANT plura alia de scalpris adduci, sed his contenti esse volumus, quibus etiam rimas, ac sedes omnes delere possumus, & ad hanc rem maximè pertinent: dum ergo opus agitur, si de rimarum vestigio accipietur fuilemus, nigro medicamento ob inito vulnere, os radatur, donec omnis tollatur nigredo, & sanguis emanare incæperit, capropter instrumentorum copia adesse necesse est, diuersa quidem in forma pro lesionum varietate, ac vnus formæ diuersa in numero, & magnitudine. Sint igitur alia parua, alia mediocria, & alia magna; vulnera enim vsque ad diploidè diutaxat ducta angustiores scalpros requirunt, & non terebra, vt contusiones, & magnæ fracturæ. Instrumentorum materia Calybs depuratus existat, acutæ aciei, vt optimè radat. Ossium abrasiones fiant iam scdâ venâ. Venâ secetur præmissio enematæ, aut post convenientem corporis euacuationem, ac summo mane, à latiori scalpro iniciando, ac per gradus ad strictiores, inde ad angustiores procedendo, donec penitus rima abolita sit. Scalpra perpetuò parata habeantur, ne ex indigentia aliundè quarantur, & tempus amittatur. Absoluto opere, cephalicis medicamentis (nam sic iubet Galenus) vsque in finem vitæ, & sufficit. Quæ verò rimæ, aut sedes altius insident, & ad meningas perueniunt, secus radendæ sunt, ab angustioribus ad latiora progrediendo, vsque quod membrana admodum detegatur, vt per ossis aditum humiditates, si quæ fuerint, vel ossicula, aut quid extraneum educi possit, ac medicamenta oportune applicare valeamus. Porro, antequam opus aggrediamur, vulnerati aures aut lana, aut xilo, aut carptis filamentis lineis obturentur, nè ab ossis frictione molestè afficiatur, & strepitus horreat; dumque opus agitur, duo experti ministri caput vulneratum immobile conferunt, nè hinc inde labatur, scalper inter dum rosaceo immergatur, nè à motu nimio incalascet, & os accendatur. Post operationem, quæ calorem, ratione motus, cui trahendi potestas incit, excitat, ac dolores commouet, nè inflammatio superueniat, vereri oportet, ob id interdum anodinis vti non ab re est; quapropter primis diebus vulnus illius rosaceo crudo expedit; aut si nervosæ partes detectæ fuerint, tercibachina lota, addito oui luteo, ac rosaceo modico; partes etiam circa vulnus rosaceo maturo calido foueantur, deia de lineum vino nigro calido, rosis, ac betonica bullito imbutum, ac expressum, quod totam partem rosaceo perunctam contegat, adhibeatur, ac supradditis alijs lineis calidis, fascia vulnus vinciri debet: talis enim medendi ratio concoquit, expurgat, temperatè exsiccatur, & carnem inducit; rosaceum confortat, inflammationes arceat, dolores mulcet, & materiam, quæ iam fluxa est, discutit; vinum esse etiam sedem corroborat, astringit temperatè, & fluxiones remeat. At, si alicuius inflammationis initium apparuerit, emissio sanguine, rosaceo solo vtendum est, de super verò cataplasmare ex hordei farina tosta, & posca: aut illud, quod paratur ex plantagine, rosis, farina hordacea aqua decoctis, addito rosaceo, ac aceti modico; verum quia de inflammatione loco proprio agemus, hæc pro nunc sint fati: dum verò inflammationis nulla adcrit suspicio, nec vllum indicium apparuerit, Hippocraticis sententiam, quam scripsim in libro de Caluarie curatione reliquit, sequamur, cum dicit, exsiccantia medicamenta capitis vultibus conuenire, & ne humida adhibeantur, prohibet, quippe nec vinum, & si exsiccandi, ac contrahendi vim habeat: ex quibus docentur pingua omnia, ac oleoia fugienda esse, sed perpetuò aridis cephalicis in vulnere vtendum; ossis nempe complexio valde sicca est, quæ sic conseruari requirit, attamen hoc semper seruari (ait Hippocrates) vt si non iuuës, saltem non noceas, symptomatum natura singularem considerat, & quicquid agis, prudenter agas, rurò quidè, citò, ac sine dolore; hæc obiter dicta sint, & ad rem nostrâ redeunt, dicimus ferrularum quarundam apud priscos ad rimas oblongas tollendas vsum fuisse, quæ præsertim transversum feruntur, & sano ossi contemnantur; de quibus Auicenna dicebat. Quodque absolvit opus subtili ferra, quam eam esse arbitramur, cuius imaginem in officina delineauimus: quamquam per subtilè ferram, cum Hippocrate, ferratum modiolum intelligere aliqui videantur, dum dicit. At si inter initia ad ægrum non accesseris, sed homo alteri prius traditus, minus tē pestilenti tibi committatur, acutiori ferra os protinus excidere, vsque ad membranas, conueniē, subinde autem tollendum ferramentum est, & demisso specillo, eius circuitus cōsiderari debet; circuitus verò nō

**De internis membranis detectis ob Caluariæ manifestam fracturam. Cap. XI.**

PRIMA SECTA EMPIRICA.

Sexta ratio. Experientia comprobatur esse, plerisque sanatos esse et sola medicamentorum applicatione, et non chirurgia, cui experimento magis credendum est, quam rationibus, non est equidē neganda eius utilitas, cum sensibus acquiescere sit necesse, nec sensum pro rationibus dimittere licet, praesertim, cum

a Hipp. lib. 7  
loc. 12. homin.  
de lib. de Cap. cu  
rat. Cellib. 8. ca.  
4. scrib. lib. 10  
comp. med. G. 1  
6. meth. c. 1. k. de  
4. de loc. aff. c. 1.  
Aet. lib. 4. c. 35  
Paul. lib. 2. c. 90  
Hab. 9. praef. 3  
34. Zonar. 2. The  
for crach. 3. c. 1.  
Ausc. 5. q. 17. ar.  
ca. 2. Ausc. 6. col  
lib. ca. 1. 6. Albu.  
lib. 3. cap. 3.

b4 Scrib. lib. de  
comp. med. de-  
lect. 101 ad me-  
tem Trifol. Cyn-  
cost. Megast. 7.  
Triphomis & a-  
liorum. Gal. 17.  
meth. cap. 13 &  
1. virg. cap. 14.  
& 3. 4. & 6. Kna-  
gens. Aesc. 4. 9.  
meth. 3. cap. 11. &  
5. Canon. ad me-  
tem Anastro. 1.  
Cellib. 7. cap. 9.  
Aesc. lib. 15. c. 13.  
Paul. lib. 7.  
c4 Am. lib. de ge-  
ner. com. 7. 6.



a<sup>9</sup> Aristot. 1. de  
Anima & 9. me  
tasph.  
b<sup>9</sup> Gal. 1. c. 4.

c<sup>9</sup> 1. 3. trac. 3.  
cap. 1. 4.  
d<sup>9</sup> Gal. 1. Me-  
mor. cap. 7. Act.  
1. 6. c. 4. 7. Paul.  
1. 3. c. 6. Hali. 5.  
prodi. cap. 10.  
Ruin. 4. id. Al.  
cap. 1. & 10. de  
med. cap. 3. Aue.  
1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

1. 3. trac. 3. c. 16

sit concessum medicamenta dari attrahendi valida, potentia prædicta; potentia enim per operatio-

Septima ratio. Sumpto medio ab auctoritatibus, sic argumentantur, ex Celso, b<sup>9</sup> ubi ait: In omni ve-  
rò fillo, fractove ossis propterea antiquiores medici ad ferramenta veniebant, quibus id excederent: sed mul-  
tò melius est prius emplastra experiri, quæ caluariae causâ componentur. Ex Avicenna c<sup>9</sup> pariter, dum  
dicit: In cura vulnerum capitis principium quidem consistit in emplastris, & erit eius redificatio veloci-  
ter, quam plurimas etiam alias antiquorum auctoritates adducunt, probantes in cura fodæ, ac menin-  
garum inflammatione medicamenta magis valere, quam manuum operatio; ergo magis probantur, & ma-  
gis valere creduntur. His omnibus rationibus breuiter respondentes, dicimus.

Ad primam: Antecedens negatur ob id, quia huiusmodi medicamenta non dantur, quæ tantum ex-  
terius applicita, eas omnes indicationes, quæ necessariò requiruntur, explere possint, veluti fracta ossa tu-  
tò extrahere, membranas à putredine mundare, vniuersum vulnus excicare, affectam sedem corroborare,  
tamq<sup>9</sup> proprio symmetro conferuare, nouam carnem producere, & tãdem inducere cicatricem, quod  
experimento conperitum est, & apud antiquos scriptores pro absurdo habetur: quod si darentur, eorū  
scriptis mandata fuissent.

Ad secundam: Negatur pars secunda minoris, rationibus iam dictis, & ad tertiam respondemus, ope-  
rationes ab experto medico, & rationali celebrari, sunt veræ, ac tunc indicationes curatiue, & ad requi-  
situm finem opportuna, ad vniorem videlicet partium separatarum inducendam: quidem Chirurgus ra-  
tionali methodo ductus vulnera, ac fracturas sanare, non autem destruere, solius est: ac dissectas partes  
humani corporis coire facit, & vniorem inducit, quod aliter tutò fieri nequit.

Ad tertiam: Dicimus medicamentorum attractiones temporis longitudine perfici, quæ caluariae fractu-  
ris cōpetere nullo modo videntur, atque minus vrgentibus symptomatibus, ac latè patente causa adhuc  
intentio in caluariae fracturis non tantum dirigi ad puris, aut ossium extractionem debet, sed ad mem-  
branae absterionem, & ad quàmplurimas alias requisitas operationes, medicamentorum varietatem re-  
quirentes, & si ab antiquis ad ossa, & spinas extrahendas medicamentorum varia genera descripta repe-  
riantur, ea quidem valere credimus, dum ossa, aut teredine affecta, aut sciencia, aut à colore innato de-  
struita fuerint: tunc spontè solent hoc modo egredi, & eò celerius noua subnascente carne, quod in cal-  
uariae fracturis expectare non decet. Amplius dicendum, medicamentorum attrahentium quædam à  
proprietate substantiæ, seu à qualitate, aut operatione, vt dicunt, occulta, quædam ob suarum partium te-  
nuitatem, & caliditatem id agere: vnde si primo modo saniem attrahere possunt, non ossa, ratione dif-  
finitudinis subtrahit: si forti calore, nullo modo cōueniunt in his affectibus, & minus, si dolor aliquis,  
aut inflammationis initium apparuit.

Ad quartam, respondendum est, melius ac laudabilius fore ægrotantis saluti consulere, quam eius ti-  
morem prospicere: præterquam si ab excellenti, & perito chirurgo tractetur, non timere, quid talis exi-  
sit, tutò, eleganter, citò, latè, & sine dolore opus absoluit, eoq<sup>9</sup> magis si opportune, & accommodatè  
instrumentis, ac expertis ministris haud indigeat: tunc enim nec timorem, nec aliud accidens inducere so-  
let, quod ex necessitate post operationem non apparet, sed inepta potius imperitorum medicorum agi-  
tatione, vel ob ambientis qualitatem, & vehementem frigiditatem, seu malam victus rationem.


Ad quintam: negatur similitudo, ob id, quia inflammationes internæ non omnes medicamentorum dun-  
taxat externorū applicatione, sanitati restituntur, sed interdum corporis vniuersi euacuatione, initiant  
morbo, ac materia pauca benigna, ac disiectioni opportuna, existere in corpore robusto, optimi habitus,  
latorum pororum, quod malorum humorum copia non scatcat: secus verò semper videtur, ubi pluri-  
ma fuerit materia facta inflammatione, in cacochimia, aut succo maligno: siquidem intereunt om-  
nes, præterquam si in incremento aliqua significatio apparuerit, crisis dicta, veluti plurimus secessus, aut  
lotij copia, vel sudoris abundantia, aut de naribus sanguinis multitudo, aut erisipelas exterior, aut  
alia quævis euacuatio à natura, & non à medicamentis facta, & si aliqui euaferunt, regulam facere  
minimè videntur.

Ad sextam: Respondemus, verum esse, quosdam sola medicaminum applicatione conuulsisse, quod  
artis perperuò esse non creditur, nam aliquibus hoc euenire posset ob intrinsecas, ac proprias dispositio-  
nes, vt in corpore cucurao, robustus viri sit, in aere saluberrimo cum latiori fractura, in qua aditus ad cō-  
pact, vt omne præter naturam contentum, faciliè educi possit: porro hæc conditiones omnes non vbiq<sup>9</sup>,  
nec in omnibus reperiuntur, nec curatio per medicamenta in vniuersum probatur, nec tutior ea habetur,  
quæ optimo victus regimine, oportunitate euacuationibus, & diligenti chirurgia perficitur.


Ad septimam: Dicimus Celsum ibi medicamenta non probare ad vulnera, & fracturas, quatenus ta-  
lia, quæ varias indicationes exposunt: sed in eorum principio humorum, ac vaporum ascensum prohi-  
bere intendit, probat lanam aceto imbutam, quæ quotidie permurari debet vsq<sup>9</sup> ad diem quintam, pro-  
bat item medicamenta alia similia ex aceto, & reliquis ad prohibendas inflammationes, & ait: Si verò  
sub prima curatione febris intenditur, breuesque somni, & tñdem per somnia tumultuosi sint, vlcus ma-  
det, neque alitur, & in cervicibus glandulæ oriuntur, magni dolores sunt, cibique super hæc fastidium  
adaugetur: tum dñum ad manuum operationem, scalprumq<sup>9</sup> veniendum est, dimittendaque empla-  
stra, &

- 80 *Ita, & medicamenta omnia reipresentia pariterque dicimus Auenennā illi de passionibus cerebri, ac nē  
brantarum sermonem habere, cum accidentium quorundam horum affectuum meminerit, praeterit inq. in id  
cerebri ventres vulnus deuenit; quo circa ad inflammationes arcendas, ac tumorem, alituratim dictū  
prohibendum, emplastris vitur, vt omnino talis meningarum, aut cerebri excrecentia impediatur, nam  
paulo post medicamenta propria localia enumerat. Auctoritatibus etiam in cura sorda a percussione di-  
cimus medicorum intentiones ad quietem, & dolum remotionem solummodo dirigī, vt potē accidentiū  
grauiorum inducias minime scientium, & non ad caluarie fracturam curationem, nec osium extra-  
nem, vulnorum absterisionem, & carnis productionem, alibi enim de vulnibus capitis ad plenum pertra-  
ctantur. Ea verō reliqua argumenta, quae hae scēda in medium solet adducere (vt potē nullius momenti,  
& frivola) omitteremus, ne frustra citā vilitatem laboremus; hoc tamen vnum addi potest, quod si Ga-  
lenum praesensere, ac tantum in hac curatione medicamentis, & non chirturgia vti fuerint, illud eueneri po-  
tuisset ob id, quoniam anatonem nō exercere, neque opportuna, cōtinuāque terebra, aut modiola pa-  
rata habebant, quemadmodum nostratē quotidianō vti obseruant.*

SECUNDA SECTA EMPIRICA.

-  *L* *TERVM* Empiricorum genus adhuc viget, Hebraeorum nimirū, ac Germanorum, quibus po-  
tionibus quibuldam caluarie fracturas indifferenter turō sanari posse, visum est; has pigmenta  
vocant, quorum visus in fistularum, cassaliumque vulnorum curatione habetur; exterius verō cau-  
lium folia solum aponentes, citra rerum non naturalium, vt vocant, considerationem, nulla quidem ra-  
tione ducti, sed priuato solo experimento, nescientes profecto illud casu eueneri, & naturae validissimo  
bore operante, non pigmentorum facultate, quae si talis esset, vulnus omne, si acturaque, licet membrori  
nobilium noxa consisteret, indubie curaretur; quod hercle falsum est. Absint igitur a nobis, tanquam erro-  
nei, & mēdaces, tamen si simplicia vulnera reliquarum partium, aut puras fistulas his potionibus exliccan-  
tibus interdum sanantur; non sunt probandae capite fracto, vbi vera, & diuersae operationes ordi-  
nate requiruntur, per excellentem, ac peritum virum administrandae. Sunt etiā, qui caluarie fracturas,  
& vulnus quodcumque tūm simplex, tūm compositum, fontis aqua duntaxat, orationibus, ac benedictio-  
nibus, incantationibus, & similibus sanare arbitrantur, linteola quamplurima eadem aqua sic parata, im-  
buta, aponentes, nil aliud agentes. Caterū quia nondum operationem notabilem ex his nouerim-  
us, neque experimentum securum viderimus, praeterquam in leui, & carnosio vulnere; ea propter nunc  
ea silentio pertransibimus; in calce enim huius primi libri describemus, quicquid particulatim scriptum  
40 inuenerimus, aut de hac empiria audierimus. Solent tamen isti in quibusdam vulnibus manuum  
operationes p̄bare, vt in fractura, engiffomatō, & camarosis, vbi ossa in plures partes diuisa apparuerit.

TERTIA SECTA RATIONALIS.

-  *V* *erō* ratione ducuntur, Hippocraticam methodum seruantes, duas potissimum causas, ob  
quas ferreis instrumentis in caluarie fracturis vti necesse sit, vt ossa fracta, aut dubio affecta exi-  
mi possint, assignare videntur; quarum prima deligatio est, indicatione sumpta a natura partis  
laesae, quam in alijs fracturis, & cu maxime phlegmonas arcentem, ratio inuenit, capiti adaptare non possu-  
mus, nec quod affluit, reprimere, nec quod in agris partibus continetur, exprimere, sine quibus praesidijs,  
nec reliquorum ossium vllum seruari sanum potest: secunda ex communi omnium sententia sumitur, vt  
50 si ossis aliqua pars pungat, comprimatur, aut humiditatum sub craneo contentarum expurgationem prohi-  
beat, illa quidem tollatur, manuū nempe, ac instrumentorum operatione; siquidem haec, nec ligatura  
duorum capitum, vt in alijs fracturis Hippocrates facere solitus erat, nec alio ingenio expelli possit. quā  
operationem innuit Hippocrates, dum dicit. Si fissuram, rimam, aut fracturam scalpro adimas, minus  
horrenda est est, & minus negotij exhibuerit fissura delecta si verō in profundo sit, & dum raditur, deleri  
noluit, calamitas haec ad perforationem deuenit, qua integrā haec fracturae curantur, & alibi. Siquidem os  
fractum fuerit, ac contritum, periculo vacat, & curare oportet hunc humectantibus medicamentis. Si ve-  
rō rumpatur, & fissura sit, periculum est, huic ferram adhibere oportet, ne in ossis scissurā sanies influens  
membranam cerebri corrumpat. nam vt per angustum intrans, non autem exiens, albigit, & furere homi-  
nem facit; huic itaque ferram adhibere oportet, vt sanies exitum habeat, & facta ampla scerratura, medi-  
camenta commodē ingredi possint; igitur ambigendum non est, an Hippocrates manuum opere, ac ferra-  
mentis exercuerit, quod aperte percipi potest. In casu Antonomi, famulae in Omilo Equisoni, Palame-  
dis, & aliorum, vti etiam Celsi, testimonio, dum inquit. In omni verō fissa, fractove osse protinus anti-  
quiores medici (Hippocrates, & Soranum innuens) ad ferramenta veniebant, quibus id exiderent. nam os  
fractum, nisi succursum est, grauius inflammationibus afficitur, difficiliorque postea tractatur. Pro-  
bat haec operatioem Galenus, dicens. Etenim si craneum est fractum, id curamus praecipue, vt quam  
citissime ossa fracta excidamus, ne videlicet ipsum cerebrum acris occurso refrigeretur id quod certe ef-  
fectus malorum vltimum illi, cui caput fractum est. Sed quid magis, nonne & Galenus ipse, leuē operatū  
60 ferramentis esse demonstrat, cum dicat. Nouimus enim aliquando simplicitis os fractum; quod autem os  
huic protinus succedit, temporis os vocatur, in quo ipsas squammatim commissuras compactas esse ac-  
cidit.

a 9 Gal. 6. v. 10.  
the. 6. Aue. ca.  
de fract. cran.

b 9 Lib. de Cal.  
cuer. lib. 2. de  
morbis. & de  
loc. in homi.

c 9 r. A. 7. Epi-  
decuram.  
d 9 Lib. 8. c. 4.

e 9 1. de v. su. p.

f 9 4. meth. c. 16.

a 9 10. de Comp.  
med. cap. de lun  
guine. columb.  
§ 10. de l. m.  
vt supra.

cidit, in eo luculenta fractura longissimè pertinebat: quam ipse equidem minimè contingens, sed tantum  
sincipitis os excidens, hominem lanauit, sic vt nunc quoque multos iam annos viuat, attestatur et etiam Per  
gamenos suos capita perforasse, dum inquit; Columbe sanguinem Pergameni nostri, atque etiam per to  
tam fere Asiam, qui capitis ossa confracta perforant, in cranium cerebri inuolucri effundere solent: &  
paulò post. Ego<sup>b</sup> verò sexcentos noui eorum, quibus Romæ perforata fuere capitis ossa, nec quicquam  
ab usu rosacei citrà columbe sanguinem officinos. Auicenna etiam idem locutus est. Scias, quod nlla ca  
pitis diuersificatur ab ossibus alijs, cum franguntur, quoniam nõ restatur natura super ea alrosbot for  
te, sicut attrahit ipsum, & nasci facit super reliqua ossa, immo rem debilem: quapropter, vt non effundatur  
pus ad interiora, oportet, vt extrahatur, si fuerit plaga capitis completa, & non fiat occupatio in restau  
ratione eius. Omnium igitur Græcorum, & Arabum sententiam iuuile videtur, qualem descripsimus;  
patetque terebris, ac modiolis cranea perforasse, vt corpus tutum redderent, ac à prauis symptomatibus  
liberarent, sed cum nostri in his opinionibus determinandis insilire non sit instituti, auctoritates quim  
plurimas dimittamus, quibus operandi necessitas demonstrari possit. Abiit igitur, qui operationes im  
probant, credentes turo cataplasmatibus, emplastris, potionibus, aquis, & suis incantationibus fracturas  
Caluarie omnes, postposito victus regimine, ac operationibus dimissis, curare possent: verumtamen si hisce  
eorum medicamentis interdum vti necessum fuerit, illud conuenienter, vel ob vulneratorum animi pa  
uorem, tale operis genus respectum, vel ob causam à medico perperam, veluti et ætas infantie, aut  
decrepitate, vt sunt vero gerentes, aut si fuerit rationalium Chirurgorum penuria, aut instrumentorum  
defectus, quæ omnia in aliquibus temporibus reperta fuisse, aliqui<sup>c</sup> testantur; vel dum talis<sup>d</sup> fuerit fra  
ctura, vt nulla indigeat operatione, nullo symptomate apparente.

e 20. 1. Thes.  
§ 1. Alia in suo  
prob. Aut. 1.  
col. 1. p. 1. & 7.  
col. 1. p. 1.  
d 9 Hipp. lib. de  
Caluarie.

### DE OPERANDI RATIONE FERREIS INSTRUMENTIS.



Ro<sup>o</sup> vbi ad manifestas fracturas peruenerimus, aut os depressū perceperimus, & sanguinē, aut  
alterū succū per ossis scissuram super membranas destillasse veremur, cerebrumq; ac membranas  
compressas, aut punctas esse dignoscamus, aut quid extraneum absconsum detineatur, manuum  
opus mollire necesse est, seu accidentia non expectando, omni adhibita diligentia, vt sedes affecta, &  
affectus natura, ac magnitudo ad vnguem percipiatur. Si igitur minor plaga est, quam fractura ipsa, se  
cetur donec vniuersum os fractum, aut quod fractum sit, dubitatur, conspici possit, sic enim iubet Hip  
pocrates, & qui tribus de causis sectionem fieri debere innuit, nempe cum os nudatum est, vt apertè no  
scatur, quid mali ferierit, & cuiusmodi sit, quantumque carnis collisum; secus verò, cū sub tello inuolutū  
seruetur, nihilq; lesum sit, quidq; opus in curatione egeat, tū quod ad carnis, quam quod ad ossis viciū  
pertinet; secundò cū nudatò ossē vulnera intus caua sint, vt latius pateat intus, quin extra, neq; possit  
ea medicamenta recipere, quibus nutriendum sit, incidi debet (scalpello, transuersa linea duña, qua par  
te medicamenta non admittit; tertio cū vulnus orbiculare est (capacissima enim omnium figurarum  
spherica indicatur) plaga, quæ in orbem est, cū angulum non habeat, vnde caro nascatur, diuturniori  
tempore repletur: quare eam sectione accommodare opus est, sic vt duæ lineæ scalpello ducantur in lon  
gitudinem hominis; altera nimirum à superiori parte orbis, ab inferiori altera, quò vulnus longum red  
datur. Itaque, inquit Celsus, quantum fieri potest, eodem momento & cutis incidenda est, & os de  
crescendum; ante inflammationem enim tutius omnia trahantur, sic etiam Paulus, & Auicenna senserunt.  
Plagam igitur, si ex vulnere talem esse nouerimus, qualem necesse est habeamus, sit erit: si autem ma  
nibus facienda est, ea ferè commodissima esse solet, quæ duabus transuersis lineis per medium se mu  
tuò secantibus literæ X figurā accipit, licet priuatum huius nõ meminerit Hippocrates, primæ quidem in  
genere sectionum manifestarum oportet autem, vbi secatur, carnem ab ossē deducere, & membranam,  
quæ ossi iuncta est, separare, deinde vulnus vniuersum linamentis implere, quò albumine imbutis, præter  
tim in sanguinis fluore, vel etiam & candido, iurcoque simul, vt dolori obstitamus; sic enim in posteru  
dicam minimo labore vulnus apertum habebimus. Suprà verò puluillus, ex molli stupa paratos, vino, &  
rosaceo infusus apponemus, aut Hippocratis cataplasma, siue polentam tenuissimā, quæ ex aceto, aquis,  
& farina hordei tosti subacta, atque incocta sit, vt glutinosa reddatur: denum caput fascijs cōtineat, & (vt  
tantum continetur, quæ fuerunt apposta) auolui debet. nam fascia, quæ ad conuincenda medicamenta  
superdantur, in capite opportuna sunt. Et hæc quidem operandi modus à nobis probatur, dimittendo spō  
giam aceto imbutam Celsi, aut poscam Pauli, cum vni non seruentur, sed vti vni plurimum aridis lina  
mentis, qui modus communiter laudatur. Alius itaque collocato capite, ita secanda est plaga, vt omni  
no prædictæ figuræ imaginem referat, sic, vt vna sit linea ipsius plagæ altera, quam scalpello chirurgi  
duxerit, ex quo tetragona figura oritur: antea verò caput radendum esse, clarius est, quam dignum, quod  
scribatur: ab ossēque diducta carne, & pericranio, angulo eleuentur, linamentis quæ aridis plagæ impleat  
tur. Vt autem opus hoc absoluat, opportunitum instrumentum requiritur, quod à Paulo culter exci  
sorius, ab Auicenna interprete nouacula, vulgo rasorius, quod quæ à Chirurgo perpetuò delecti debet; ad  
eam imaginem efformatur; aut tale sit, cuius formam in officina expressam intueri licet, aciem obtusam  
ex altera parte habet, ex altera verò acutissimè fecat.

Vt autem forma incisionis externe cutis, quam illi scorticaturam vocant, superius enarratæ facilius  
sensu

e 9 Lib. de Cal.  
curat.

f Lib. 9. c. 1.  
in fine.

10 sensu visus percipitur, cum sub effigie, de qua suo loco in officina, delineare decreuimus, in qua anguli quatuor eleuantur.

A T cum se penumero contingat, vt vel ratione ossis substantiæ imbecillioris, vel ratione modi percussionis, vnum plagiæ latus duntaxat fracturam experiatur, tunc vnam partem tantum fecare sufficit, la-  
tus nimirum illud, sub quo fractura impressa est, nam non semper ad eam sectionem, quam crucialem vo-  
cant, cogimur deuenire, præterquàm in fractura ingenti, aut magna depreSSIONE sub ambitu plagiæ totius.  
Ergo interdum datur sectio recta à latere vulneris ad vulnus ipsum, adeo vt anguli recti continuantur  
ex linea recta, ducta supra lineam rectam, præsertim si vulnus rectum, aut oblongum exierit, sit & figura  
trigona, quæ ad operantis intentum conducit. Diducatur ab osse caro, & membrana, ac eodem modo  
regatur vulnus, vt dictum est. hanc sectionis formam multi orthogonalem vocant, à qua anguli duo recti  
prius formantur, deinde super os detectum, cum labra eleuantur, triangulus quidam apparet, ac, vt talis sit  
prius vulneris sectionis imago efformetur. ¶ postea in hac capitis forma, duorum: angulorum ele-  
uatio, triangulum efformantium, conspici potest; quod figura in officina descripta aperte demonstrat.

Q UOD si vulnus ob sui magnitudinem, rectæ quæ fracturæ formam, diduci potest, labia quæ non ni-  
hil separari, nulla sectione opus est: sed mox tantum aut digito, aut vnguis, aut instrumento aciem  
obtulam ex altera parte habente membrana ab osse diducatur, labia adinuicem æqualiter distent, sic vt  
fractura late pateat, & opus commodè conficiatur, quemadmodum figura in officina suo loco de-  
scripta, videre est.

C UM autem fecare intendimus, latas, & magnas sectiones vitare oportet ob id, quia particula, vbi ad  
cicatricem est perducta, non solum turpissima reddetur, sed etiam procius imbecillior fiet: ergo cū nu-  
dati ossis causa plaga in capite secatur, vt pateat, necnè a telo os ipsum læsum fuerit, eatenus incidi de-  
bet, quatenus opus esse videatur, omni studio, ne <sup>a</sup> meningæ os tegenti inflammationi suboriatur, ac inde  
confortij lege duræ membrana, & cerebro communis fiat. Sutura igitur nunquam fecare oportet (nā  
in sutura os est diuisum, & facilius cardit) neque ab ea pericranium diuellere; siquidem <sup>b</sup> futuræ maxime  
neruosa sunt, nec memoria excidat, quod tempora, & regio superior iuxta venam, quæ per tempora fer-  
tur, ob eius sensibilitatem attingi non debet: vtrum enim, qui incisus fuerit, neruorum distensio prehendi;  
nerui enim, qui à tertio pari oriuntur, per has membranas diseminantur, & in eas desinere videntur, mu-  
sculorum quippe omnium hi à prauis accidentibus facillimè corripuntur, cum neruorum principio val-  
dè proximi sint, adeo, vt ossis tantum substantia tenuis inter ipsos, & cerebrum media sit, inferiori ma-  
xillæ motum præstant, quæ capiti iuxta tempus committitur, & nè <sup>c</sup> ab externa causa facile læderentur,  
fagax natura iugalis dicta, Zigonata à Grecis dicta, solida & duriora absque medulla superpositi sunt. Cæte-  
rum quamquam Celsus <sup>d</sup> hac omnia nouerit, in eis etiam sectionem admittere visus est. ait enim: Neque  
id vitium vllum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, affert, sed ibi quoque nihil tutius fit,  
vrgente nimirum necessitate, & si accidentium magnitudo impellat, agenda quæ tunc temporis incisio est,  
iuxta villorum progressum in temporibus: scus verò in fronte, & supercilijs, vbi sectio corporis rectitu-  
dinem transuersim rugas requirit, nè ob cicatricem facies plurimum deturpetur. Idem supra caluarie  
futuras sectiones veniunt; nam pericranium illasum ibi perpetuò feruari debet, cum per futuras duræ  
meningæ, à qua ortum habet, proximè coniungatur, plurimæ quæ venæ per eas transitum habeant; nec  
vilo modo facta sectione, calli in futuris gigni debent, nè vaporum continuus exitus impediatur, ac in-  
terioris membranae motus deprauentur. atamen concessum in ipsis est, præsertim in coronali, caute-  
re vilgo dicta, fieri posse, vel candenti ferro, vel vrente quopiam medicamento, pro affectus ratio-  
ne. Quapropter nos, & accidentibus, & rationibus coacti saepe & in temporibus, & in futuris talich  
quidem euentu sectiones moliri sumus; cuius actionis testes sunt quàmplures discipuli nostri, qui nunc  
excellentes viri cœsuerunt, & curationibus nostris sapius interfuerunt. hortamur igitur Chirargos neces-  
sitate motos intrepidè ad opus deuenire; nam fatius est aliquid nonnulla cum fiducia, vel cum periculo  
facere, quam omni spe adempta, certò perire. Pateat itaque, ac demonstratum est, fracturæ caluarie cura-  
tionem manuum opera, ac ferreis instrumentis fieri debere, sed antequam ipsam aggrediamur, considera-  
tiones quàmplurimas necessariò requiruntur, quarum prima <sup>e</sup> temporis est operationi opportunum: secūda  
loci, siue illi accommodatus: tertia <sup>f</sup> quantitas ossis extrahendi: quarta <sup>g</sup> instrumen-  
torum forma, & numerus ad operis absolutionem: quinta <sup>h</sup> operandi modus: sexta <sup>i</sup> medica-  
minum administrandorum post operationem substantia, ac facultas ad rationalem vulneris curationē  
conueniens, ac infirmal ordo totius in ea seruandus, tum ad præcauenda accidentia, tum etiam ad ea amū-  
uenda, quæ supercrescunt. Sed vt ordine quodam procedamus, à tempore, veluti ab ea indicatione, quæ  
fatis vrget, initium capiamus.

# DE TEMPORE CONVENIENTI.



I C ET varietate quarundam antiquarum opinionum de temporis historia ad has actiones dubi-  
tari possit, cū de eo multi diuersimodè crediderent: nos tamen dubitationes dimittentēs, ex lon-  
ga praxi dicimus, operationū huiusmodi determinatū tempus non concedi, sed sumi debere ab  
indigentia ipsius operationis; quandoquidem curatiua vulnerum indicatio à morbi essentia, patientis ro-  
bore,

Tract. 2. De vuln.

D

bore,

a Hipp. lib. 1.  
b Coac. prænot. de  
lib. de Calu. cu-  
rat.  
c Gal. com. 4.  
d Hipp. de 1.  
e Gal. de 1.  
f Gal. de 1.  
g Gal. de 1.  
h Gal. de 1.  
i Gal. de 1.

bore, & symptomatum natura, & non à tempore sumi debet; non est enim, quòd tempus præfixum ad opus plurimum faciat, cum symptomata, aut ea, quæ affligunt, aut quæ afflictionis indicium præstant, temporis præbeant occasionem: porro ab Hippocrate dictum est, modò citius, modò tardius accidentia fracta calvaria superuenire: quapropter omnes vniuersimodè fatentur eà operationem tutiorem, vtiliorè, & magis laudabilè fore, quæ celeritè adimpletur, & idèò axioma hoc perpetuò durat, quantò citius, atò melius. Cum igitur ad operationè accedere cogimur, auctore Hippocrate, ea nèpè ante quartam administretur, idèq; magis afflicti temporibus, in quibus humores putredini parantur, & insultus naturæ contra morbum mouentur, cumq; tempelluè ad curationem accersiti sumus, & ante inflammationis initium, corpore euacuato, si expedit, os perforare oportet. nam plerunq; æstate post septimum diem febris corripit, hyeme verò ante decimumquartum. Igitur, inquit Cellus, non sunt audiendi, qui offe nudati diem tertium expectant, vt tunc excident. ex quo euenit, vt humor ad membranam descendat, exitum verò nò habeat, ac cam irritet, & graues inflammationes moueat. Matura itaq; operis absolutio requiritur, cum internam læsionem nouerimus, neque tertium transigamus diem, nempe hoc pacto determinata temporis designatio fieri posset. Cum verò accidentia vehementer intenduntur, dum humiditates ad putredinè tendunt, & naturæ insultus contra morbū apparet, nec de Lunæ aspectu (hoc est nouilunio, aut plenilunio) aut de criticis diebus, qui magis ad prognosticū, quam ad curationem, faciunt, cura habenda est; sed quāprimum negotiū molendum, vt sanguis nondum congelatus facilius exeat, ac nè errans cerebrū perturbet, vel premèdo grauet, vel æstuando inflāmet, minusq; extendendo dolorè moueat. hinc Auicenna dicebat: Quando transitur cranelū, & intrigidatur velamen, & apostemat, tunc opus est, vt festines ad incisionem; at si necessaria fuerit expectatio, ea sit vsq; ad duos dies, aut tres, sed vt plurimum oportet, vt curetur in secundo, præsertim si panniculus coarctatus, aut punctus fuerit: quoniam punctura facit ad apostemā, & spasmus; quare oportet, vt extrahatur illud os statim, & remoueantur accidentia. Ergo ab apparentibus symptomatibus, aut ab eorum timore operandi indicationes diligens Medicus sumere potest, & magis in corporibus cachochimis, aut malis succis repletis: verum vbi à principio facta non fuerint ea, quæ subterfugere non licet, reliquis diebus efficiamus: satius nanq; est, quoquo modo tardius occurrere remedijs, quam ijs omisis, sine spe mori ægrum sinere. ob id & tertio, & sexto, & decimoquarto, & reliquis diebus indifferenter operari possumus: quòd si per fracturam humiditates, & quicquid subter continetur, faciliè expurgentur, cerebrum à noxa tuctur; vel si materia exigua, & benigna fuerit, & ab innato calore regulari, & discuti possit, tunc demorando interdum nihil damni ahtere, eoque magis si in regione temperata, constitutione nò æstuant, reperiamur, ægrotantisq; habitus validus sit, nec copia malorum humorum scateat, si opportuna euacuationes præcesserint, vicus ratio congrua, nec accidens vllum apparcat, quibus conditionibus temporis assignationes obseruandæ sunt. Ab anni constitutione solbat Hippocrates operationem innuere, cum dicit, Ab initio autem cum vulnera- tum susceperis, hyeme quidem ante quartam decimam diem, omnino os auferre tentato; æstate verò ante septimam, priusquam symptomata mala oboriantur. vt ùm, quoniam hyeme quodam die vnde- cima accidentia superuenire solent, decima absque vlla operatione non est præterenda, quæ æstate accelerari debet; tunc enim humiditates facilius aliterātur, & corrumpuntur vehementius in humidiori tem- peratura. Abijciamus igitur Empiricorum sententias, operationes reprobantes, nec eos audiamus, qui symptomatum accessum morantur, priusquam operentur, quò sit vt errores, & damna ægri experiantur, corpora siquidem humida in loco calidiori non ventilato constituta faciliè putrescunt, ferius verò in frigidiori: & hinc efficitur, quòd accidentia diuersimodè, & varijs diebus apparent, & (vt retulit Paulus, & Auicenna) etiam transacto anno patientem inuaserunt: non datur igitur ad hoc tempus præfixum, sed omnia rationalis Medici iudicio dirigantur. Celsi præceptū obseruatis, prudentis hominè esse primum, qui seruati non potest, non attingere, nec subire speciem eius vt occisi, quem fors ipsius peremit, deinde, vbi grauis metus, sine certa tamen desperatione, indicare necessarijs periclitantis in difficili rem esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel secessisse videatur.

## DIGRESSIO.

a ¶ Paul. libr. 8.  
cap. 90. Autic. c.  
de fract. crn.



b ¶ Aristo. 3. de  
Anima. cap. 14.


T cum<sup>a</sup> caluariam quandoque frangi contingat, cure exteriori integra remanente, non est, cur ambigendum sit, nunquid huiusmodi fracturæ genus concedi possit, quamquam argumenta quamplurima adducuntur, videlicet quòd minus percussioibus cutis, & caro resistat, 60  
os, & idèò suapte natura promptior sit ad vulnera suscipienda offe ipso, agens<sup>b</sup> enim facilius agit in pa-  
tiente bene disposito: Cutis os sui substantiam mollem, laxamq; minori negotio soluitur, quam os,  
cum melius disposita sit: Insuper cum ossis tegumētum, ac tutela cutis à natura genita sit, offe facilius  
frangi, disrumpique potest, vt potè solidiori, ac duriori: præterea quemadmodum in fluxionibus à ca-  
pitate ad pectus pulmonè promptius affici contingat, molliorem nimirum, substantiamq; laxiorem cor-  
de ipso solidiori, ac densioris, & in capite veritabilis est, cutem, quam cranium, lædi posse: sed vni-  
cuique patere potest, quomodo ossis substantia, licet durior, actamen tanquam tenuis, frangatur, cū  
magis resistat, & corpori graui opponatur, impetu quodam exteriori adueniente, quam cutis compactæ  
quidem substantiæ, & cedenti adeo, vt non frangatur ad sensum, quamquam continui solutionem patir-  
tur,

10 tur, idque magis euenire solet in ossibus siccioribus, vel natura, vel ætate, vt in collisionibus, & contusionibus quotidiana comonstrat experientia; secus verò in pueris, \* qui ob ossium humidiorum, non solumque substantiam minus franguntur, cum facilius cedant, ac flectantur; propterea in casu ab alio præcipitante, vt plurimum noxam euadunt. patet etiam tale quid in phisicis de fulmine, à quo ex velocissimo descensu ab aere enlis in vagina absumitur, illa in vagina compertum est etiam in re medica febrem fixam, quam Hæcicam vocant, prima accessione solida membra inuasisse, & non spiritus, aut humores, cum tamen facilius sit humores, & spiritus affici, quam solida ipsa membra. Quod autem cum eis non rumpatur, falsum est, soluitur enim semper in contusionibus, quamquam innoretur afflicto, vt in apoplethibus contingit. Sequidem b in eis, & si occulte, necellario datur continui solutio. porro ex tribus morborum generibus vnum fit autem apoplema. sed his omniis, dicimus huiusmodi fracturæ genus celerem quidem, ac solertem manuum, instrumentorumque operam requirere: namque, dum occupatio in apoplethibus curatione sit, & ad tracturam non peruenit, fortasse accidit, vt os defubtus putrefiat, & accidunt, antequam fiat sanies, aut post ipsam, ægritudines male ex febribus, tremore, de structione rationis, & similibus. Ergo cum in mora periculum sequatur, quod decet quamprimum per petuo ante diem tertium adimpleatur, præsertim si cerebrum, aut eius meningæ punquantur, aut comprimantur, aut alio modo lædantur, nec obest, si Galenus temporis considerationem prætermiserit, cum satis illi fuerit ad Hippocratis mentem pluries dixisse: Quicquid agis, cetero, late, ac sine dolore agas: & hæc duo semper seruato, vt nisi iuueris, saltem non noceas. insuper si sextus methodi liber Galeni, in quo omnia explere promiserat, & quem imperfectum habemus, apud nos extaret, aut septimus à Rasi citatus, qui non reperitur, fortassis tempus ad hoc opus determinatum, cognosci posset.

\* Hipp. lib. de nat. hom. Gal. de Calo. cur. Antic. 4. tract. 2. cap. 4.

b Gal. lib. de iniqua comp. Aut. 1. cap. 5.

### DE LOCO, SIVE SITV OPERIBVS OPPORTVNO.

 Vm \* actiones vniuersæ ab agente dirigantur in finem, cuius gratia aliquid fit, & sedes cranij perforanda plurimum ad finis consecutionem conducit, iccirco opportuna, & accommodata eligi debet, vt facilius finis ipse assequi possit, præsertim dum ad tum, & ostium parum ad varium humiditatum sub caluaria contentarum expurgationem; tunc enim vel terebris, vel modiolis, vel cyclicis, vel simili alio instrumento emissarium in caluaria facimus, nempe ita commodo loco, vt facillime succus omnis extra venas exeat, sicque ad hanc finem in ima, ac decliuiori vulneris parte locus im primatur; porro finis infimus, & decliuus, ac huic expurgationi prouis interdum respectu rectitudinis corporis consideratur, quandoque ad fracturæ formam, vt vnum; verò ad rem nostram minime conducit, nisi per eam materiam rursus educi possent: sed ea utilis est, quæ ex decubitus patientis modo desumitur. in quit Princeps; Oportet, vt sit incisio ex loco conuenientiore, & conuenientior quidem est aggregatis ad oppositionem, per quam exsiliemus, quod virus currat ex eo melius, & ad facilitatem incisionis: ad eundem modum si membranae comprimantur, lacereatur, aut punquantur ab osse, aut ab alia re adeo, vt mala subsequantur symptomata, partem auferimus, quam arbitramur nocere, & operatio duntaxat respectu symptomatum abluuitur: quod fit, vt non magis hanc, quam illam partem auferamus, sed tantum eam, quam commodiorem, ac vtiliorem iudicamus, non contenti interdum vno tantum foramine, vt infra ostendimus, sed quam plurima, cum res ita expositulat, fieri debent; at in fractura rain genti, vel depreSSIONE, vel cum ossa in frustula diuersa diuisa sint, necesse est quandoque terebellocixiguo, modioloue sanum os fracto contiguum perforare, quo, eo imposito instrumento, quod Græcè ostiagran, Latine vctem, & vulgò eleuatorium nuncupatur, os depresso attolli possit. nam citra periculum imbecillia ossa, teste Hippocrate, non perforantur. quare nonnihil sani ossis interdum accipere licet: vbi verò inferiori osis tabellam, fracturam, osse superiori maiorem, pari percipimus, re quo scalpro, ac malleolo vti licet, vel forpicebus, vulgò mordenti, appellatis, vt paulatim partem superiorem per osificum vndique auferantur, quousque talis reddatur adicus, quod diploides, siue secundæ laminae commodè fractura extrahi possit, seu quicquid intus contineatur. A natura itidem partium operationis modum desumimus, cum d in ipsa caluaria varietatem in crassitie, duritie, & soliditate spectare oportet; occipitis enim ossa solida, & crassa, & firma sunt: contra verò scintipitis ossa tenuia, & debiliora, verticis autem inter hæc media sunt; lateralia, & circa tempora frangibilia, ob id eorum fracturæ valde periculose sunt, cum in lateribus non vno in loco etiam neruorum, horumque non leuis momentum quidam exitus exeat, quibus admoniti ab eximendis ossibus, quæ in lateribus capitis sunt, abstinere debemus, Galeno \* asserente; Nouimus aliquando sine pitis os fractum; quod autem os huic osi proptinus succedit, temporis os vocatur, in eo luculenta fractura longiusquæ pertinebat, quam ipse equidem de minimè contingens, sed tantum scintipitis os excidens hominem sanauit, quod autem capitis partium diuersitate considerasset Galenus, ait; In alia similiter se habent fracturae cogitamus os supremum dimittere, ac quod à lateribus erat, quod sanies deflueret, eximere; mox cum, & crassitudine eius, & duritiem æstimaßem, vtilius fore iudicaui, supremum os potius eximere, quam ob defluxus sollicitudinem, cerebrum valenti concutere; cogitaui præterea accidere posse, vt si à latere magnum fieret in ossibus foramen, promineret fortassis hac parte cerebrum, quapropter inueniente Hippocrate, aduertendum est, in durioribus ossibus opus terebris, ac modiolis absoluti debere; nam sic caput minime co-

c Arist. a. phy. com. 79.

d Hipp. lib. de Calo. vena. Gal. lib. de ossib. 1. & 2. de vlt. par.

e Gal. meth. ca. 16.



cutitur. In tenuioribus autem, & imbecillioribus cyclis, aut simili alio instrumento, siquidem terere  
 in his periculo non vacat, oportet autē, si vulnus in sutura fuerit, & telum ossi inleiderit, diligenter ani-  
 madvertere, ut inuestigemus, qua noxa os teneatur, nam secare ipsas suturas non expedit, sed ab illis  
 recedere, atque ubi sectio necessaria sit, proximū os secare convenit, dum ergo operamur, fugiendū fu-  
 turū sunt, nam per eas pericranion durū meningē alligatur, & ipsarū vulnera lethalia iudicantur; quod si-  
 ut perforationes haudquaquā in ipsis conveniant, verū in virgine causa circa ipsas; quinimo vtrunq;  
 latus multoties perforare cogimur, suturas cauentes, cū materiā vndiq; sub calvaria adesse, arbitramur :  
 At si accidentium magnitudo inualeat, in ingēti depreessione, aut magna fractura etiam super suturas  
 manum admovebimus, præsertim cum indicia adfuerint propria, duram meningē à craneo abscedi,  
 vel percussione robore, vel à copia humoris super eam contenti adhuc suturarum varietatem conside-  
 rare oportet; in capitibus enim quibusdam sagittalis ad supercilia usque protenditur, in aliquibus lamb-  
 dois æthior efficitur, interdum omnes adeo conveniunt, ut vix discerni possint, & menē, ac oculum  
 fallant. nam & Hippocrates à suturarum angustia se deceptum esse memorie prodidit, interdum adeo  
 hiant, ut vapores, & succi tenues intra cranium facili per halicum dissi-pentur, in quibusdam pars ante-  
 rior eminet, in alijs deprimatur, ut potē auctoritate Hippocratis, hominum capita nihil inter se simile  
 habent, neque suturæ capies in omnibus eodem loco consistunt. porro capita nautarum, militum,  
 rusticorum, sub dio vitam degentium, ac alimentis crassioribus nutrita, dum consistunt, duriora, ac soli-  
 diora evadunt; focus verò infantium, mulierum, sub vmbra, otio, & quiete degentium, ac victu molli,  
 & concocto facili valescentium tenuiora, & molliora existunt: magna cautio circa occiput opus est, ne  
 cervicis penitus pars afficiatur, ac cerebellum, spinæque origo motus à voluntatis imperio produntis  
 noxam subeat: quinimo aliqui opinantur occipitij perforationes nunquam sanari. Cum ergo latra-  
 les partes perforamus, summa cura habenda est, ne cerebrum prominat; orificium itaque exiguum sit,  
 deligatura opportuna, & decubitus secundum exigentiam.

## DE OSSIS EXTRAHENDI QUANTITATE.

**OSTOYAM** b sedes iam constituta, ac signata fuerit, ossis quantitas extrahenda se offert, quæ  
 ea quantitate auferenda est, quantum os fractum, & seicunctū expositum, quod si cuti inhæreat,  
 ab ipsa diuellatur, cum in caluaria, ut in alijs ossibus, callus nunquam expectetur: his Gale-  
 nus c astipulator dicens: Quantum verò excidere conveniat cuti, quod affectum est, deinceps expo-  
 nam; quod vehemens est constructum, id totum est auferendum; at si fragmenta quædam longius ex-  
 currant, ut interdum accidere cernitur, hæc ad finem persequi non expedit; illud persuasum habebitis, 40  
 minimè futurum, ut ex eo noxa vlla sequatur, modò reliqua omnia ritè sint parata. Nos verò non se-  
 mel, aut bis, sed planè persæpe sic facientes, voti compotes fuimus. Hanc Galeni sententiam ad vngū  
 imitatus est Paulus, & Auenenna. e consultò itaque ossa fracta educemus, ut noxam, potissimum à  
 membrana, & cerebro, auferamus; scilicet quoniam caluaria poro solido, & crasso non eger, cum tenuis, ac  
 levis sit, & à solido poro membrana subcings premeretur; quæ propter ossa educere oportet, ut in de  
 substantia illa cartilaginea, quæ ossis munere fungatur, gigni possit, siquidem callus, aut porus sarcois,  
 aut alrobor non generatur, f nisi in osse, in quo medulla reperitur; nam medulla ossis alimentum est,  
 & ut inquit Celsus, callus ossis cicatrix est. Tertiò s cum caluarie ossa nec motui insigni, nec oneri ali-  
 cui subiiciantur, sed ut regatur duntaxat, & turetur cerebrum, veluti galea, extructa sunt, fortissimi ac  
 solidissima concretionē minimè egent. in scissuris autem penitioribus, ac reliquis fissuris eò deducen-  
 da res est, nempe cyclis, & scalpris, ut tantum ossis auferatur, quod humiditates, si quæ fuerint retē-  
 tæ, per facilem aditum educi possint, & membranam commodè abstergere valeamus, nec tunc ingēs  
 foramen requiritur, veluti in casus depreessionibus, dum ipsa membrana premitur, vel cum secunda la-  
 mina superioris maiorem experitur fracturam: quod si os compressum citrà disunctionem appareat,  
 ad vitanda symptomatica foramen exiguum in imo depreessionis paramus, quo immisso, elevatorio os at  
 tolli potest: ut ergo iuxta ossis extrahendi quantitatem orificium magnum, & paruum, perfecta nimi-  
 rum materię contentæ copia, membranæ noxæ, ac fracturæ sedes; siquidem in partibus lateralibus, imisq;  
 sedibus cerebri providentia verenda est. nam pro comperto habetur, cutis amplas sectiones, si  
 cū ossis notabilis quantitas extractionem, ac operationis moram cauere oportere. hæc  
 enim omnia membrum imbecille reddunt, & eius potentiam regitum destrunt. 60

At cum hic particulatim de his actionibus sermo à nobis propolitus non sit, hæc  
 dicta sufficiant. Sit ergo tempus, locus, situs, ossis quantitas, oportu-  
 na ac concinna instrumenta, necnon approbata medicamenta  
 iudicio, & arbitrio solentis, ac eruditi Chirurgi dirigenda,  
 qui suarū indicationum fundamenta à fracturæ essen-  
 tia, à patientis robore, à sede affectæ, & sympto-  
 matum fortitudine sumere  
 tenetur.

De Terebris, modiolis, facotis, scalpris, cyclificis, meningophylacibus, ac alijs instrumentis ad cranij perforationes opportunis. Cap. XII.



**A**PTET fracturæ inter omnes corporis affectus, præsertim in soluta continuitate, instrumentorum varium vsum maximè exposcunt; ceterò chirurgum solertem decet eorum copia, ac formæ varietate minimè carere; siquidem \* indecens est, in occasionibus ea alibi perquirere, ob id de eis in præsentia aliqua dicamus, varias eorum formas delineantes, tum ex antiquorum sententia, tum etiam ad recentiorum opinionem, ut, qualis nam probabilior, ac utilior esse videatur, pateat, & hæc vel illam accipere fas sit. Ne miremini igitur, si instrumentorum tot varias formas hæc designauerimus, apta quidem, ut decet, ad omnes caluarie perforationes: porrò tertia illa medicinæ pars, quæ chirurgia nominatur, in duas partes diducta est, vna carnis vicia corrigi, altera ossium fracturas coniungere, aut luxata ossa in sedem propriam reponi. igitur quod ex vi nominis, ac operationis colligitur, solum affectus illi ad eam pertinere videntur, qui manus operam requirunt, & ea præstidia, quæ corporibus sic languentibus adhibentur, non nisi multorum instrumentorum auxilio celebrantur, licet ceterò ea, quæ fracturæ craneo opportunè opitulatur, in officina ordinatè delineare decreuimus, ut ea operando in commodum vsum parata habeamus, quæ si ea, quæ egermus, diligentè delineata non erunt, eorum tamen utilitas, & operatio facillimè intelligi poterit. Prisci nempe illi medici, qui chirurgiæ operam nauarunt, in caluarie perforatione quibusdam instrumentis utebantur, dum durioris ossis amplum spatium detectum adesset. Terebram, ac Terebellam sic vocitantes. excidit \* enim os duobus modis: si paruum est, quod læsum est, modiolio, quam choenitiam Græci vocant; si spatiosum, terebris. Terebrorum autem duo sunt genera; alterum simile ei, quo fabri vtuntur, præsertim ad vasa terrea per foranda angustis quamplurimis foraminibus; idem in caluarie ossibus sic illi operabantur instrumentis, nempe formas imitantibus, in officina suo loco positas.

Hoc terebro foramen fit in ipso sine viciati ossis, atque integri; deinde alterum non ita longè, tertiumque, donec totus is locus, qui excidendus est, his cauis cinctus sit, atque ibi quoque, quatenus terebra agēda sit, scobs significat; tunc excisioris scalper ab altero foramine ad alterum malleolo adactus id, quod inter vtumque medium est, excidit, ac sic ambitus similis ei fit, qui in angustiore orbem modiolio imprimitur. Terebræ proprium est perforare, cum acutum mucronem habeat; aptatur propriè, cum ossa plurimum firma sunt, sed memendum est, nè, dum agitur mucrone terebri membranam violenter, quare imperauit Hippocrates, nè operando nimis altè descendat. Adhuc eius vsum alienus est, vbi ossa vehementer sunt contracta, aut vbi per se imbecilla faciunt: At quia, dum terebrum hoc circumagitur, periculum imminet, nè membrana lardantur, ideo nonnulli (inquit Galenus) ut quò minus vique aberrarent, & hoc periculi genus euitarent, eiusmodi terebras excogitarunt, quæ mergi non possunt, & ob id à Græcis **ΑΒΑΤΥΣΤΑ** dicuntur, circumcurrit enim parum supra acutam terebræ culpide circulos quidam parum extans: expedit sanè complures id genus paratas habere, quæ omni caluarie crafitudini adaptari possint: nam crafiori ea conueniunt, quæ inter extantem circumulum, & mucronem longius spatium habent, tenuiori contra quæ breuius: atque etiam huc pertinere videntur terebræ secundo loco à Celfo descriptæ capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, dein subito latius fit, atque iterum ab altero principio paulò minus, quam æqualiter sursum procedit; prohibet enim capitulum, quod super mucronem subito latescit, nè terebra altius descendat. Terebræ istæ habena ducuntur, cum in transversarium inferuntur, quod medium perforatum est, ita ut facile sursum, ac deorsum per ipsam feratur, dum habena circum ipsam obuoluitur, & circumagitur, ac impetu per le in contrariam partem conuertitur: hoc terebrum credimus illud esse, quod quamplurimi medici tum veteres, tum nostrates vnico ore instrumentum securitatis appellant, ab aliquibus etiam terebrum non profundans dicitur; eo tamen nos uti non ausi sumus, cum securiora, ac magis idonea parata perpetuò habeamus; sed ut ab aperturæ vera forma cerni possit, imprimi curauimus in officina.

Quam plurima orificia angusta fracturæ ambientia, non tñ à periculo tuta, longissimo tempore, magis agitationibus, ac laboribus ab his terebris imprimebantur, quæ habena triplici modo circumducuntur, vno nempe per transversarium, & duplici habena, ut dictū est; altero per simplicem mediæ terebræ arcū alligatam, ac sæpius circa ipsam obuolutam; tertio cum exiguis arcus admoventur licet, ut chorda se mel circa terebram voluatur: quæ autem terebra per simplicem habenam, aut arcum circumagitur, pilâ mobilis in summo continet, quæ manu sinistra firmiter conseruatur. terebræ verò acuties in osse sano, vbi desideratur orificium, situatur, ac dextera habenam ex tenui corio, aut exigua fune vi quadam trahendo, os terebræ magnitudine perforatur duobus nempe, aut tribus, vel pluribus, si opus fuerit, orificijs; quamquæ autem ab Hippocrate, Celfo, & Galeno de acutis terebris mentio facta sit, præsertim in osse puerili, cum os terebra in circuitu perforatur, iubeantque ad motis scalpris excidi; tamen, quia periculo non vacante, hæcæ temporibus reprobantur. Sed, ut eorum potentia dignoscatur, videamus imagines in officina

NAVY AP, & qui castra sequuntur, instrumentorum penaria, ossa cranij quibuscum suis cerebris perforare imaginati sunt, quae vna tantum manu aduoluuntur in summo, aut pilam, aut transeverfarium quoddam continet, in imo valde acutae, aut torculatae, aut triangulae sunt, sed quia facillime meningas attingere possent, reprobantur; possent fortassis à viro perito commodè uti, quare earum formas delineare decreuimus, ut in officina suo loco.

### TEREBRA, QVAE VNA TANTVM MANV AVOLVVNTVR.

ARABIS ille magnus chirurgus Albucasis\* in caluarie perforatione quoddam terebrum commendat, quod digitis tantum voluitur, & eam agit operationem, quam superius descripta terebra facere solita sunt, & quia folis digitis circumferuntur, tenusa admodum clat opinamur. Ab Auienna<sup>b</sup> patet etiam quod terebra commemorantur, quae magnarum acutum triangulatarum effigiem praefereunt, ac eorum<sup>ap</sup> praecipue, quae ad subfella, aut scamna restauranda accommodantur, at quia periculo non vacante, cum ad membranas immediate descendant, non admittuntur, formam videbis in officina.

ACUTA terebra quamplures angustas perforationes, cranij fracturas ambientes, radioli crassitudine a quidistantes, formare solent: quod verò inter foramina residet aut residet, aut curvis scalpris malleolo plibeco adactus recindere expedit, quod ad rem esse nequaquam videtur, nam scalpri acies membranas violare possent: quare, ut tutius opus perficiatur, scalprum quidam aut ceteris timidior res, aut fortasse rationes adiuuere, quo nec quia minori cum periculo, nec quia celerius perficiatur, forandi modum inueniri possit, praefertim in vehemensissimis fracturis, quas medici Graeci engistolmata, & camaromata vocant, nam praeter alia, membrana ipsa ab ossibus, quae vehementer sunt afflicta, celerrimè recedit, adeo ut nullus sit metus, eam, quae iam secundum est, terigisse: ergo vnam semel nudauerimus partem, ac scalprum, qui in cuspide praefixam habet oculum, leuè quae lenticulae speciem, aciem verò per longitudinem erectam submiserimus, ubi latam partem lenticulae supra membranam statuerimus, iterum malleolo, ac sic caluariam diuidemus, eueniunt enim ita agentibus, quae requirimus, omnia; nam membrana, ne si domitans quidem quis agat, lata tantum lenticulae parte occurrere, vulnerari potest: tale quidem scalpri genus, quod in imo lenticulae speciem habet, atque hanc hebetem, in longitudinem verò aciem acutae, apud priores omnes commendatur, quo adhuc in ossis cranij valde comminuto, aut arte pluribus in locis terebrato, sed non ubique separato, nostrates chirurgi vtuntur, nam lenticula, quae membranà ab omni noxa protegit, malleolo eget, nam excidendo praerè debet. quam excidendi rationem Galenus praeter ceteras approbat, ut quae celerrimè effectum praestat, idque sine vlla membranae cerebri noxa: facit interdum post ceteram operationem ad inquiras, sive satagias diploids remouendas, ac ossis parietes leniendas, aut eius partes non ex toto dimotas separandas. Phacotum Graeci vocant, Latini lenticulam scalpri, & communiter lenticulare, lenticium, & lenticula vocatur, eius cauda ad vtrumque foramen diuersimodo formatur, ut diuiso, aut depresso osse, subleuari possit, effigies in officina cernatur.

PRÆSTANTISSIMI Chirurgi, ut cerebri membranam ab angulo scalpri, omnino noxa tuerentur, instrumentum quoddam eius custodem inuenire, quod operando sub caluarie immititur. Formatur hoc modo, inquit Celsus; a Lamina aenea, aut argentea, & tirma, pauli resima ab exteriori parte, leuissimè demittitur sic, ut exterior pars eius cerebri propior sit: subinde autem ei subijcitur, quod scalpro dila- tiendum est, ac si expediat, eius angulum vltro transire non patitur, eoque & audacias, & tutius scalprum malleolo subinde medicus terit, donec excisum vndique os eadè lamina leuatur, tollitur sine vlla noxa cerebri, potest. Alteram adhuc hoc instrumentum praestat vtilitatem, ubi os totum excisum est, circumradenda, leuandaque sunt ora, & si quid scobis membranae infedit, colligendum; ubi superiori parte sublatà, inferior relicta est, non ora tantum, sed os quoque totum lauandum est, ut sine noxa posita cutis increscat, quae aspero osse innascens, protinus non sanitate afferret, sed nouos dolores commoueret: quod etiam inquit Auienna,<sup>d</sup> dicens, Cum perlo deris os, oportet, ut aquas asperiatum eius, qui sit ex incisione, de concanone, aut cum nouacula, aut cum aliquo incisoriolum, quod similitur aciei cuspis, postquam posueris instrumentum, quod cooperit liphac, & seruat ipsum, & si remanserit aliquid ex ossibus paruis, aut frustis, tunc oportet ebit, ut accipiantur cum facilitate, donec curatur vulnus, cum vnguentis. Probant hoc instrumentum antiqui, quod tamen non nisi à perito chirurgo uti licet, si quidem adsum est à Galeno; f. Quemadmodum inter os perforandum, cum quis membranam neghigenter, ac vltra quam res expolienda, meningophylace, id est membrana custode, premendo violauerit, sopor accidere solet, ita ubi os calvariae vehementer attritum ipsius ventriculos comprimat, maximeque medium, sopor superuenire potest, à Graecis meningophylax, à Latinis spatomelis, & cōmuniter membranae cultos, vocatur, cuius ima go effe creditur ea, quam in officina suo loco effigies curauimus.

TEREBRAE proprium est perforare, cum acutum mucronem habeant, & angustos canales facere, & ob id scalpri, & malleoli opus requiritur: foramen primum in fine vixit ossis, atque integri sit; deinde alterum non ita longè a tertiumque, & quartum, donec (ut supra diximus) totus locus his cauis cinctus sit, tunc excisiorum scalper, aut lenticularis, ab altero foramine ad alterum malleolo plibeco adactus, id, quod inter vtrunque medium est, excidit, quod opus duae imagines aperte demonstrant in officina suo loco posita.

10 **EXPOSITIS**, quæ ad acuta terebra pertinebant, ad alata, & caudata trāſſare tempus eſt, quibus oſſa radi, & excuari poſſunt; hæc aſiem hincinde habent acutam, & formatam ſemioſalem; & in ſuo vertibulo, aut manubriolo poſita, & pluries conuerſa oſ excidunt, nec ad membranas poſſunt deſcendere, nā quæ prominent alæ, cæteras partes penetrare faciliſſimè non ſunt. Huius generis quæ plurima habenda ſunt laciore & anguſtiora. priuſ quidem laciſ ad mouendum eſt, deinde anguſtius, ſic, vt, cum dimidiū exciſum eſt, maximè anguſti adhibeatur in cariſiſ oſibus, & uagnis terebribus iſtis vti, non inconuenit; ſecus verò in rimis, aut parvis ſciſſuris, tardè enim, ac magno ſtrepitu operatur. Hæc ſub diuerſis imaginibus formantur, nempe duarum, aut quatuor, aut plurium alarum, vt in officina ſuo loco.

**ALTERA** terebrorum ſpecies ſtriata ſine alis, ſed alpera, & limæ formam imitans, inuenta eſt, cuius opus in ſquamis oſium, & ſciſſuris approbatur, pariter in corruptis, & terebribus, fed poſſimum ad ſquillas, ſiue ſatagias delendas, ac eorum omnes aſperitates leniendas, vt inde ſuper ea caro oriri poſſit, tardè, ſed tūto operatur. & ſi quis de induſtria ad meningas deuenire voluerit, longiſſimo eget tempore: nam ſtatem ſeobinis, ſiue aſperitatibus repletur; hæc de re nullibi vſitatur. eſſet fortaiſis in perita chirurgi manu opportunum inſtrumentum, cuius formæ ſunt in officina ſuo loco compietæ.

**ALIAM** terebri formam ad oſſa valdè dura perforanda aliqui imaginati ſunt, & terebriſ imaginatum vocarunt, quod in craneo ſine ſciſſuris timorose operatur; ſub duplici forma eſtingitur, vna aculeum caudatam, acutum, ex duabus æquidistantibus, ac incidentibus alis munimū habet, quod Neptuni tridentis eſſigiem imitatur: altera aculeum, acutum terebri, vna tantum ala ſecame: terebellu, quo vaſa vinaria forantur, aſſimilatur: porò quia huiusmodi inſtrumenta operando aut caput commouent, quod quietem potius expoſcit, aut quia effectum celeriter non præſtant, atque non ſine vilo timore quod Hippocratis, & Galeni præceptis repugnat & longo temporis ſpatio indiget, & capitis oſſa quam celerrimè excidenda ſunt, nec cerebrum aut commoueatur, aut frigore aſſiciatur, aut quia ad meningas faciliſſimè delabuntur, non videntur multum ad rem eſſe. Nulla ergo de iſtis conſideratio habeatur, ſed qualia ſint terebra imaginata, per eſſigies in officina ſuo loco poſitas faciliè apprehendi poſſeſt.

**HACTENUS** de caudatis terebris multa diſimus, quæ profeſſo per ſe niſi alterius inſtrimenti auxilio nullius valoris, ac vtilitatis iudicantur. reſtat igitur, vt qua ratione perpetuò vique ad operis finem circumagatur, explicemus. celebratur opus hoc vertibulo, aut manubrioli munere, ob id eorum fabricam deſcribere, & imagines ad ſenſum reddere licet. Inſtrumentum ferreum, aut argenteum eſt, ima parte quadratum, vt cauum ſimile, aut torculatum habeat, cal terebri cauda inferitur, in medio ſectitur, vbi ſiſtula quædam mobilis auoluatur: in ſummo verò pila mobilis annexa eſt, terebro oſſi aſſixo, altera manu pila conuertitur, ſiſtula altera circumagitur; ſic enim terebri acuties oſ perforatur, aut modiolo in orbem præciditur. Vertibulorum formæ ſunt, quæ in officina ſuo loco eſtinguntur.

**LONGISSIMO** experimento noſimus, quod vertibulum ſuperius delineatum, dum auoluitur, & altera manu pila, quæ in ſummo eſt, cōtinetur, altera ſiſtula circumagitur, vt hoc pacto oſ, circa quod ferramentum agitur, perforetur, ac in orbem præcidatur, opus laborioſum, & tardum verè eſt, nec ab omni noxa tutum, cum alio operetur: accirco alterum diſſimile, fed eiſdem operationis, fabricauimus argenteum, aut æneum, aut ligneum, ouali forma, ad mediam longitudinem perforatum, per quod medium tranſit axis ferreus, qui in ſummo reflexus, in grum dextera vertitur, in imo adest cauus, vbi terebri cauda imponitur; ouatum verò in ſiniſtra receptum, ſuper caput inſeritur firmiter accommodatur, ac terebro in cauo aſſixo, & craneo adapto, dum auoluitur inſtrumentum, oſ circò, tūto, ac quietè perforatur; manubriolum ouale vocatur, cuius formam in officina poſitam intueri licet.

**SUPERIUS** varia delineauimus terebra, ac, qua ratione auolueretur, explicauimus. reſtat modò, vt de modiolo, nō ſecus ferræ diſſimilibus, ſermo habeatur. Modiolo\* ferramentum concauum teres eſt, iſtis oris ſerratum, per cuius medium clauſus ipſe quoque interiori orbe cinctus demittitur, vt, co inſiſtente, modioloſ delabi non poſſit; at vbi iam iter modiolo preſſum eſt, medius clauſus educitur, & ille per ſe agitur, donec opus perfectum eſt. Hoc inſtrumentum ferræ teres Hippocratis\* eſt, quæ, dum caluarie oſ ſecaret, vtebatur; nam operando eius circuitum conſiderari iuſſit; circulus enim non niſi a terebri inſtrumento produciatur. A Galeno\* etiam commendatur, qui poſt Abapitiſtæ deſcriptionem inquit: Antiquiores non nulli, aut alijs timidoſiores, aut tutiores, iſs, quas chynicidas vocant, ſunt vſi. timidoſiores nempe in quibſdam fracturis operando, in alijs verò tutiores: ſiquidem Paulus, \* poſtquam multas operationes explicauerit, inquit: At quæ adminiſtratio ferris, & modiolo, quem chernionem, ſiue chynicidam Græci vocant, peragitur, a recentioribus, ceu noxia, improba eſt ſed adminiſtrationem, quam pariter in rhogme expoſuiſmus, probant. idem etiam modus, oſſium excidendorum etiam in reliquis caluarie fracturis conuenit: antiquiſſimū quippè terebrum eſt, ac multum his temporibus vſui ſeruatum. nam ſi circumſpectè oſſi adhibeatur, ac ea ſecturur, quæ Hippocrates ſeruari iuſſit, circò, tūto, & ſine rumore operatur, a Græcis chynicida, a Latinis modioloſ, ab Auicenna corrupta voce antichades, cuius eſſigies variè fingitur, nā aliqui ſub ſimplici cannuſi ſerrati forma, alij alijs multis circumducuntur, multi ſub limæ forma ſunt, multi inter ambas manus auoluerunt, quæ plurimū vna tantum ducuntur. hi caudati ſunt, vt in vertibulo cauo imponi poſſint, illi proprio manubrio inſeruntur, vt in ſiguris in officina poſitis videre expedit.

a. q. Celſib. 2. cap. 1.

b. q. Lib. de Cal. curat. lib. de hoc in bon.

c. q. 6. meth. c. 6.

d. q. Lib. de ca. po.

RECENTIORES medici ferè per totam Europam, nouam modioli formam inuenere; instrumentum teres est, non à chynida dissimile, ferratum, ex ferro Indo, duabus alis secantibus ad longitudinem tendentibus manitum, quæ modiolum repètinè mergi non sinunt, ac ossis terebrati perpetuo operando, circumferentias erodunt, & oritium latius reddunt, vt gradatim, quanta sit ferræ penetratio, apertè dignoscatur. Tardè, nec sine aliquo rumore, sed tutò operantur, ob id & nostrates chirurgi talem approbant modiolum, qui in officina locatus est.

PARITER qui hac ætate chirurgiam exercere, vt breuior, tutior, ac latior sit istius modioli operatio, quatuor alis eum adiungit, & verè instrumentum satis accommodatum est: cuius forma dignoscitur in officina.

ALTER modiolus vique in suo genere tutissimus reperitur, quàm plurimis alis circumsolutus, qui, eo quia Mespili fructus formam imitatur, mespilatus modiolus communiter vocitatur. eius forma in officina conspici potest.

ET si prædicti modioli vbique ferè in continuo vsu seruentur; attamen aliqua incommoda afferre videntur, vnde nomen securitatis omnino non merentur, quemadmodum multis eos securitatis instrumenta appellare placuit; siquidem instrumenta securitatis, quæ eo, quia mergi non possunt, Abaptista vocantur, circulo, & non alis munitionetur; ob id circulos modiolos fabricauimus, quorum circuli exstantes, ac gradatim circumcurrentes parum à cuspide acuta, siue tertii ferræ distant, sic, vt crassitudini ossis cranij adaptari possint, & modulum violentia quadam descendere non sinunt, qui paulatim caluariam perforans membranas violare nequit. Porro instrumentum hoc verè sanctum, tutum, incomparabile, & abaptistum vocari meretur. Nos instrumentum securum vocamus; nam si quis dormitans eo vteretur, nullum incommodum afferre posset: similia in forma, & cannuli latitudine esse debet, diuersa tamen in circuli distantia à ferrâ; capita enim hominum multum inter se differunt; eorum imagines subiecinus in officina.

FORMANTUR etiam modioli aliqui, qui loco circuli nonnullas descendentes eminentias continent, quæ ad ferræ immum non perueniunt, sed ab ea gradatim distant, eo ferè officio funguntur, quod ab Abaptista expectare decet; quare aliqui modiolos abaptistos vocarunt. eorû delineationes in officina videntur.

ALIQVI modiolorum numerum, & varietatem euitantes, modiolum cannulatum, teres, ferratum sine ala, aut circulo, sed plurimis in locis gradatim perforatum struere; & ne mergi possit, transversarium quoddam parû extans in eius cauis ordinatè locarunt, quod ad cranij crassitiem ascendendo permutari possit; sic enim vno solo modiolò omnibus crancis accommodato ossa perforant. Ingenium profectò instrumentum est, sed incommodum, maximam caluariæ detectionem requirens, ac longo tempore in transversarii mutatione indigens.

CHIRURGI diligentes in manuum operationibus, vt tutò caluariam perforare possint, novos quosdam inuenere modiolos, cannulatos, ferratos, & exterius torcularos, quibus ab extra alter brevis succedit cannulus, interius oppositè pariter torcularus, qui paulatim ascendendo, ne vi ferræ ad meningas perueniat, probatè; modiolus torcular à cuspide ferræ parumper distat, sic, vt ferræ perforando, quietè descendere valeat, vt per figuras in officina positas suo loco demonstratur.

INTER modiolos cannulatos, ac ferræ munitos, quidam non sine artificio ex duobus cannulis contextus reponitur; quorum primus simplex est, teres, ferratus, senuiuvacuus, in imo longitudinis medietatis digiti, à quo in summo duæ alæ resultant, tenues, & æquales, in quarum fere medietate duo parua transversaria exterius eminent; modiolus verò quoddam orificiè impressum continet, ubi Vertibuli torculara cuspis inferitur; alter teres, sed latior est, in quo primus ingreditur, sed breuior, & sine ferrâ, à quo pariter alæ duæ oriuntur, interius cauis multis repleta, in quibus alarû primarum parua illa transversaria ingredi possunt; sic enim serratus modiolus in opere, descendendo, tutò omnè caluariæ transitiem penetrat: auoluitur cuiusdam vertibuli munere, cuius effigiem vnâ cum binis illis cannulis delineauimus in officina.

ATQVE nos modioli quædam forma reperitur, magno quidem magisterio constructa; manubriolû est superioribus multum simile, cui tres modiolorum formæ cannulata, teretes, ac serratæ ad libitum inferi possunt: variant nempe circuli latitudine. nam alter altero latior formatur. continet manubrium in ima eius parte ramos septem, medius verò clauus est, his, qui sequuntur, angustior modiolus locatur, in alijs magis latus, in amplioribus latissimus applicatur; videamus, quælo, instrumenti artificii, pulchritudinem, ac utilitatem. Modiolus ramificatus vocitatur.

Næ præter hos alij desunt modiolus ad caluariæ perforationem opportuni, veluti subsequens est in manubriolo ligneo, recto, cauitatibus quàm plurimis ordinatè insertis refferto, vtrobique duæ serræ teretes construntur, cui exterius est cannulus quidam, à quo duæ æquales auriculæ ortæ ad medij digiti longitudinem ingreditur; quæ suis transversarijs cannulum sustentando, modiolum profundari non permittunt; porro à media ferè auricularum regione duo parua transversaria eminent, quæ manubrioli cauitates ingrediendo, ac cannulum firmiter tenendo, modiolum violenter mergi prohibent. cannulus verò ad operantis libitum & extollitur, & deprimitur.

- 10 **N**unc duo instrumenta, quæ sparsim per Chirurgorum officinas videri non solent, delineabimus, quibus in Caluarie curatione vti soliti sumus. Vertibulū vnū est, nō diuersum ab alijs, in medio reflexū, in imo cauum, vt terebri, aut modioli quadratæ caudæ locentur, in summo mobili pila munitum: Alterum torcularum, cui duo pariter modiolis interius torculari inferi possunt, quorum vnus ferrū ad cō breuiem continet, vt vix eius ferraturæ vestigium dignoscatur, & primus in operatione est; nam aculeū con-  
tinet, & masculus vocatur; alter ferram habet alijs non dissimilem, & femina nuncupatur. Eorum ima-  
gines per figuras apprehenduntur, quæ sunt in officina suo loco posite.

- R**estat modo, vt de modiolis planis aliqua dicamus; Astula lignea est, longitudinis palmi, quæ hincinde modiolum tertetem, planum, concauum, ac ferratum continet: aculeus in vno apparer, va-  
cuus alter est, cum inter duas manus voluitur, ac in orbem ducitur: ossa caluarie mirifice perforat, à  
10 **G**racis chynicida, à Latinis modiolus planus vocatur.

**Q**uamquam modioli plani citò operentur: non tamen ab omni noxa liberi sunt, cum facili-  
tè mergi possint, ob id aliqui illum magis approbarunt, qui à mespilato superius descripto non va-  
riat, & eius effigiem præferret. plurimis alis circumdatur, quæ operando orificium latius reddunt. Mo-  
diolus mespilatus est.

**D**ecrevimus adhuc aliquos modiolos delineare, qui apud nautas reperiuntur, & vna tantum  
manu auoluntur; attamen, quia tardò operantur, à nonnullis reprobantur. nos autem eos summope-  
rè laudamus.

- H**actenus de terebris, ac modiolis multa explicauimus, qui caluaria perforata, os in orbem tere-  
bratum in propriam sedem relinquunt: at quoniam tunc eo vti instrumento opus est, quod eleuatoriū  
30 dicitur, quod absque aliquo timore non iudicatur; siquidem os aliquod eleuando in vna parte, id de  
primi in opposita potest: vnde, ne membrana pungatur, aut deprimat, quia periculi imminet, can-  
nulatam quandam tenculam fabricauimus, æqualiter secundum eius longitudinem bipartitam, modio-  
lo aliquantisper angustiore, eiusdem formæ, absque ferra, vt terebratum diploidem amplectatur, ac  
tutò dirimat, nullam interius squarilam, aut satagiam relinquens, vt autem modiolorum numerum se-  
quatur, ad eorum imaginem eius forma fabricari debet.

**N**on desunt quamplurimæ aliæ modiolorum formæ, ad varias utilitates necessariæ, veluti ea, quæ  
ferè oualis est, teres, concaua, ferrata, sed extrinsecus limata, & aspera, quæ perpetuò operando ob eius  
formam ampliando procedit, vnde nec mergi, nec membranas violare potest; dum, aut vna, aut amba-  
bus manibus auoluitur, omnes ossis terebrati satagias, ac asperitates delet, & adæquat: formatur  
40 **M**odiolus asper modo, in officina suo loco explicito.

**V**t pariter æquentur ossis terebrati asperitates, ac circuli parietes lenes fiant, quædam parantur in-  
strumenta sine cannulo, & ferra, sed plana, oualia, & aspera; quorum infima pars lentis formæ præferret,  
quæ non multum differt à modioli latitudine, & membranam ab omni noxa tuctur; & quia eorū ope-  
ratio est æquare, Aequatores vocantur.

**I**n quodam antiquo Albucasis Codice vidisse recordamur nonnulla instrumenta ad cranij ossa de-  
pressa eleuanda, quæ, eò quia magno sunt artificio constructa, delineare statuiamus: esset quippe longis-  
simus sermo, si quis singulatim eorum fabricæ rationem narrare decreuisset; quare sat sit, vt eorum ima-  
gines in officina delineatas inspiciamus, ac de eorum operatione iudicium faciamus.

- D**e terebris, modiolis, & similibus instrumentis hucusque enarrauimus in caluarie perforatione,  
10 leui, quieta, ac opportuna: nunc restat, vt nonnulla de his, quæ valenter operantur, delineemus, de quibus  
nullam adhuc mentionem apud antiquos reperire potuimus. Cogitur interdum Chirurgus ossis par-  
tem aliquam disrumpere, arripere, secare, aut cōminuere, vt meningæ à noxa liberentur; præsertim  
si ossis partes dissēctæ fuerint, nec digitis, aut alio instrumento dimoueri possint, vt in ea fractura, quæ  
thlasma, aut encephaloma vocatur, fieri solet. Horum munus est rodendo plerumque duri ossis par-  
tem absumere, aut os diuidere, ac ipsum ad faciliorem extractionem parare; fracturæ orificium hoc modo  
latius efficitur, vnde postea humiditates cōmodè euacuantur: ab eorū forma nomina propria sortien-  
tur, ab aliquibus scalpria excisoria opposita vocantur, cōmuniiter forpices, & vulgo Mordenti nuncupi-  
tur, semper apud expertos Chirurgos parata reperiuntur, & continuo vsui seruantur, quorum vari-  
effigies suo loco possunt in officina conspici.

- 60 **M**ulta alia de instrumentis ad caluarie perforationem opportunis, in medium adduci possent:  
sed nē operatores radio afficiantur, silentio prætereunda exilimauiamus; ac horum prædictorum fun-  
gulum quomodo in vsū veniat, exponere tempestiuum esse iudicamus.





V<sup>a</sup> fracturæ caluariæ curationem instrumentis aggredi statuerimus, hæc primò sup-  
poni debent, virtus nimirum agrotantis, quæ omnium optex est; si enim imbeci-  
la fuerit, vel ob nimiam sanguinis effusionem, aut nobilium partium noxam, aut pra-  
uorum accidentium copiam, vel vulneris, aut fracturæ magnitudinē, accipitem me-  
dicum in opere reddere solet, adeo, vt quandoque ab eo abstinere deceat. nam  
dictum est ab Hippocrate; <sup>b</sup> Vbi est indigentia, laborandum non est, secundò sym-  
ptomatum natura, quæ si adeò valida fuerint, quòd mortem necessariò præfagiant,  
ex toto (ne mali medici nomen subeat, & vt vulgarij calumniz euitentur) ob omni opere abstinere  
congruum est; ob id dicebat Celsus; <sup>c</sup> Prudentis hominis est, primum eum, qui seruari non potest, non  
attingere, nec subire speciem eius vt occili, quem fors ipsius peremit. verum tamen ex prudentis artificis  
opere, aliqui præter omnem spem, & si sæua apparuerint accidentia, conualuere, florente nempe ætate,  
ac virtutis robore, necnò corporis optima tēperie, ac animi constantia; hæc enim omnia perpetuò spēs ali-  
quam promittunt; horum autem, si tanquàm deplorati primis diebus suscipiantur, curationem tentare  
per humanum est, forma denique, & fracturæ magnitudine, ac sede affecta sedulo perspecta, à quibus cu-  
randi rationales indicationes omnium operationum sumuntur. Et primò vndeque de cōstis capillis,  
digito, qui verus iudex est, aut specillo, fracturæ natura inquiratur, indē pericranion commodè à craneo  
remoueat, ne operi impedimento sit; quinimmo, si decet, & vulnus in cute ampli reddatur, vel ad eius  
restitutum, vel orthogonaler absque nimio sedis vulneratæ detrimento; quod opus Chirurgum in-  
genio præditum, & expertum expostulat. postmodum, extranea, si quæ sunt, conestim, & in prima cura  
auferantur, ne ægrum in grauiora pericula inducant, ea præsertim, quæ sine iactura, & magno periculo  
auferrī possunt. & si sanguis non levis aliquis fluxus appareat, quo patientis vires destituantur, hunc ti-  
stere aut appositò digito, aut xylo adusto, aut oui albumine confuso, aut aliquo puluere huius operi accō-  
modato, laborandum est; quantuis veteres <sup>d</sup> aut pannis siccis, aut spongij oxytrato, siue posca infusis, san-  
guinem sistebant: nos eam methodum non approbamus, sed potius vsum filorum, aut spongiarum in  
vino nigro austero, quamuis nec hæc, quia tuta non est, continuo vsui seruetur; qualecunque igitur ad-  
habitum fuerit præsidium, ac obiectis linamentis occupatus sanguis, caput altius eleuandum est, ac op-  
portunis fascijs auoluendū; postea molli culcitra, ac obscuro thalamo patiens locetur, ac ibi quiescat.  
In secunda visitationibus, si ratio admittit, nulla obstante causā, sanguis præmissio clystere mittatur; &  
si aliqua plethora apparuerit, à mediana, aut à capitali vena sius oppositi in ea quantitate, quam vir-  
tus, ætas, sexus, habitudo, & tempus anni exposcit: at si adhuc aliqua cacochymia aderit, superfluis  
ille humor convenienti pharmaco purgetur; quod est præceptū Hippocratis, <sup>e</sup> & Galeni sub his ver-  
bis; Purgatio ventris deorsum plurimis vlcibus confert; & in vulneribus, quæ sunt in capite, & in vē-  
tre, & in articulis, tenui victu regatur; fluxiones ad longiora diuertantur, ac vrgentes humores fēra-  
pijs, ac decoctis quieti detineantur. Sed quia superius multa de his diximus, hæc facis: iam transien-  
dum est ad Chirurgiam, quæ à lésionum forma indicationes sumit; talis quidem fracturæ caluariæ sex mo-  
dis occurrere solet, & eorum quilibet singularem operandi modum tum manibus, tum instrumentis ro-  
quirit; & à simplici inchoando, quæ scissura nuncupatur, dum in ossē solum lædentes instrumenti im-  
pressio, siue sedes dignoscitur, quæ siue capillaris, siue rinularis nuncupetur, quandoq; secum dubitati-  
nem adducit; quare rationalis medicus, aut scalpro, aut cyclico vna tantum operatione totam scissu-  
ram delere teneret, vt superius Capite x. diffusius explicatum est. camque hoc opus præstare intendit,  
vel scalpris radere, vel terebris perforare, patientis aures gossipio, aut lana in formam clauj parata, ac  
rosaceo oleo tepido madefacta, obturandæ sunt, manibus quæ ministri auxilium ferentis, premeandæ, quò  
& firmius caput quiescat, & ne etiam strepitu horreat: Secunda huius fracturæ species, aut forma, ea est,  
quæ ad diploidem vsque terminatur, & diligentiorē requirit operationem, cui liquoris nigri vsus sa-  
tis accommodatus est, qui qualis nam specie sit, & quanta magnitudine, apertissimè ostendit: excua-  
re sic oportet, donec nigredinis vestigiū apparuerit. igitur inducendum est super os aliquod medicamē-  
tum nigrum, quod diluunt sic, post tridie, purgata plaga, os radere. quod si integrum non fuerit, sed sis-  
sum, aut collisum, reliquum, quod album erit, album inuenietur, huius verò, quem modicamentis com-  
biberit, in alio ossē, quod album erit, nigrum conspicietur: in operatione verò fouenda, muniendæque  
sunt vulneris labra lincolis oleo rosato tepido imbibitis, ne cruda fiant, & arefiant, nostrates verò  
dimissio atramento tuto operantur, præterquàm in cacumine, vbi terebri, aut modioli opus non ad-  
minitur, ibi namque maxima cerebri quantitas subest, & ossa tenuissima sunt: pariter vbi sagittalis  
sutura, vbi cum coronali vnitur, cæui in cauteriorum administratione, & terebratione esse debemus:  
nam ibi dura meninx, vti in suturis, ab ossē difficulter abscedit, & non insigniter ab externa calu-  
ariæ superficie remouetur: porrò si rima ad meningis occultū descendit, excutatur os, donec du-  
ra ipsa membrana paruerit. præceptum est Hippocratis sub his verbis; Hanc scissuram conspectam  
totam secundum profunditatem radere oportet: nam scissura, quæ ratorio scalpro deleta est, minus

verem-

a Hipp. lib. de  
art. m. cap. 87.  
Auric. 2. l. 1. c. 12.  
2. cap. 3.

b 9. a. phis. 16.

c 9. lib. 1. c. 16.

d Cels. 8. c.  
4. Paul. 2. d. ca.  
90. Auric. cap.  
de fr. calv.

e 9. lib. de Vite.  
1. c. 10.  
f 9. a. med. c. 1.

10 verenda est, & minus negotij exahbet; non propter hoc conducit illicò membranam ob offe denudare, ne frigecat: fricando cauere oportet, ne multū procedatur, & mēbrana nonā percipiat. Sint igitur apud Medicum chirurgū ministri experti, lumen opportunū, ac calidus, medicamenta parata, & instrumētorum varietas: Nos verò sola hac operandi ratione sēpē in vulneribus similibus aegros iuuimus.

TERTIA fractura illa est, quæ manifestē ad intima caluarię descendere videtur, confusa nimirū, à suspitione, & timore non aliena, cum anfractus, & vias satis amplas contineat: ob id si maiorum accidentium timor adest, offe valdē duro existente, terebro vti necesse est. nā minus patientem inficit, breuissimoque tempore operatur: verum, quia antiquorum terebra suspitione non vacant, iam sunt reprobata, sed ex modiolis vno vtimur, cuius operationes nunc describere intendimus. Collocato igitur aegrotō, aut prout sedes vulnerata, ac lēssioni forma requirit, recumbente, auribusque  
20 lana, aut xylo obturatis, ne à Modioli strepiu lēdatur, ac vinculis, quibus caput abolutum erat, solutis, & linamentis omnibus exēptis, ac gossipio, siue xylo, vino nigro imbuto dēteris sordibus, iubendū est, vt experti ministri caput immobile conseruent: & si apud Paulum, & Auicennā legitur, Fac, vt duo ministri quatuor angulos attollant, eos nempe, quos arte parauit medicus in cruciali dilatare, quod opus possē fieri negamus: sed præcepto Hippocratis, labia vulneris linteculis rosaceo tepido madefactis, ne frigescant, & incruduntur, aut ferro lēdantur, cooperiantur, inde opus Modiolo, per cuius medium aculeus transiit, inchoare oportet, leuiter imprimendo, donec æqualiter in circulo auoluatur: tunc aculeus extrahatur, & Modiolus per se agat: estque quidam premendū modus, vt os forctur, & Modiolus circumagatur: quia si leuiter imprimitur, parum proficit: si grauius, non mouetur, nec alienum est interdum Modiolum rosaceo immergere, quò magis lubrico voluatur, & non aqua, vt antiquorum

30 mos erat, aut rosaceum terebratō osi infillare, ne calefact, & inde instrumentum calefaciat: porrò id pauca sunt; nam secus ferramenti aciem hebetat. At, cum os dimidium perforatum fuerit, maiori cura agendum est, & lentius instrumentum auoluendum, & sæpius attollendum, & foraminis altitudo cōsideranda, ne Modioli mucrone, aut ferra membrana lēdatur: igitur exempto sēpē Modiolo, iam adnoto specillo speculari non inconuenit: quare terebrantem oportet, vbi iam valdē parum abest, vt os perforatum sit, & iam mouetur, ab opere desistere, ac finire, vt os sua sponte dilceat: nam tunc nihil mali accidere potest: siquidem non conducit membranā ab offe statim denudatā esse, ne frigecat, aut malē afficiatur: quod inuit Paulus, & Auicenna sub his verbis: Frequenter cerebrum, ac eius mēbranz post chirurgiam inflammationes patiuntur: sed quia tardē terebratum os ex se exire possit, perforata caluaria cautē, ac æqualiter debet attolli, ne meninga violetur: ob id hoc cōsulata illa nostræ  
40 inuentionis tenacula opportuna esse credidit, quæ in officina confici potest.

MULTA ab experto Chirurgo in his operationibus consideranda veniunt, præsertim locus affectus, nam dicebat Galenus: Cogitauit accidere posse, vt si à latere magnū fieret in caluaria foramē, promineret fortassis hac parte cerebrum. est porrò, & in laceribus non vno in loco etiam neruorum, horumque non leuis momenti, quidam exortus, cum in supernis capitis partibus ne minimus quidem vsquam oriatur neruus, his ergo admoniti, ab eximendo offe, quod in latere capitis est, abstinere debemus, nec temporis os tangere Galenus ausus est. futuræ pariter terebrandæ non sunt: siquidem per eas dura meninga pericranio alligatur: at os, quod ex sui natura intro celsit, parum proforatione opus habet, & quæ maximē intro cesserunt, & maximē fracta sunt, neque dissectio magna, nec quæ in debiliori sede occurrit, perforatione indigent: sed quoniam quandoque caluariæ fractura, aut collisio ita  
50 ingens est, vt totum, quod perforationi subijci debet, terebro amplecti minimē potest: idcirco peruestigandum est, qua industria tutò totum id auferri possit, nam & si à lenticulato scalpro adactō malleolo id fieri possit, horridus tamen quidam modus est, ac in opere tardus: ob id nos infirmos, & stabili offe multiplici Modiolorum perforatione rem, vt opus requirit, peragimus: tunc cuspides, siue angulos, qui inter circulos remanent, clypeato, aut lenticulato scalpro, phacotum Græci vocant, obtundimus. Si verò os amplum fuerit, & fractura ingens, nullo adhibito terebro, sed scalpris adunciis, aut rectis, ac ferra præcipuē id totū auferimus. nā sulci scalpris parantur: residuum verò ferra tollitur, & sic quod decet, secamus: sola etiam ferræ opera interdum id agimus. Terebrationum prædictarum imagines, vt noscantur, subicimus in officina.

QUARTA fracturarum species ea est, in qua manifestā osis depressio apparet, & tunc an os depressum vbiq; separetur, inquirere oportet: tunc denique, si expediat, digitis tantum eradicetur: sin minus, voluella, aut tenaculis, aut prædictis forcipibus. Secus verò si alicui parti adhæserit, & alibi depressum, fractum, aut diuisum apparuerit. Si quidem illicò decet eo vti instrumentum, quod eleuatorium vocant, eius vnā extremitatē sub decliuorē osis depressi parte intronitendo, præsertim vbi latior fractura videbitur, super oppositam verò æqualiter, ac leuiter comprimēdo pars inclinata, ac depressa ad sedem suam naturalem attollitur, aut ex toto auertur, & sic subcingens membrana ab omni noxa liberabitur.

60 QVARTA fracturarum species ea est, in qua manifestā osis depressio apparet, & tunc an os depressum vbiq; separetur, inquirere oportet: tunc denique, si expediat, digitis tantum eradicetur: sin minus, voluella, aut tenaculis, aut prædictis forcipibus. Secus verò si alicui parti adhæserit, & alibi depressum, fractum, aut diuisum apparuerit. Si quidem illicò decet eo vti instrumentum, quod eleuatorium vocant, eius vnā extremitatē sub decliuorē osis depressi parte intronitendo, præsertim vbi latior fractura videbitur, super oppositam verò æqualiter, ac leuiter comprimēdo pars inclinata, ac depressa ad sedem suam naturalem attollitur, aut ex toto auertur, & sic subcingens membrana ab omni noxa liberabitur.

Occurrit multoties, & si ingens fuerit depressio, quòd nullibi os separetur, nec aliqua fractura videatur, scia tamen accidentia patientem infestant: quare opus est angusto Modiolo in ima parte officium parare, vt ab opposita Vestis cauda os depressum attollatur: verum expedit de sano offe parum.

parumper absumere, vt commodius Vescis firmari possit: nam ossa depressa terebrationes non exposcunt. dictum est enim ab Hippocrate; Quæcunque ossa intrò confusa cedunt, ex sua ipsorum natura rupta, aut etiam diffecta valde ampla, talia minus periculosa sunt, vbi membrana sana fuerit: & quæ pluribus fissuris, aut ampliorem intrò rupta sunt, adhuc minus periculosa sunt, & ad detractionem faciliora sunt; & nullum ex talibus perforare oportet; verumtamen & in his, symptomatibus apparentibus, aliquam partem terebrare expedit, vt membrana à nocuentis liberetur, ac immunis reddatur. Solent nimirum post terebrationes ossis frustulæ quædam remanere, à quibus praua oriuntur symptomata: quare ostium debilitati euellere opus est, inde circumferentes parietes Aequatore lenire, ac ab omni squamula denudare, aut Phacoto, siue Lenticulato orificia omnia aequalia reddere: in pueris verò deprediones solę, cute integra remanente, ceratis aliquibus, aut emplastris, absque vlla manuum operatione sanari solent.

QVINTA fractura, quæ simpliciter fractura vocatur, dum ossa in plures partes diffecta videntur, diligenter operatorem requirit. nam omne, quod separatum est, eget ablatione: quod adhuc refidet, accurata diuisione, & tunc lenticulatum instrumentum opportunum indicatur. nam præter alia, membranam ab ossibus, quæ vehementer sunt afflicta, turò recedit, adeò vt ex hac operatione nullus sit metus, vbi latam partem lenticulæ super membranam statuerimus, ac malleolo feriemus, caluaria commodè ab ossibus fractis separabimus. sic enim omnia euenient, quæ requiruntur: maximè tamen hunc modum in vehementissimis fracturis laudamus, quare nec qui minori cum periculo, nec qui celerius perficiatur, separandi modus inueniri potest.

SEXTA has caluariae fracturas nonnullæ à Meningophylace, id est instrumento, membranæ custode, auxilium petunt, veluti ea, quæ à Græcis engissonata, & camaromata dicuntur, præsertim vbi aliquod conueniens orificium aderit, per quod id instrumentum locari possit; quod verò refidet, Phacoto adfecto malleolo diuellatur. nam tunc membrana interior, ne si dormitans quidem quis agat, vulnerari potest. Attamen huius ætatis Chirurgi hunc operandi modum nõ approbant, sed eum, qui à forficibus Mordemibus, & Serpentinis refultat; & nos cum ipsis eiusdem sumus opinionis, ob id: quia absque vlla capitis commotione citò, ac turò operatur, nec opus est malleolo, aut Meningophylace, ac perpetuò quid operator agat, considerare, ac inspicere potest, vnde errorem cõmittere non potest.

SEPTIMA fractura omni timore, ac suspitione plena est, potissimum quæ ab angustia, & acuto telo imprimitur, & perforatio vocatur; siquidem incognita eius perforatione, ob angustiam, à qua cerebri nobiliores partes afficiuntur, praua resultant accidètia; quod dum aduenit, si quid extrinseci aderit, veluti sagitta, aut pugio, statim extrahatur, ijs seruatis, quæ à nobis dicenda sunt de extractione sagitarum verum si decet, vt commodius medicamenta applicentur, lato modio os circa angustiam fracturam perforetur; porro in similibus læsionibus magis, quàm in aliis, opus Modioli approbatur.

Datur & altera fractura, quæ oppositionis fractura nuncupatur, dum percussa vna parte, aut illi opposita, aut alia magis propinqua frangitur. nam euenire solet (quod pluries compertum est) vt altera parte fuerit ictus, & os altera sit fissum, & vulncris genus miserrimum sit, si ignorat medicus, quæ capitis parte operationem moliri possit.

In pueris ab alto cadentibus, aut alio modo percussis, caluaria absque vlla fractura comprimi solet, vt vasculis stanneis, aut plumbeis percussis euenire contingit, & more Hippocratis, os tantum colliditur: nunc verò nullum opus requiritur, nisi derasis capillis, aliquod ceratum, aut emplastrum adhibere. nam ossa mollia, ac tenella in sedem propriam facillimè his medijs reducuntur, ita vt natura agente sanitati restituantur: & vt ea noteant medicamenta, quæ ad ossa collisa eleuanda probantur, præsertim puerorum, hæc pauca annotauimus.

#### CLYPEI AD MOLLIA OSSA COLLISA ELEVANDA.



RECIPE Terebinthinae claræ partes duas, ceræ citrinæ partem vnā, resinae pinæ partem mediam; liquefiant omnia simul, inde manibus aceto madefactis, diu malaxentur, ac in eo per diem marcescant, & Recip. succi Betonicae partes duas, Verbenæ partem vnā, lactis mulieris, quod sufficit, & secundum artem fiat ceratum, quod affectu parti applicatum diu conferuetur.

Recip. ceræ recentis, olei masticini an. vnc. ij. pulueris Marchesitæ vnc. s. pumicis drag. iij. absynthij, cimini, sulphuris an. drag. ii. baurach. drag. j. fursuris tritici pugillum j. vini optimi drag. iij. melle, & fiat emplastrum secundum artem.

Recip. Resinae puni, ceræ citrinæ an. vnc. iij. terebinthinae claræ, gummi elemi an. vnc. iij. olei rosari vnc. ij. ammoniaci vnc. j. s. farinae iuliginis vnc. j. vini nigri optimi pro emplastro, & vtere.

Varia medicamenta cephalica huic operi accommodata in fine huius libri describemus, nempe illud Diabotaron, aut Sacrum Galeni, aut de Centaurea Guidonis, aut de gummi elemi Conciliatoris, quæ valenter in his affectibus operantur. igitur pro nunc hæc satis: sed caluariae fracturæ historiam continuando de medicinis post operationes opportunis aliqua dicamus; postmodum quibus medijs accidentia, quæ his læsionibus supernascuntur, remoueri possint, explicabimus.



rosaceum ipsi crasse membranæ nudæ admouetur, vt in ijs, quibus aliquid ex osse capitis excinditur, accidit, solum ipsum applicamus modicè calidum. hanc secutus opinio Actius \* ait: Columbinum sanguinem solent hi, qui ossa capitis fracta perforant, crasse membranæ infundere; quod si columbinus non adsit, palumbi, aut turtur in sanguine vti licebit; verò sexcentos vidi ossibus capitis perforatis, & nihil laesos ex rosacei vii circa sanguinem columbini. Paulus pariter ab hac methodo non deuians inquit; b Post chirurgiam panniculo simplici lineo, vulnere æ quali, rosaceo madenti, cerebri membranam operimus, exiguaeque lanæ partem similiter rosaceo imbutam prædicto panniculo imponemus, deinde linamentum implicimus duplex, in anleo, aut ipso rosaceo imbutum, toti vulnere circumponemus, diligenter adhibita, ne cerebri membrana grauetur. postea latiore vtetur ligamento, neque hoc astringere, vt tuta vt linamenta solum retineat. Eandemmet sententiam scripsit Auicenna, c & qui cum secuti sunt, & longissimo experimento hæc veritas comprobatur, ob id quia post operationes medicamentum non datur, quod magis propria qualitate, ac potentia, mediet membro consimili, aut quoquo modo alterato, eius naturalem complexionem, ac innatum calorem corroborando, fluxionibus inhibendo, intemperies, quæ noxam præstant, remouendo, causis dolore imprimantibus resistendo, ac coniunctam quamlibet causam discutendo, quam oleum rosaceum bonum. Rationes etiam quamplurimas reperiuntur, probantes nimirum hanc medendi rationem tutam, commodam, & ad medicorum mentem existere, & prima hæc est. d In cura caluarie fractæ vnaqueque indicatio in prohibitione inflammationum dirigitur, cuius primus terminus est, sepeima aut nona dies, & nil \* magis eas inducit, quam dolor, nam quod dolet, plus aliquid affluere facit, atque etiam si quod affluit, pro isto naturæ modo se habeat, attamen vires ipsæ partium, quæ tum propter dolorem, tum etiam ex vulnere sunt imbecillæ, ne quod iustum est, ferant, sed veluti ab iniusto grauantur, & tument; iiccirco perpetuo causis dolorum incumbendum est, nempe medicamentis mollientibus, & anodinis. Secunda hæc est; Vultus \* in crudefcens non parum moleste exhibet, in crudefcit verò fœcis adhibitis suffragijs. nam dictum est, vulnera laxa bona, cruda verò mala; ergo non semper in vulnere initio, nec statim post chirurgiam arida cephalica sunt opportuna; nempe dictum est, multociens post operationes cum ferro meningæ, aut cerebrum inflammatione tentatur, ergo quæ dolores leniunt medicamenta, & fluxionibus inhibent, magis probantur, sed non longo tempore, nā putredinis suspicio aliqua aderit, eoq; magis indicatio talis opportuna fuerit, si dolor, aut inflammationis initium apparuerit, quod verendum est, indicatione sumpta à natura, & nobilitate sedis affectæ, præsertim in cacochymia, aut corpore nimia putredine scatente. adhuc vulnera sanari nequeunt, nisi quietis symptomatibus, & in capite vulnerato quiescent, rhodino adhibito, siquidem & rosaceum vtpote, cuius natura olei, rosæque in medio est, in inflammationum augmentis optimum remedium est, in eo ramen fortis non reperitur frigiditas, sed latis temperata complexio; Compræhenum est à me ( subinde dicebat Galenus ) i rosaceum illud esse optimū, quod ex oleo claro, crudo, aut maturo conficitur; quippe bisariam ipsum nominant, sine sale absque odoramentis præparatum, rosæ nempe Zebedensis plurimus in tinctis: esse autem rosaceum non vetus, sed illo anno paratum, aut Vere, aut inuente Aestate. Sic enim rationibus, quæ huic methodo aduersantur, respondebimus; & ad primam dicimus, verum esse, quod vulnere cura sit exsiccatio, sed vt vulnera sunt, & simplicia: lecus verò de caluarie fracturis creditur, quæ semper morbi compositi sunt, magis post chirurgiam, quæ alicuius symptomatici occasione adhibita fuerit, nec putredo expectanda est, si bis quotidie purgabitur vulnus. Ad secundam respondemus. Cum symptomatum tempus præterierit, quæ ratione vulneris vsque ad decimam quartam diem timenda sunt, ad exsiccantia deuenire oportet, vt vnaqueque superflua humiditas exsiccecur; quæ non nisi temporis longitudine producit, & in vulneribus concavis, huiusmodi noua producit caro. quod affirmat Galenus, id cens; Necesse igitur est in obis primū fracturæ aliquid nudare, quo videlicet detergere, & abluere sanæ à membrana liceat. postea verò cum phlegmonum tempus præterierit, omniaque secca ad vnguē fuerint, carnem producere, & cicatrici locum includere. Ad tertiam dicimus, quod oleorum quatuor genera reperiuntur, vnum, quod ex puris oliui maturis, aut viridibus, exprimitur, & hoc absolute oleum vocatur; alterum, quod ex seminibus oleaginis extrahitur; Tertium, quod vi ignis destillatur; Quartum, quod ex oleo, cui aut folia, aut radices, aut flores, aut animalium partes, sunt incoctæ, & quod de primo intelligit medici, cum dicunt, oleum vulneribus neuosis aduersari. præterea dicimus, non habere præ manibus dissectum, aut punctum neruum, vbi olea, & humida reprobantur, sed membranam detectam, & symptoma tum custodiam, quæ si equestrer in his affectibus subnascentur. Ad quartam responsum dedit Galenus, probans in rosaceo temperiem reperiiri, nec in eo eam adesse frigiditatem, quæ meningis, aut cerebro non xam præstare possit, idque minus nam semper super eas actu calidum adhibetur. sic itaque huic parti finem imponentes, dicimus, parafactam cerebri membranam non modo dolore, aut inflammatione vrgēte, illico lenientibus mederi debere, nam Galenus de tracto osse tepidam rosam imponebat, quod seruari iustum est à principio vsque ad symptomatum securitatem, inde vsque ad finem exsiccantibus perseveretur, quæ ob hoc cephalica vocantur: ar si ab initio aut dolor, aut inflammatio oritur, eam adhibetur curatio, donec vulnus porum restitatur: sic enim nostras chirurgi inter initia perpetuò ad rosacū maturum, nullo apparente symptomate, consuegiunt. secus verò ad crudum, quod omotribus, & omphacinum Græci vocant, inde ad ea medicamenta, quæ cruentis vulneribus opitulantur, deueniunt. Solet nimirum

a Gal. 1. 1. 1.

b Gal. 1. 1. 1.

c Gal. 1. 1. 1.

d Gal. 1. 1. 1.

e Gal. 1. 1. 1.

f Gal. 1. 1. 1.

g Gal. 1. 1. 1.

h Gal. 1. 1. 1.

i Gal. 1. 1. 1.

k Gal. 1. 1. 1.

l Gal. 1. 1. 1.

m Gal. 1. 1. 1.

n Gal. 1. 1. 1.

o Gal. 1. 1. 1.

p Gal. 1. 1. 1.

q Gal. 1. 1. 1.

r Gal. 1. 1. 1.

s Gal. 1. 1. 1.

t Gal. 1. 1. 1.

u Gal. 1. 1. 1.

v Gal. 1. 1. 1.

w Gal. 1. 1. 1.

x Gal. 1. 1. 1.

y Gal. 1. 1. 1.

z Gal. 1. 1. 1.

aa Gal. 1. 1. 1.

ab Gal. 1. 1. 1.

ac Gal. 1. 1. 1.

ad Gal. 1. 1. 1.

ae Gal. 1. 1. 1.

af Gal. 1. 1. 1.

ag Gal. 1. 1. 1.

ah Gal. 1. 1. 1.

ai Gal. 1. 1. 1.

aj Gal. 1. 1. 1.

ak Gal. 1. 1. 1.

al Gal. 1. 1. 1.

am Gal. 1. 1. 1.

an Gal. 1. 1. 1.

ao Gal. 1. 1. 1.

ap Gal. 1. 1. 1.

aq Gal. 1. 1. 1.

ar Gal. 1. 1. 1.

as Gal. 1. 1. 1.

at Gal. 1. 1. 1.

au Gal. 1. 1. 1.

av Gal. 1. 1. 1.

aw Gal. 1. 1. 1.

ax Gal. 1. 1. 1.

ay Gal. 1. 1. 1.

az Gal. 1. 1. 1.

ba Gal. 1. 1. 1.

bb Gal. 1. 1. 1.

bc Gal. 1. 1. 1.

bd Gal. 1. 1. 1.

be Gal. 1. 1. 1.

bf Gal. 1. 1. 1.

bg Gal. 1. 1. 1.

bh Gal. 1. 1. 1.


bi Gal. 1. 1. 1.

bj Gal. 1. 1. 1.

bk Gal. 1. 1. 1.

- 10 mirum in plerisque harum fracturarum, etiam contra cica trice, quæ ab extrinseco aere fuerit circumdata, aut ab oleis, pulueribus, & vnguentis alterata, aut ab instrumento cadente aliquo modo contusa. ab innato calore desitui, & proprio humido, ac elementari priuari, & mori, siquid dictum est ab Aristotele: Offa suis spoliata membranis siderantur, & Galenus <sup>a</sup> dicebat: Vlcera omnia edicari oportet, præcipue in quibus patitur os, ut abscedat pars eius, quæ vitata est. ob id excuti partes eius superficiales; & dum talis expectatur desquamatio, integrum vulnus claudi non debet, nec caro illa, quæ mollis est, excidenda exoptat; nam si natura squammam ossis emittere tentauerit, caro ibi mollis apparebit, & statim, exempta squamma, pars ficcarur. & solidior facta, cicatrice obducitur. Indicia vero ossis abscessus, sunt color eius alteratus, pus subtile, & copiosius magis, quâ pro ratione vulneris, cuius labra non coeunt, nec coalescunt, dolor quidem mitis, aut pruritus ex humoris acrimonia sentitur; quo tempore abscessus sit, discrimen est. nonnulla enim ossa graviora, alia exigua sunt: & quæ in summo continentur, celerius excidunt, ea fere ossa celerimè abscedunt, in quibus celerimè pus apparet. & caro mollis increfcit, quod euenit, & solet secundum ægri habitudinem, ætatem, exercitium, & viuendi modum. caro enim, quæ in vitata parte succrescit, plerumque os alteratum attollit: Ambitus ergo totius ossis, si quadraginta diebus abscedit, optimè abscedet: quum nonnulla ad sexagesimum vsque, & vitra perueniunt, rariora quidem ossa maturius. Firmiora ferius abscedunt: Porro <sup>b</sup> caluarie os, quod longiore spatio carne non recipit, ipsum omni diligentia leuiter radere oportet, donec sanguis emanauerit, tunc quippe indicium est, eam partem viuere, à qua statim caro efflorescere incipit.

P R A X I S.

- 30  Os vero in hac curatiua methodo sic perpetuò agimus, indicatione supra à natura vulneris, præmissis vniuersalibus, si membrana à telo detecta mollis, mobilis, alba, illæsa, & pura apparuerit, aridis cephalicis cum leuiter cooperimus; inde totum vulnus aliquo medicamento ex his, quæ ab capitis fracturas sunt approbata, replemus, donec plaga ad cicatricem deuenit; parantur hæc omnia, vt in fine huius libri videre licet; nec ab re est, quod longo experimento nouimus in Athletis, & exercitatis corporibus) aquæ vitæ, addito rhodomelle, guttis quatuor vulneris immo cooperire, & residuum pulueribus, aut vnguentis replere, & calefaciat hoc medicamen inter duo vasa, ne ariditatem acquirat; ponatur igitur in vase vitæ, & illud in alio aquæ pleno, qui modus balneum Mariæ vocatur, nam sic docet Gal. octauo methodi, quoniam aliter calefacto, vitatur eius facultas si autem membrana ex industria fuerit detecta, indicatione sumpta à symptomatibus, quæ, vt dictum est, multoties post operationem cum ferro occurrere solent, aut ratione agitationis, aut ex acuta quadam ossis eminenia, aut ex limimentorum grauitate, aut ex multo usu, aut vini potu, aut alia quadam occasione latente, dimissis aridis, rhodino crudo loco vimur, quod paratur ex oleo non maturo, & rosæ ad plenum non apertis, à Græcis omotribus, & omphacinum dicitur, à Latinis rude, crudum, acerbum, album, & sparium vocatur, à Galeno <sup>c</sup> mirum in modum probatur nam stipticitate corborat, & temperata frigida- tare inflammationes prohibet; Optimè in sanitate vsu, ait Dioscorides, <sup>d</sup> ex immaturis oliuis expressum oleum esse nouum esse debet, odoratum, ac gustui nulla mordacitate præditum, eo nempe in vulnere tepido sæpe vitatur ad septimam vsque medicaturam. inde vulnus ipsum splenis vino nigro, & os, betonica, & myrtis bullito madefactis, ac expressis cooperimus; aut Hippocratis emplastrum superponimus ex hordacea farina, pulvere rosarum, & rosaceo; cui, si licebit, aliquid aceti addere expedit; sanie itaque optima apparente, dum affecta sedes propriam seruauerit symmetriam, nec do lore, aut inflammatione affligitur, si opus fiet pro debili quadam abstensione, oleo ipsi crudo aliquantulum rhodomellis addatur, ac si eius caliditas, aut mordacitas veretur, iuleb, aut syrupus rolati probatur, ab aliquibus lotam adifigimus; si vero abstensio fuerit condecens, cum rhodomelle omnia componimus. nam sanè caro sine ea in vulneribus pignè nequit, ob id Antiquis Sidoneus lide solo utebatur in corporibus Persarum durissimis, ac robustissimis, & in his, qui in Asia debebantur celebre in caluarie fracturis medicamentum ab antiquis credebatur; eius inuentor, est he Galeno, <sup>e</sup> Heras Philosophus fuit: facit ad omne vulnus ad capitis affectus cum ossium abruptione, & sanat citrà reparationem, describitur à Scribonio Largo <sup>f</sup> sub his verbis: Emplastrum viride Gliconis Chirurgi, quod sui generis, meo iudicio, superat omnia, vocatur. Iis facit hoc emplastrum ad detectam membranam tegentem cerebrum, de industria à medicis cum cerebrato excinditur, quod eam laedit, os, vel alioquin detectam, rosâ diluam, & imposuim. à Galeno, <sup>g</sup> & Actio <sup>h</sup> inter catagmatica cephalica multum probatur, & Actuarius <sup>i</sup> de eo sic dicit. Iis ab aliquibus epi-

a Hipp. de mor. acul. cap. 13.  
b Hipp. de mor. acul. cap. 13.  
c Hipp. lib. 3. de fract.

d Hipp. lib. 3. de fract.

e Hipp. lib. 3. de fract.

f Hipp. lib. 3. de fract.

g Hipp. lib. 3. de fract.

h Hipp. lib. 3. de fract.

i Hipp. lib. 3. de fract.

j Hipp. lib. 3. de fract.

k Hipp. lib. 3. de fract.

l Hipp. lib. 3. de fract.

m Hipp. lib. 3. de fract.

n Hipp. lib. 3. de fract.



gonos appellata, facit ad omne vulnus, & præsertim capitis, si cum interfectione ossium hies, sine iactura 10  
 perforantur. Nos verò in his regionibus non nisi eo modo, quem Scribonius, & Galenus docent, vti ausi  
 sumus; addito nempe ad duplum rosaceo. omnia verò qualitercunque applicamus, calida qualitatibus  
 applicanda sunt, dumque curationem adhibemus, hyeme præsertim, regulam terream, aut anciam calidâ  
 sic, vt tantum aer alteretur, super vulneratum caput conservamus; æstate verò pannis calidis continuo  
 detectum vulnus fouemus; gignunt autem carnem, quæ primum exsiccationis ordinem non multum tran  
 sgreddiuntur. Puluerem aridum cephalicum sic paramus in molli corpore; Corticum radices opopanax,  
 olubani, Iridis, aloes, farinæ orobi an. misce, & fiat pulvis subtilissimus. aut Recip. in corporibus robusto  
 ribus (nam tollit squammas, & ossa corrupta rapit) Iridis Illyricæ, panacis, an. drag. iij. aristolochiæ ro  
 tundæ, manne an. dra. ij. squammæ æris, pumicis vlti an. drag. i. ttritis vtæ. probamus pariter vnguen  
 tum Periclimenon, basilicon minus, & de gummi elemi. aut fiat mixtura ex resina, succo betonice, Jan  
 ceolæ, mastice, sanguine draconis, & cera sine oleo repleto vulnere, euis inducitur cerato ex betonica, 10  
 aut ex chalcitide, aut tripharmaco. reliqua postmodum agenda sunt, prout vulncris essentia requirit, vt  
 inferius dicemus.

a Gal. j. meth.  
 cap. 3. Anic. 4.3.  
 cap. 3.8.

## DE MEMBRANA VULNERATA.



I membrana, quæ cerebri tuelca, & cooperimentum est, aliquo modo afficitur, passio fit, Arabi  
 cè Alame dicta, & tunc primò inquiratur, si fuerit detecta, & vulnerata, & si ab ea plurimus san  
 guis emanat, qui, eò quia constringi nequit, nec oportune medicamenta adhibentur, magnum  
 negotium facessit: veruntamen illæ indicationes seruandæ sunt, quas superius descripsimus. inde stude  
 re oportet, vt quam citissime vulnus agglutinetur medicamento nempe valenter exsiccantibus, omnem 30  
 corruptionem prohibentibus, dolores demulcentibus, & proprijs, ac similibus qualitatibus affectam par  
 tem corroborantibus, quæ quidem qualia sint, ad plenum adhuc inuenire non potuimus, & si Galenus  
 ad mentem Archigenis dixerit: Non rarò accedit in ruinis ex alto, aliquam cerebri, aut membrana  
 rufi partem absumpti: quod vbi contigerit, capitis dolor magis vehementer euadit. optimum est igitur in his (ni  
 si ætas prohibear, & vis vitalis imbecillis appareat) initium curationis à sanguinis missione moliri, & con  
 gruis superfusionibus in capite vti, lanas oleo dulci madidas ipsi circumponentes: si prohibeatur propter  
 horum aliquid, aut ætatem, aut virium imbecillitatem, aut etiam propter vitæque, sanguinis detractionem  
 tentare, clystere ventrem euacuabimus, & euulsionis gratia, ne humores ad affectas partes deferantur.  
 mox auxilia vtentur ad inflammationes inscriptis: si autem membrana consuleretur fuerit, probò eam  
 conglutinat (vt ait Archigenes) calaminthæ succus infillatus, & farina milij arida inperfa, & deinde bu 40  
 tyrum, rosaceû, & adeps fusilla salis expers, vetusta, mixta, & tepida insufa: patientes à vino, & multo cibo,  
 præsertim si febricitent, abstinere oportet. Hæ omnes operationes ad dolores sedandos dirigunt, ne  
 inde locus inflammetur; ob id nonnulli hanc methodum imitantes, super membranam detectam, ac vul  
 neratam lac muliebre calidum, alij columbinum sanguinem statim ab alis detractum, multi vinum nigrû  
 myrtis, rosæ, & betonice bulliû infillunt; postea lichinis rosaceo crudo calido madefactis vulnus repit,  
 ac totum caput inungunt: si verò omphacinû optimum nò aderit, rhodinum rosâ, cum myrtino cõponunt,  
 & sic vulnus vsque ad septimam regatur. postmodum parum quid syrupi rosati, aut rhodomellis adda  
 tur, vt leuis quædam fiat absterfio, inde aridis cephalicis vsque in finem vti expedit. Nos autem sic agimus,  
 præmissis vnuerfalibus, in secunda visitatione tale medicamentum super lectam membranam applica  
 mus, olei de Terebinthina vnc. ij. aquæ ardentis, quam isti vinum sublimatum, aut aquam vitæ appellant, 50  
 syrupi rosati de rosæ siccis an. vnc. j. misce. postea totum vulnus tali puluere replemus, myrtiæ, aloes,  
 mastices, sanguinis draconis, reubarbari electi, corallorum rubeorum, an. drag. ij. misce, & fiat pulvis  
 subtilissimus, & per peciam lineam transmissus, ac superposito cerato ex Betonica, Aut Diabotano, aut  
 Humano, caput totum rosaceo completo inungimus. postea plenius ex carpentata stupa, vino nigro,  
 ac rhodoleo madidis fouemus, & ne membrana grauetur, latiore vtetur ligamento, neque hoc astringē  
 te, sed tantum vt linamenta retineat. Verum si membrana nigruerit, ait Paulus, & Auicenna, & solû per  
 summam eius ex medicamentis effusibus id euenerit, mel triplum rosaceo miscentes curabimus, ac si  
 nigrities sua sponte prouenerit, atque in imo potissimum vni cum alijs grauioribus iudicijs, attingi tunc  
 non debet, vt quæ natuum calorem emortuum innuat, nos autem Iside medicamento membrana  
 initium spheceli curauimus, ac interdum felici successu ad Aegyptiacum deuenimus, omniaque medicamē  
 ta adhibita super findonem furicam rubei coloris extendi iussimus, ne amplexus quidam cum vulnerata  
 membranae labris oriretur, aliter cum non probamus: nec licet huiusmodi vulnera aut stupa, aut bom  
 bice, aut lana, aut filamentis lenci abstergere, sed tantum linimento aliquo exsiccante ipsa oblinire.

## DE CEREBRO SANCIATO.



D VENT interdu, quod medullaris cerebri substantia, mollis, alba, & venularum plena, ac pri  
 marium membrum, in quo ratiocinatricis animæ sedes quiescit, vulneretur, & talis passio lethali  
 sit ferè ab omnibus medicis iudicatur: attamen non ob id, qui sic vulnerantur, desituerendi sum;  
 nam extra speciem nonnulli mirabiliter euasere. dictum est à Galeno<sup>4</sup> in desperata salute: Quantum itaque 60  
 satius

c. l. l. de mor  
 bu lib. de Co  
 ac. arbor. 2. 6.  
 Arbor 18 Cel  
 lib. 5. c. 2. de vul  
 ner. Gal. A  
 p. l. l. l. c. 18.  
 Anic. 4. 4. c. 1.  
 c. 9. l. meth.  
 10.

70 satius est aliquid nonnulla fiducia, vel cum periculo facere, quam spe adempta certo perire. Tanto pro-  
ficetio satius est potentibus praesidijs pugnare, quam nihil agere. & Celsus dicebat libro secundo cap. x. In  
magnis morbis satius est anceps auxilium experiri, quam nullum agentes, siquidem & si aliud non ad-  
veniat, saltem lati aegri moriuntur, dum sibi medelam non sine spe praestari vident. In hominibus (ait Hip-  
pocrates) a qui virum robore sunt repleti, salutis spes perpetuo reperitur, nec ex toto huiusmodi cu-  
rationis possibilitas a medicis reprobat. nam dicebat Hippocrates: Vulnera magis lethalia sunt, quae  
in venas crassas in collo, & in gignibus insiguntur, deinde quae in cerebrum & in hepatis, postea quae in in-  
testinum, & vesicam. Sunt autem haec omnia perniciose valde, non tamen ita, ut nemo ex his quatuor, vel  
vuln. putatur. adimat. & etiam cerebrum sphacelari posse, & sanitati restitui. experimento etiam ab eo com-  
probatum est, in puella, quae de rupe cecidit, & lsi cerebri varia symptomata apparere, voce destitu-  
ta, inestatio a dextra, vomit ad noctem sanguinem multum, aquam difficulter deglutiebat, stertor, spiritus  
densus veluti morientium, vena circa faucem distenta, decubitus supinus, pedes tepidi, febris debilis, vo-  
cis interceptio, & superflus manit. A Galeno etiam haec veritas confirmatur, ait nempe: Cerebrum vul-  
neratum saepius sanatum vidimus, & semel, & bis in Strima Ionia, viiente adhuc praeposore Pelope, &  
erat vulnus satis memorabile, quod rarissime contingit. admirabile atque incredibile spectaculum, quod  
aliquando conspiciamus, adolecentem, vulnere in alterum anteriorum ventriculorum accepto, su-  
perstitit huius, Dei, ut plerisque videbatur, voluntate. cerebrum enim nec durus est, nec ex se mouetur,  
& illi manus, ac medicamenta adhibere possumus. ergo nisi circa eius basin fuerit vulneratum, curari  
potest, etiam quod raro contingit, nec a Principe haec possibilitas reprobatur, siquidem dicebat Ipse: Ipsi  
vulneribus peruenientibus ad panniculum cerebri, accidit laxitas in latere vulnerum, & spasmus in oppo-  
sito eius, & cum inciso non peruenit ad ventres, sed ad terminum velaminis subtilis, est magis incolumis,  
cum vero peruenit ad cerebrum, apparet febris, & vomitus cholerae, & non est ex eis, qui sanetur, nisi raro;  
ergo quis potest interdum sanari, quod etiam eius testimonio confirmatur, cum dicit: Membra, in quib-  
us cum cadit vulnus, augetur eorum nocuumtum, & interficit, ut plurimum, & fortasse non interficit,  
nisi raro, sunt sicut vesica, cerebrum, renes, intestina minuta, & hepatis, quamvis fieri sit possibile, ut saluetur  
super ea, cum est leve. in corde autem non speratur salus, & non ex eo accidit vulnus. A Celso pariter  
dictum est: Servari non potest, cui basit cerebri percussa est. multoties nobilia membra fauciat, ait Pau-  
lus & Avicenna, extra spem mirabiliter servata fuisse, quod etiam quamplurimi recentiorum claris-  
simi Medici suis doctissimis scriptis approbat, veluti magnus Guido de Cauliaco, Vgo Senensis, Theo-  
doricus, Nicolaus Florentinus, Iacobus Carpenis, Nicolaus Massa, & Victor Trincavellus, Veneti om-  
nes, profecto Philosophi, & Medici Illustrissimi. adhuc Andreas Vesalius Bruxellensis, Ioannes Tagaul-  
tius Gallus, Vidus Vidius Florentinus, Petrus Andreas Mattheolus Senensis, Gabriel Fallopius Mutinensis,  
Philippus Ingrassia Siculus, Franciscus Valerius Gallus, Antonius Musa Brasavola Ferrariensis, Al-  
phonfus Ferrus Neapolitanus, Realdus Columbus Cremonensis, Bartholomeus Maggius Bononiensis,  
Antonius Calmarheus Gallus, Leonardus Botalus Atenensis, Hieronymus Crassus Vimenis, Ioannes  
Baptista Romanus, & alij, quorum volumina apud nos extant, nos etiam & Venetis, quae nobis dilectis-  
sima patria est, hoc anno praesertim, & Feltria, ac alibi, dum adhuc iuniores essemus, vulnera meningarum,  
& cerebri sanavimus, & sanata vidimus, nec sumus decepti, plures actus anatomicos in humanis cor-  
poribus proprijs manibus exercuimus, & quamplurimas, ac propemodum innumerabiles calvaria fra-  
cturas pertractavimus. Quorum fidelissimi testes esse possunt excellentissimi patres, D. Franciscus Lon-  
gus, Leander Zarotus, Vincentius Provincialis, Augustinus Gadaldinus, Tiberius Barbarus, Decius Pul-  
cher, & bonus, Ioannes de Francis, Ioseph Bonipertus, Bartholomeus Belazus, Aloysius Bognotus  
a Cruce, nepos, & nobis tanquam filius dilectissimus, qui a latere nostro vix nunquam discessit, ac quam-  
plurimi alij huius inclitae civitatis Veneriarum philosophi, ac medicis praclarissimi. Sed ad rem nostram  
redeunt, dicimus, quod si vulnus ad cerebri substantiam devenit, & patiens optimi roboris, ac bonae  
habitudinis fuerit, collocato ipso in convenienti, & obscuro loco, praemisissis vniuersalibus indicationibus,  
prohibendus est ab eo omnis motus animalis, sicut & corporalis, prohibenda sunt locationes nimiae,  
suspiria, clamores, quae sterturamenta ciere possunt, & quae mandando dura sentiuntur. postmodum vul-  
neris conditiones diligenter considerare expedit, & si quid praeter ordinem concitat, nulla violentia,  
sed statim, euellatur. verum si euelli nequit, abstinere opus est, & totum naturae committatur, ut id ex se  
emittat, aut commodae extractioni praeparet. Secus vero inquietudines magnas, & mors in Empirico-  
rum manibus, inagno cum eorum dedecore sequi solent; ob id dicebat Avicenna: Si apparent signa mor-  
tis, ab omni opere abstinere oportet, ne superveniat nobis locus sermonis stolidorum, cum hoc, quod pa-  
rum conferimus infirmo; huiusmodi vulnera nullo modo, ut abstergantur aut lana, aut xylo, tangi pos-  
sunt, ne acerrimi membranarum dolores subsequantur, & ille, qui patitur in cerebro, & non loquitur, cu-  
vsque ad tertiam ita remanet, & accidentia non minuuntur, neque augentur, tunc laudetur tertia, & ex-  
pectetur septima, & non moueatur ante illud cum aliquos vero vigente causa (nam quamplurimae  
humiditates assidue in capite producantur) vulnus vino albo decoctionis rosarum, myrrillorum, ac be-  
tonicis abluimus. & si dolor aliquis appareat, hac illico ab vberis emulsum, aut columbinus sanguis tepi-  
dius, aut aqua pimpinellae probatur; membrana inde cooperiatur sindone rubea, quae tingitur ex cocco

a4 Lib. 1. prae-  
dic. com.  
b4 Lib. 1. prae-  
dic. com.

c4 Lib. 1. de pro-  
bus. & 7. Apho.  
51.  
d4 f. & 7. Epi-  
dem.  
e4 f. de v. s. s.  
par. 10. & 6.  
par. Aphor. 18.

f4 f. 1. 3. trac. 3.  
cap. 14.

g4 f. 1. cap. 3.

h4 Lib. 1. c. 119  
144. & 145. a  
cap. 10.

i4 f. 1. c. 1. m.  
144. & 145.

vero, & non ex vermibus, oleo de Terebenthina, ac rhodomelle imbuto, reliquum oportet repleri lich-  
 nis tali medicamento madidis, aloes, myrrha, masticis, sanguinis draconis an. drag. ij. Terebenthinae cla-  
 rae vnc. ij. aquae vitae vnc. j. misce. aut Recip. Terebenthinae aqua consolidae lotae vnc. ij. aquae vitae, syru-  
 pi rosati an. vnc. j. pulueris olivani, masticis, myrrhae an. drag. ij. mumiae ex craneo, granorum hyperico-  
 nis, sanguinis draconis an. drag. j. quae terèda sunt, subtilissimè terantur, & fiat medicamentum, ac super  
 omnia amplè vulnus congeatur emplastro ex Bethonica, aut Diabotano, aut de gummi elemi caput to-  
 tum omphacino, aut rosaceo, & myrrino irroretur, ac superpositis plenij vino supradicto infusus, & com-  
 modè fascijs leuiter inuoluatur vsque ad septimam, sic quotidie agendum est, si nulla corruptio, de qua  
 summo perè verendum est, nullibi apparuerit, sola ardent aqua, rhodomelle, ac aloes, & myrrha contien-  
 ti, opus perficiamus, hoc obseruato, vt topica medicamenta fasciata alioque, quam cerebro se-  
 cto, sicciora sint. nam affectus partes pro viribus in sua propria natura conseruari requirunt, vt cerebrum  
 praeseruetur. nam eius substantia mollis, humida, ac dissolubilis, facillimè corrumpitur, nec curatio coga-  
 tur, sed ordinatè procedere decet, donec natura nobiles partes restitucendo, totum opus expediat: nos  
 verò plures vidimus, qui ex tali effectu diu cannulum aureum, aut argentum, in ipso cerebro tulerunt, vt  
 continuè humiditates effluerent, quae, dum retinebantur, epilepticos mortis, & diuersa symptomata  
 producere apta erant, ob id in hac curatiua methodo & patientes, & diligentes esse oportet, quemadmo-  
 dum Feltria nos fuimus in curatione cuiusdam adolescentulae, quae cum à cuspide falces, vulnus cum ce-  
 rebri latione passa fuisset, ex quo terabrata caluaria, notabilem portionem ipsius cerebri exiuisse, comper-  
 tum est, transactio quarto mense sanitati fuit restituta, & in vulnere semper cannulum conseruauimus, ac  
 vsque ad decimum quartum diem solo oleo de Terebenthina, & aqua vitae curauimus: inde vulnus gut-  
 tatim tali liquore repleri iussimus, vini mōtani vnc. xx. succi betonicae vnc. 4. succi calamitinae vnc. ij. myr-  
 rhae, olivani, aloes, sanguinis draconis, centaureae minoris, granorum hypericonis an. dra. j. pistentur quae  
 pistari possunt, ac in subtilissimum puluerem reddantur, & omnia simul componantur, ac per triduum in  
 vitro vase bene obturato marcescant, postmodum lento, & claro igne, donec tertia pars absumatur, bul-  
 liant, & adde mellis rosati vnc. iij. & parū adhuc bulliant, & ab igne vase detracto, adde aquae vitae vnc.  
 vj. liquefiant, & percolentur, & adde olei de Terebenthina vnc. iij. & in vitro vase cera obturato opti-  
 mè, & diligenter conseruetur, reliquum vulnus repluimus cephalico puluere ab Auicenna descripto,  
 ac deluper latam petiam lineam pluribus in locis perforatam cerato humano munit àdhiberi iussimus:  
 cum verò perfectam loci restitucionem nouimus, solo melle rosaceo, ac cerato praedicto vsi fuimus, &  
 Deo fauente iuuenem sanitati reddidimus. vexabatur tamen quadam linguae balburie, & oppositi bra-  
 chij mollitie. longo quidem experimento nouimus omnes ferè ab his viceribus Dei nutu liberatos, ali-  
 qui symptomate ex his, quae cerebro affecto apparere solent, detineri. Oleum de Terebenthina sic para-  
 tur. Recip. Terebenthinae clarae, & odoratae lib. iij. arenae fluuiorum depuratae, lotae, & siccae, aut viri con-  
 tuli lib. j. s. omnia in curua bocca cū suo recipiente ponantur, & bocca in vase terreo, inter quod, & boc-  
 ca cinis in ea ad sit copia, quod nullo modo tangi possint: & lento igne, ne terebenthina tumeat, & infla-  
 tur, fiat elambicatio: & quod primò distillat, aequum est, ac nullius momenti: quod secundò, coloris auro  
 obcurioris, ac densioris substantiae, optimum est, ac vsui seruandum: quod tertio, atrum, & ceno simile  
 est, probatur in viceribus tibiarum antiquis, & cacohere. aut Recip. Terebenthinae clarae lib. ij. laterum  
 recentium lib. s. masticis, styracis, an. vnc. j. lateres igniti oleo extinguantur, & fracti miscerentur reliquis,  
 & per lambicum tres, vs dictum est, excipiuntur liquores, quorum secundus & tertius optimus est: hae  
 sunt, quae de simplici, ac composito capitis vulnere in praesenti dicere decreuimus, ad honorem, & glori-  
 Dei benedicti, qui sit laudatus in secula seculorum.

## De symptomatum profligatione. Cap. XV.

**S**YMP TOMATA, quae fracta caluaria contingunt, adeò sua interdū existunt, quòd  
 proprias causas superare videntur, ob id interdum postposita curatiua methodo,  
 illis, veluti causis vtgentioribus, & quae maius minùs periculum, incumbere licet:  
 sunt itaque (& si minima, ac debilia apparuerint, praesertim in die aliqua significati-  
 ua) summo perè verenda: & illi admodum decipiuntur, qui de ipsis dimissi omni co-  
 sideratione, curando simpliciter procedunt, nec ea, quae meningum, aut cerebri  
 passionibus propria sunt, ab aliorum communibus, secernere valēt, vnde multi hoc  
 errore ducti ad lēctiones, dilatationes, ac terabrationes inconsideratè procedunt: & hinc multa in dies  
 oriuntur incommoda; Natura (ait Galenus) & morbi species ex propriis accidentibus dignoscitur: ma-  
 gnitudo autem ex eorumdem vehemētia. quare diuinus Hippocrates a vulneratis petere in primis iubet,  
 vt nunquid mali, aut os, aut meninge, aut cerebrum sub telio senserint, pertransierint, & quantum sit, videat  
 tur: nempè si sine sensu quasi dormiens inuenerit, si oculi oboccati fuerint, si vertigo ipsum occupauerit, si  
 incompōsitè locutus fuerit, si bilem vomuerit, & similia, ac si vera indicia sint cerebri vulnerati, nam tunc  
 medicus, his apparentibus, ad operis celeritatem cogitur: secus verò prouident agat: externa enim, ac in-  
 terna symptomata (vt intemperies, & dolor) magna fiducia tractantur, cum timore verò nonnulla, vt in-  
 flammatio,

a Gal. primo  
 ad Glau. & 23.  
 meth.

b Gal. de crisi  
 22. 4. R. y de loco  
 alio cap. 7.

90 inflammatio, aut profunda corruptio, ob id nos primo de externis, ac internis partibus affectis, quomodo in propria temperie conservari debeant, & quomodo, si in contrariam lapſe fuerint, restituatur, potis prius causis, temperaturam transmutare potentibus, instituere decrevimus.

DE INAEQUALI TEMPERIE.

- TRANſſe** qualitates à Græcis difcrasie, à Latinis intemperies dicuntur, nonnunquam vulnera to capite superascuntur sine materia, dum qualitates tantum, aut ad calidum, aut ad frigidum, aut ad humidum, aut ad siccum alterantur, & simpliciter hæ qualitates hæc empirico medico raro considerantur, multoties ab aliquo succo diverso, præsertim tenui, & calido producitur, qui à sui intrinseco supremas partes petere solet, & ad affectas sedes facillime debuit, aut ratione doloris, aut à medica mento calido attrahente, aut à copia indumentorum, aut ab ambientis potentia, aut imprudentis chirurgi inepta actione, aut à pravo vitæ regimine, aut à causa aliqua occulta. Si ergo ad caliditatem intemperies inclinaverit, ex robore, aut colore florido, dolore, veficatione, & loci caliditate deprehenditur; in vulnere sanies modica, tenuis, subrubida, & acuta producitur; patiens à febricula non absoluitur, & inquietus apparet. tollitur hoc symptoma opportuna diæta, sanguinis missione, ac omni diversificatione generis, nempe clysteribus, frictionibus partium, quæ multum à vulnere distant, cucurbitulis, & ligaturis. nã sic novæ fluxiones reuellantur, & quod coniunctum est, facillime diffunditur: si decet alium mollire patienti, denudò medicamentum cologogum exhibear, veluti Casia, Manna, aut syrupus rosatus, vel violatus solutius; & quia frequenter affecta corpora cacochymia, aut plethora vexantur, victus tenuis, violentus videlicet, ac humidus infilstratur, vinum prohibetur, inflammata pars violaceo, ac rosato tepido perungatur; vulnus primis diebus rosaceo solo regatur, postmodum ex periclinione medicamento, lacte muliebri lotio: quæ verò vitiorem frigiditatem adepta sunt, dimittantur, ne præcepto Hippocratis materia ad intima retrocedat; talia sunt tamen, quæ qualitates contrariis sedem inflammationem ad temperiem reducant, affectus siquidem non curatur, nisi affecta sedes fuerit optimè disposita: si verò adtemperit (quod solum in contusis vulneribus aduenisse videtur) vt mala temperies frigida orta sit, locus albescit, aut liuidi coloris fit; frigidus æger, non dolet, mollis apparet, & sanies tenuis, & arida gignitur: nulla febris oritur, & somnolentus fit æger; tollitur hoc symptoma contrariis qualitatibus, nempe calcfactione facta primò pannis calidis, aut vino tepido imbutis: topica sunt temperata caliditatis, veluti emplastrum basilicon minus, citrinum, nigrum, regale, aut de gummi elemi; victus regimen mediocre, & vinum oligophoron, aut multa aqua dilutum sit. vt autem fluxa materia attenuetur, ac resoluatur, caput camomelino, ac rosaceo complexo irroretur, & si alium euacuare expediat, electuarium lenitium, aut cataplasma coctæ probantur: si verò humiditas multa locum obsecrit ex mollitie nota, quæ ad tactum percipitur, ex aliqua eleuata dimensione circa vulnus, cuius labia laxa sunt tumida, & decolorata, ac sanies multa, & tenuis videtur, suo quoque contrario proliganda erit; quare siccantium medicamentorum visus commendatur, præsertim foque ex vino nigro, beronica, stocade, roſis, myrris, balustijs, & aristolochia bullito: localia parantur ex pulueribus cephalicis tertij, aut quarti ordinis; probantur medicamentum ex lili solo, aut alteri admixto; cibaria sicca sint, & vinum pauciferum, ac, vt decet, euacuationes innoventur. Siccæ apparente temperie, aut ex aeris qualitate, aut ex medicamentorum potentia, aut ex assidua febre, aut ex cibi penuria, nulla, aut pauca in vulnere concoctio producitur, vulneris labra depressa videntur, coloris pallidi; cum vicina siccitate manifesta, tunc ea medicamenta tempestiuè applicantur, quæ temperatè humectant; expedit igitur caput oleo communi, aut rosaceo tepido oblinire, ac decoctio ex maluis, violis, & meliloto in vino albo tenui stupis in eo madidis cooperire; prodest etiam ad siccum locum aliunde humiditates attrahere, ac obstructions aperire; vulnus cunctis medicamento ex Terbinthina, Iuteo oui, & multo oleo rosato, aut vnguento ex matresylua, corticibus thuris, & lepo hircino; ratio victus satis laeta fit, euacuationes non probantur, nisi adhibitis clysteribus. Intemperies igitur omnis, quæ exterius apparere solet, his indicationibus, ac remedijs tollitur, præsertim si vulnus quò ad ea, quæ circa ipsum pertinent, potest se habere videatur, omni seruata consideratione, ne internæ partes afficiantur, nam plerumque cruciari solent, & inde inflammatione affici, & alia accidentia & fortiora & fauorosa demonſtrantur, febris intenditur, capitis dolores augentur, rigores inordinati perseuerant, & cõuulsiones oriuntur. vltimò alienant, qui sic affecti sunt, & tandem moriuntur.

DE DOLORE.

- N**ovæ accidentia seu, quæ vulnerato capite suboriuntur, dolor est, siquidem in eius remotio ne temporis latitudinem non expectat, si potens est, si etiam si purum ab excrementis totum corpus fuerit, fluxiones irritat. particula nanque, quæ dolore affligatur, sanguinem, ac succum diversum ad se trahit, copiosius scilicet, quàm sit illi ex vi, unde inflammationes in ea frequenter excitantur; vehemens dolor, & febre adducit, repentinè facit mutationes, virtutes & proflernit, digressionem corrumpit, somnum tollit, & est causa mortis: ob id inter acuta symptomata numeratur, cui, dum apparet, omnino studio incumbendum est: quàm plurimæ sunt causæ, hoc symptoma in vulneribus capitis commouere potentes, nepe mala temperatura, quæ dum violentè continuum aut alterat, aut soluit, commouet

511. de e  
bus princip. 6.  
& 6. Aphor. 3. 6.  
b. 9. Hipp. lib. 2.  
Veneris. Gal.  
3. meth. cap. 8.  
de 4. meth. 6. 2.  
Ausc. 4. 1. c. 2. 2.  
de 1. 3. 2. 2. 2. 2. 2.  
2. 2.  
c. 5. Gal. lib. 2.  
cap. de de. 1. 2.  
de Gal. 3. 1. 2. 2.  
cap. 4. Paul. 2.  
4. 2. 2. 2. 2.

d. 9. Gal. 2. de  
fe. feb. ca. 1. 2. 2.  
Aphor. 2. 2. 2. 2.  
3. meth. c. 4.  
d. 9. Gal. 2. de  
comp. an. 2. 2. 2.  
2. 2.  
c. 9. Gal. 2. de  
loc. aff. c. 1. 2. 2.  
meth. cap. 7. 2.  
proph. c. 1. 2. 2.  
lib. 2. 2. 2. 2. 2.  
cap. 2. 2.

ratur, natura pariter, ac partis lesa compositio dolores promouet, ut sunt tempora, ubi musculi illi, quos  
 Græci crotaphites, & Latini temporales vocant, locantur; quapropter Hippocrates omnia loca capitis se  
 care iubet præter tempora, inquit ipse: Vbi caput incidendum sit, cæteræ eius partes tutò inciduntur, tem-  
 pus, & regio superior iuxta venam, quæ per tempora scitur, hic inquam locus scalpello attingi nõ debet;  
 cum enim, qui incisus fuerit, neruorum diffusio prehendat acriter etiam, & acuta medicamenta dolores  
 moueant, idem facit aliquid extraneum in vulnere contentum, aut aliquid eo pungens, aut grauius, aut  
 praua patientis diœta, aut aliqua causa occulta. Tollantur igitur cause, quæ sensibus subiunguntur, ea  
 ratione, quæ tolli possunt, hoc seruato, ne noxa aliqua nobilibus partibus cõtribuat. si verò additæ fue-  
 rint, optinui in his (nisi etas prohibear, & vis vitalis inbecilla appareat) curationis initio à sãguinis emissio-  
 ne mollior, & congruis superfluis ibidem in capite vi, lanas oleo dulci, aut rosæco madidas ipsi circumpo-  
 tes; at si prohibeat propter horũ aliquid, veluti ætatẽ, aut virũ inbecillitatẽ, aut etiã, propter vtriusq; 30  
 sanguinis detractionẽ tẽtare, clystere ventrem euacuabimus, & omnibus modis materias reuellemus; ab  
 fluitare tales oportet à vino, & cibi satietate, præsertim si febre afficiuntur. Alteram doloris causam, quæ  
 sub occulta dispositione continetur, Paulus, & Auicenna <sup>a</sup> assignare videntur; sit enim in eo scũ, qui  
 in capite etiam alijs ex causis fieri videtur, in quo, continuatè cutis integra existente, ortus abscessus qui  
 scõtus fuerit, offensam ibi hominis caluariam fuisse, repertum est; quæ ratione dolores etiam acuti præ-  
 cessere, donec causa absumpta fuerit; porro <sup>c</sup> si aliquid inflammationis pericranij communione, quæ per  
 suturas cum dura membrana habet, etiam intra caluariam transmissum fuerit, eiusmodi capitis dolor per  
 riculo non vacat; quibus etiã dispositio intra caluariam est, his ad oculorum radices dolores perueniunt,  
 & sæpe moriuntur, ob id, quia oculorum tunica à membranis cerebri oriuntur; cæterum non raro acci-  
 dit in ruinis ab alto aliquam cerebri, aut membranarum particulam abruptam, quod ubi contingit, adhuc 30  
 magis capitis dolor vehementior euadit, & dispositio tota curatu difficilior fit, & periculum præsentius,  
 & vehementius ostendit. Ait Hippocrates; <sup>d</sup> Si venæ circa cerebrum sanguinem superuenerint, ac ce-  
 rebrum calefecerint, febris emergit fortis, & dolor ad tempora, & scincipur, & postero rem capitis par-  
 tem extenditur, & aures tinnunt, ac statu implentur, & nihil audit, & anxius est, & se ipsum præ dolore  
 iactat, hic quinta, aut sexta de moritur. secus verò de venis in cerebro credit Aristoteles <sup>e</sup> (sub his verbis)  
 Cerebrum omnibus priuatum sanguine est, nec venam intra se villam continet, & ad tactum frigidum na-  
 tura est; interdum <sup>f</sup> doloris causæ externæ sunt, nempe indumentorum copias, & cataplasmatum natura,  
 & simile præsertim in his, qui calidi cerebri sunt, nec pondus in capite ferre possunt; signis ex carbonibus,  
 mali odores, vapores putridi, status australis, rumores, strepitus, & clamores caput lædere solent; non ul-  
 li etiam confortij lege si exiguis quidam in ventriculo, & magis in eius orificio humor acris collectus 40  
 fuerit, illico capite dolent; eodem modo multi à cibo diutius abstinentes offenduntur; angustia enim ip-  
 sis propter longam inedia talium humorum puritatem; acutatur igitur eos, qui sic inestantur, oportet, ni-  
 hil capiti admoventes, siquidem neque vilius peculiare affectum sustinent, sed corpus conuenienti nutri-  
 mento nutrire, aut noxios ventriculi humores celeritè euacuare, & omnem manifestam causam remo-  
 uere; In omni dolore à causa interna (ait Rasis) qui perseverauerit, corpus fluxibile reddatur, cibis do-  
 eratur, & vinum ex toto prohibeatur, & si inflammationis initium apparuerit, sanguis mittatur, & clyste-  
 res acuti administrantur; sic enim vires validiores redduntur, ut doloris causas per sensibiles, aut insensi-  
 biles euacuationes absolvere possint, veluti per scesselum, aut lotium, aut sudorem, aut vomitum, aut ali-  
 quem abscessum, dum tales alicui facili euacuationi paratæ fuerint; porro vires validas reddunt, quies,  
 somnus, cibi boni, facili concocitio, & leues frictiones, quæ postea per poros cranij, & angustos meatus 50  
 insensibiliter dolorum causas discutunt; nec ab re interdum est caput leui oxyrodino perungere, aut,  
 ut ipse Rasis inquit, & carapalasma applicetur ex succo soliorum salicis, myrti, oleo rosato, vino nigro odo-  
 rifero, myrrhæ, tertula campana, calamo aromatico, alumine cameno, & bolæarmeno, aut ex folijs myr-  
 ti, menthalis, vitis, & simplicibus. Hæc omnia Auicenna <sup>b</sup> Arabum auctoritate approbavit in foda sine vul-  
 nere, & inquit; Fortasse contentus eris oleis, & rectò agit, qui eis vitur tepidis. His remedijs dolores  
 capitis, dimissis narcoticis, id est stuporem inducentibus medicinis, tolli solent;

## DE INFLAMMATIONE EXTERNA.



Vulnerato capite, si qua externa inflammatio suboritur, sæpe semper à bilioso sanguine gigni-  
 tur, cum talis humor sui natura suprema petat, & raro alter humor huic sedi, præterquam in con-  
 tibus, noxam præstat, siquidem pituita in eis delibere apta est cum igitur alicuius fluxionis initio  
 demonstratur, & ne locus inflammetur, tumor adest, quod <sup>a</sup> dignoscitur ex colore loci, calore, dolore, &  
 dimensione. causa tunc efficiens, tum materialis illico perquiratur, nam exmet esse possunt, quas in internis  
 febribus descripsimus; quapropter si qua fuerit nota, tollatur. secus verò inflammationis tempus con-  
 sideretur, ve loco, & tempore præsidia adhibeantur, nam <sup>b</sup> vulnera curari nequeunt, nisi finita inflamma-  
 tiōe; in hoc autem diligens Medicus requiritur, ne naturæ operationibus aduersetur, quod est præceptum  
 Hippocratis, dum inquit: Quæ ducere oportet, quò maximò natura vergit, per loca consentanea ea du-  
 cere, ob id motus omnis consideretur, si enim <sup>c</sup> erysipelas, & vnaquæque inflammatio ad extra verti bo-  
 num sit, procul sit, id est quæ repellunt, & prohibent, dimittantur: porro late inanius prohibendum est  
 dicta,

a Gal. 1. c. 90.  
 b Gal. 1. c. 90.  
 c Gal. 1. c. 90.  
 d Gal. 1. c. 90.  
 e Gal. 1. c. 90.  
 f Gal. 1. c. 90.

g Gal. 1. c. 90.  
 h Gal. 1. c. 90.  
 i Gal. 1. c. 90.  
 k Gal. 1. c. 90.  
 l Gal. 1. c. 90.  
 m Gal. 1. c. 90.

n Gal. 1. c. 90.  
 o Gal. 1. c. 90.  
 p Gal. 1. c. 90.  
 q Gal. 1. c. 90.  
 r Gal. 1. c. 90.  
 s Gal. 1. c. 90.

t Gal. 1. c. 90.  
 u Gal. 1. c. 90.  
 v Gal. 1. c. 90.  
 w Gal. 1. c. 90.  
 x Gal. 1. c. 90.  
 y Gal. 1. c. 90.  
 z Gal. 1. c. 90.



- 10 diarta, & euacuacione. Sic enim precipit Hippocrates, <sup>a</sup> dicens, Vbi autem in vulnere capitis siue scetio adhibita sit, siue non, tumor rubicundus, & ad erysipelatis naturam accedens, in facie, atque oculis, vel vtriusque, vel alterutro oritur, isque tactus doleat, febris item superueniens, & grauis horrore vixus verò, quòd ad carnem pertinet, rectè se habere videatur, os, & quæ iuxta vlcus sunt, rectè procedant. excepto faciei tumore, cui nullus alius error in vltus ratione adjiciatur, alius homini ducenda est, dato medicamento, quod bilem moueat: post purgationem febris cessat, tumor finitur, & sanitas restituitur. Sed, cum medicamentum datur, attendenda sunt vires hominis, vt valeant. Nec quidem hoc casu expellenda est materia: concoctio, nihil de sanguinis missione, pura bile peccante, memorie ibi prodidit Hippocrates; sed alibi <sup>b</sup>, si tumor à materia, aut mixta, aut crassa prodiderit, sanguinem mittit. insuper humores, qui adhuc supererint, quieti, iterapijs, decoctis, frictionibus, & conuenienti diarta, seruari debent.
- 20 Topica sunt oleum rosaceum: nam de eo dicebat Galenus; <sup>c</sup> Rosaceum verò vt potè eius natura olei, rosæque in medio est, in inflammationum augmentis optimum est remedium: at si inflammatio ad constitutionem deuenerit, & partes vulnere proximæ occupauerit, tunc quod fluxum est, discutitur, & quod fluxit, reprimatur: tunc ergò rosaceum, & myrrinum vnà probantur, aut cataplasma tale applicetur. Recip. medullæ panis aqua rosacea, & addito puluere rosarum, myrtillorum, violarum, betonicæ, & oleo rosato fiat emplastrum: & si tumor ad delitescentiam inclinauerit, caput totum rosaceo maturo, & camomellino tepido pluries irroretur, aut emplastrum adhibeatur ex floribus rosarum, meliloti, betonicæ, camomillæ an. m. j. farinæ fænuigræci, hordci, feminis lini an. vnc. ij. rob. olei rosati an. q. s. misce & fiat emplastrum: discusso tumore accidentia minuuntur, & tunc discutendi, & exsiccandi indicatio est oportuna. igitur inuncto capite rosaceo, & masticino, tale applicetur emplastrum. Medullæ panis, pulpæ passulæ rum an. vnc. ij. florum camomillæ, meliloti, rosarum, siccados an. vnc. s. farinæ fabarum, hordci, fænuigræci an. vnc. j. mellis crudi vnc. ij. lixiij. clari q. s. & fiat emplastrum: si autem materie copia in aliquo sinu coaceruatur, agente in ea calore mixto ex naturali, & præter naturam, ad suppurationem tendit, quod cognoscitur auctore Hippocrate ex eleuata dimensione, febre, & dolore, tunc sedis affectæ vis corroboratur, & innatus calor referetur, ne diffilari possit, & tunc triapharmacum, quod & macedonium vocatur à multis, a probatur. paratur ex aqua communi, oleo oliuari, & farina triticea: aut ex farina triticea, decocto caricarum, passularum, & foliorum maluæ, rosaceo, & a dipe fuilo: concocta materia, in decliui parte exitus fiat, & ea obferuntur, quæ capite octauo explicauimus. vulnus hoc interim opportunis indicationibus regatur. Et hoc vnum perpetuò obseruandum est, quod à Chirurgis non obferuntur, nisi ab his, qui Hippocraticam methodum sectantur, quòd non raro aut ab acre, aut medicamento erodente, aut
- 40 incepta operatione pericranium inflammatur, & confortij lege interior meninx afficitur, & sequa occurrit accidentia, & mors; vulnus decoloratur redditur, labra tenuia fiunt, & ab offe separantur: tunica languet, febris augetur, sanies aquea fit, & mali odoris; inde delirium sequitur, cõuulsiones gignuntur; vltimò molificationes subsequuntur, & mors.

DE INFLAMMATIONE INTERNA.



V<sup>u</sup> <sup>c</sup> cerebrum, aut eius membranæ inflammatione vexantur, dolor totum caput occupat, ea maximè part e, qua inflammatio constitit; aures sonitu replentur, auditus hebescit, & venæ temporum ex tæ sunt, & pulsant, febris continua augebit, pulsus durus apparet, rigores inordinati perferuntur, & dolor nunquam cessat, oculi rubescunt, facies nigrescit, lingua alpera fit, ac pulsus repletur, vulnus liuescit, nec proprium seruat colorem, & saniem modicam, ac tenuem emittit, & carnem sale conditam repræsentat; laborans mente non constat, distensio in altera corporis parte supernasclitur, attonitus fit, & moritur. si verò inflammatio anteriorem capitis partem occupauerit, potentia imaginatiua corrumpitur, & tunc patientes manus ad faciem admovent, vt inde quidpiam superuacue inquirat, aut frustra mulcas venantur, aut festucas colligunt, aut de veste pilos euellunt, aut de pariete paleas, & falsa perpetuò imaginantur: si autem mediam sedem percussit, cogitatio virtus destruitur, vnde patientes facillimè irascuntur, incompotitè loquuntur, ridet, somno priuantur, & si dormiunt, aut ignem, aut ignitas res videre imaginantur, à somno timentes surgunt, & facias, quibus caput auolutum tenebant, la cerant, medicamenta abijciunt, & vulnus frigido acri obijciunt, quod exsiccat, & patientes moriuntur: cumq; posterior pars inflamatur, memoria perturbatur, facillimè obliuiscuntur quæquid tunc dixerint, aut petierint, aut ostenderint: at si tota regio capitis accenditur, accidentia omnia, aut maior eorum pars apparere solent, quæ omnia nò illic, sed tractu tēporis dignoscuntur. Harum inflammationum varij sunt causæ, nempe os aliquod meningis pungens, aut lacerans, aut frigus, aut caliditas, aut vini potus, aut praua chirurgia, aut dispositio aliqua oculica, veluti interior tractura venularum ocularum, aut materie copia super meningas contentæ, aut acris humoris quædā fluxio, inter dū à vicinis partibus transmissi, aut ibi geniti, quæ omnes causæ aut per se solæ, & singulatim, aut commixtæ hos prauos affectus producere aptæ sunt, quorum initium (vt ait Auicenna) <sup>d</sup> dignoscitur, quia si in illo, qui habet hoc impedimētum, appareat febris, & contrahatur intellectus tunc iam incipit apostlemari; augmentum verò ob rigorum vehemenciam, nam dicebat Princeps <sup>e</sup>; Et quandoque accidit rigor, propterea quia relictus calor ad interiora, sicut fit in apostematibus in iussicis, & sunt rigores pericrurantes, quibus intensior calor non subsequitur;

<sup>a</sup> Lib. de Col. curat. Gal. 4. n. e. th. cap. 6. Paul. lib. 6. cap. 90.

<sup>b</sup> Lib. de fr. dionis.

<sup>c</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>d</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>e</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>f</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>g</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>h</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>i</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>j</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>k</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>l</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>m</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>n</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>o</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>p</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.

<sup>q</sup> 1. de comp. ma. 1. loc. vbi de soda à percent. 3. de Len. c. 16.



a Gal. de hoc.  
alio. cap. 3. a. de  
tunc. caul. ca.  
vii.  
b Auz. l. 1. p. 123.  
c Gal. cap. 1.

subsequitur; porro si talis inflammatio in panniculis orta, calida fuerit, à Græcis \* phrenesis, ab Arabi- 10  
bus \* Sirien, & Karabitus, & à Latinis membranarum inflammatio vocatur, aut cerebri, potissimum mem-  
brarum, ob id quia venarum, ac arteriarum maiorem copiam continent, & earum substantia densior  
est; quare facilius inflammationes ferre possunt; cerebrum verò dum affligitur, quia molle, humidum, fri-  
gidum, ac dissolubile non, nisi à potentissima causa, occupatur: hac ratione sphaelo interdum corripitur,  
& illico mens turbatur, & vita perit; quod illi occurrit, dum in eo extra venas sanguis effunditur, ac extra  
venas continetur; & ideo hæc phrenesis vera non est, sicuti velaminum inflammatio, quæ in eius initio cu-  
rari solet, causam removendo, si sensibus subicitur: si verò occulta, absumatur omni diversionum gene- 10  
re, & sit sua sollicitudo, & finis in intentione ad hoc, ut dolore sedes, ait Auicenna, in quantum potest, &  
elonges materiam à loco laevo, aut cum evacuatione, aut attractione ad contrarium, & non apostemetur:  
primum ergo, quod te oportet facere, est phlebotomia cephalicæ, aut nigra: si autem est repletio, oportet 10  
præterea clysteribus acutis, scilicet cum pulpa coloquintida: & si intensæ apparuerit febris, clyster equa-

e Gal. 3. ca. 7.  
Auz. l. 1. p. 123.  
3 cap. 4.

bis: primò ergo sanguis mittatur à propinquiori sede lateris vulnerarij: interdum etiam, auctore Paulo, sub 40  
lingua, si materia fuerit subtilis; cibus minuatur, vinū ex toto detrahatur, materia diuertatur friccionibus,  
excubitis, ligaturis, & clysteribus: localia verò ea sunt, quæ in inflammationum initio probantur, nempe  
oleum totum rude, siue omphacinum tepidum: in incremento inflammationis in auribus ea, quæ cali-  
ditatem remittunt, infillare oportet, sicut est rosaceum, & violaceum oleum; occipitium, spinam, ac su-  
bascellia rosaceo, ac gallinæ pinguedine humectare; & si decet, caput totū cooperiatur cataplasmate  
ex farina hordeacea, seminum lini, oleo rosato, & sapa, calida omnia dimittantur, præsertim indurætorum  
copia; si quidem immoderatus calor ex multis pannis, stupis, pellicis, calidiori conclusio, calidioribus  
medicamentis excitari solet; ob id Hippocrates in his nec fascias tantum applicare ausus erat: si autem 30  
inflammatio perseverare videatur, quod diagnosci ex symptomatum fortitudine, & augmento, & ni-  
hil prohibet, medicamento, quod bilem purgare possit, patientem evacue expedit, & illud probatur,  
quod validum, & leue est, validum nempe, ut à capite diuertat, & evacuet; leue, ut semel, aut bis tantum  
purgare possit absque caliditate, & violentia, nam dictum est ab Hippocrate, \* febricitans caput ne pur-  
gato, ne furiosus fiat; calcesciunt enim caput pharmaca purgatiua, nam si ad caliditatem febrilem accedit, id, 30  
quod in medicamento est, insanis facit. ob id dicebat Auicenna; Si apostema calidum perseverat, & non est  
aliquod, quod prohibeat fumere medicamentum solutivum solvens semel, fiat illud, nam sic præcipit Hip-  
pocrates; attamen in novis Auicennæ correctionibus ab Andrea Bellunensi nuper in lucem editis, dictio  
illa, semel, non legitur, & textus ille sic sonat: Si apostema calidum perseverat, & non est aliquod, quod  
prohibeat omnino fumere medicamentum solutivum, fiat illud, nam sic præcipit Hippocrates, quod etiam 40  
firmat Paulus sub his verbis: Si pleurit inflammatio, & nihil aliud prohibet, medicamentum, quod bilem ducent

d Gal. de hoc.  
in homine.  
de libro de medic.  
purgat.

de est, purgare ipsos Hippocrates præcipit, igitur in antiquo Auicennæ Codice dictio illa, semel, tolla-  
tur, & eius loco, bilem, ponatur, ut una cum Hippocrate, & Paulo sententia intelligatur, siquidem ratio  
hoc demonstrat, non enim medici munus est, pharmacum exhibere, quod semel, sicut bilem, evacue  
possit, possit fortassis textus ille Auicennæ sic intelligi: si inflammatio perseverat, & nihil prohibet, se-  
mel fumere medicamentum, quod bilem soluat, fiat illud, & unum notare expedit, quod Hippocrates bi-  
lem evacuat, vulnere bene se habente, sed facie insuamata tantum, & ignis sacri speciem referente, & ni-  
hil de cerebro, aut meningis inflammatis memoriæ prodidit, hæc de causa multi sanguinis missionem, &  
clysteriorum usum in affectibus intrinsecis magis, quam pharmacum, approbant; tamen, urgente cau-  
sa bile expurgandi, medicamento aliquo eradicante vti non expedit, veluti antiquorum mos erat, sed si 50  
nirius omni caliditate expoliatus sit, ut est calia, tamarindi, mirobalani, manna, reubarbari, aut syrupus ro-  
satus solutivus, aut simile medicamentum benedictum, quod vi movere non possit, ne materia crudeæ mo-  
veatur, & ad affectum partem concurrant, siquidem scammonea casti corrigi minimè possunt, quin pri-  
maris, ac nobilibus membris noxam inferant, & quæ vi evacuant, ventriculum offendunt, inde pravi gi-  
gnuntur humores, qui, si evacuationi apti non fuerint, conturbantur, & moventur, & ad affectas partes sa-  
cillime ascendunt, & capiti nocumentum afferunt, & ut ait Hippocrates, insaniam producant, id est phre-  
nesin, & membranarum inflammationem, hac ratione Galenus \* in acutis morbis medicamentum eradica-  
tivè evacuant dari prohibet, nec ob id tantum, quod morbus acutus est: sed quia perpetuò febris adest,  
quod augetur, & vapores mali caput petentes inflammationes excitant, porro s felices evacuationes co-  
gnoscentur concocta materia, concoctiones verò non, nisi in chronicis, expectantur, hac ratione præla 60  
ristissimi medici cerebro inflammato magis phlebotomia, quam pharmacum, approbant, in cacochymis  
à mediana, in plethoribus à capitali vena eiusdem lateris, cuius Hippocratis \* methodus servatur, si  
qualia oportet purgari, purgentur, confert, & faciliè ferunt; si contra, difficulter, porro secta vena, sanguis  
in ea copia mittatur, quæ desideratur; secus verò à pharmaco, qualecunque fuerit id evincere solet, ideo  
in Aphorismi scriptum est: \* In acutis passionibus raro, & in principijs medicinis purgantibus vti, qua-  
re dicebat Galenus: \* Si minus quidem auxilium per sanguinis missionem, quam per purgationem, sequi  
tur in morbis acutis, securius tamen multò existit, immo nullum ex eo, quod per scissionem venæ fit, peri-  
culum impendit, eo discrimen maximum subeunte, quod per purgationem renatur, & potissimum, si  
laborantis naturam expertus quis non fuerit, nempe difficulter alij natura purgantur, alij modico as-  
sumpto

e Gal. lib. 9.  
cap. 1.

f Gal. 1. reg. ac. ed.  
11. de 12. & 13.  
Aph. com. 14.  
g Hipp. lib. de  
humoribus. de  
1. Aphor. 12.  
Gal. 1. de erod.  
cap. 8.  
h Gal. 1. Aph.  
com. 14. g. Aph.  
com. 16. Auz.  
4. 1. cap. 5.  
i Gal. de medic.  
purgat. 1.  
Aph. 1. 4. Aph.  
3. de 5. de 6. Expi-  
derantur.  
k Gal. 1. Aphor. 14.  
l Gal. 1. reg. ac. ed.  
12.



vtemur, quod si nō iuuat, medicamento lide interdum, & ægyptiaco tutō vti decet; si verō nigredo non cedit, calorem illius partis emortuum iudicabimus. Adhuc notare oportet, quod interdum quā dā mollis caro adeo concreuit, vt similis tumoris formā præferat, quæ vnguentorum applicatione augur; quare tunc ad ea, quæ valde ficcant, deuenire opus est.

## D E F E B R E.

**E**stis, quæ apostema comitatur, quod alicui membrorum nobilium incipiendo innascitur, mala est, & illa peior, quæ sequitur ad inflammationem panniculorū cerebri. ipsa nanque est febris phreneticus; dictum est à principe; In illo, qui paritur lodam à percussione, si apparet febris, & conturbatur intellectus, tunc iam incipit apostemari, & si vñus perueniat ad cerebrū, & apparet febris, & vomitus coleræ, non est qui sanetur, nisi rarō: potest quippe interdum non multo timore in caluaria fracta febris oriri, præsertim in ætate ante septimā, & in hyeme ante decimā diem, aut ratione doloris, aut animi affectuum, aut bilis motus, aut longæ inediæ, aut dum pus conficitur, aut retentis corporis excrementis, aut si aliquod extrinsecum apparuerit erysipelas: concentratur inrer dum natura in his motibus expulsiuis, & rigores subsequitur, postea florido colore locus alatur, & febris quiescit, nec ob id vulnus eo modo exsiccat, sicuti in occulta inflammatione, tunc enim febris a dens perpe tuo patientem affligit, & rigores inordinati, ac diuersi perseverant, ac si febres plures, ac inordinatæ, & mali modi, adesse suffocant denique innato calore, & languida facta nutritiua virtute, vulnus siccum redditur, sit mali odoris, os luescit, inde ob intentum calorem nigrescit, & teredine afficitur, lingua arida fit, ac ob humoris acredinem, qui continuō à cerebro ad os destillat, pustulis repletur, & alcola, siue vlcuscula, aphræ à Grecis dicitur, per os producuntur, tandē qui si affecti sunt, conuelluntur in opposito latere, mollificantur in proprio, postremō mente non constant, & moriuntur; febris tamen primō apparet mitis quidem, non multi caloris, quæ si in quarta, aut septima, aut vndecima, aut decima quarta die oritur, mortem futuram indicari, iudicatur à plerisque, si quidem quarta vulneris die inceptit, ad vnde cimam; septima, aut decimā quartam, aut decimā septimā si verō vndecima, aut vigesimā: porro si in febris initio aut delirium, aut aliqua conuulsio orta fuerit, malè præfigere oportet, nisi omnino ex optimis signis criticis aliquod apparuerit, aut virium robur adit; optima nempe signa hæc sunt, copiosa è naribus sanguinis emanatio, aliquod extrinsecū, erysipelas, aut aliud simile, quod perfrictam crissim ostendat, & tunc, ait Hippocrates; Si vulnerati sunt conualescentes, in parte aliqua corporis perpetuō patiuntur, nec febris quidem terrere debet, si in magno vulnere, dum inflammatio est, permancit illa perniciosa est, quæ vel leui vulnere superuenit, vel vltra tempus inflammationis durat, vel delirium mouet, vel si neruorum rigor, aut dissentio, quæ ex febre orta est, eam non hinc, si quidem dictum est in libro separatorem sermonum: Febrim conuulsioni melius est superuenire, quam febris conuulsionem. & qui à neruorum conuulsione detinentur, aut dissentione, febre superueniente, liberantur: hæc febris fœlita est magna ex parte suo calore extenuare, atque dissolvere conuulsionis causam: illa verō febris fœlubris est, quæ, orta inflammatione extrinseca, superuenit vulnere bene se habente, aliter perniciofa iudicatur. Vrinæ in febribus ex occulta inflammatione claræ, & crudæ malæ sunt, arguent nempe calorem innatum circa materiam internam occupatam esse: illæ i pessimæ sunt, si albæ, & perspicuæ minguntur, & magis, si patiens delirio affligitur; Nunquā delirantem, ait Galenus, cum his vrinis saluatum vidi. Cū igitur vulnerato capite, aut fracta caluaria, febris oritur, quæ nec Ephimera, nec humoralis, siue putrida fuerit, nullum seruans typum, aut periodum, sed assidua, alijs prauis symptomatibus, quæ Inflammationis initium, aut cerebri, aut meningarum portendunt, associata, victus regim: an attenuetur; qui, vt docet Hippocrates, frigidus, & humidus sit, veluti prifana hordeacea est, aut panatella cum saccharo, & lacte anygdalidarum, aut seminum melonum: potus aqua decocta sit, addito vino granatorum, & zupilio rosato. Si virtus constet, denud capitalis vena aperiatur: & si corpus plurimū bile scatuerit, medicamento ca lologo euacuetur, humores serapijs opportunis æquantur, veluti de Endiuiā, rosatus, & de cichorea cum aquis, aut decoctis conuenientibus; omne genus diuersionum probatur, postissimum verō similitum clysteriorum vñus. Recip. foliorum maluæ, violarum, scariolæ, lactuæ, bletæ an. m. j. decoquantur in communi aqua, & Recip. prædicti decocti vñ. x. & adde mellis violati, Zuechari rubei an. vñ. j. olei violati vñ. i. j. casie extractæ vñ. j. ouorum vitellos n. j. salis cochlearis m. i. miscæ, & har clyster; spina rota rosaceo vnguento, muliebri lacte, & violaceo oleo inungatur, & vulnus indicationibus proprijs regatur.

## D E A L I E N A T I O N E.

**V**l capite vulnerato mentis perturbatione vexantur, si alia internæ inflammationis signa adfuerint, fac erit tales solis Presbiteris relinquere: nam in meningis, aut cerebro facta est inflammatio, aut iam sit: quod si facta est, curationem expectare non licet, & minus, si per se accidens fuerit, & non consortij lege, omne quidem delirium, principem facultatis moriatur, ac in intellectus partem operatitius causæ duæ sunt, internæ, & externæ. internæ prauis lucci sunt, aut vapores niali, cerebri ventriculo corruptentes, nam æpe à ventriculo vapores ascendentes, aut subtiles materię ad caput, intellectus operationes perturbant, vnde vulnerati mentis compotes non sunt: inediæ pariter, quæ

a Hipp. l. 1. pro  
dict. aph. 1. & 2.  
Alm. cap. 1. f.

b 1. j. aph. 1. & 2.  
c 1. j. aph. 1. & 2.  
d 1.

d 1. Hipp. l. 1. p. 2.  
e 1.

e 1. Gal. l. de cri  
s.

f 1. Gal. l. 1. vñ  
de ratione vi  
deus vulneris.

g 1. Aph. l. 1. f.  
h Aph. l. 1. f.  
i de morbu

j 1. Hipp. l. 1. de  
c l. corac.  
k Hipp. l. 1. de  
c 1. p. p. p. &  
l Aph. l. 1. f.

m 1. Hipp. l. 1. f.  
n 1. Hipp. l. 1. f.  
o Aph. l. 1. f.

p 1. Gal. l. de lo.  
q 1. c. 1. f. de loc.  
r 1. cap. 1. Ratis  
gud Alm. c. 1. f.  
s 1. Alm. c. 1. f.  
t 1. c. 1. f.  
u 1. Gal. l. de lo.  
v 1. c. 1. f. de lo.  
w 1. c. 1. f. de lo.  
x 1. Gal. l. de not.  
y 1. Alm. c. 1. f.

10. quæ modum excidunt, præsertim in his, qui valde concoquunt, præter alia, febrem, & alienationē produciunt, quæ tamen (ait Paulus) phrenesis non est, sed delirium ex consortio ortum hac ratione diuinus Hippocrates in victus regimine aliquid dabit ætati, consuetudini, & anni temporis; procaritæ verò, siue extrinse sunt res purgentes, aut comprimentes meningas, aut cerebrum, quibus remotis, statim & effectus remouetur: porro, si causa abdita fuerit, & corpus plenum, victus attenuetur, aer alteretur, somnus reconciliatur, vena cephalica brachij, aut frontis, aut nasi extremitate scietur, aut ab hæmorrhoidibus si quis mittatur, hirsutines post aures applicentur, cucurbitularum visus, frictions, ligaturæ, balnea, & omne augmenum, quod à capite reuellere possit, probatur: verum, si nihil prohibet, medicamentum leue, quod bilem euacuet, dare oportet in initio caput oxyrhodino inungatur, in statu, quæ discutiunt, conueniunt; & si vltimus tale accidens processerit, nihil agendum est, sed naturæ totum opus committatur, siquidē qui tali desipientia, aut delirio tenetur, moriuntur.

DE VOCE DEPERDITA.

- E** A C V S S O capite, aut fracta caluaria, sæpe occurrit, vix intercipiatur, & patientes muti fiât, nec vllum quidem verbum proferre possint, & hoc potissimum indicium est, quod cerebrum male affligatur. nam scriptum est in Aphorismis, Quibus cerebrum aliqua ex causa concussum fuerit, necesse est, statim muros hærere: autem eodem modo, quo apoplectici, sensus ac motu destituti. cerebrum hoc modo interdum conuati contingit, propter aliquem casum totius corporis violentum, ex locis altioribus factum. tales enim casus in spinæ vertebrae concussionem facere soliti sunt, quando ipsa rum harmoniæ commotæ fuerint, spinalis verò medulla, quæ in eorum cauitate continetur, laboratur.
30. rit, ipsa verò valde concussa periculum adduxerit, ne aliquis nervus eorum, qui in ipsa nascuntur, abrumptur, quod non minus in ipso fit cerebro, idque magis, quânto plus vacui loca habent, quæ ipsam circumstant: quiescit enim patiens ob id, quia contrahitur vis animalis in se ipsam in talibus dispositionibus, à motu vehementi molestata, vnde murum, atque immobile totum iacet, quod ita afficitur, animal: quare dicebat Auicenna, Et ille, cui aduenit offensio, aut casus, aut aliud, & absconditur sermo eius, & inclinatur caput eius, & arefcit anhelitus, & sudæ frontis ipsius, moritur statim, quandoque etiam percussio, aut casus levis est, & curatur, & quandoque peruenit ad hoc, ut cerebrum permittitur, & percatinam continui solutio quandoque accidit in velaminibus cerebri, quandoque in eius substantia, & quandoque in eius venis, & sciuntur, & in his omnibus affectibus prædicta accidentia apparere solent: dictum s etiam est, & ille, qui cadit in caput, multo citius non loquitur, & cum remanet vsque ad tertium, & non minuitur, neque additur, tunc laudatur in tertio, & expectetur vsque ad septimum, & non moueatur ante illud cum aliquo, scilicet medicamento euacuante interius sumpto, aut manuum operationibus, præterquam in amplis, & manifestis fracturis, id quæto symptomate, ne à pugna natura distrahatur, cuius officium est internas læsiones corrigere. Nos verò sæpe vidimus, hoc apparente symptomate, eoque in eadem latitudine permanentem, cessare præterierit, patientes sanitati restitutos, quod ab Hippocrate sub his verbis probatur, Quibus cerebrum sphacelatum, id est, corruptum est, in tribus diebus percutitur, verò hos euaserint, si nihil sunt, potest siquidem cerebrum concussum aliquo modo ad sphacelum ire, nō tamen sphacelari, cum sphacelus sit vniuersalisque partis substantiæ corruptio: ob sui ergo nobilitatem cerebrum hanc dispositionem pati nequit, nec contingit hunc, qui sic aggroat, perferant, verum si ante triduum mors non sequitur, sed ad quartam patientes deuenerint, ob virum valetudinem, quæ morbum superare solet, ipsum declinare sperandum est. Nos verò hoc in loco per sphacelum inflammationem interpretati sumus, que in gā grānam terminari potest: solent nempe in his signa phrenesis primò apparere: postquam verò inflammatio exorta fuerit, gangræna gignitur, nam dictum est, Nisi præcesserit maxima inflammatio, non fit gangræna: porro omnes medici, excepto Serapione, cerebrum sphacelari cōstentur, cui Auicenna mirifice aduersatur, sed ad vocē amissam redeuntes, dicamus cū Hippocrate, Cum cerebrum nimium caletactum est, corrumpitur, & si de repente obmutescit, qui sic afficiuntur, in tribus diebus pereunt, verum si dormiunt, & ex naribus sanguis fluit, aut multum vrinae emittunt, ac septem dies transgrediuntur (plerique autem non transgrediuntur) euadere possunt: isti hoc tempore sola pituita nutrantur, videntur rumores, lumina, & quæcunque sonnum prohibere solent si verò hoc symptoma absumi nequit, ea ad vnguem observare oportet, quæ ad cerebri inflammationes valere explicauimus, vltimum ab externa causa oritur, potissimum ab aliquo ossis cerebrum lædente, quod dum contrahitur, nervos recurrentes, qui à sexto pari originem duunt, & lingue motum præstare solent, secum adducit, & retrahit, vnde vulnerati muti fiunt, quod probatur, dum conuulsiones initium apparet, cui interdum loquendi impotentia præcedit: cūque igitur causa dignoscitur, autatur si abscondita fuerit, sanguis mittatur à vena, cucurbitulæ apponantur, hæmorrhoides prouocentur, extrema laqueentur, leuiter tridentur, imponantur enemata cum hiera, & diaphonice, & si expedit corpus aliquo pharmaco euacuare, pilulæ cochineæ principatum tenent, caput totum rosaceo tepido humectetur, cui parum acetii addere licet. cumque verbum aliquod profertur inceptis, rosaceum, & camomellium summè conueniunt si verò nulla conuulsio solutio apparuerit, tale cataplasma toti capiti adhibeatur, Recip. sursum tritici vnc. iij. farinæ fabarum, seminum lini ani. vnc. ij. rosarum, camomillæ, betonicæ, meliloti, ster. c. 3. do an. m. j. absynthij, anethi, cortandor.

rum an. de ag. ij. quæ in puluerem contundi possunt, contundantur, inde omnia in vino nigro bulliant ad mellis consistentiam, & adde olei rosati, rob. an. q. s. pro emplastro, & si diu persequeretur hoc accidet, prædicto emplastro addatur calamentum, origanum, aslarum, pulegium, oleum masticianum, & luvium clarum, siquidem credendum est, magnam pituitæ copiam in capite contineri.

## DE CONVULSIONE

¶ Lib. de Co-  
ac. orom. & f.  
Aph. a. 1.  
¶ Lib. de Spas-  
m. ca. vlt. g. de  
ex. sym. ca. 2.  
de 6. Aph. a. 1.  
¶ Gal. 3. de ho.  
an. scap. 6. de f.  
Aph. com. 5.  
d. Hipp. 6. Aph.  
35. Gal. 3. Aph.  
com. 1. 6.



**C**onvulsio capite, convulsio apparuerit, mortem prædicat, nam dictum est ab Hippocrate, **C**onvulsio ex vulnere lethalis est, cum enim **l**acertorum capita, aut nervi aut tendones vi quadam ac involuntariis vetus eorum originem contrahunt, motus aliqui contracti aliorum partium sequuntur, qui Græcè spasmi, & Latine convulsiones dicuntur, hi **n**ec naturales, nec secundum hominis arbitrium sunt. Huius **s**ymptomatis causæ duæ sunt, aut nimia humorum copia, qua nervosæ partes repleri solent, qui dum per eas cerebro communicantur, volens id ab ea se exonerare, contrahitur, ad quem motum omnes partes, quæ illi annexæ sunt, aut ab eo originem ducunt, contrahuntur, & sunt convulsæ, & hic affectus ille est, qui fracta calvaria, & vulnerat nervis, occurrere solet, cui semper aliqua præcedit inflammatio affectus partis, aut in eo abundat copia humoris corrupti, aut veneno prædicti exsiccat interdum ex nimia humorum penuria nervosæ partes, præsertim naturalium, ac nutritiarum, & sunt convulsæ, & hæc secunda convulsiones species non lubitò, sed temporis intervallo, creatur, quæ alibi in tertio libro de hac re ad plenè tractaturi sumus, nihil amplius hic dicere decrevimus, sed far erit scire, quoddammodo si puncta fuerit, aut inflammatione affecta, aut cerebrum compressum, aut à materia diversâ corrupta alteratum, in eo primo genio, aut lege confortij sunt contractions convulsæ sedis oppositæ partium capitis vulneratarum, si vulnus latus occupaverit, si verò in media regione confisterit, ambae partes convelluntur, ut Antonino occurrit, quod **a**lijs corporis partibus non aduenit, quæ convelli nequeat, nisi præcesserit inflammatio manifesta, primò enim convelluntur partes, quæ inflammatione vexantur, inde noxa cerebro communicatur, postmodum totum corpus convulsio redditur, & sic nervorum distensiones sunt, cum ipsi musculi primò, ac præcipuè, deinde partes, ad quas perveniunt, ad suum principium contrahuntur. Huius symptomati præcedit sæpe docti dolor, postea nuchæ, vltimò capitis, & sunt partes fere immobiles, ac tense, & magna cum difficultate moventur, vulnus si cum reddidit, & qui sic affecti sunt, clamant, & libere verba proferre non possunt, vltimò contrahitur sepe, & suffocantur, præcedit interdum acutus oculorum dolor, aut fluxus diarrhæis, aut focum inuoluntariis fluxus, aut locij reddendi difficultas, & cum hæc accidentia apparent, moriuntur. Cùmque aliqua materialis convulsio apparuerit, teste Hippocrate, **o**pportunis evacuationibus curari solet, potissimum si causa interna fuerit, aut enim manifeste, ea quippe subtilia, absuntur, igitur si patiens plethoricus, aut cacochimicus laboraverit, evacuetur, aut sanguinis missione à capitali vena affectæ sedis, si habendo, ætas, virtus, & anni tempus id admiserit, & distensio ab inflammatione provenierit, aliter corpus acerbis clysteribus, aut medicamentis bilem ducentem moveatur, si verò pituitæ copia, aut crassi humoris abundaverit, Agaricus, Hierapicra, & pilulæ cochæ probantur, fin autem clysteria, caput purgia, siue apoplegmatica conveniunt, spina vbiq; ac sæpe, subalcellis, iugum, collum, ac vniuersæ partes convulsæ calente oleo communi, aut lilio rum, aut camomilla, addita gallinæ pinguedine, iungantur, interdum totam spinam, iundurasque omnes magna vitilitate illinire tali linimento cõsuevimus, Recip. olei violarum, amygdalarum dulcium an. vnc. iij. pinguedinis gallinæ, medullæ crurium vituli an. vnc. j. s. omnia simul bulliant in decocto maluarum, radicum althææ, & seminum lini, donec decoctum abluatur, colentur, & fiat linimentum.

¶ Gal. 3. Aph.  
com. 1.

¶ Libro de nar.  
hymna. lib. de  
facibus. & 3. Aph.  
com. 1. 1.

## De paralyti in parte affecta, &amp; convulsione in opposita, opiniones diuersæ.



**V**ia hæcenus ad plenum rationes & causas, cur convulsio in oppositis partibus sedis læsæ capitis intimè vulnere, at, & paralyti in proptijs oriatur, intelligere non potuimus, idè pro hac indaganda veritate, hæc pauca in medium adducere decreuimus, semper meliori iudicio, ac veritatis cultore erit, & si nullibi de paralyti verbò vilius proferat Hippocrates, Princeps tamen Auenenna **h**æc duo symptomata, læsa calvaria, euenire commemorauit. Inquit Hippocrates, Convulsio plethorice corrupta in altera corporis parte, siquidem si in sinistra capitis parte vulnus quis habet, in dextera convulsio oritur: si verò dextera laesata est, sinistra convulsio corrumpit, ac pluries hoc euenisse fatetur, experimentoque, ac exemplo demonstrat, præsertim in casu illius famulæ in Omilo duodecim annos natæ, quæ ex capitis vulnere in media ætate, decimaquarta die moria est; convulsio verò manum sinistram inuadebat, nam in dextera magis vulnus habebat: Attamen huius effectus oppositum aliqui falsò credunt, asserentes magis rationabile fore, convulsionem partem, siue latus affectu occupare, quàm in altera, & sana oriri, ea quippe ratione, quia convulsio motus est non naturalis, sed coactus lacertorum primò, deinde cerebri, & nocentes causas eorum violenta contraccio ne expellere possunt: ergo magis credibile est, quòd in affecta parte, quàm in sana, contrahatur, huiusmodi ratio motu epileptico corroboratur, siquidem in tali affectu cerebrum contrahitur, & ea omnia membra, quæ illi annexa sunt, secum adducit, fin enim epilepsia, & vniuersalis convulsio produciat. Alij dicunt.

¶ Lib. de Col-  
lac. lib. de cal-  
ac. orom. lib. 3.  
de fraci. 1. 3. h. 1.  
de 7. Hippoc.  
lib. 1. 3. cap. 14.  
¶ Libro 1. de  
mor. popu.



- 10 dicunt. si natura supremum ventrem panniculo illo, à Græcis diaphragmades, & à Latinis mediastinum, vocitatur, separat, nempe, ut affecta vna parte, reliqua incolumis conseruetur, magis cōuenit, ut cerebrū potius in læsa parte, quam in ea, quæ non affligitur, contrahatur, ergo cōuulsio in parte vulnerata potius oriri debeat, quam in valida & sana: Horum opinionibus sic respondēdo esse arbitramur: Corpora 3 no  
stra, quia continuo resoluntur, continua etiam egere restauratione, & alimento, ob id natura sagax nutrimentum in quali, & quāto proportionatō, & qualiter omnibus partibus impartiri tenetur, quæ quod sibi propriū, ac peculiare est, trahit, retinet, & p nutritione præparat: portio verò alimentī, quæ caput p eius nutritione petir, dum nec (ut decet) permuratur, nec assimilatur partibus nutriendis, quæ ex vulnere, & alijs causis imbecilles iam factæ sunt, & in similibus potentia deficere videntur, sub quadam cruditate natura, in cerebri substantia, sed potius in nervorum initijs, residet. quæ cum tam magna sit, & multæ mo  
lis, magna etiam eger alimentī copia. hæc enim cum in vulnerata sede reperitur, partem cum magna spir  
rituum copia per vulnus, sub qualitate, & substantia saniosa, & partem naturæ, ac topicorum actione, insensibiliter absumitur; siquidem in affecto loco materiæ quantitas retineri non potest, sicuti in opposita & sana parte, in qua dum à causa simili diuersa, ac in maiori copia, quàm deccat, non aliena ab aliquo spir  
ritu vncosio, cerebrum, ac nervorum origo opprimuntur, querentes similem causam aliunde expelle  
re, & ab illa se tueri, corriguntur, & contrahuntur, ac inde membra, quæ ab eis originem ducunt, secum  
trahunt, vnde conuulsio illius lateris, quæ potius more Hippocratis cum palpitando, aut concutendo ap  
pareat, motus conuulsivus dici potest. oritur etenim 6 omnis expulso, quæ à primarijs mēbris pericitur, contugatione, & contractione fieri solet; quapropter si faciem, aut eius partem, nempe si oris cutem, mē  
debulam, aut linguæ radicem conuulsam videntur, quia partes has omnes, à musculis, à cerebro, & nervis  
30 à tertia coniugatione oritur, vires suscipiuntur, moueri nouimus, cerebrum ipsius sic laborantibus affectū esse necessariū credimus. huic repositioni fauet notabilis illa cerebri separatio, ob id quia pars non affecta, à similibus causis molestata, ob prædictæ facultatis deperditæ impotentiam, eas absumere nullo mo  
do potens, violentia quadam, ac impetuosè mouetur, & contrahitur, & sic spasmus in ea parte producti  
us, ea verò, quæ sancta est, quia imbecilla, contrahi nequit, sed repleta ea humiditate, mollis fit, & paraly  
tici affligitur. ob id dicebat Auicēna: In vulneribus capitis pertinetibus ad panniculū cerebri, accidit  
laxitas in latere vulneris, & spasmus in opposito eius. & de paralyti rationē reddēs, ait: 4 Non elongatur,  
quin ea potentia, quæ nostrum regit corpus, seruet naturam vnius duorum laterum capitis incolumem,  
purgando & expellendo materiam ad latus, quod est debilius, & quod est magis susceptibile materiæ  
primæ, & cui accidit percussio, & ictus, & ad quod expellitur superfluitas lateris cerebri, quod ipsum  
sequitur; & non est mirandum, si appetitio sit propria vni lateri abique alio. Natura enim præcepto sui  
40 creatoris iam discernit quod est subtilius hoc, potest ergo & brachium, & crus lateris affecti primò para  
lyti affligedum contraria parte, & sana, conuulsione detinere. Porro occurrit interdum percussio capite,  
quod à cerebri potentia materiæ diuersæ nocentes alibi propellantur, potissimum ad aliquam sedem  
imbecilliozem, quæ sui natura superflua facilius recipere solet; hæc si ad oculos deuenierint, eos strabos ef  
ficiet; si ad os, cynicum spasmus procreabunt; si ad spinæ vertebra, paralytici ad cerebri nervos, con  
uulsionem, quæ diuersimodè latus alterutrum molestare potest, semper iam orta inflammatione: at si epi  
leptia appareat, totum corpus conuulsione molestatur; si apoplexia, aut moritur æger, si fortis fuerit, aut  
vnum corporis latus mollificatione tentabitur: Hæc omnia euenire solēt, cerebro, ac eius partibus prima  
rio affectu laborantibus. Ad 4 caput pariter, aut sedum, aut costum, veluti ad sedem male affectam,  
50 ac dolore molestam, variz desuunt superfluitates, & crassa, & tenues. tenues cerebri substantiam mol  
lem facillimè ingreditur, quæ dum contrahitur, & si fibrosa minimè sit, sed ratione annexorum, in cau  
sa est, vt pars sana distendatur, vulnerata verò ac debilis crassas retinet, quæ vias nutrimentī, ac spiritus  
sensum, & motum illis partibus deferentium, obstruens, mollificationem partis læsæ, ac nervorum, qui  
bus mouendi facultas donata est, gignunt. equidem sic cerebri potentia, aut alteratur, aut corrumpitur,  
necnon nervorum habetudo, & operationes eorum naturales pereunt, vnde prædicta oriuntur sympto  
mata: si verò in his humiditatibus insignis aliqua putredo aderit, à qua vapores mali, putridi, aut vene  
nosi resulent, & exitum non habeant, ac nervorum principia petant, illius partis nempe sunt inordinata  
60 conuulsionem, seu motum quēdam conuulsivum producant: Nonnulli autem, qui anatomē valent,  
dum rationem huius questionis assignare conantur, dicunt nervos motuos à nucha, & spina natos, vni la  
teri sensum, & motum deferentes, à contraria parte originem ducere, hac ratione, capite vulnerato, con  
uulsio in parte opposita vulneri, oriri contingit. Alij dicunt motum conuulsivum similem esse motui ex  
pulsivo ventriculī, dum, quod nocuum est, ejicere conatur, siquidem in tali motu, in oppositum contrahi  
tur, nempe si per vomitum, in portonario; si per meatum ordinariū, in pyloro siue æstophago. Sic in  
conuulsis semper contractio oppositum situm occupare solet, nec propter hoc obstat diuisio illa, facta à  
natura in cerebro, quod interdum per se conuelliur, interdum consortij lege, & tunc Hippocrates mo  
re, motus sit conuulsivus, & propter hoc in caluarie percussionibus, interdum sola conuulsio, sæpe sola  
paralytis, multoties ambo hæc accidentia, & nonnunquam vltum videri solet, quod ex corporum diuersi  
tate, & plenitudine contingit: porro multi, qui chirurgicam artem diu coluerunt, conuulsionem affectam  
partem occupasse, & paralytim oppositam inuasisse, cognouerunt. Nec Hippocrates hoc symptoma

3 Gal li. 3. de  
dissol. conuuls.

4 Gal 7. de ho.  
aff. cap. 1. Auz.  
1. 1. 1. 1. 1. 1.

4 Gal 7. de ho.  
aff. cap. 1. Auz.  
1. 1. 1. 1. 1. 1.

4 Gal 3. Apho  
com. 1. 4. 1. 1.  
com. 1.



a Lib. de Cal.  
cor.

b Lib. 1. & 3.  
d. ut.

c Hipp. lib. 1.  
de fract. Galien.  
de motu musculi.  
c. 1. & 3. de  
n. 11.

d Galen. 4. de  
med. loc. aff. c. 4.

e Galien. 3. de  
fract.  
f. 1. h. 3. de ar.  
ticulari.  
g. 1. cap. 18.

sic de necessitate euenire pollicetur, sed ait; \* Plerosque consilio corripit in altera corporis parte, & frequenter, dum musculi malitiorum in temporibus siti, vulnerati fuerint, hic enim locus ferro attingi non debet; si incisus fuerit, nervorum distensio oppositam sedem molestat solita est. & si quis rationem ex Hippocrate assignare veller, posset dicere, aliqui in homine reperiuntur musculi, qui germani, & fraternali nuncupantur, ob id, quia inter se consortium, & cognationem retinent, ad eundem nepem, & idem opus destinati, latentem quandam copulationem inter se seruantes, dignoscuntur, ubi situi sunt, dum affecta una parte, altera pariter manifeste laeditur, quemadmodum in vitroque temporum situ, dum capitis vulnera tractamus, euenire percipimus; musculi enim ipsi temporales, maxillares, & masticatorii dicti, ad dextram & sinistram situi, ad inferioris maxillae elevationem facere videntur, cum illi praeciduntur, qui maxillam ab una parte connectebant, amplius prohibere non possunt, quominus musculi alterius partis ad suum initium contrahantur, quod & proprium est, ac innatum omnium musculorum, qui suo singuli tur mouentur, dum ad hominis libitum, versus eorum initium contrahuntur: quod cum inuitis nobis occurrat, ob alicuius inflammationis magnitudinem, aut malam qualitatem, musculi ipsi, & nervi distenduntur, & conuulsi fiunt, hic enim musculi, qui à maxilla laesa tendebantur, & musculi alterius partis alligabantur, & germani eant, non aequè possunt contrariae partis musculis continere, ne conuellantur, merito igitur irritati contrahuntur, & breuioribus fiunt; nam validi sunt, & robusti, secus verò de oppositis, & vulneratis est, qui agendi potestate priuantur, si verò à utraque simul parte laedi contingat, non nervi proprii, sed in cerebro loci cuiuspiam, à quo nervi procedunt, primus affectus est: quod si vni duntaxat, vel musculi, vel nervus quoquo modo, siue primaria affectione, siue per consensum fuerit affectus, pars ipsa in aduerfum trahitur musculum; nam resolutio musculi, qui dextram maxillam mouebat, ipsa ad sinistram deflectitur, at si is, qui sinistram mouet, resoluatur, ipsa trahitur ad dextram, & in aduersam partem deflectit contingit, quippe in similibus moribus consensuius, musculi, qui integri sunt, breues fiunt, trahentes ad se partes, quae illis annexae sunt, trahuntur, & etiam interdum musculi in se ipsos, non enim à se ipsis, sed quiescentes atque ociosi, ab ipsis, qui in contraria parte siti sunt, & sunt tensi, enim musculi, ac nervi euenire, affirmant Hippocrates, & Paulus, a potissimum dum una aliqua capitis pars laesa fuerit, nam si se altera, & opposita motu aliquo consensuius afficitur, & mortem vel plurimum adducit, quod fecus in alijs corporis partibus euenire contingit, nam semper affecta sedes primò inflammatur, postea consensione deiectur.

## DE PARALYSI.



Causis internis, & externis laeso cranio, aut potius saluere, in aliqua corporis parte, praeter  
tamen in ea, quae una cum vulnere consortium tenet, mollificatio, quam Graeci paralyseos vocant,  
oriri solet, & est magna nervorum resolutio, quae partem quampiam, non autem corpus totum  
inuitat, & differt h in hoc ab apoplexia; nam in apoplexia ex noumento iam in nervorum principio con  
tracto, omnes corporis partes & motum, & sensum amittunt, diaphragmate excepto; in paralyse alterum  
corporis latus, aut dextrum, aut sinistram, motum tantummodo deperdit, & vniuersalis paralyse  
vocatur: cum verò hic affectus vnam tantum particulam laeserit (nempe manum, pedem, aut linguam)  
particularis paralyse nuncupatur: paralyse ergo ea est, cum motus tantum alicuius partis deperdi  
tur: ab intrinseca etiam causa paralyse gignitur, dum materiae multae, crassae, & vitidae nervorum coe  
pora replent, & animalem facultatem, quae à cerebro oritur, ad resolutas sedes transire prohibent,  
quod sic aduenit in meningarum compressione: quare in percussis, aut fracta calvaria, dum ea me  
nix opprimitur, etiam primis diebus hoc symptoma apparere solet, ob id dicebat Auenenna: \* Et quod  
doque sit ex compressione vehemens paralyse, sicut accidit à percussione, aut casu; interdum ex  
inflammatione, quae nervorum principio, aut ramis occurrit, quod saepissime videre soliti sumus, dum  
calvariae fracturas curamus. Paralyse à procatartica simili causa orta sanari potest, ea siquidem abla  
ta, sed ab interna, & materiali aut nunquam, aut serò, & magna cum difficultate in his, qui senio con  
fecti sunt, paucos praedicti calore, qui omnium opifex est: nihilominus dicebat Rasis: \* si paralyse ex  
percussione, aut casu euenierit subito, taliter permanebit, quod nunquam sanabitur; quod si non re  
pentè, sed paulatim, & molliter inuaserit, sanitati restituatur: quod Roms Galeo \* euenit, dñ Paus  
aniam posthastam Syriacum curaret, qui, cum è curiculo ceciderit, vniuersae manus duorum digito  
rum amiserit sensum & motum, sanatus est: & ea paralyse non sanatur, ait Paulus, & quae à nervi diui  
sione orta est. Cum igitur ex compressione, aut punctura meningarum aliqua gignitur mollificatio,  
tolli potest, subleuato, aut detracto officio, quae autem ab inflammatione, & humorum copia initium  
ducit, opportuna euacuatione, & omni diuersum genere regatur, quae autem contracta cicatrice, re  
sident, opportunitas indicationibus; quae ex humorum multitudine, convenienti euacuatione: si omnia  
membra resoluta sunt, ait Celius, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat, aliud curacionis genus vix  
vnumque sanare restituit, saepe mortem tantum differt, vitam interim infestat, post sanguinis missio  
nem si non redit & motus, & sensus, nihil spei superest, fed particularis mollificatio, cum acutus mor  
bus non sit, interdum curam admittit, miratur igitur sanguis in hac passione, si expedit, & si pueri co  
pia abundauerit, cum commodè euacuant pilulae cochlear, foetidae Arabiae, & assaerit, cum agarico  
verum

h Celius 3. c.  
27. Galien. 3. de  
med. loc. aff. c. 18.  
i. 1. h. 3. de ar.  
ticulari.  
g. 1. cap. 18.

k Galien. 3. de  
motu musculi.  
c. 1. & 3. de  
n. 11.

l Galien. 3. de  
motu musculi.  
c. 1. & 3. de  
n. 11.

m Galien. 3. de  
motu musculi.  
c. 1. & 3. de  
n. 11.

n Galien. 3. de  
motu musculi.  
c. 1. & 3. de  
n. 11.

o Galien. 3. de  
motu musculi.  
c. 1. & 3. de  
n. 11.

p Galien. 3. de  
motu musculi.  
c. 1. & 3. de  
n. 11.

q Galien. 3. de  
motu musculi.  
c. 1. & 3. de  
n. 11.

- 10 verum, si hic euacuandi modus non expedit, clysteres summè probantur, quæ sic parantur. Recip. mal-  
uæ, alkez, mercurialis, saluæ, betonicæ, iuæ, thechadis an. m. s. bulliant in communi aqua, donec ter-  
tia pars consumpta fuerit, Recip. prædicti decocti vnc. x. electuarij de benedictis vnc. v. indi drag. iij.  
melis crudi, olei rutacei, laurini an. vnc. j. salis drag. ij. ouorum vitellos nu. ij. misce, & fiat clyster, cuius  
vñs alternis diebus, & summo mane laudatur. occipitium, vertebra, ac adenosæ partes oleo liliorum,  
irino, de spica, & simili calido foueantur, aut Recip. olea prædicta, & adde masticum, camomellinum,  
ex lumbriticibus an. vnc. j. euphorbij, castorei, an. drag. iij. misce, & aliquantisper bulliant, & vtere. probantur  
fontana ex decocto saluæ, sanflicij, camomille, hypericonis, thechados, iuæ, & betonicæ, in vino albo po-  
tenti, quo expleto, inunctio fiat ex prædictis oleis, aut tortioribus, quale est costinum, vulpinum, lauri-  
num, de euphorbio, de lateribus, quod oleum philosophorum appellant, aut cum vnguento martiaton,  
aragon, agrippe, & simili. adhuc mirabile illud medicamentum est, quod Mesue annotauit capite de pas-  
sionibus cordis, & nos, vbi de cura vulnerum neruorum, in fine illud descripsimus. laudantur apophle-  
gmatisata, & caput purgia post vniuersales euacuationes; pariter & antidotum theriaca antiqua, aut  
Muridarum, aut area Alexandrina, aut diamulcus, aut rosara nouella, aut cōserua illa de acotibus. Hæc  
de inueterata paralyti dicta sunt. fracta tamen caluaria, si vñ cum malis indicij fuerit, nempe rigori-  
bus, febre, vomitu, & similibus, ieremam inflammationem consignatam indicat, & mortem. Parali-  
corum vitæ ratio sicca sit, potus aqua mellis, & saluæ: vt autem causa conuocatur, valet syrupus de  
betonicæ, de thechade, & rhodomeli: si verò diu perdurauerit hoc symptoma, ea probantur medicamē-  
ta, quæ acopa à medicis vocantur. Interdum motus, interdum sensus in paralyti deperditur, quod aut  
ratione sedis affectæ, aut magnitudine inflammationis, aut natura obstructionis aduenire solet.

a Gal. 3. Aph.  
cum. 14. j. Aph.  
cum. 16. Aug.  
4. 1. cap. 3.

# DE APOPLEXIA.

- 10 **V**ALOTIUS ex casu, aut percussione virtus motiua, & sensitiua omnium corporis partium de-  
perditur, diaphragmate excepto; Symptoma à medicis b aut apoplexia, aut morbus attonitus  
vocatur, porro quando commune principium neruorum affectum est, atque omnes corporis  
particulæ motum sinu) & sensum amiserint, apoplecticus morbus appellatur; accidit principalibus ani-  
mi functionibus obliu) si autem in altera corporis parte obstructio oborta fuerit, Hemiplexia, siue pa-  
ralysis nominatur: si vñam quandam particulam occupauerit, illius particulæ affectio dicitur, ex nocu-  
mento in principali animæ contracto, præsertim in ventriculis cerebri, vbi animæ functiones celebrantur,  
aut à compressione, aut punctura, aut vehemēte inflammatione; vnde c quæ ita sunt affecti, ne sensu,  
neque motionis munere funguntur: spirandi tamen facultas haudquaquam læditur, & hic affectus inter-  
dum caros, siue sopor vocatur: si verò adeo vehemēter sp̃itationem opprimat, vt quis vel magno cona-  
tu vix spirare possit, coram exemplo, qui per grauem somnum stertere solent, apoplexia nominatur;  
quæ, d si fortis fuerit, curationem non admittit; debilis verò non facilem, & ea fortis est. e quæ inspira-  
tionem prohibet, & cordis temperamentum corrumpit. Cum igitur fracta caluaria oscium hoc sym-  
ptoma apparuerit, & causa in propatulo fuerit, tollatur. nam dictum est à Principe, f Compresio, aut  
punctura, quæ ab osse in meningis sit, inflammationes, coquelliones, & apoplexias inducit. extra-  
do postmodum osse, illico redit sensus, & motus; nec vt id natura faciat, expectare oportet, sed me-  
dici diligentia, & optima chirurgia: si autem humore pituitoso, ac viscido ventriculis cerebri oppletis,  
id euenerit, & nihil obstat, à cephalica vena sanguis mittatur. postea, si decet, ab hemorrhoidibus; verū-  
tamen si omnia membra vehemēter c̃soluta sunt, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat. quare  
si alia expedit euacuatio, quæ raro ob patientis impotentiam, & imbecillitatem admittitur, tunc cly-  
steres probantur, quæ à capite crassos humores reuellant, veluti Recip. humariz, epichimij, thymij, senæ,  
polipodij an. m. j. pulpe coloquintidæ, corticum agarici, turbit an. drag. s. thechadis, samflicij, saluæ,  
betonicæ, acori, glycyrricæ an. m. s. storum camomille m. ij. aquæ claræ lib. x. bull ant, donec aquæ medie  
tæ consumpta fuerit, & facta forti expressione, Recip. prædicti decocti vnc. x. Hieræ picræ vnc. s. ele-  
ctuarij diarsenæ drag. vj. Zucchari rubei, olei anethini, camomellini an. vnc. s. liæ gemmæ, drag. 4. ouo-  
rum vitellos nu. ij. misce & fiat clystere. vñs glandium commendatur, extrinsecus etiam partibus ligaturæ,  
& frictions vehemētes: sinapisticus quoque, siue emplastrum rubificancia, quæ à recentioribus vesica-  
toria vocantur, & quia sepe apoplexia in paralytim terminatur, aut debiliorem dispositionem, nec ex  
toto conualescunt, qui sunt sic affecti, & si tale discrimen effugiunt, subinde in quandam diuurnā pas-  
sionem incidunt, aut quorundam membrorum, aut totius corporis, potissimum in verborum prolatio-  
ne: pro curatione verò, ea seruanda sunt, quæ superius descripsimus.

b Hipp. 3. Aph.  
16. Celib. 3. c.  
17. Gal. 3. de loc.  
aff. 10. 1. Aph.  
cum. 41. Act. 16.  
d. cap. 17. Paul.  
lib. 3. c. 15. Aul.  
1. 2. 2. 1. cap. 3. 4  
& cap. de trad.  
era.  
e 4 Gal. 4. de loc.  
aff. cap. 1.

d Hipp. 3. Aph.  
41.  
e 4 Gal. 3. de loc.  
aff. cap. 10. & 11.  
Apho. cum. 41.  
f 4 1. 4. c. de ha  
& era.

# DE EPILEPSIA.

- 10 **A**UO, sed interdum percussu caluaria, ac cerebro patiente, quoddam symptoma apparere so-  
let, quod medici Greci epilepsiam, & Latini morbum comitalem, sacrum, bereuleum, & cadu-  
cum vocant: conuulsio quippe interpolata est, in qua sensus, & motus vitatur, & eius causa le-  
uis quedam ventriculorum cerebri obstructio est, sed non ex toto, quæ hominem stare prohibet, sed re-  
pentinè cadit, & quia spiritus difficulter ab aspera arteria exsistatur, spuma ab ore emanat, nec diu

symptoma perdurare solet, & patientes ex se surgunt. Nos verò talē affectum semel tantum inter curandum vidimus, multoties verò eum contracta iam cicatrice inspeximus, vt Feltria cuidam puella euenit, quæ post à vulnere recuperatam sanitatem, transactis quatuor mensibus, à tali symptomate diu vexata fuit, & tandem conuulsit. Credunt aliqui, quòd & si vulnerati cadunt, conuellantur, cinici fiant, spumam emittant, foeces, & lotium involuntariè expurgent, nihilominus veri epileptici non sunt, sed motibus epileptici molestantur. siquidem, quàmplurimæ materiæ à vulnere perpetuè expurgantur, epilepsia fieri nequit. Curatur hoc symptoma, si à manifesta prouenerit causa, iæa remota, & si ventriculorū cerebri opulatiua causa est ex crassorū humorū copia, & diu permanserit, iisdem indicationibus, quibus apoplexia, & conuulsio, sanatur.

## DE VVLNERIS SICCITATE.



**V**ULNERIS siccitas post quartam, aut septimam diem, & ultra permanens, id est in vulnere nula la concoctione apparente, suis accidentibus eam comitantibus, indicium mali præfagij est, nam dicebat Galenus; \* Multoties vulnerum siccitas, ob imbecillitatem illius potentie, quæ nostrum regit corpus, ac ipsum alit, prouenire solet. siquidem dictum est, <sup>b</sup> suppurare maximum est viceris signum ad securitatē nihil enim mali viceri pus generanti aduenire potest; <sup>a</sup> vlcus, siue antea exstitit, siue existat in morbo, considerandum est si enim moriturus est æger, antè mortem aut liuidum, aut pallidum, aut siccum erit. Siccum sic redditur, quoties facultas nutritica languida fuerit, color permutatur ex humorū, ad vlcus ascendendum, prauitate, quod affirmat Hippocrates, dum ait; <sup>d</sup> In offe & groatē caro liuida mæ lum, quæ offiū malas indicat qualitates, extincto in ea carne innato calore. dictum est ab Hippocrate; <sup>e</sup> Si in vulneribus prauis, & fortibus existentibus humor non apparet, ingens malum; quippè suspicandum est, ne humores ad locum affectum descentes, ad nobiliora retrocedant, & magis verendum est, si dolor adfuerit, & propter ipsum omnino aliquid insinuat: porro vulnera laxa, (id est optima sanie prædita) bona sunt, siccā verò mala: Nimis intumescere vulnus, ait Celsus <sup>f</sup> periculosum; nihil intumescere periculosissimum; illud indicium est magnæ inflammationis, hoc emortui corporis. Detecto igitur vulnere, color primo consideretur; quòd si liuidus, aut pallidus, aut niger, aut varius apparuerit, scire licet malum vulnus esse. Vulnerum siccitatis causæ variæ sunt, nempe meningiarum, aut cerebri inflammatio, circa quam innata concentratur calor, & vulnus ab eo destitutum siccum redditur, febris ardens assidua, & naturalē, & aduentitiam humiditatem exficcare solet. idem facit erysipelas, quod vulneratas partes obfideat: medicamentum validum in siccitatē, & aer ambiens valde siccus, nutrimenti penuria, & fames longa (potissimum in his, qui eam tolerare nequeunt) vulnus siccum faciunt. Si ergo fracta caluaria, aliquibus transactis diebus, vulnus exsiccat, & calida manifesta fuerit, absumatur; si verò non, indicatione à siccitate sumpta, humedatio cura erit, nempe à propinquieribus locis ad vulnus conueniens nutrimentum attrahendo, quod mē bri discrasiam alterare possit. quare olei rosati continua infusio probatur, aut vitellus oui cū rosaceo, aut terebinthina cū oui vitello, & modico olei rosati. caput etiā totum foueatur decocto maluarū, camomilæ, betonicæ, violarum, & scenograci, nec his operationibus obstat febris, aut inflammatio aliqua exterior, quæcunque igitur, ac qualiscunque causa fuerit, ad suum contrarium alteretur: si autem abscondita, vulnēratus de necessitate moriut.

## DE MEMBRANA DENIGRATA.



**M**embrana subcingens denigratur (que modum post empiricæ operationes contingere solet) malum indicium est, laceratur interdum, postmodum putrescit, aut præcæsa inflammatione corrumpitur: cui quàmplurima mala subsequuntur symptomata, & ob id timere, ac de patientis salute nihil sperare, dignum est: quæque magis, si nigredo ad externam vsque oculi tunicam, abque procætarica causa terminauerit, talis siquidem à dura meninge originem ducit: hoc symptoma innatū caloris, & membrana maximam corruptionem, ac eius destructionē, aut quòd gangræna afficiatur, declarat. solet etiam à topicorum natura, & operatione hoc euenire, & ea nigredo ab eius leuitate, & facili remotione non dignoscitur, nullo associante symptomate. tollitur hic color sola syrapi, aut mellis rosati applicatio, & si tenuis fuerit, pro dimidio rosaceum adhibeatur: si ratione trigiditatis medicaminum, aut ambientis hoc euenierit (quod ex temporis longitudine dignoscitur, nam transacta etiam quarta, nigredo apparere solet, quod à sola contusione non occurrit) tunc enim, quæ temperatē calefaciunt, adhibenda sunt: veluti est sanguis columbinus, aut Turturis, calidus, addito rodometle, aut oleum abietinum cum melle ipso rosaceo, aut oleum terebinthinæ stillaticium: ac vulnus replendum est puluere cephalico, & superaddito emplastro de betonica, aut de gumma elemi nardino soluto, caput falscijs opportunis auoluatur, & calidis foueatur: autem aut sanguis congelatus, aut materia aliqua viscida id fecerit, oxymellis, rosaceo admixto, abstergetur: si contusio, aut compressio nigredinem duxerit, eam absumit rhodomellis pars vna, granæ finissima, & aloes puluerizati pars media, misceatque: aut malus aer, aut praua chirurgi administratio, aut inflammatio profundam nigredinem effecerit, nec rhodomellis, aut oxymellis auxilio tollitur, morbus extremus iudicatur, & extremis eget remedijs, & tunc si de medicamento vti non ab re fuerit, quòd, detecta membrana, ab antiquis vsui seruabatur, nos verò in hac re non raro līn Terebinthina,

a ¶ 1. proposit.  
c. 1. §. 5.  
b ¶ Gal. 5. Aph.  
c. 1. §. 1.  
c ¶ Hipp. li. de  
Coc. promot.  
d. 1. Praefag. 15.

d ¶ 7. Aph. 3.  
e ¶ 1. de morb.  
papa lib. de Vi-  
ceribus. & 5. A-  
phor. 66.

f ¶ Lib. 5. vbi  
de ac. vult. vul-  
nerationem.

10 bithina, aut oleo ex Terebintina admixtum experti fumus, interdum & ægyptiacum addidimus, felici quippe successu, nempe Recip. olei abietini vnc. j. rhodomellis vnc. s. vnguenti ægyptiaci descriptione Aui cennæ drag. ij. misce. tale enim paratur ex melle, Zinari, alumine liquido, sine aceto. soliti vnguentum etiam folio ægyptiaco nigredinem cum fetore absumere, interdum etiam hydragiro preparato, quod præcipitum vocatur, uti auli fuimus. si autem hæc non profunt, fugere licet, & ægrotum presbyteris commendare.

DIGRESSIO.



OSTENDITUR caluarie perforationem, membrana intacta, colorem, & motum naturalem seruari solet, postmodum eo amisso, amplius non mouetur, nec ob id aliud symptoma innouatur, paucis postea peractis diebus, superficies eius alba, & tenuis admodum squamas facere incipit, & pellicula quedam prætenus araneæ modo eleuatur, & inde noua caro oriri inchoat, res quippe admiratione digna; siquidem pars substantiæ ipsius membranae est, & membrana conuoluerat rarò sanatur: nec adhuc apud antiquos scriptores de hoc vltimo verbum legere potuimus, nec aliam rationem huius affectus assignari posse, opinamur, præter eam, qua & cranij ossa squamas separant, & emittunt, nempe aeris actionem, aut variorum localium applicationem, & alia, quæ ossium naturis aduersantur, aut quia contusione aliqua fuerint vexata, & pars superficialis moritur, & ab humido suo proprio & elementari derelicta, aut carne subnascente relaxatur, & à reliquo osse, quod alterationem non nouit, separatur, & in picciis squamarum effigiem exiit, aliquantisper colore alterata, pariter cum id duræ matri euenerit, chirurgum in hac curatione non exercitatum, timetere reddidit, ne pellicula illa corrumpatur, aut mala temperie afficiatur: 30 attem ex se solè superficies illa dimouetur, aut tantum rhodomellis auxiliosum non autem, Recip. Terebintinae claræ, vino albo lotæ vnc. ij. rhodomellis, aquæ vitæ, farinæ hordei cribatæ an. vnc. j. myrrhæ, aloes, grana, sacchari fini an. drag. ij. misce, & vtere, donec membrana pura moueatur, ac sui coloris apparuerit; inde ea adhibeantur, quæ seruata methodo, alijs capitis vulneribus opitulantur. Soluti contusione in hac sequestratione fietor quidam apparere, de quo dubitandum non est, nisi alterum adierit præuulsi symptomæ nam in exteriori superficie affectus tantum reperitur, ossa caluarie præterea, postquam color vulneris rufus, aut subliuidus apparerit, nimirum calore eius innato ex toto deficiente, corrumpi incipiunt: tunc igitur, cum caro liuida efficitur, ossa ægrotans teste Hippocrate, & nigra sunt, inde cinerica, & acri humore exasperantur: nigrescit autem quod album erat ob ingentem inflammationis calorem, ac deinde, cum iam purulentum est, palliet, vel album efficitur, huiusmodi enim est color sanicitalis quid lignis euenire videtur, cum vruntur, ab igne enim primò nigra fiunt, & deinde in cinerem versa, albescunt. Hoc etiam in osse respondet, cum alieno calore primò nigrescat, deinde subpalidum, vel subalbidum fiat: huc denique quæ symptomata sequuntur pustule quamplurimæ in lingua, & æger mente non constare videtur: pustulæ similes huius ætatis chirurgi rarò videntur, ut qui cubantis linguam non intueantur, præsertim cum deliraret, & prope mortem sit constitutus: lingua sic afficitur consortij lege, quæ est inter cerebrum, & oris partes, sanies enim acuta à cerebro, in quo eius maxima reperitur copia, à qua opprimitur, ad palatum, & linguam defluit, ibiq; residens, cum acris sit, pustulas excitat, varis similes, quæ (ut ait Celsus) cum rû panetur intrus, quasi caro exulcerata conspiciunt. Hæc igitur mala, si craneo fracto superueniunt, ad vltimū ventum esse, cessantur.

117. Aplot. 2

118 Hipp. lib. 2. de ramor. pop. 119 Lib. 2. c. 4.

DE CARNE AVCTA.

10 VITÆ carne repleto, illa interdum mollis, & spongiosa augeri ita solet, quod de genere morbi in quantitate est, salubris tamen, quam tantum cicatricem generi prohiberi prouenit multoties ex nimia nutrimenti copia, aut ex nimia topicorum humiditate, aut ex tarda medicatura, aut ex abstersione diminuta. Hæc adaugetur caro, quam Hyperfercosin Græci vocant, interdum indicatione sumpta à natura sedis affectus, & à temperatura totius, solo alumine rothæ cõbusto, aut zuchcharo ablutitur, aliquando hermodactylorum, aut aristolochiæ, aut spongiæ nouæ adustæ, aut cucurbitæ adustæ pulueret collitur: validiora verò medicamenta sunt, calcieis, & Muli, aut fris squamma preparata: metallica etiam quamplurima lota, adusta, & preparata, vnguenta etiam multa, si res postulat, adhiberi possent, ea uendo, ne aliqua sequatur incommoda, ob id nõ semper probantur, nisi in durioribus & defæctis cor poribus, ut lili, cerascos, cauterij, ægyptiacum, & similia. vicius tenuis etiã in hoc conferre videtur, ob id alimenta subtrahenda sunt, ac aliunde frictionibus recuella.

120 Hipp. lib. 2. de Viceribus Cd. lib. 2. c. 26. Gal. 3. meth. c. 4. & 4. de com. med. facandi gener.

121 Gal. 2. meth. cap. 1. & 2. Kaus gni.

Solet interdum caro super incertam membranam adeo augeri, quod omnium humiditatum sub craneo existentium, liber exitus prohibetur, nec ibi commodè medicamenta adhibentur, quare Medici intereunt, in hac re diligenter adhibere, & ea medicamenta tunc probantur, quæ absque vlla mordicatione probe siccant, & in hac & operatione (sicuti in carnis productione) natura opus expectare non licet, siquidem aduersæ admodum actiones sunt, auxilia verò, quæ huic operi adaptantur, à filamentis lineis, albis, & ficcis, aut ab hermodactylis pulverizatis, aut coraljs albis, & rubeis, aut raved fini pulverizato, aut alumine adusto petuntur. Insistantur adhuc capitis vulnera varijs alijs symptomatibus, dum in eo inflammatio aliqua oritur, aut iã orta est, nempe oculorum dolore, oris doli omione, syncopa, stupore, diarrhæa,

vigilatum instantia, osium nigredine, & similibus, quæ optimo victus regimine, opportunis euacuationibus, & naturæ auxilio dimoueri solent. Scire etiam licet, quod hi, qui morbo gallico affecti sunt, non nisi magno labore à vulneribus capitis liberantur, quod longo experimento à nobis obseruatum est; nec interdum, nisi auxilio Guaiaci, aut Zarzæ parillæ sanitati restituantur. Hæc ad omnipotentis Dei laudem, ac hominum vtilitatem in materia de caluariæ curatione dicta sufficiant.

### De vilitatis medicinis in fractæ caluariæ curatione. Cap. XVI.

**I**N hoc capite, perinde ac si huius libri antidotarium esset, quamplurima medicamenta Chirurgi opportuna, ac perpetuo vsui seruanda describere intendimus, vt indicationes omnes à morbi essentia selectas tuto, ac celeriter adimplere valeat; quorum aliqua ex antiquis, & multa ex recentioribus accepimus.

#### VT SANGVIS COHIBEATUR.

- 1 Digni diuturna compressio.
- 2 Arancorum tela.
- 3 Xylum adustum.
- 4 Filamenta ex lino, minuta, & sicca.
- 5 Fermentum aridum adustum puluerizatum.
- 6 Oui albumen contusum.
- 7 Oui albumen cum aceto, & vino nigro austero.
- 8 Oui albumen cum aloë, boloarmeno, & draconis sanguine.
- 9 Oui albumen cum aloë, olibano, leporum pilis molissimis, ac tenuissimè incisis.
- 10 Gypsum, aloës, farina volatilis, & sanguis draconis.
- 11 Calx viua cum stercore asinino adusto.
- 12 Actuale cauterium, id est ignis, quod diuersimodè administratur.

SANGVINIS missio per antipasin, id est per reuulsionem ad longinqua, potissimum remedium est; remeat sanguinem animi deliquium, extremarum frictions, laqueationes, & balnes, opportuna deligatio, ac comoda compressio, & venæ orificij obturatio: obturatur digiti appositio, splenia ex lana, ex bobice, ex stupa, aut ex pilis leporinis tenuissimis, potissimum fasciæ super vulneris orificium pluries auolutæ, venæ sutura, aut laqueatio, aut eius totalis incisio.

#### VT FLUXIONES INHIBEANTVR.

- 1 Oleum rosatum maturum.
- 2 Oleum rosatum crudum.
- 3 Oleum violatum.
- 4 Oleum myrtinum.
- 5 Oleum menuphatinum.
- 6 Acetum rosatum.
- 7 Oleum violatum cum vnguento rosato Mesues.
- 8 Oleum rosatum omphacium cum boloarmeno.

MEDICAMENTA omnia, quæ Græcè apocrustica, & Latine inhibetia, aut defensiva dicuntur, illi par ti adhibenda sunt, per quam fluxionis hæc transitus. nam dictum est in Aphorismis: Frigidis vti conuenit, vbi sanguis fluit, aut fluxurus est, nō in vulnere, sed in regione supra vulnus, vbi nerui, aut peruosæ partes sunt affectæ, ob id in capite eorum vltus raro probatur.

#### VT VVLNVS PRAEPARETVR.

- 1 Oleum rosatum completum.
- 2 Oui luteum cum oleo rosato.
- 3 Terebinthina cum vitello oui, & rosaceo.
- 4 Recip. sepi castrati colati vnc. ij. Terebinthinae claræ vnc. j. vitellos ouorum nu. j. olei rosati vnc. s. croci, scrup. j. s. corticum thuris drag. ij. misce.

Vsvs horum digestiuorum diem septimam raro excedit, sed sat fuerit, donec optima apparuerit coctio, probatur nempe in crudis, aut dolore affectis vulneribus, sed potissimum in contusis.

#### VT ABSTERSIO PERFICIATVR.

- 1 Mel violatum.
- 2 Syrupus rosatus.
- 3 Mel rosatum.
- 4 Oleum de vitellis ouorum.

- 10 5 Oleum de Terebinthina.
- 6 Terebinthina cum farina hordei, & rhodomelle.
- 7 Emplastrum Iſis Gliconis.
- 8 Emplastrum ceraſeos Meſue.
- 9 Vnguentum ægyptiacum minus.

R 120 admodum, præterquam rhodomel, cætera medicamenta fracto cranco probantur; vrgute tamen neceſſitate, vt de membrana denigrata dictum eſt, validioribus egetus remedijs.

VT NOVA CARO PRODVCATVR.

- 1 Irios, farina orobi, ariſtolochia, opopanax.
- 2 Irios, farina orobi, ariſtolochia, opopanax, thuris cortices.
- 3 Irios, farina orobi, ariſtolochia, opopanax, thuris, aloes, & myrrha.
- 4 Aloes, myrrha, olibanum, ſanguis draconis, corallia rubra.
- 5 Aloes, myrrha, olibanum, ſanguis draconis.
- 6 Irios, farina orobi, ariſtolochia, olibanum, corticum radicum opopanax, myrrha, ſarcocolla, ſanguis draconis.

Gal. 6.  
Gal. 1. m. c. d.  
Paulin. m. c. a.  
Ratib. 1. c. 13.  
exp. 17. ad Alm.  
Aut. 7.  
vt. c. 4. d. ca.  
An.  
cruc. ca. de ſis.  
Co.  
pr. li. 5. ca. pro.  
Gio.  
mi. l. y. Katag.  
d.  
Aet. li. 14. c. 35.  
m. li. 6. ca. 13.

M V T A medicamenta, quæ arida cephalica ſarcotica, id eſt carnem inducentia, vocantur, apud antiquos reperiuntur, quæ ad requiſitas indicationes variè parantur; ſiquidem hominum variè ſunt habitudines, ætates, & exercitia, ac viuendi modus, & ſexus; porro in mollibus corporibus, nempe puerorum, mulierum, & eorum, qui vitam ocio depunt, ea conueniunt medicamenta, quæ primum ordinem exſiccationis non multum transgrediuntur in meſſoribus verò, militibus, nautis, & in his, qui ſenio ſunt conſecti, aut ſub dio, & Sole viuunt, quæ valenter exſiccant, opportuna iudicantur; ſiquidem ad oſſa denudata pinguium, & eorum, quæ ad tingenda linamenta parantur, vſum vitamus, & ficcis tantum vtimur.

VT CICATRIX INDVCATVR.

- 1 Pini cortex, cadmia, pulvis balauſtiurum.
  - 2 Conchilium cortices aduſti, gallarum pulvis, aloes, & pompholix.
  - 3 Pumex aduſtus, ariſtolochia, & ſina ſicca, & irios.
  - 40 Myrtus, mirabolani, alumen rochæ, & cadmia.
  - 5 Thypharmacum, diapalma, diacadmias, diaoſtreon, dialoes, melitera, & cera tum de betonica.
- Q V A plurima medicamenta euphorica, quæ arida cephalica ſigillatim nominantur, ab antiquis deſcripta reperiuntur, quæ pariter ſecundum corporum diuerſitates, cõmodè adhiberi poſſunt.

Gal. 5. de com.  
med. gen.

Cel. 8. f.  
Gal. 4. & 5. Kan.  
geni.  
Paul. lib. 9.  
Lucius Catag.  
res.  
Aclepiades.  
Tryphon Chl.  
r. mag.  
Galenus.  
Meſius.  
Galenus.  
Nicolaus.  
Aſuarus.  
Nicolaus.  
Auerenn.  
Meſius.  
Anchor.

ANODYNA. IDEST DOLORES SEDANTIA.

- 1 Oleum roſarum maturum, omnes dolores emalcer, digerit, mollit, & diſcutit.
- 2 Oleum roſatum completum, cruda vulnera præparat, dolores tollit, & coniunctas materias diſcutiendo abſumit.
- 3 Oleum roſarum omphacinum, fluxiones prohibet, inſtillationes remouet, & dolores ſedat.
- 40 Oleum violatũ, eryſipelas remittit, mollit, & omnes inſtillationes extinguit.
- 5 Oleum amygdalarũ dulciũ, parotidas abſumit, aurũ ſibilationes remouet, & oẽs durities mollit.
- 6 Oleum myrtinum, temperatè repercutit, & laxa membra corroborat.
- 7 Oleum camomellinum, lenit, diſcutit, & ſine attractione omnes dolores remittere ſolet.
- 8 Oleum de vitellijs ouorum, dolores tollit, vulnera expurgat, & cicatrices delet.
- 9 Oleum de Terebinthina, tremoribus, & conuulſionibus mirabiliter auxiliatur, & cerebrum à corruptione præſeruat.
- 10 Oleum de lumbricibus, durities neruorum mollit, ac artuum prauos ſenſus demit.

Nicolaus.

R 120, & ſerè nunquam in capitis leſionibus (præterquam in temporibus, aut magnis conuulſionibus, aut inflammationibus) dolores occurrunt; & ſi accidunt, aut futuram inflammationem, aut conuulſionem prænuntiant, quare decet omni modo illis vacare, & malas temperaturas remittere, ne ſui actione materie aliunde ad caput trahantur.

EMPLASTRA CEPHALICA MODERNIORVM  
de matreſylua.

Commune.

Recip. ſucci ſoliorum periclymenonis, quam iſti matreſyluam vocant, olei communis an. vnc. vj. reſine pini, terebinthine claræ an. vnc. iij. bulliant omnia viſque ad ſucci cõſumptionem, & adde ceræ vnc. iij. miſce, & ſecundum artem fiat vnguentum.

ALTER MODVS.

Recip. ſepi caſtrati colati vnc. vj. olei roſati, myrtini an. vnc. ij. pulueris betonicæ, matreſyluæ an. vnc. j. oliban, maſticis, ſarcocollæ an. vnc. s. terebinthine claræ, ceræ an. vnc. ij. miſce, & fiat vnguentum.

ALTER



## ALTER MODVS.

Ex Petro de Aegleia.

Recip. matrisfylluz m. iiii. decoquantur in vino, donec medietas consumpta fuerit, & cola cum forti expressione, & adde ceræ, olei rosati an. q. s. iterum bulliant, donec ex toto vinum consumptum fuerit, misce.

## ALTER MODVS.

Ex Iacobo Carpona.

Recip. resine, terebinthine, resine pini, ceræ nouæ an. vnc. iiii. olei rosati boni vnc. vii. matrisfylluz, betonicæ, pimpinellæ. an. m. ij. herbe minuti incidantur, & in lib. x. vini albi p. horas vigintiquatuor marcescant, inde bulliant, vsquequo consumpta fuerit vini medietas, cola, & frigeat, ac denuo quod percolatum est, bulliat vnâ cum resinis, & cera, donec vinum defecerit, & cola, & adde masticis, olibani, myrrhæ, sanguinis draconis an. vnc. s. gummi elemi vnc. ij. inde omnia misce, donec perfectum acqvisieris corpus, & sic dimittatur.

## ALTER MODVS:

Ex Nicolao Floren.

Recip. Verbenæ, matrisfylluz, pimpinellæ, betonicæ, scabiosæ. an. m. ij. bulliant in vino optimo ad eius mediam consumptionem, & adde terebinthinæ, olei rosati an. vnc. iiii. iterum bulliant ad vini consumptionem, & cola, & adde ceræ, gummi elemi, resinæ albæ an. vnc. ij. myrrhæ, olibani, sarcocollæ an. vnc. ij. iridis, aristolochiæ an. drag. ij. masticis, sandalorum, draganti an. drag. j. misce, & secundum artem fiat vnguentum.

## MODVS, QVO VTIMVR.

Recip. Verbenæ, betonicæ, matrisfylluz, diptami, consolidæ maioris, & minoris, lanceolæ, millefolij, pimpinellæ, scabiosæ. an. m. j. bulliant in vino albo, donec herbarum virtus extracta fuerit, & cola, ac viriliter exprime, & adde sepi hircini colati, ceræ nouæ. an. vnc. iij. gummi elemi vnc. j. olei rosati, myrtini vnc. iiii. bulliant iterum ad vini defectum, & adde boliarmeni, cerulæ, masticis an. vn. ij. misce, & secundum artem fiat vnguentum in bona forma.

## BASILICON COMMUNE.

Ex Scribonio &amp; Celso.

Recip. opopanax, galbani an. drag. xij. picis græcæ, resinæ terebinthinæ an. drag. xxx. olei rosati q. s.

## BASILICON TETRAPHARMACON.

Arioli Chierugi &amp; Pauli.

Recip. Colophoniz, resinæ, ceræ, picis græcæ, sepi taurini an. partes æquales.

## BASILICON MAIVS.

Ex Mesue.

Recip. ceræ albæ, resinæ, sepi vaccini an. vnc. vi. picis naualis vnc. ij. olei communis vnc. xxiij. olibani, myrrhæ an. vnc. j.

## BASILICON MINVS.

Ex Mesue.

Recip. resinæ, picis græcæ, ceræ an. olei rosati q. s.

## BASILICON MAGISTRALE.

Rafæ.

Recip. olei rosati, camomellini an. vnc. iij. myrtini, hipericonis an. vnc. j. s. suci betonicæ, matrisfylluz an. vnc. ij. saluiz, millefolij an. vnc. j. vini albi q. s. bulliant omnia, donec vini medietas consumpta fuerit, & facta forti colatura, adde sepi castrati colati, medullæ crurii vituli an. vnc. ij. bulliant iterum parum, & adde masticis, myrrhæ, spumæ argenti an. vnc. j. minij. picis naualis an. vnc. s. ceræ citrinæ vnc. iiii. misce, & secundum artem fiat vnguentum.

## CITRINVM.

Recip. olei rosati vnc. iiii. resinæ pini vnc. vj. Terebinthinæ claræ vnc. iij. ceræ citrinæ q. s.

## ALTER MODVS.

Recip. Terebinthinæ claræ, olei rosati an. vnc. vj. resinæ pini vn. iiii. ceræ citrinæ vnc. iij. gumi elami vnc. s. misce.

## DE GYMMA ELAMI, SIVE ELHEMI.

Recip. gummi eleni, quam isti elami vocant. Terebinthinæ an. vnc. iij. olei rosati, ammoniaci aceto foliati an. vnc. ij. resinæ pini vnc. iiii. ceræ q. s.

## ALTER MODVS.

Recip. gummi elhemi, opopanax an. vnc. vj. bdelij vnc. s. resinæ pini vnc. j. Terebinthinæ vnc. iiii. thuris, masti-

10 masticis an. drag. ij. cerę citrina, olei rosati an. vnc. x. fiat vnguentum secundum artem.

ALTER MODVS.

Recip. gumme elami drag. ij. resine drag. iij. cerę drag. vj. ammoniaci drag. ij. terebinthine drag. iij. succi  
betonicę drag. v. misce.

DE BETONICA.

Recip. succi betonicę, plantaginis, apij an. vnc. iij. cołentur, & aliquantulum bulliant, & adde resine,  
cerę nouę an. vnc. iij. iterum bulliant vsque ad succorum defectum, & adde Terebinthine vnc. x. & secun-  
dum artem fiat vnguentum.

ALTER MODVS.

Recip. succi betonicę, pimpinellę, saluie, centaureę minoris an. vnc. ij. vini albi odoriferi vnc. xij. olei ro-  
sati, mirtini an. vnc. ij. bulliant, donec vini medietas consumpta fuerit, cołetur, & adde terebinthine, cerę  
citrina, resine pini an. vnc. ij. iterum bulliant ad vini defectum, & adde boliarmoni, mumie, sanguinis dra-  
conis an. drag. ij. masticis, olibani an. vnc. s. misce.

MODVS QVO VTIMVR.

Recip. succi betonicę vnc. vj. pimpinellę, matris fylę, consolide minoris an. vnc. j. vini maluatici vnc. x.  
bulliant, donec vinum consumptum fuerit, & adde terebinthine vnc. iij. olei rosati, sepi castrati deparat-  
i an. vnc. ij. masticis, mirrę, mumie an. drag. iij. viridis eris vnc. s. cerę q. s. pro vnguento.

DE CENTAVREA.

Recip. centaureę minoris m. vj. incidatur, & per noctem in vino marcescat, bulliat postea, donec vini  
medietas defecerit, & cola: inde quod percolatum est, bulliat vsque ad mellis consistentiam, & Recip.  
istius decocti vnc. iij. lactis mulieris vnc. ij. terebinthine vnc. x. cerę nouę vnc. ijs. resine vnc. js. olibani, ma-  
sticis, gummi arabici an. vnc. j. misce, & secundum artem fiat vnguentum.

CERATA CAPITALIA ANTIQVORVM.

Apostolicum chirurgum.

40 Recip. picis naualis vnc. xij. picis gręcę vnc. vj. galbani, serapini, ammoniaci, opoponacis an. vnc. s. pro  
polis vnc. iij. aceti, vnc. vj. gumme, quę teri non possunt, cum aceto in catioli liquecant ad ignem, postmo-  
dum catiolum cacabo aqua frigida pleno immittes, donec frigescere inceperit, & tunc adde picem  
gręcā, ac masticis, olibani an. vnc. s. misce perpetuo agitando cum rudicula, donec citrinum colorem  
acquisierit, nā tunc coctura facta est, illico ab igne dimouetur, & adde terebinthinę vnc. ij. misce, & ma-  
nibus oleo laurino inundis, diu malassetur, & magdaleones formetur.

MEGETIS CHIRVGI.

Recip. squammę aris ciprij drag. xxv. guttę ammoniaci, aristolochię, iros, myrrę, aluminis fissi an.  
dragm. xx. terebinthinę piciutina, adipis tauri, cerę an. drag. iij. olei veteris vnc. xvij. aceti acris drag.  
70 7s. eius compositio fiat, cum caniculę sydus oritur, sub sole teratur, donec ex toto acetum extinctum  
fuerit.

TRIPHONIS CHIRVGI.

Recip. squammę aris cyprij drag. xij. olibani, ammoniaci, resine, terebinthinę an. drag. vj. resine pini  
drag. x. pinguedinis vituli drag. iij. cerę vnc. iij. olei rosati vnc. js. aceti vnc. iij. quę teri possunt, terantur,  
ac aceto nutriantur, vsquequo mellis crassitudinem acquisierint, postquam verò ceram, resinam, & olei  
purgaueris, omnia misce, & liquecant, ac lento igne bulliant, donec terati consistentiam acquisierint, per-  
petuo agitando, donec facta fuerit coctura, postmodum manibus diu malassetur, & fiant magdaleones.

RELATVM AB ANDROMACO.

Recip. granorum fructuum palme, salis rubci, salis armoniaci, aristolochię, radicis cucumeris agre-  
stis an. drag. xx. piperis longi, rotundi, ammoniaci, xylobalsimi, amomi, olibani, myrrę, resine sicę,  
vici quercini an. drag. x. cerę drag. xxx. pinguedinis caprę drag. xv. facis olei liliorum q. s.

ADDITIO.



VAMPLEVRIMA alia medicamenta, quę eo quia fracto accomodantur capiti, cephalica vo-  
cantur apud Celsum \* de mente Philotę Iudei, & Megetis multa apud Scribonium \* de mente  
Irasę, Gliconis, Aristidis, & aliorum multa apud Galenum \* ad mentem Alcepiadis, Deleont-  
tis, Philotę, Dionisi, Samij, Lucij, Cathegetis, Herę, & aliorum multa apud Actiũ, & Paulum \* legi pos-  
sunt

a q Lib. r. c. 19.  
b q Lib. de ceph.  
med.  
c q Lib. a. 4. & 6.  
Kroeg.  
d q Lib. 15. ca.  
11.  
e q Lib. 7.

sunt, quæ nunc breuiatim causa diuiter intendimus, ac quæ etiam quia validissima sunt, & fracta caluaria non parum timenda iudicantur, siquidem fortia sunt, & magnæ attractionis; sed ea tantum vsui seruetur, quæ passim considerata ætate, habitudine, virtute, vita, & patientis exercitio, à nobis longa praxi obseruata sunt. At quia diuersimodè caluaria fracta apud quasdam nationes aliquibus experimentis curari solet, nulla eis adhibita fide illa, quæ habere potuimus paulò inferius describere decreuimus.

## CERATA CAPITALIA MODERNORVM.

de gummi elhemi.

Gentilis.

Recip. ammoniaci, b. delij, feni pini, popanacis an. vnc. s. gummi elhemi, siue elimi vnc. j. terebinthinæ, picis naualis, refinæ, visci quercini an. vnc. ij. aristolochiæ longæ rotundæ, diptami, colophonæ, myrrhæ, calamini hæ, polipodij, corticum radicum arundinis an. drag. ij. fermenti, æxingiæ porcine, olei laurini an. vnc. ij. acetii vnc. j. olei rosati vnc. iij. ceræ q. s.

## ALTER MODVS.

Michi Floren.

Recip. gummi elhemi vnc. ij. popanacis vnc. ij. b. delij vnc. s. refinæ vnc. j. terebinthinæ vnc. iij. masticæ, olivani an. vnc. ij. olei rosati vnc. xx. ceræ q. s.

## DE BETONICA. OM

Io. maia de Vig.

Recip. betonice m. j. matris fyluæ, saluæ, hypericonis, millefolij, pilosellæ, consolide minoris, an. m. l. c. tauræ maioris, minoris, pimpernellæ, v. b. en. an. m. s. Terebinthinæ claræ vnc. xx. olei rosati vnc. x. refinæ pini, gummi elhemi an. vnc. j. s. herbæ mirum inciduntur, ac terantur, & ad ignem omnia ponantur, & adde vini albi optimi vnc. xxiij. aliquantulum bulliant, inde in vase aperto omnia Soli exponantur per dies octo, pluries quotidie miscendo. postea bulliant ad vini consumptionem, & cola, ac fortiter exprime, & adde ceræ q. s. pro cerato, quod postea manibus lacte caprino, aut vaccino inunctis diu malleatur, & vltimò aqua vitæ, & diligenter conseruetur.

## DE MINIO.

Epistom.

Recip. olei rosati vnc. xij. masticini vnc. ij. feni castrati, vitulini an. vnc. x. lithargij aurei, & argentei an. vnc. iij. minij vnc. ij. vini odoriferi vnc. xv. bulliant simul perpetuò agitando lento igne primis horis, qui postea paulatim augeatur, donec medicamentum nigrescat, & adde terebinthinæ vnc. vj. gummi elhemi vnc. j. masticis drag. ij. ceræ q. s. pro cerato.

## GRÆCVM.

Magistral.

Recip. olei rosati omphacini, myrtini an. vnc. viij. acetii albi vnc. iij. lithargij aurei, & argentei an. vnc. vj. masticis, aristolochiæ rotundæ an. vnc. s. minij vnc. j. puluerizentur quæ trituranda veniunt, ac per horas vigintiquatuor in oleis, & aceto marcescant, sæpe agitando, deinde lento igne bulliant ad spissitudinem, & manibus lacte inunctis, diu malleatur.

## HVMANVM.

Iacobi Carpen.

Recip. Terebinthinæ lotæ cum vino maluatico, refinæ pini colatæ, ceræ albæ an. vnc. iij. mumiæ ex craneo vnc. j. s. liquefiant omnia simul, & ad ignem perpetuò admiscendo, fiat perfecta mixtio, iterum omnia in vase æneo nido iaceant, in quo acetii rosati ex vino maluatico vnc. xxxvj. reperiantur, sic maneant per diem naturalem, & manibus in eodem aceto malleantur, donec ex toto acetum à cerato expurgetur. ceratum inde in vase vitro, aut terreo vitreato sine aceto locetur, in quo vase lactis mulieris vnc. vj. succi tormentillæ vnc. j. succi pentaphilonis vnc. s. succi betonice drag. ij. succi brioniæ, succi plantaginis an. drag. j. s. omnia lento igne super cineribus bulliant, donec humidi corporis tertia pars consumpta fuerit, & adde succi verbenæ vnc. j. succi pimpinellæ vnc. j. s. melle, & omnia Soli æstivo opponantur, caute quidem, ne à pulvere turbentur, sic per mensem maneant, quoties lac mulieris addendo ad pondus vnc. ij. & succi betonice vnc. j. excutabatur quippè lac, & succus, ob id singulis horis decet ceratum reuifere, ac lignea spatula agitare, vt optima fiat mixtio; si verò Solis actio defecerit, debilis ignis suppleatur, donec humiditas tota exsiccata fuerit, quæ semper innouari debet. postea magdaleones ad pòdus vnc. iij. formentur, & in mēbrana pagina auoluantur, & in loco ab omni humiditate alieno seruentur.



**Myrica** **castrua** (sic enim à solo experimento dicti sunt empirici) omnes calvarie fracturas indifferenter curare in cindit, perceptu patientibus carnes, ossa, castrum, & vinum concedens. curare illorum, qui ad pauca reficientes, seipso- rum manibus committunt, maior pars vitam cum morte mutare solet. Horum alii folis pulueribus, alii stillatitij liquoribus, multi positionibus, quae pigmenta vo- cantur, alij ceratis aut emplastris tantum, alij folis simplicibus, alij incantationibus, & plerique suis orationibus, & pura aqua utuntur, omnes manuum operationes fi- nitis moti opinionibus, vt in duabus scilicet empiricis explicauimus. Sed vt eorum ex- empto intelligantur, nonnulla nunc describimus, quae nobis fuisse à multis relata, & de modo à recentioribus descripta inuenire potuimus.

Nicolaus Florentinus in septima suorum voluminum parte, vna cum Ioanne de Vico hanc praxim approbant: in vulnere aqua vite replent, & quod residet, cephalico pulvere, inde totum vulnus foliorum caulibus cooperiunt, & opportuna fascia caput auoluunt.

IOANNES DE VICO Genuensis in l'ua chirurgia sic ait: Aquæ ardētis vnc. x. myrrhæ vnc. j. aloes vnc. ij. sarcocollæ. s. turis an. drag. ij. c. oci scrup. j. melle, vulneris fundus repletur liquore tali, relinquitur verò cephalico puluere Auicennæ, ac de super cerato ex minio, aur. de beronica.

**MARTI**VS Sanctus, Barolitanus, in suo chirurgicali compendio membranam rhodomelle coope-  
rit, refidum aqua virg replet, ac cephalico puluere, ac defuper marinam spongiam apponit, & cum lata  
petia vnguento baffilicone tincta totum caput amplectitur.

**I**ACOBI BERGEGIIUS Carpeſis in tractatu ſuo de fractura cranij, apud Hiſpanos, & Genuenſes quidam curandi modus folijs liquoribz obſervatur, & hic eſt vnus. Accipe virg libij, vini maluitici libij, aloe, mirrhę arabani an. vñcij pulueris iadicum conſolide maioris vñcij pulueris cemaureę vñcij pulueris hypericonis vñcij terebinthine clare libij omnia miſce, & per menſem in vitro vaſe optime obſervato vna maneat, & diligenter cola, ſi forte exprime, & quod expreſſum eſt in vaſe ſervetur, ita vñ nūc expirat, vñ ſus verò filiis nidiſco, in liquore tepido inſuſe. reſolatur.

**PARMISIVIA.** Parmisifis in suo tractatu similem parit liquorē. Aque virae stillaritis bis, aut ter per elambum extractae libij. facis, myrrhae, herbani, gummi elemi, gummi hederae, ammoniaci, opopanis, bdellij, matrifilij, betonicae an. drag. ij. oblati hinc vncij. ex his quae conundi possunt, conundantur, & omnia in boccia fictili orificij ponantur, & fec triduum permanent, inde lentō igne fiat de stillato in balneo Mariae secundum Alchemistarum artificium; & quod stillatum est, in vitro vase optime clauso servetur, postmodum vulnus eo medicamento abluatur, ac filis nitidis eo insulis replicetur, ac desuper laisa peria vincturo ex gummi elemi, aq. matrifilij caput totum cooperiatur.

His brasses quidam Teutonius hoc verbarum liquore, quo mulla lucratus est: Aque viræ libij, mel  
li rofati vnc. vj. vini maluatici vnc. iij. sanguinis draconis, terree fillulæ, mumij, alocz, myrrhe an. drag.  
j. pulueris betonicæ granorum hypericonis an. drag. ij. croci scrup. ij. ex omnibus fiat opusculo mixto, quæ  
per dies octo in vitro vase bene obturato feruetur postmodum viriliter exprimatur, & quod expressum est,  
suffodiatur: vulnus filijs in eo madefactis repleatur, postea lata petia vnguento ex gummi elemi, aut de  
betonica cadur. coheratur.

Quamplurima medicamenta similia variis in locis parantur, quæ elixir vix, mater balsami, olea balsamina, aqua balsami vocantur; æsi balsami virtute prædita essent, magno pretio venduntur: nos verò in caluarie curatione ea nullo modo probamus, sed tanquam periculosa experimenta reprobamus.

## MODI VARIJ MEDENDI VVLNERA CAPITIS

orationibus, & aqua



**T** R A Hippocratis \* tempore homines quidam, vnde sibi vltum pararent, nescientes, medici caduere imaginati sunt, aliove magica arte, aut incantationibus sanare pollicebantur, & hi ( vt dicebat Hippocrates ) expiatorios, circulares, & arrotantes erant, & se valde pios, ac doctrinam plenius esse simulabant: eodem modo multis in locis dyblol sunt, qui medicinam proferunt, & omnia vulnera pura aqua, orationibus, & incantationibus, alijs salis petrijs lineis benedictis in crucis formam applicitis sanare promittunt: at quia haecenus hac via notabiles curationes videre non potuimus, eam quippe nec probamus, nec sperimus, siquidem verba ipsa & sancta, & benedicta fuerint, vt per infrascriptas descriptiones plene intelligi potest: nec quam probare cogimus fracta caluaris, & ff Hippocrates b in puris capiti vulneribus caute laudauit, quod & Celsus ( sub his vrbis affirmat: Locus plaga iuuatur etiam, si ex aqua frigida expressa spongia imponitur: iterumque ait: Vlnus aperendum, detergendum, sanies ex aqua frigida est, eademque rursus iniicienda: & iterum, \* fluente & sanguine, spongiam aqua madefactam superponere inbet nec Galenus diffinit, nam dicit: \* Scias, si spongia noua in vulture variis vno aqua, aut oxocrato, aut vino pro corpore diuertere, & lutinabit siquidem ea similiter, atque me-

a 4 Lib. de mort  
de facie.  
b 4 Lib. de hu-  
ma. vi. a.  
c 4 Lib. 7. cap.  
de glur. val.  
d 4 Lib. 5. cap.  
de rec. vi. v. vul-  
neratorum, &  
cap. quomodo  
velut simpli-  
dum est.  
e 4 Lib. 5. cap.  
de cura fluxu  
ling.  
f 11 de Simp-  
med cap. de ipi-  
gia.

a ¶ Lib. 1. cap. de spongia.  
b ¶ Lib. 14. cap. 36.  
c ¶ Lib. 6. c. 34.  
d ¶ Lib. 6. c. 34.  
e ¶ 4. c. 1. c. 34.  
f ¶ 4. c. 1. c. 34.  
g ¶ Lib. 17. ca. 10.  
h ¶ Lib. 17. ca. 10.

h ¶ Vbi agi de fignis caribon d.  
i ¶ Guido in par. 8. Chilo. 1. Per. de Argenti. 1. 1. 8. c. 4. Theod. 1. 1. 8. c. 4.

camenta, quæ encmeta vocantur, quod iam probauit Diofcorides, s' sub his verbis, Spongia ex aqua, posca  
ve recentia glutinat vulnera. quod pariter affirmant Aerius, <sup>b</sup> Alexander, <sup>c</sup> Paulus, <sup>d</sup> & Auicenna, <sup>e</sup> vale  
re in simplicibus, ac recentibus vulneribus. non autem in compositis, & minus caluaria fracta, nam si vinum in com  
modum est, quanto magis aqua, quæ cunctis vulneribus nocet, præsertim ossi detestatio, aut aperto & præ  
terito legitur apud Actium, quod antiqui, dum medicamentum Præsidis reipublice parabant, hæc profe  
rebant verba: Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Iacob huic pharmaco vires largiuntur. Docet pariter Ae  
tius, <sup>f</sup> vt cum deoratur spina, aut ossicula, & in t'ossillis, aut sibi infixæ fuerint, & extrahi nequeat, sic age  
re, te ad agrum descendente conuertere, ipsumque tibi attendere iube, & dicere, egredere os, si tamen os, aut  
fessella, aut quicquid tandem exiit, quemadmodum Iesus Christus ex sepulcro Lazarum eduxit, & que  
madmodum Ionam ex Cero, atque apprehenso argi gutture, dicit, Blasius Martyr, & seruus Christi dicit;  
aut ascende, aut descende. Theodoricus, <sup>g</sup> etiam iunior Chirurgus, dum sagittas de corpore euellere cup  
pit, genibus flexis, dicta Dominica oratione, sagittam manibus apprehendit adiunctis, inquit, sicuti Ni  
codemus clausos ex manibus, & pedibus Domini extraxit, sic & hæc sagitta extrahatur. Alij postea, <sup>h</sup> aut  
medendo, aut medicamenta parando exorcismate tali videntur. In nomine Patris, <sup>i</sup> & Filij, <sup>i</sup> & Spiritus  
sancti <sup>i</sup> Amen. In nomine sanctissimæ Trinitatis indiuisibilis, dextera Domini fecit virtutem, dexte  
ra Domini exaltauit me, nõ moriar, sed viuam, & narrabo opera Domini, castigans castigauit me, & mor  
ti non tradidit me. orantes Dominum, vt infirmus sanetur: qualia verò sint huiusmodi medicamenta,  
quarendum est apud Vgonem, & Theodoricum, quibus in deploratis dispositionibus interdum vti for  
san licebit.

## ALTER MODVS.

**SUPER** aquam puram, & claram, dicta confessione genibus flexis, quæ sanctissimam Missam præce  
dit, dicunt aliqui, Benedicta sit sanctissima Trinitas, ac sua indiuisibilis vnitas, confiteor illi, deprecando,  
vt nobis suam ostendat misericordiam, benedicamus Patri, Filio, & Spiritui sancto, & inclinato capite  
emittit spiritum, postea ter Dominicalè orationem, ac ter Angelicam salutationem dicit, & perias lineas  
nitidas in eam benedictam aquam immergunt, & cum eis sub forma Crucis totum vulnus regunt.

## ALTER MODVS.

**FACTA** confessione, quæ initium sanctissimi Altaris sacrificij est, genibus flexis, ac dicta Dominical  
oratione, ac Angelica salutatione, aquam puram benedicunt, In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti.  
Amen. inde perias immergunt, & vulnus in modum Crucis cooperiunt, dicentes: In nomine sanctissimæ  
Trinitatis, dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltauit me, non moriar, sed viuam, & nar  
rabo opera Domini.

## ALTER MODVS.

**AQUAM** multi sic benedicunt, dicentes, Te benedico aqua per Deum viuum <sup>i</sup> per Deum ve  
rum <sup>i</sup> per Deum sanctum <sup>i</sup> & per Deum, qui te in mundi principio creauit, & per Iesum Christum,  
vnicum filium eius, & dominum nostrum, qui in Cana Galilee cum mirabili signo suæ potentie te in  
vinum permutauit, & equam à Samaritana postulat, in nomine Patris <sup>i</sup> & Filij <sup>i</sup> & Spiritus sancti.  
<sup>i</sup> Amen.

## ALTER MODVS.

**ATQUE** benedicendo dicunt, Sicuti Longinus Hebraeus lancea costatum Domini nostri Iesu Chri  
sti aperuit, à quo statim exiuit sanguis, & aqua, Domine Iesu Christe, te rogo per tuam sanctissimam  
passionem, ac per septem verba, quæ in Cruce dixisti, in manus tuas Domine commendò spiritum meum.  
& per ea verba, quæ in fine pronuntiasti, Consummatum est, & per omnia miracula, quæ fecisti, vt vir  
tem huic aquæ largiaris hoc vulnus sanandi sine sanguinis fluxu, dolore, inflammatione, aut spasmo, in  
nomine Patris <sup>i</sup> & Filij <sup>i</sup> & Spiritus sancti <sup>i</sup> Amen. Christus regnat, Christus imperat, Christus hoc  
vulnus ab omni malo defendat <sup>i</sup> Amen.

## ALTER MODVS.

**NONNISI**, postquam vulnerati peccata sua confessi sunt, & sanctissimam Eucharistiam sump  
serint, ac percussori pepercerint, simulque manibus iunctis generalem confessionem pronuntiauerint, quin  
quies Pater noster, & quinquies Ave Maria, dixerint ad honorem quinque plagarum domini nostri Iesu  
Christi, secretè super vulnus hæc proferunt verba, In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti. Domi  
nus noster Iesus Christus in Natalli nocte natus est, & pro nostra salute in Cruce mortuus est, & tertia  
die resurrexerat: nos verò cum deprecamur, vt huic vulneri impetret ad sanitatem, dolore, & spasmo  
vacare. accipiunt inde quinque perias in pura aqua madefactas; quæ prius in hunc modum benedicta  
fuerint: In nomine Patris, & Filij, & Spiritus sancti, & vulnus ad modum Crucis cooperiunt, dicen  
tes. Domine sic mihi dedit, sic illi placuit, sic etiam, quando illi placuerit, me liberabit, & eius nomen  
bene

- 10 benedictum sit in secula seculorum. Amen. & tandem, ut unico verbo in hac curandi ratione concludamus, hæc, & similia sacra verba, si rectè, ac bona intentione prolata fuerint, maximam habere virtutem & potentiam, existimandum est. secus verò, ac superstitiosè, aut minus rectè, illi, qui eis abutuntur, puniuntur.

*Operationum chirurgicalium, in calvaria fracta curatione, breue compendium.*

- 30 **C**hiavros, qui calvaria fracta curatione est aggressurus, in omnibus medicinarum partibus exercitus esse debet.
- Iuuenis, aut iuuentuti propinquus, in anatomicis sectionibus instructus, instrumentorum iuxta opportunitatem inuenitor, in simplicibus & compositis medicaminibus exercitatus.
- Quietus, & prudens, sed fortis & intrepidus, eius vestimenta grauitatem ostendentia, sed expedita sint.
- Inter medendum, tranquillo animo appareat, languentibus indubiam salutem promittat, affinis verò, ac de eorum vita querentibus, veritatem, quæ à virium robore, vulneris meliori constitutione, & symptomatum priuatione, sumi solet, prædicere studeat.
- In latentibus, aut timidis percussionibus, ad confutendum Deo peccata sua, & ad condonandum inimicis iniurias, patientes adhortetur in saluberrimis verò pacem probet.
- 30 **S**ymptomata communia, ab his, quæ propria sunt, accuratè distinguat.
- Si quid præter naturam vulnus occupauerit, quietè, ac turò euellat.
- Lumen opportunum, aut aversum, aut aduersum accommodet.
- De toto primo considerationem habeat, inde ad particulares descendat operationes.
- In necessarijs euacuationibus, nempe in sanguinis missione, aut ducenda aluo, sit diligens, & circumspexit.
- Fluxiones à sede affecta, omni ingenio reuellt, veluti frictionibus, cucurbitulis, clysteribus, supposito-rijs, hyrudinibus, ligaturis, aut similibus.
- Vitium ienuem instituat, vinum, moenem, iram, venerem, & omnem animi affectum prohibeat.
- Fluentem sanguinem præsidij opportunis sistat, & caput mollibus indumentis auoluat.
- 40 **I**nstrumentorum varietatem paratam habeat, & eam optimam, ac nitidam conferuet.
- Medicamenta, quibus vitur, aut vti debet, ratione & experimento selecta, ac à fideli & experto aromatario parata, munda, & pulueris expertia seruare studeat.
- Ministri, qui medico assilunt, & eidem opem ferunt, & pauci sint, sed experti, affabiles, & timore vacui.
- Medico operante, omnes filea ne pueri & mulieres procul arceantur, ac rumores omnes vitentur.
- Priusquam ad operationes se conferat, vulnerati vires diligenter perpendat. nam ubi est indigentia, laborandum non est. Secundo morbi magnitudinè consideret, ne prædicendo hallucinetur. Tertiò symptomatum naturam, quæ si valida, ac timoris plena fuerit, & consilium, & focios quærat, ne mali medici nomen subeat.
- 50 **S**i vulnus dilatare tentauerit, cautè id agar, ne læsa pars nimis imbecilla reddatur, & turpis inde residat cicatrix, & ne pericranium operationem impediatur.
- Frontem, tempora, ac calvaria suturas, quàm fieri potest, incolumes conferuet.
- Vigente necessitate, vbique, quocunque tempore, & qualibet die, operationes adimplere tenetur.
- Nisi indicia propria, & causæ immediatæ aduerint, ossa calvaria terebrare minime consensit.
- Ante terebrationem, infirmi aures aut lana, aut xilo obturentur.
- Operationes, qualescunque fuerint, sedem decliuorem exposcunt.
- Cauere oportet, ne operando os calefaciat, & membrana inflammetur.
- Dum instrumenta ad diploiden diuenerint, cautè procedatur, & quanta sit penetratio, specillo sæpe, ac diligenter perquiratur.
- 60 **I**nter fricandum, aut terebrandum, os eo pacto auferatur, quòd quæ sub eo humiditates extraneæ continentur, commodè expurgari possint.
- Ossa terebrata vi extrahi non debent, sed rosacco tepido sæpe humectanda sunt.
- In æstate bis, in hyeme semel, vulnus curare oportet.
- Quæcunque capiti adhibentur, calida qualitatibus adhibeantur.
- In qualibet operatione, caput linteis calidis coopertum decineatur, & nulla apparente inflammatione, ignis propè egrum conferuetur.
- Medicus, medendi rationem, medicaminum vires, lichinorum, plagellarum, penicillorum, turundarum, spleniorum, fasciarum, & clipeorum quantitatem, numerum, materiam, & formam, omni studio consideret, ne comprimant, aut nimis calefaciant.



Symptomatum prohibitionem prævideat, & ea, quæ apparent, corrigere, & proligare studeat.

Necessarias indicationes, præparando, abstergendo, carnem producendo, ac cutim inducendo, secundum tempora opportunitatem obiectet.

Fasciandi modus primis diebus sit retentivus, postea expulsiuus, vltimò incarnatiuus.

Si ossis superficies desquamari debet, vulnus apertum præseruetur, & ossis eleuatio expectetur.

Citò, & serò ossa desquamantur, secundum patientis habitudinem, ætatem, exercitium, & anni tēpus, aut topicorum potencias, & operationes.

Optimi medici munus est, vt agat citò, rurò, lateò, & quàm minimo cum dolore, & hoc illius potissimum munus est, vt in suis operationibus, si non iuuat, saltem non noceat.

Hæc sunt, quæ in materia de caluarie curatione ex nunc habere potuimus, & pro fine primi libri huius primæ sectionis, ad laudem omnipotentis Dei, cui infinitas, ac immortales reddimus gratias.



## CHIRVrgIAE

IOANNIS ANDREAE  
A CRUCE, VENETI  
MEDICI,

## Tractatus Secundus.

## De vulneribus.

## LIBER SECVNDVS.




## De Facie vulnerata. Cap. Primum.



A 124, idest pars illa tota, quæ capillis subijcitur, ac mento & auribus terminatur, motuque voluntario mouetur, à Græcis Protopon dicta, cum sit membrum iniurijs exterioribus expositum, sæpè vulnere aliquo affligi solet, nempe ab acuto telo perforante, aut ab ense, vel gladio secante, aut à re graui, obtusa, & plana contudente, vnde variæ, ac diuersæ in ea occurrunt continui solutiones. Quarum omnium de sectis vulneribus ad præsens aliqua enarrare decreuimus. Huiusmodi enim vulnera, aut simplicia sunt, & pex se sola manent, ac citra substantiæ deperditionem, aut alio morbo, vel diuerso symptoma te, aut propria causa complicantur. Porro ea simplicia vulnera sunt, quæ rationem causæ non obediunt, & carnosas tantum partes leuiter offendunt, nempe frontem solum, aut genas, & nihil proprijs habent, ac tunc citò, & sine molestia vniuntur, & agglutinantur. Præsertim, quia hæ partes siccæ, & viscidæ natura sunt, ob id faciliorem curationem admittunt, ac ratione medici finalis indicatio vna tantum remanet, vt sanato vulnere, cicatrix perpulchra, ac decora resideat, & appareat. At si vulnus in summo non refidet, aut per longitudinem alitè descēdit, non parui timoris iudicatur. & prima eius curandi methodus est extraneorum, si quæ aderint, ablatio, mox laborum æqualis, & iusta vitio; Extranea propterea extrinsecus aduenientia consilium asserenda esse existimamus, dum sanè sine iactura, & magno dolore, diuici possunt, vt vulneris labra citò coire valeant. extranea verò appellamus, non tantum quæ extrinsecus adueniunt, sed quæcunque nostræ naturæ contraria aliquo modo sunt; aut ab ipsa natura conseruari nequeunt, vt piliferium, vitrum, lignum, lapis, ossa fracta, caro contusa, sanguis à venis extramissus, & similia, quæ omnia, aut curationi aduersantur, aut turpem cicatricem producunt; quemadmodum & telorum ærugo, aut sclopotorum pulueris nigredo, aut gossipium exultum, quod frequenter, vt sanguis cohibeatur, vulneribus adhibetur, aut mala medendi ratio, in qua prima die summa ope nitendum est, vt nihil agatur, priusquam vulnus intus purgatum sit, nequid ibi alienæ rei, nec linamentum quidem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est, nec cœcreti sanguinis relinquantur. id enim & in pus vertitur, & inflammationem mouet, & conglutinari vulnus prohibet. quare non inconuenit inter dum, ipsum aut vino, aut posca abluere, postmodum, vt vulneris partes quàm rectissimè adinuicem coniungātur, nempe accommodata sutura, ac videlicet subtilissima, breui, ac rotundacuius causa ita excavata sit, vt in ea huius ad faciliorem acus transitum recodatur, sic enim mitius corpori insidet; filum verò lineum,

æquale, & duplicatum, sed non feticum probatur, nam id carnem citò diuidere solet. Puncta verò bre-  
uia sūt, & adinuicem æqualiter distent, quæ nec admodum profunda, nec multum in summo figantur.  
Aliquidem hæc non retinet, illa verò cutim facillimè fecit, hoc peracto, si sanguis multus emanauerit, oui  
albumine, aut posca, aut pulueribus ad hoc destinatis, si alter non datur modus, sistatur. à gossipio, siue  
bombice adusta omnino abstinentidum est, siquidem eius nigredinis vestigia in cicatrice apparere solent.  
Postmodum victum tenuem, donec ab inflammatione, aut reliquis symptomatibus eger tutus fuerit, præ  
scribere oportet, venam cephalicam, si affectus egerit, ac ætas, & vires serant, iniectione prius clystere mol-  
liente, aperiatis medicamenta etiam laxantia, mitiora tamen iuxta humorum dominium, exhibeantur,  
ac, ut quotidie albus liberè fluat, curabimus. Animi ac corporis quies summè probatur. Altera verò die,  
ut partes scilicet rore proprio, ac elementari per viam, scilicet primæ intectionis, absque sanie viri pos-  
sint, studere oportet, nempe glutine aliquo, super linteolis hinc inde extenso, quò sic vitæ partes con-  
seruentur, quo facto, quamprimum sutura secetur, & puncta amoueantur. Gluten verò vario modo pa-  
rari solet. Aliqui glutine piscium aceto soluto, & cocto, vtuntur, alij ex oui albumine diu concusso le-  
uiter, fundum vasis ænei cooperiunt, de super postmodum tenuissimam calcem viuam, vt vix appareat,  
inspergunt, & facta tenaci mixtura, paratam telam liniunt: accipiunt multi gummi arabici, dragagabri, ma-  
sticis, myrrhæ, picis, sanguinis draconis, calcis viæ an. drag. s. pollinis, id est farinæ volatilis molendini  
drag. j. albuminis oui q. s. misce. Alij glutin sic construunt, & hoc illud est, quò quàm sepiusmè vti sumus.  
Accipiunt casei vaccini antiqui non salini ad libitum, ipsiisque diu terunt, vsque ad mellis consistenti-  
am, cum oui candido hyemali tempore, aut lacte siccum sub magnis æstibus, aut saltim cum aqua rosæ, &  
addita viua calce optimè puluerizata q. s. iterum omnia simul, vsque ad glutinis formam componunt, quæ  
isti collam vocant, & ea hoc modo vtuntur. facta labrorum vulneris æquali vnione, vbi motus validus  
non adest, ac pannis lineis validis, & non asperis, glutine aliquo linis, ac vtrinque admotis, qui, ut exigit  
vulneris forma, quantitas, & situs, diuersas effigies præ se ferunt, nempe Triangularem, aut Quadra-  
tam, aut Semioualem, aut Oualem, aut alterius modi, ad formam scilicet partis  
inclisæ, cui applicari debent, vulnus constringunt, quemadmodum in his figuris, caracteribus signatis,  
concreti potest.



Ea verò magnitudine parari gluten debet, quæ laeso membro, ac vulnere congruere videatur, potissi-  
mum vbi cicatricem apparere minimè speramus. panni verò aliquo tenaci glutine linis, ac vtroque  
per digitum equidistantiam ad vulneris latera adhibiti, cum adhære tenaciter videntur, & sicci facti sunt,  
simul aut laqueis, aut sutura constringantur, donec vulneris labra adinuicem rectè commissa cohererint,  
quæ postmodum superaddito medicamento ex oui candido optimè concusso, addita rosæ aquæ quar-  
ta parte, glutinabuntur, aut Recip. Aquæ ardentis, virg nuncupata, decoctionis consolidæ, aquæ, & ma-  
sticis in vino, albuminis oui diu concussis, an. portione æquali, colentur, & quod percolatum est, vtere. Tu-  
rundæ verò si in profundis vulneribus, aut vbi ossa fracta sunt, aut caro ablata, vel interperies aliqua ap-  
paruerit, admodum non sunt sic enim cicatrix deletur. At si vulnus casum fuerit, vel carnis, aut ossis  
pars aliqua deprea est, tunc de laram, & turpion cicatricem expectare oportet: si sanguinis copia em-  
onat, opportunè pressidii sistatur postmodum ab omni superfluitate expurgato vulnere, digito queratur,  
an os situm, aut manifestam fracturam patiarur, siquidem notæ fracturæ osium sensu tactus sunt: si  
talis perspicitur, quæ aut vbiq; sciuncta sunt, aut aliam lateri adherent; si ex toto fractura est diducta,  
aut cratera. Secus verò, nullo modo dimouenda est, ne inde turpis residue cicatrix. huiusmodi enim vul-  
nera adhibitis opportunis remedijs, ac conuenienti ligatione, quæ in fronte, aut vbi pili non adfuerint, firmè  
gere debet, facillimè adherent, & agglutinantur. Igitur dimissa acuum apolutione, aut pellicularum su-  
tura, quæcunque fuerit vulnus, aut in parte molli & mobili, aut sicca & immobili, humilioris, siue com-  
muni sutura vi comode expe dit: quæ inde per aliquos dies tali puluere à putredine præseruetur. Recip.  
sarcocollæ, dragaganti, terræ samis, aloes, masticis, an. drag. s. misce. & fiat pulvis febrilissimus, si humidi-  
tas multa abundauerit, sutura secetur, & glutine aliquo labra simul committantur, in imis partibus orifi-  
cio dimisso, & tunc emplastro illo celebri barbaro simplicioris temperaturæ, aut tripharmacæ, aut de  
minio, aut de puluere eius vi tempestiua est, quæ autem commissa sunt partes, prima die, nec nimis  
hæte.

- 10 lare, nec nimis arcte constringantur, sed gradatim iam expurgato vulnere, præsertim si ad buccam terminauerit, tunc enim assiduè rhodomel adhibeatur interius, & os aliquo magistrali decocto abluatur, quale hoc est. Reci. penthlonis, myrtiliorû, radicum consolide maioris, gummi arabici, dragagani an. mîscæ, & decoquid in vino nigro paretur. cui addatur syrûpi myrtini, aut rosaceti, aut diamoroniis, quod fat erit, & vtere: Interim multa obseruanda sunt, nempe ne vulneratus vi quadam manducet, nâ violenta masticatio, ac multus risus, & frequens loquela, si vulnus alicuius fuerit momenti, futura ab-rumpit. porro circa humida, meri potus, aer malus, ventus, ira, clamores, & similia vniomem prohibere solent, quæ nature tantum opus est; si autem carnis portio sublata fuerit, nec futura, nec glutine vi est opus; siquidem à futura vulnus recolecti marsupij effligim præ se tert. Tunc vulneris caui sanandi pri-ma indicatio nobis insinuat, carnem eadem specie cum ea, quæ perijt, rursus giugnendam esse. quo fit, vt
- 30 geminus curandi finis nobis propositus sit, nempe repletio, & vnitio; quoniam & affectus geminus est, videlicet continui diuortii, & cautitas, quæ ex amissa propria substantia est contracta; itaque continui diuortium vniomem, cautitas repletionem desiderat. Particulares verò indicationes, quibus causa vulne-ra repleti solent, sumuntur ab ægri temperie vniuersali, ætate, sexu, exercitio, modo viuendi, necnon sedis affectû natura, & compositione. adhuc, vulneris quantitate, & symptomatum robore; siquidem horum plurima dum à symmetro naturali deuiant, caro non generabitur. nam carnis giugnende materia sanguis bonus est, qui nec quantitate, nec qualitate vitiosus fuerit. opifex verò, & edificatrix causa, natura ipsa, quæ opificis rationem non habebit, nisi subiecta materia iustum temperamentum obtineat; & sanguis, qui ad eam fluat, bonus, & modicus sit. hac ratione, his ambabus causis, vi caro nascitur, præsentibus, nulloq; extrinsecus, quod impediat, obstante, carnis generatio prohiberi non potest. Quæ verò singulariter in hac indicatione obseruanda sunt, loco suo explicabimus: vbi verò vulnus purgatum, ac repletum fuerit, vt cicatrix pulchra inducatur (quod summè necessarium est) studere oportet. hæc ex curicula quadam noua producit, quæ talis omnino, qualis erat quæ perijt, esse non potest; illa quidem ex femine patris ortum habuit, hæc per accidens giignitur, & curis officium supplet, quæ carnis regimè-tum est; vnde interdum ex medicorum imperitia, aut negligentia cicatrices deformes, atque indecoræ productur; prout aliquæ causæ sunt, vbi ossa exoluta fuerint, quæ teste Hippocrate correctione nō admittunt. Interdum ex mala medela, quæ ante tempus opportunum cicatricibus medicinis (Epato-lia Græci dicuntur) vsa est, tollitur hoc symptoma, cicatricem remouendo, & vulnus denuo planū renouando, quod facit assidua fricatio cum vino puro, aut geranijsolijs, aut cantharidibus, donec veli-cula eleuetur. quæ amota, vulnus, adhibito emplastro auro, aut basilicone minori, carne replet. post-modum noua cicatrix inducitur. At si eleuata, & eminens plus iusto apparebit, ut inequalis, & crista-fur, si adhuc recens, & tenella existerit, diu, ex antiquiore experientia, asinina pinguedine fricetur, & superaddita lamina plumbea arcte alligetur: si verò dura, inueterata, & callosa erit, scalpello exulce-rari debet, aut medicamentis, quod duram substantiam excedat, tollatur, aut saltem cute exulcerata su-pereminens caro aut alumine roche adusto, aut hydrargyro sparato, aut squama gris cōbusta, aut aliquo simili Epirotico absumatur, donec sanæ cuti æquetur, & tunc cicatrix inducatur. quæ si dura tantum per-cipitur, admoto diachylone, aut lithargyro, aceto acri nutritio, molliatur. quod etiam faciunt radices cu-cumerorû agrestium trite, addita asnerina axongia, aut ciclamini radices trite cum melle: delect no-uas cicatrices vnguentum alabastrinum, de pomo citri, & de ouo. idem facit oleum de tritico, de myr-tha, de vitellis ouorû, balsaminum, & balsamū ipsum, si haberi potest. valer etiam mirisic in Vere aqua;
- 50 quæ à vite incisa refudat, aut à fraxino viridi, cum altero capite aduritur, aut ab ouo recenti, si apud prunas coquitur. Nigricantes verò cicatrices, aut malo colore affectas, remouet oleum, in quo brionij radix incocta fuerit, aut calamintha in vino bullita; aut Reci. argenti sublimati vnc. s. succi limoniû drag. ij. ducantur omnia in mortario lapideo, cum pestillo ligneo, sub Sole, donec siccetur. deinde ponatur in linteolo, & fiat fasciculus, qui leuiter immergi debet in duabus partibus succi limonum, & vna aque ro-sarum; & ita dimittatur, donec succus totus absumatur; & facta leui expressione, ex eo, quod expres-sum est, cicatrix liniatur. Hæc pro cicatricibus reparandis agenda sunt: Attamen, vt ait Celsus libro 3. capite vngui molestio, circa finem, Scultum est, si vel excreuerit cicatrix, vel causa fuerit, decoris causa, rursus & dolores, & acrem medicinam sustinere.

De oculorum vulneribus. Cap. II.



**C**VLUS, idest organa visus, vulnere aliquo affici solent, à telo præsertim acuto, & perforante; sæpè etiam à re graui, obtusa, & equali, nempe lapide, aut pila, aut re simili contundente; raro verò, aut nunquam scetum vulnus patiuntur, quin & facies ipsa magno vulnere, ac profundo lsdatur, cum oculi canis sedibus sint reconditi, ac præsertim eorum vulnera apertissime sensibus dignoscuntur, & medico ma-gnum negotium, ac egrotanti periculum non minus afferunt; ob id, quia eorum me-branæ, ac acui immediatè à cerebro propagantur, maximo sensu præditi sunt, & ad visoriam facultatem destinati humores continent labiles, tunicas tenuissimas, perpetuò mouentur, &

itiones recipiunt vndeque facillimè, quare non ab re est, aut cæcitatem, quæ ex paruo admodum  
 ietu oriri solet, aut futuram mortem ab aliquam consulsionem, prædicere: Quomodo cumque verò lesio  
 aliqua eis conigerit, statim eiusdem lateris vena cephalica aperitur, ob eorum enim nimium sensum,  
 facillimè atrocissimo dolore cruciantur, & quamplurimè materię ad sedem dolentem plus iusto trahun-  
 tur, & inde inflammatione vexantur; vnde ne oculus corruptatur, vereri oportet: nam ab Actio sic dicti  
 est; Vbi profundum vulnus in oculo obtigerit, ne infusi humores periclitentur, obseruari oportet, ac ne  
 inflammatio sublequetur, quam febris, & consulsio comitatur. præ omnibus ergo, si virtus ferunt, vena  
 cubiti capitalis secanda est, inter initia enim nihil hoc præsidio efficacius: at si venę lectio non admittitur,  
 purgatorio idoneo vtamur; sin minus, clysteribus alium subducenibus, euacuatio fiat; victus ratio te-  
 nuissimè sit, & ea omnia cauenda sunt, quæ caput replere solent, ac fluxiones irritare; vinum ex toto,  
 visquequò accidentia quieuerint, prohibeatur; obscuritas probatur, motus omnia, & mentalis & corpo-  
 ralis alienus sit: si sternutare, vomere, ac fortiter clamare, pelissimum est: repellentia verò apertissime fronti,  
 ac temporibus admouebuntur. parantur ex oui albumine consulsio, aqua rosacea, & boloarmeno, aut ex  
 vnguento rosaceo, croco, & cerula: in oculo candidum oui aliquandiu digito agitur aut instilletur, ac de-  
 super cataplasma adhibeatur ex oui albo, & luteo consulsio, addito rhodino, vno nigro, & hordei farina,  
 ita vt leuiter resectum, & lana exceptum adhibeatur, & leui fascia equaliter comprimat. In secundo  
 apparatu albumini ouorum addicere poterimus collyrium album sine opio ad dimidium, ac desuper  
 fomentum, quod ex rosarum, meliloti, ac capitum papauerum decocto, cum modula panis, vtello oui, an-  
 croco, & mulierum lacte, componitur, oculus verò leuiter deligetur, & cataplasmata leuia sint; ac, ne sic-  
 centur, crebro permittentur: & superna palpebra sola ex his contegatur: si oculus dexter afficitur, dor-  
 miat patiens super latus finitrum, si vulnus fuerit in finitro, quiescat super latus dexterum. In tertio ve-  
 rò, aut quarto apparatu Recip. Syephalbi sine opio Ratis drag. ij. aque rosarum, albuminis ouorum an.  
 vnc. j. tutie præparatæ drag. ij. ducantur aliquandiu omnia in mortario marmoreo, & veteri sub forma  
 collyrii aut Recip. Lapidis hæmatitis præparati scrup. ij. camphoræ, aloes loti, an. drag. ij. tutie præparatæ,  
 sieph memihæ an. drag. s. misce in mortario plumbeo visque ad linimentum consistunt, & vttere, medi-  
 camenta hæc omnia ab particule naturam ab omni rosione, siue morsu aliena, adhiberi debent, inter quæ  
 quod ex pompholyge, & aloes lota conficitur, ab omnibus probatur. Succus etiam quamplurimi, iplis, mi-  
 scetur, non solum rosionis expertes omnino, sed qui vehementissimos dolores lenire possunt; vt poli-  
 gonij, oleastri, aut plantaginis. Nos verò ab oui albumine non discedimus, constat etiam talia præfida,  
 cum medendi tempus prope est, vt formentur, eo quod citò ardeant. omnes pariter puncturæ in oculo,  
 (quales à stylo, aut aliquo confimili telo imprimuntur) magni timoris sunt; & si cornea perforatur, excut  
 humores & muci, præsertim aquo si, & inde cæcitatem expectare oportet. igitur post viuensalem curan-  
 di methodum, si nullus instat dolor, solo oui candido; secus verò turturis, aut columbe sîngine, irrigan-  
 dæ sunt. ab initio quidè fomenta, aut cataplasmata calida vitanda merito veniunt, sed ea vlti tunc utur,  
 quæ ad prohibendas inflammationes parantur; collyria etiam leuissima adhibeantur, quanuis vulnus im-  
 purum apparuerit: experti plures sumus trifolij oculati succum (andacochar isti vocant) addita tutia præ-  
 parata, & cando puluerizat o. adhuc oui candidum diu consulum cum tertia parte aque rosarum, ac pa-  
 rum quid tutie præparatæ & boliarmeni, aut Recip. Syeph de thure drag. j. de plumbo, tutie præpa-  
 ratæ, aloes loti, candi. an. drag. s. succi andacochar, aut eufragiæ, aque rosarum an. q. s. misce, do-  
 nec collyrium efformatum fuerit; de quo guttatim repidum in oculo instilletur, ac desuper linteolo-  
 rum, vnguento rosato Mcfues, aut cerulato coopertum, applicetur. si multa effluit humiditas, tali præ-  
 sidio excisicetur. Recip. Lapidis hæmatitis, antimonij præparati, tutie præparatæ, an. scrup. j. croci g. v.  
 misce, & fiat pulvis tenuissimus: qui in linteolo sub fasciculi forma alligatur, & bulliat in aqua plan-  
 taginis, & rosarum, & fiat expressio, & quod expressum est, guttatim oculo adhibeatur. Si verò o-  
 culus prolapsus fuerit (vt ex casu ab alto, aut ex violenta quadam capitis percussione contingit) rupsit  
 nempe vasit, aut pelliculis, aut lacertis, quibus in eius capsula adheret, & conseruatur, periculosa se-  
 quitur affectio; & si foras iam rupsit procedit, sine auxilio res est, quamuis dixerit Galenus; Inre-  
 dibile quippiam, & quod nunquam antea videre conseruaram. Puer cum iuxta pupillam stylo pun-  
 geretur, effluente proxius aquoso humore, imminuta est pupilla, ac ceratoides tunica omnino corruga-  
 ra videbatur, qui mox curatus, visum recuperauit, inflaturio scilicet humore paulatim, qui antea effluxe-  
 rat. Sed huiusmodi euentus raro videntur. nam talia vuluera magna ex parte cæcitatem inducunt: ab  
 Hippocrate æquidem dictum est; Quibus rumpuntur oculi, & postea prominent, vt extra locū oculi sit,  
 his & tempore, & arte, opem ferre non datur, ad hoc vt videant, possit fortasse humore albugineus resit-  
 ui, tunica intacta remanere, quod evenire nequit, si vitrea, aut vasa fuerit vulnerata: cunqne igitur affe-  
 ctus similis occurrat, statim ea curatio adhibenda est, quæ per venæ sectionem, & capitis purgationem ce-  
 lebratur. cibis, ac vini potus subrahendus est, & ea topica conserre videntur, quæ dolores emulere so-  
 lent. exterius verò repellentia adhiberi debent, quæ non exasperent, hoc est non validam habeant astri-  
 ctionem; mitigatoria verò sunt oui albumen, foenugraci decoctum, sanguis columbaceus, sub ala extra-  
 ctus tepidus, ac maberis iuncule læ recter in oculo expressum. Hæc verò monomemata Græci dicta  
 medicamenta, in vehementissimis doloribus, aut dum inflammationis initium veretur, aut propter au-

a Hipp. 6. Aphor. 31. & v.  
 Aphor. 47. Cel.  
 lib. 3. c. 6. Gal.  
 de comp. med. lib.  
 Inc. v. & lib. de  
 oculis cap. 10.  
 Aer. lib. 6. c. 33.  
 Pau. lib. 3. c. 33.  
 Auic. 3. c. 37. c. 6.  
 3. Raz. 9. ad  
 Alm. cap. 15.

b Libro. 9. ad  
 Alm. cap. 15.

c Libro. 1. de  
 symp. can. ca. 1.

d Lib. 3. præi.  
 c. oculis.

- 10 xi humoris acrimoniam administrare tenerur, non tamen immediate supra vulnus, sed in locis propin-  
quioribus, exterius verò spongiam mollem, aut plenium posca, aut vino asfringente, aut rolarum de-  
cocto imbutam, superdare commodum est; aut tale adhibeatur medicamentum, Recip. Syeph albi com-  
pleti, syeph de plumbo an. drag. j. seminum papaveris albi, fenugraci an. drag. ij. aque rolarum, lactis mu-  
lierum an. drag. s. pulpe pomorum coctorum vnc. ij. misce pro cataplasmate, aut llecip. foliorum papave-  
ris albi coctorum sub cineribus, carnis malorum dulcium similiter coctorum an. vnc. ij. croci drag. j.  
fumine femi. fenugraci drag. s. lactis muliebris vnc. i. olei rosati completi abluti q. s. misce,  
& fiat cataplasma. in dolore vero mitiori sat est. emplastrum parare ex pulpis pomorum dulcium  
sub prunis coctorum, cum saccharo copioso, vnguento rosaceo, & croco: caput pilis denudetur, &  
cucurbitula occipiti, ac vertici affigatur: reuulsiões à longinquis secundum omnem modum lau-  
dantur, & visus acrimia clysteriorum summo perè probatur. Cubantis locus obscurus sit, & lumen oppo-  
situm conferuetur; Somnus, ac quies perpetuò sint, elevato capite, aer verò, & omnia calida viten-  
tur. coitus etiam his vulneribus inimicissimus est: At si vulnus simul cum inflammatione obortum fuerit,  
curationem ex his, quæ inflammationem linire, & concoquere possunt, moliemur, non neglectis ijs, quæ ad  
vulnus propriè pertinere videntur. Ad disciendum, ac dissoluendum sanguinem, ex ista aut contusione  
in oculo, aut tunicis concretum, ruptis nempe, aut contusis valis in oculorum tunicis (affectus Græcè Hy-  
pophagma, & ab Arabibus Taisati dictus) facit sanguis columbaceus calens cum mulebri lacte instilla-  
tus, ac super medullam panis torrefacta, & vino rubeo macerata ac expressa. valet absynthium viride tri-  
tum, cum oui albumine, nocte superpositum. pariter & fomentum ex decocto ferni le campanæ, & semi-  
num fenugraci aut Recip. Collyrii albi, mucilaginis seminum cidoniorum, aqua rosari extractæ an. vnc.  
30 saloes lotij, iunie præparatæ an. drag. s. misce, pro collyrio, laudatur ad hoc collyrium diademon, nilli, &  
diaphsimon, ac multa alia medicamenta, quæ a Galeno<sup>a</sup> descripta sunt. si quod autem vulnus bulbi, siue  
oculi capsulam tamquam leserit, tunc terebinthina abluatur, aqua consolidæ aut feniculi, & cum ea vulnus  
regatur: si verò sagitta hoc effecerit, magnus in de oritur timor, & ea tunc observanda sunt, quæ intra li-  
bro sexto explicaturi sumus: si quid verò præter naturam in oculi substantia infixum fuerit, ac ita ibi resi-  
deat, quòd nisi quadam violentia euelli possit, nullo modo commouendum est, præterquam si grugino-  
sum, aut venenosum fuerit, sed opus totum naturæ committatur: localia verò medicamenta parentur ex  
oleo terebinthine, aut de vitellis ouorum, & parum quid croci, exterius fomentum adhibeatur ex decocto  
fenugraci, profarū rubearū, & plantaginis in vino nigro, ad coerendum inflammationem: oculorum ve-  
rò cicatrices attenuat collyrium ex succo eufragiæ, & rutæ, cum melle, & sagapeno, aut ex succo anagalli  
40 dis, & feniculi cum melle, & felle taurino.

<sup>a</sup> Lib. 4. & 7.  
de comp. m. li.  
cundum. lo-  
cos.

## De Naribus sauciatis. Cap. III.



**N**asus, hoc est instrumenta odoratus, multoties aut transuersaliter, aut oblique  
vulnerantur: interdum contusione aliqua affliguntur, aut eorum pars amputatur,  
aut densiores partes franguntur. quomodocunque autem lædantur, si affectus ad  
narium foramina non deuenierit, curationis methodus eadem sit, quæ capite de  
simplici vulnere faciei superius iam descripta est. Si verò foramina ipsa læsa fue-  
rint, summa diligentia adhibenda est, ne odoratus aut minuat, aut destruat. qua-  
re partes vulneris simplici futura, ac nempe breui, & curva (quæ si talis in prom-  
ptu non habetur, igitur supercalescitur recuruetur) secundum iustam naturam, adiuuante committan-  
tur, vt deinde cicatrix non sit deformis, non distorta, sed aspectu iucunda: inde superaddito oui albu-  
mine optimè agitato, internæ partes digitis minimis in nares immittis, aut saltem specillo, exactè, &  
concinne sunt componendæ; ac, si decet, cannula argentea, aut plumbea, aut penna aserina, aut vultu-  
ris, aliquo confringente linimento exterius obuolura naribus imponatur, vt eorum forma, ac vitilitas, &  
officium conseruetur, id est, ne spirandi, ac odorandi facultas destruat, si paries nimis arctè coierint;  
exterius verò aut oui candidum, aut barbarum simplicioris temperaturæ adhibeatur. at si hic curandi  
ratio molesta fuerit, quia inspiratio prohibetur, aut quia patiens distillatione vexatur, aut dolore affligi-  
tur, tunc inde internæ adhibeantur, molles nempe, ac flexibiles, barbaro mirrhino multo soluto, muni-  
60 tæ: siquidem nares solent humido proprio citò glutinari, hac ratione, quanto citius expedit, puncta fe-  
ciuntur, & gluten aliquod imponatur, vt de facie vulnerata dictum est. Dum verò contrahitur, & cō-  
tinui nulla apparet solutio, statim manibus cōprimatur, & rectè æquetur, ne sinus reddatur, aut deor-  
sum spectet, aut in neutram partem inclinetur, ac statim oui luteum cum duplici rhodini parte applice-  
tur, aut oxirhodinum cum cerua adhibeatur, sic enim dolor quiescere solet, & fluxiones inhibentur.  
postremo nigredinē tollit emplastrum ex quo, aut alabastrum studere enim debemus, vt quæ contusa  
sunt, maximè ab inflammatione teneantur, & quæ inflammata sunt, celerrimè ab inflammatione liberen-  
tur: ubi id parçè viuere, ac corpus totum euacuare, optimum præsidium est.

<sup>b</sup> Hipp. lib. 2.  
de articulis. Pm.  
lib. 6. p. 1. Anas.  
7. ar. 3. cap. 3.

Si frangitur natus, fractura: modus vnus non est: siquidem interdum comprimitur, interdum abrum-  
pitur, interdum etiam deorsum, aut ad latus, aut in ea parte, quæ cartilaginosa est, aut in ea, quæ osi  
bus



bus continetur, inclinatur. Ima narium pars, quia cartilaginea est, frangi non solet, sed contundi, siua peruerit, superior, quæ ossa est, frangi commodissime enim restituitur. Nasus fractus, si in inferiorem partem demittitur, eadem die, vel certe paulo post: Nasus enim (ait Hippocrates) ex omnibus corporis partibus facillime componitur. eequidem nullum vnoquam nasum fractum vidimus, qui non posset protinus componi, si priusquam callus increseat, compelleretur, modò quis rectè mederi possit, ac vellet.

Ex eo si fractura omnino in inferiori parte fuerit, dirigere eam oportet, atque superius compellere, & in pristinam sedem restituere; cui rei quocumque medico magis idoneus est, æger ipse, si id facere audeat, nā immisso in nares indice, vel minimo digito, nō magno negotio fracti ossis partes in sua sedē reponet, aut si non ipsius ægroti, saltem pueri, aut mulieris, mollibus siquidē manibus opus est, ut optime nasus fractus in priorem effigiem restituatur. vtrinque enim digitos, qui narium accommodentur, immittere oportet, ac in imum, quantum fieri potest, atque ita quiescere, nulla obstante ratione, donec agglutinetur, vel certe multo tempore, in narium quidem callus citò increscit. & nisi corrumpatur (ait Hippocrates) decem diebus sanescit: si verò id fieri nequit, licet aliquid in narium inferere, vel linamē rem, vel lintecolum, ita figuratum, quod idoneum sit, & linimento aliquo cinctum, quale ex manna thurum, boloarmeno, & masticæ, & oui albumine diu agitato parari solet, & sic vnum singulis foraminibus nā si imponatur. Galenus verò frustum pulmonis ouili conijcere docet, asserens, si spongæ indantur, homo rem imbibant. antiqui lintecolum cartaginensē pellicula obuolutum, circumforumque adhibebant, quod magis probatur quàm ouilis pulmo: At ubi fractura superior fuerit, nihil horum dimitti intus potest, nam difficulter spiratus trahitur, sed grandis penna mollis, pellicula circumdata, ne fracta aliqua pars in eius cauum decidat, ea siquidem est, quæ impulsu eget, ut excitata possit in suam sedem derineri.

Quòd si plura erunt fragmenta, eodem modo extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda, & adhibito medicamento ex farina milij recenti lota, & glutinosa, boloarmeno, draganto, thure, masticæ, ac resinæ portunculæ habena ad hoc idonea sic conservari debent, nec altera fasciæ adhibenda est, nam, ut ait Hippocrates, qui præstantia vincula amant, sine mente complura alia lædunt, ut quæ magis partes resimas efficiant, & disforquant. attamen habena interdum sic paratur, quæ vel ut pollicem non excedat, vel quantum conuenit, lata sit, & extrinsecus naso, quæ parte declinatur, intendenda, sic ut nasus dirigatur: longa enim esse debet, ac tum sub aure, ac circa caput sursum adducenda, & ibi obuoluta vincire. verbum ad nasi fracturam diuersitatem, varij modi fascian di, ac fasciæ admodum diuersæ à Galeno lib. de fascijs fuerunt descriptæ, veluti funda, accipiter, vallum, rhombus, & semirhombus, quæ ferè omnes literæ X imaginem præferunt. Cumque nasi pars aliqua ex toto amputatur, præsertim cartilaginosa, curationis spes omnis perditur, ob id, quia hæc pars cum exanguis sit, neque augeat, neque coalescat, Deficientes verò partes, inquit Galenus, quæcunque ex sanguine ortum habent, corrigi quidem non est impossibile, quæ verò ex semine, propemodum impossibile existit: porro augere partes, si iam defecerit propria substantia, subnascente carne, quæ deperdita est, & vocatur cohalinus per viam secundæ intentionis, à Græcis verò sifacosis. Coalescunt verò, dum rore proprio, ac elementari agglutinantur, & dicitur cohalitus per viam primæ intentionis, sifuphis Græcè dicitur: legitur autem diendi non sunt, qui ablatum nasum denuo restituere possent, quoniam neque naturæ artificium, neque artificis munus iam amplo privilegio constitutum est, ut abscissum penitus à facie nasum, in integrum restituere possit, nec nasum semimortuum rescindere debemus; siquidem partem nasi sic constitutam, reificatam, & agglutinatam interdum vidimus: curantur communiter nasi vulnera siccis nimis medicinis: nam Hippocrates ea vulnera abundè ficari voluit: porro si pars nasi frigida, aut semimortua apparuerit, eam, aut patientis manu calefacta, ac diu applicita, aut lintecolis supercalefactis adhibitis, excalefacere oportet: ad quod etiam facere solet pullus gallinaceus, aut columbaceus de recenti sectus, & calidus suprapositus: prius tamen partes futura condecenci vniantur, nasus siquidem, nisi ex toto amputatus fuerit, & conciderit in solum, facillimè agglutinationem recipit.

### De laborum vulneribus. Cap. IIII.



**V**ulnera laborum, quæ ex quatuor muscolis, qui ipsi famulantur, composita sunt, quorum fibræ vario modo procedunt, atque inter se commiscuntur, & implicantur, unde varios motus edunt, exactè ob decoram formam, & quari desiderant, quæ adamussum est conservanda. igitur si amplum fuerit vulnus, decentem requirit futuram, ac sicca medicamenta, quæ cruentis vulneribus accommodantur, nempe quæ citò eius partes sectas agglutinare possint, nam loquela, ac frequenter spumouendo, & humectando, huius membri consolidationem prohibere solent: ob id his vulneribus ea medicamenta iuuare videntur, quæ vulneribus narium prosunt; igitur interius rhodomelle, exterius oui albumine, aut barbaro mirrhino multo soluto, ut amini.



# IOANNIS ANDREAE A CRUCE, VENETI MEDICI,

## Tractatus Tertius,

### De vulneribus.

#### LIBER TERTIUS.



#### De nervis, ac nervolis partibus laesiatis. Cap. Primum.



N partium <sup>1</sup>similarium humani corporis numero nervi habentur, qui, utclique simplices existant, pretiosissima organa sunt, & munere præstantissimo funguntur, cum sensus & motus vniuersi corporis vehiculum sint, à cerebro, & spinali medulla, tanquam à fonte (& si secus crediderit Aristoteles) <sup>2</sup>originem ducentes, cui contuminate indeficienti iunguntur, nec <sup>3</sup>ab ipso admodum discedunt, nisi quatenus compactioni materia sunt constituti: quod factum est, ne à quolibet facile læderentur, eoque magis densantur, quo elongati ab ipso, partibus atque motum excitare tenentur: secus autem si, qui sensibus duntaxat inserviunt, à cerebro immediatè propagati, molliorem consistentiam sunt consecuti, jiccirco etiam humidiores sunt: sic enim ad faciliorem alterationem, velocioremque opus erat, siquidem ad sensuum instrumenta principis partis potentia, luminis instar, irradiantur, perficiuntque instrumenta ipsa, ut species omnes colorum, sonorum, gustus, & tactus suscipere queant, quemadmodum & motui <sup>4</sup>musculis circumfusi, in tendones desinentes, ubique motus arbitrarios impartitur, delata nimis rum identidem facultate ipsa (veluti radius essent) ad omnes partes motrices: cuius quidem rei indicio sunt, superiores partes vinculo obductas, seu quouis modo arcatas prociuis inferiorum obstupescen-  
tiae causam esse, ac earum sensus, & motus priuationis: licet autem partibus quibusdam seivntum nervi sensitui à motui nec distingui, nec percipi possint, non est, cur hæsitandum sit de ipsorum differentia, quin alij sensus, alij motus, delatores existant, cum in quibusdam partibus liquidò constet, ut in oculo, & lingua: dignoscitur etiam ex passionibus. nam nervus incisus, contusus, oppressus, laqueo interceptus, <sup>5</sup>callis affectus, aut putrefactus, à musculo omnem motum, & sensum aufert; & qui phlegmone patitur, non parum convulsione detinetur: eorum <sup>6</sup>substantia satis mollis est, & humida, forma oblonga, & alba, tenui duntaxat membranula induta, ac inter seminaria membra enumerata. Nervi <sup>7</sup>seci non coeunt, neque diminuti augentur, deficient quidem generationis prima materia, eorum <sup>8</sup>tamen propria humida est, à frigido coagulata, à cerebro, & medullari spina alimentum suscipiens: replentur <sup>9</sup>nervi facillime humore albo, frigido, ac viscoso, jiccirco <sup>10</sup>putredini, ac convulsioni obnoxii sunt, quò <sup>11</sup>fit, ut vulnera i eorum curationi æqueum, seu quid aliud humidum medicamentum repugnat: in vniuersum <sup>12</sup>autem omnes tum sensitui, tum motui sensu nimio præditi sunt, non enim ex seipsis, sed desuper à magno principio defluente, fusus tamen in superioribus, maxima animalis spiritus copia exuberante. Hinc ori-

10

10

tur,

89 Gal. lib. 1. de temp. c. 3. & lib. de sect. nervor. Avic. can. ca. de anat. nervorum.

b 4 J. de nat. ani. mal. cap. 4.

c 4 Gal. p. de usu par. c. 14. 16. de usu par. cap. 1. lib. de const. an. m. cap. 4. lib. de motu musculi c. 6. meth. c. 4.

d 4 Arist. 1. Phys. secum. & 11. metaph. Gal. li. de motu musculi.

e 4 Gal. lib. de const. an. c. 4. & li. de femine.

f 4 Hipp. 6. Aph. 19. 2. Aph. 1. 1. libro de Cras. purior. & lib. 1. de semine ca. 8.

g 4 Arist. 3. de an. ani. c. 3. Gal. li. de usu par. c. 6. meth. c. 3. Avic. 1. 3. c. 3.

h 4 Gal. 3. Aph. 1. 1. c. 3. meth. c. 3. 1. 1. c. 3. 1. 1. c. 3.

i 4 Gal. 3. Aph. 1. 1. c. 3. meth. c. 3. 1. 1. c. 3. 1. 1. c. 3.

k 4 Gal. 3. Aph. 1. 1. c. 3. meth. c. 3. 1. 1. c. 3. 1. 1. c. 3.

l 4 Gal. 3. Aph. 1. 1. c. 3. meth. c. 3. 1. 1. c. 3. 1. 1. c. 3.

m 4 Gal. 3. Aph. 1. 1. c. 3. meth. c. 3. 1. 1. c. 3. 1. 1. c. 3.

n 4 Gal. 3. Aph. 1. 1. c. 3. meth. c. 3. 1. 1. c. 3. 1. 1. c. 3.

o 4 Gal. 3. Aph. 1. 1. c. 3. meth. c. 3. 1. 1. c. 3. 1. 1. c. 3.

p 4 Gal. 3. Aph. 1. 1. c. 3. meth. c. 3. 1. 1. c. 3. 1. 1. c. 3.

q 4 Gal. 3. Aph. 1. 1. c. 3. meth. c. 3. 1. 1. c. 3. 1. 1. c. 3.

r 4 Gal. 3. Aph. 1. 1. c. 3. meth. c. 3. 1. 1. c. 3. 1. 1. c. 3.

- 10 tur, quod vulnera sapè conuellantur, & mentis perturbationem pariuntur. Et si ferè naturæ sunt tendones, siue enervationes, tendones à tendendo Græcè dicti, in secundo nervorum partium ordine habiti, qui à musculorum extricare originem ducunt; namque cum nervus à cerebro, aut spinali medulla ad laceri initium terminatur, in eo inseritur, ac in multas, & minimas, seu capillares partes, aut membranas fibras diuellitur, ac disseminatur, quæ totum musculi corpus intertexunt; denud in fine coalescunt, ac corpus quoddam album, densum, ac fatissimum generatur, chori da communi voce appellatum, cuius munus est parti sibi annexæ motum absolvere: sentit autem, ac mouetur ea ratione, quæ nervi est particeps, mixta etenim est eius natura, mediæque inter nervum, & ligamentum, tantæque nervo durior, quanto ligamento mollior, propterea & validiora medicamenta ferre solet, & accidentia ex ipsius orta mitiora apparent. Enumerantur: c post hæc, ac in tertio nervorum ordine sunt, vincula, seu nervæ ligamenta, Græcè δσυνδεσμι, Arabicè hacab appellata, quæ ab ossæ oriuntur, & in ossæ, aut musculo terminantur, & parùm forma ob eorum duritiem, & densitatem à tendonibus dissident, & à nervis mobilitate tantum, cum prorsus sensus caperes sint eorum vitæ est, ossa adiniviscem colligere, ac artus formare; vulnerata, ut nullum vitæ periculum, ita feram, ac difficilem curationem admittunt. Sunt postremo inter nervos substantias enumerati, ac simillimas habent speciem, panniculi nervi, seu membranæ ad hoc genitæ, ut ab eis partes aliquæ duriores sensum accipiant, ut ossa: alioquin, quia substantiæ terree sunt, natura prorsus sensu carent, attamen, dum vivunt, & nutriuntur, mediantè panniculo ea vestiente, stupido sensu prædita sunt, qui vbiq; Græcè περιστεας, quasi circa ossa in capite verò pericranion dicti soler, aliæ verò membranæ sunt, quæ membra induunt, ut pulmones, secur, & lienem, quæ viscera esse non sentiunt, & illis aliquem sensum communicant; aliæ præservant, & intersciunt, ut quæ cor ambit, & syphac Arabicè aliæ conservant, & mediant, ut dura meninx, aliæ dividunt tantum, ut in thorace mediastinum, Græcè διαφραγονδες dictæ, aliæ sunt, quæ suspendunt, ac alios præstantes vsus corpori asserunt, quæ vulneribus raro admodum obnoxie sunt, nisi vna secum & membra, quibus præfunt, & consortium tenent, laedantur, quorum, vbi de annexis membris sectis sermoinariuri sumus, & si aliter credat Aristoteles) curationem aggrediemur.

a Gal. lib. iii. par. mca. 92. c. mch. ca. 1. & 3. lxxviii.

b Gal. libro de moris mch. 6. mch. 2. c. 4. c Gal. 14. de vlt. par. 6. mch. cap. 4. d Gal. 6. mch. cap. 4.

e Lib. 3. de mor. an. cap. 1.

## De nervorum vulnerum formali differentia. Cap. II.

- 40 **N**ERVOUM, ac nervosarum partium vulnerum curationem tractaturi, de qua aliqui nihil, quidam vberius, quidam parcius, quam ars ipsa chirurgica exposituare videatur, disseruere, decet quidem prius ad maioris huius rei dilucidationem eorum formales differentias scrutari, quæ ad tertiarium numerum reducantur, nempe ad sectionem, puncturam, & contusionem: porro si occurrat, ut casim nervus vulneretur, vultus id, vel transtversim, vel iuxta longitudinem inhiñxi erisq; ex horum utriusque quoddam sit sine substantiæ carnosæ amissione, quoddam cum carnis, ac cutis, quæ interueniebat, deperditione in utroque etiam, vel ex toto nervus præcisus est, vel ex parte dissectus, quod pariter puncturis aduenire solet; aut manifestè, aut occultè, cum vel secundum partem, vel iuxta medietatem, aut secundum totum perforaturum verò nervo contritio accidit, ea nempe erit vel sola, & simplex absque carnis diuisione, & nervi attritione, aut cū manifesta continui solutione, adeo ut quandoque, sicut in ceteris similibus vulneribus, nervus nudus appareat, interdum punctus, aut sectus: insuper aliquæ aliquo vrgemium symptomatum genere complicantur, nempe dum ingenti dolore, inflammatione, aut consensione premuntur; aliæ mixte sunt, illas compositas, has simplices sectiones Medici vocare solent. Ab his igitur enumeratis differentiis decet, tanquam à morbi essentia, quam naturam vocant, curatias indicationes ssumere.

## De nervorum vulnerum causis. Cap. III.

- 60 **E**ST omnium eiusmodi vulnerum causæ sunt, quæ & cæterarum corporis partium doloris nempe accedentes, ac per accidentia corpora alterantes, ut substantiæ inanimatæ nimium pungentes, secantes, & contundentes, aut corruptentes, cuiusmodi sunt, quæ veneno affecta esse possunt: verum cum superius, vbi de caluarie curatione egimus, subtilissimè de causis vulnerum enarratum sit, hæc pro nunc sufficiant.

## De nervorum vulnerum signis. Cap. IIII.

- O**TIAS vulnerum nervorum, ac nervosarum partium, propriæ illæ sunt, quæ ob eorum vehementem sensum sunt, præsertim dum sedis affectu substantiæ nervosa suæ sunt, inquam, dolores ingentes, inflammationes, resolutiones, convulsiones, febres, mentis perturbationes, & interitus, verumtamen amor dolor satis commune symptoma est, nec (sicut consensio) liquidò nervum secutum esse ostendit; nam dictum est ab Avicenna, quod sapè nervorū vulnera perducunt ad spasmodum absque aut ecclensione la lionis præuæ, & non de in eis exculatio, quin illis sit apostema magnum absque dolore magno, & faciliores eorū dispositi

f 4. 1. 2. 4. 1.

tiones sunt febres, & apostemata multa apparet in alijs locis, quàm in vulneribus, & fisis, & vigilie, & desiccatio lingue, patet igitur ex his cõuulsionem fieri posse, aut inflammationem, nullo precedente vehementi dolore, aut ob partis naturam, aut ob inflammationis morem, nam Galenus auctore, puncto muscoli capite, quamprimum cõuulsio aduenit, quæ nulla conuenienti medicamentorum vi remittitur in si more verò, in partibus genæ anterioribus, ubi magnum videre est tendonem, qui consensus ratione repecta tina cõuulsione corripitur, morsque inde subsequitur absque dolore magno, quemadmodum etiam post vehementem inflammationem, nam à maximo, eoque celeri humorum defluxu, nervorum, aut chordarum substantia repleri solet, ac tumet, eiusque habitudo alteratur, & inæditur, quo fit, ut sensu diuis deperdat, quæ in eius symmetrio proprio, ac temperamento iuxta naturam consistit, & ob id improprie a causa diuersa subditi in eo factam, apprehendere nequit, quæ tristis sensus est, dolor vocatam, qui enim Galenus<sup>h</sup> Cõuulsio, ac mentis perturbatio sequuntur inflammationes nervorum, ac nervosa-  
rum partium; quare dicere expedit, proprias vulnerum nervorum notas, inflammationes varias esse, cõuulsionem, ac mentis perturbacionem, dolor item si adfuerit, & ipse pariter nervum cõuulsuratum esse testatur. est enim nervus instrumentum, & organum principale sensus tactus, febribus quoque cõtinuis associata rigoribus, nullum seruans periodum, lauciatos nervos consequitur, ob quantitatem vaporum, cordis regionem petentium, medullarum, ubi nervus magnus fuerit vulneratus, ob nervorum cum cerebro confortum, præsertim si quis magnus nervus læsus fuerit, & inflammatio aliqua appareat, à qua eleuari vapores quamplurimi, & putridi, caput afficiunt spiritum animale conturbant, idem ex ardentibus, & assidua febre contingit, dum accenduntur, aut exsiccantur humores, & spiritus in membranis, & in capite, aut ex longis vigilijs, & somni priuatione. Paralysis quoque nervum scdum esse, interdum at testatur, & si inter hæc signa non describatur, declarat siquidem motus instrumenta pati, unde sequitur impotentia quædam ad motum secundum hominis imperium, paralysis admodum similis, præsertim partium sub ipso vulnere existentium, replentur etiam nonnunquam succo diuerso nervi scdum, aut tendones, & instat sibi virtutem amittunt, tremorque partis inde subiicitur, ob spiritum ad inferiora debilem transitum: humoris adhuc à vulnere continuo emanantis copia, eleodes Græcè, melicæria Latinè, nervosam partem vulneratam innuit hæc, si facile effluit, vulnus à doloribus, & alijs pravis symptomatibus innocuum reddit, licet quandoque sarcoma, siue eminens, laxa, mollis, ac spongiosa caro supercrecere videatur: si verò tendoni, aut nervi capiti à vulnere exeant, nervum, aut nervosam partem affectam esse, notius est, quam dicere conueniat, præter id, quod ab affecta sede optimis anatomistis nervum, aut tendonem vulnus accepisse, dignoscitur.

## De præfagandi modo in nervis sauciatis. Cap. V.



Vulnere tanto sensu, ac tali iam demonstratum sit, nervos præditos esse, merito cum læduntur, laboranti periculum imminere, & medico negotium, prædicti potest. namque ad leuem eorum læsionem, acutissimi dolores sequuntur, quos celerimè inflammationi subsequitur, & lege confortij ad sua principia retrahuntur, & cõuulsio sunt, fitque tunc passio acuta, & lethalis, siquidem cõuulsio ex vulnere est lethalis, cum in ea tandem contrahatur sepius transuersum, diaphragma Græcè dictum, anhelitus deficiat, & cordis temperamentum alteretur, eiusque operationes destruantur, unde mors sequitur. Futuram autem cõuulsionem significat tumores mox apparentes, de repente evanescentes, nam quibus tumores in vulneribus apparent, non cõuoluntur, neque infaniunt, verum his evanescentibus, de repente quibusdam à tergo cõuulsiones, & distensiones sunt, quibusdam autem infania, vel dolor lateris acutus, vel suppuratio, vel difficultas intestinorum, si tumores sunt rubicundiores inflammationem igitur vulneribus superuenientem, cõuulsiones sunt, & primum quidem videntur cõuulsij, quæ è dextro sunt partium inflammatione laborantium, deinde, postquam principium attigerit, passio ad totum extenditur corpus; secus verò in calvaria fracta contingit. Quædo igitur quis parte posteriori vulnus accepit, quæ plurimis nervis repletur, ac tumore aliquo vexari incipit, quæ de repente evanescit, cõuulsiones periculum imminet, nec in dorso duntaxat, sed ubique locorum nervorum, dum præterea hæc Hippocrati est; si in vulneribus fortibus, & pravis existentibus, tumor non appareat, ingens malum, illa verò vulnera prava sunt, quæ in capicibus, aut sinibus musculorum occurrunt, & in his suspicandum, nè humores, qui ad vulnus fluere deberent, cerebrum petant, cum tendoni, nam & in his imbibantur, præsertim si dolore cruciantur; quo fit, ut apostemata, cõuulsiones, ac deliria sequantur, malum est igitur, si vulneratis nervis tumor non appareat, hoc est, saniose humiditatis copia; nam laxa vulnera, id est optima sanie prædita, maximam salutis spem pollicentur, non est quidem dubitandum, inquit Galenus, ex vulnere pus generante, siquidem labra vulneris tumida, mollia, ac rubicundiora, quæ cõuulsiones comitantur, certam portendunt salutem, siquidem labra vulneris tumida, mollia, ac rubicundiora, si dolore carerent, ac vulnerati pravorum symptomatum expertes quiescunt, secus verò nervorum vulnera timenda sunt, si clausa fuerint, & non exsperint, nam occurrat vulnere, retineatur materia, ac dolores excitantur, quos inflammationes, vigilie, syncopa, lingue siccitas, febres assidua, alienatio, cõuulsiones, interdumque

49 Gal. lib. art. parum ca. 98. 6. meth. 2. & 3. Krasig. Aet. lib. 24. cap. 17. Paul. li. 4. c. 14. Aue. 4. c. 12. 3. cap. 1. e q Hipp. lib. de Coie. pignot. & 4. Aho 2. f q Gal. 1. Aph. com. 18. e q Hipp. lib. 1. de mor. populi. 9. Aph. 65.

h q Lib. 2. de mor. populi. 17. Aph. 66.

i q Hipp. 5. Aph. 68.

- 10 terdumque mors subsequitur: difficilem curationem habent neruorum fissura, nam eorum substantia frigida, & exanguis est, & calefcere nequit, nec eorum humiditates coctionem admittunt, & vulnera caeothetica vocantur. Quae transuersim occurrunt, periculosa, quam quae iuxta rectitudinem iudicantur, illa liquidum & ferulum, & motum partis cetero destruant, haec autem suspitione vacant: rursus ea deteriora sunt, quae neruum penitus non secant, sed vnam duntaxat partem, ob quam sanam inde grauius ledi, & saeva sequi symptomata contingit, quippe & praeciso per transuersum toto neruo, dolores sedati, consouisiones prohiberi, & reliqua his vulneribus infesta, tolli videntur. Ad eundem motum consouisiones vendit, ubi humorem crassum, viscidumque, quo facillime replentur nerui, & putredini etiam obnoxij sunt, cum ab innato calore regi he humiditates nequeant. Hi quoque in praecipui sunt, quorum articuli vulnus acceperint, tum ob fedas capacitatem, ubi humiditas copia facile accuari potest, tum etiam ob partis motum continuum, quapropter sero plerumque cicatricem admittunt, vehementissimique dolores videntur tendonum, quorum quantitas, qui in eorum capitibus musculorum oriuntur, aut terminantur obiectuaturque est, vulnera omnia articulis quatuor digitis circumscrip-  
ta, periculo non vacare, ac Chirurgorum doctissimorum solertia indigere: ceteris in neruorum vulneribus, sed maxime puctum infectis, perperam a principio curatis, maxime omnium inflammatio, & putredo superuenit. Ligamentorum vero vulnera, vt sensu prorsus expertia sunt, ita timore vacant, ac valentissimorum remedium vim tolerant, ergo sinefimus si is fuerit, qui ab osse ad os permat, maxime sine periculo est: Quidam tamen (inquit Galenus) cum non valeat ligamenta cognoscere, inquam neruos & tendones vuln-  
neratos suspecta habent, a periculo aliquoq remota quomodocunque, afficiunt, quippe insensibilia, & ex ossibus, non musculari orta, sicut tendones: vel ex cerebro, spinalique medulla, vt neruissimos vero,  
30 quoniam eorum substantia composita est ex neruo, & ligamento, quatenus nerui participes sunt, eate-  
nus ex cerebro oriuntur, unde seci maximum timorem adducunt, minus tamen, quam ipsi, nerui consouisionem accersunt: quatenus autem sinefides naturam sapiunt, omni suspitione carent: verumtamen seci tendones vtiplurimum particulas, quibus alligantur, debiles reddunt. Diuerforum panniculorum vulnera, praefertim illorum, qui inter neruorum compagines numerantur, magni timoris sunt, nempe pericranij, meningum, pericardij, septi transuersi, peritonaei, vesicae, & similium; nam horum omnium fabrica ner-  
uea est, & consorij lege partibus nobilibus alligantur: seruant nimirum tendones villorum ordinem, ad  
40 vius longitudinem, quod in panniculis later, sed equales & consui in omni parte consistunt. Tendones ab omni causa alterantur, panniculi stupide scelerunt, ligamenta aperte dignoscuntur; nam eorum substantia dura, alba, ac sanguinis experta est: sere eiusdem habitudinis cartilaginee sunt, quae ossium extremitates  
40 articulant, ubi simul iunguntur, & articulos componunt. Verum quia partes he ignobiles sunt, pauca de eis dicere intendimus: hic autem solum sciendum est, quod ab omni causa frigida, aut si interius, aut ex-  
teriori euenerit, membra haec omnia maxime afficiuntur, atque magis detecta & caue denudata. Indu-  
tur vltimo, particulae ab vsum naturae inficiturum, ineptas fore, ac perpetuo in ea constitutione manere,  
quando nerui, aut tendones vulnerati inflammatione premuntur, aut penitus fuerint scisi, aut aliquo spina  
cilo destructi, aut exsiccati, & tabidi conficiuntur: porro pro confesso habetur, quod nerui scisi neque  
augentur, neque coalescunt.

De vniuersali ratione curandi neruorum vulnera. Cap. VI.

- 50 **V**NA QUAEVLTUR indicatio, quae huic curationi dirigitur, sub tali scopo continetur,  
ne quis dolor vulneratam partem occupet, & vt sedes affecta ab inflammatione tuea-  
tur; nam hic omnis consouilio, quae ab his causis emoluitur, prohiberi solet: haec & ratio  
non expedit aliquo modo vulnerum consolidationem accelerare, sed cutis vul-  
nus apertum, iuglunatumque custodire, quo per id ex neruo vulnerato sanies ef-  
fluat, & omni ingenio, ne alia praua insurgant accidentia, studere: quae duo ex ne-  
cessitate, nisi obliterimus, consouisionem subinde afficiunt. Vt autem talem sco-  
pum assequamur, tres intentiones totam artem medicam constituentes, rursus a nobis erunt diligenter  
obseruandae, nempe diuina, quae in recta viuis constitutione consistit, & sex rerum non naturalium opti-  
mo regimine; porro id est materia antecedens subtrahio, ne ratione doloris confertim ad locum affe-  
ctum confluant; de Chirurgia, quae accommodata manuum operatio est, medicamentis topica oppor-  
tune applicando; ac omnia circumscribendo adhibendo, dolores sedando, aruginosas materias eda-  
cendo, & consouisionis noxas vindicando. Patiens igitur victum tenuissimum a principio vsque  
ad symptomatum securitatem seruet; liquidem talis pascio inter acutas numeratur, in quibus Hip-  
pocrates victum tenuissimum feruari iubet; ob id panatella cum saccharo sola aqua decocta, his  
quorum habitudo biliosa est, & aetas iuuentutis tantum concedi potest; quibus, si talem abhor-  
rent dietam, condum in brodio paruae pullae decoctum concedatur; caro, ovis, caseus, acris om-  
nia, aut cruda, & quae multi nutrimenti sunt, dimittantur: aliquibus peractis diebus, nisi aliquid noui  
emerferit, diuina aliquantisper augeatur, ouum forbile recens tantum exhibendo, aut montanas zuniculas,  
aut carnem paruae pullae, aut aliquid simile, iuxta illi formam, quam in fractura aluaris superius expel-  
simus:





10 lætè, & prorsus sine dolore operando, & ea omnia qualitercunque vulncri applicauerit medicus, calida actus, & qualitatibus afferat: Sexta est correctio, & profligatio symptomatum his vulneribus superuenientium, remedia unicuique propria, prout res desiderat, admoendo, vt singulatum suo loco dicemus.

De Neruorum longitudinali fissura. Cap. VII.



Vm vulnerum neruorum curationem in vniuersum superius tradiderimus: nunc superest, vt singulatum eorū curandi rationem ostendamus, & à fissuris, seu vulneribus casim insinctis, ac longitudinalibus, tanquā à simplicioribus, & ab ijs, quæ tutius curationem admittunt, initium capiamus. Si ergo tendo, aut neruus planè casim vulneratus fuerit, solet nempe talis scissio ab acutis symptomatibus expoliari, & sensibus dignosci, præsertim manu, aut pede affecto, magna liquidem ex parte nerui in his scissibus vulnerantur, aut vbi pauca admodū caro reperitur, & multum interueniens, ac præiacens cutis diuisum fuerit, aut sic affectus angustus est, vt nulla certitudo habeatur: tunc vero spectandum venit, num totus neruus dissecus fuerit, an ex toto præcisus: sed quo modocunque id eueniet, nulla causa extranea assilente, optimi Medici officium est, partes vulneris ad inuicem (si cutis, quæ interueniebat, satis pateat) aut futura, aut fibulis, aut laqueis, aut fasciis vnire, ac maximo decori sic vnitas conseruare, ne turpis appareat cicatrix, in imaq; parte emissariū aliquid relinquere, quo collecta sanies effluere possit; postea affectum locum ab aliena fluxione custodire, & partis laborantis temperaturam conseruare, ne dolor, qui ob exactam, & excellentem eius naturam vehementissimus excitari solet, subsiquatur. sit igitur Chirurgi actio omnis leuis, laxa, dolorem non inducens, nempe turundas molles, & accommodatas imponendo, opportunas fascias conuoluendo, ac omnia in his peragendo, quæ in Medicatrina ab Hippocrate diligentissimè descripta sunt: sibi primò ea omnia præparet, quæ inter medendum occurrere possunt, vt potè medicamenta, & quæ vulncri circum scribenda sunt, ne, eū illi necessaria fuerint, aliunde quærat: vulneris ory committende, ac agglutinande non sunt, nisi prius humiditas omnis expurgata fuerit; nam à collecta humiditate extranea, quæ effluere nequit, nerui putrescent, inde praua sequuntur accidentia: putredo namque in eis sustinet, nam creati sunt ex materia humida à frigore coagulata: & quia, dum sola huiusmodi vulnera esse solent, ac solo fasciandi modo sanari, non multi à de eis dicere opus est; sat tamen erit, saltem primis diebus, si neruus adamussim expoliatus non fuerit, turundam aliquam mollem, medicamento ex terebinthina, aut luteo, & paululo croci illinitam, in decliuorem locum immittere, hoc seruato, ne aliquo modo neruus, aut tendo tangatur; desuper verò celebre illud barbarum, aut diaphanicon sit, vt per spacium quatuor digitorum vulnus amplectatur, expedit applicare: circumiacentes partes inungatur rosacco, myrrino, ac masticino oleo, donec nullum amplius phlegmonis, aut consulationis periculum imminet, si verò curis, & caro, quæ interueniebat, dissecata, aut deperdita fuerit, adeo vt neruus nodus appareat, nullum præstantius medicamentum repertum est glutine ipsa alboto: quare cū de eo sermonè habiturus esset Galenus, b in hac curatione inquit; Vfus sum primū refina terebinthina per se quidem in pueris, mulieribus, & generaliter ijs, qui molli essent carne, aut vitam ocio, & sub vmbra degunt: ob id dicebat Amicenna: c Gluten alboto est de melioribus medicinis vulnorum neruorum, cum quibus incipitur: verū illis, qui sunt sicut infantes, & mulieres, & cuius complexio est vehemens humiditatis, sufficit, quod est sicut glutinum, alboto solū. non ergo immerito d' vsi seruatur ab omnibus, d eū omnes requisitas intentiones huic curationi opportunas in se contineat. insuper audiendū est, quid de ea Galeus dixerit; inquit enim; e Amici mei, commentarios vobis paro, ex quibus, quā efficax sit nostra neruorum curandi ratio, adinuenire poteritis, ex qua omnes seruati sunt, non autem manci, nec claudi redditi; quæ aliter curatis, accidere conspexistis, quemadmodū etiam nonnullos cōuulsionē correptos, vel cum dolore, vel putredine, vel febre mortuos. apud me igitur cōtempusatus omnia ex humiditate, & calore putrescere, ac frigida neruis inimica fore, optimum esse vulneratis neruis medicamentum intellexi, quod & ficaret, & ad calorem accederet: calidum ramen satis esse posse, modo siccandi potestate polleat. etenim calor citra humiditatem putrescere nihil habet: ergo horum medicamentorum facultas sit temperate caliditatis, sed fortioris siccitatis, quorum substantia tenuis sit, & fluxibilibus fipicioribus, & omnis mordacitatis experti, cui virtus insita sit, omnem humiditatem à profundo euocare; caliditas verò non admodum vehemens sit, siquidem mordicare possit, & aliunde materiā attrahere, ac locum ad inflammationē excitare: porro siccitas neruosas partes à putredine præferuat, eas corroborat, & omnem dolorem tollit: hæc quippe ratione communis opinio est, in neruorum fissuris longitudinalibus nullum nobiliss, ac securius medicamentum dari posse glutine alboto: id est terebinthina clara, & odoraria; Ex omnibus resinis, ait Dioscorides, f terebinthina principat' datur, post eam lentiscine, tum eis, quæ de picea redduntur, & abiete, exciccat, corroborat, præferuat, obstructions aperit, & absque vilo dolore abstergit; quare in denudato neruo, & ad longitudinem cūsum affecto nullum præstantius medicamentum dari potest: multocius etenim in his vulneribus

a Gal. 6. meth. c. 3. Amic. de cura vuln. uonum.

b Gal. meth. c. 3. Amic. de cura vuln. uonum.

c Gal. 6. meth. c. 3. Amic. de cura vuln. uonum.

d Gal. 6. meth. c. 3. Amic. de cura vuln. uonum.

e Gal. 6. meth. c. 3. Amic. de cura vuln. uonum.

f Lib. 1. c. 90.

iuxta membri longitudinem factis, deligatura vulnerari musculi partibus iouicem contrahendis sufficere  
 Quare (dicebat Auicenna) si nervus fuerit derectus, & incisio ad longitudinem, tunc fide, vt ipsum  
 carne cooperias, & pone super ipsum medicinas exsiccatas, & stringe pannis longis strictura colligen-  
 te, & aggregante super rem magnam loci sani. veruntamen, si de aliqua eius nitrositate verendum  
 sit, abluatur vino albo, aut aqua betonica, aut consolida, quod facere præcepit Galenus, & etiam  
 omnibus mineralibus pro hac curatione vfitatis; & mel, & cera, & terebinthina abloenda est, vt abique  
 mordicatione exficcare possit: in corporibus verò laboribus affuetis (nempe militum, rusticorum, & navi-  
 gantium) si vehementiorem desiderabimus exsiccationem, illi addatur parum quid tutie, aut calcis sub  
 cane aqua dulci sapius elote, cum permagna humanorum corporum fit differentia, tum in temperamen-  
 tis, sicuti rarum mutationibus, vitæ studijs, sexibus, viuendi ratione, & similibus; unde nulla ratione sin-  
 gulare quoddam medicamentum omnibus conuenire potest. Igitur duo in promptu habere expediat, al-  
 terum potentius, & similius genere confectum, alterum mitius; quæ duo iniucem componi, & admisceri  
 possunt, dum vñs postulat. si namque partem ex vtriusque portione quis temperauerit, exactè medium  
 amborum erit; quod si alteri plus adiciat, illud à medio tantò recedet, quântò mixtura superauerit: & hæc  
 fortassis erit vera horum vulnere curandi ratio. nam dicebat Galenus; Proponatur, multum cutis esse  
 apertum, adeò vt nervus nudus appareat, isque per directum, non per transuersum ductus, hinc nullum  
 iam memoratorum medicaminum, quæ ex euphorbio, ac similiter acrisbus emplastris sunt applicabiles; nu-  
 darus namque, non fert eorum vim, ita vt, cum interposita cutis erat, vtilis optime igitur eo calu calce elo-  
 ta multo oleo rosato, aut masticino soluta, aut quod ex pompholyge medicamentum sit, vtare, salutare  
 enim admodum est.

## P R A X I S.

**D** vulnere quæ primùm accersitus, vt cognoscas, elaborandum est, siquid in vulnere præter  
 naturam cõineatur; nam id statim eximere oportet, aut digiris, aut vossella, aut forcipe, aut alio  
 instrumẽto, cuius effigies locis proprijs sunt delineata: & si cutis, aut carnis, quæ interuenit, sectio  
 non satis patuerit, ampliori, vt decet, diuisione aperiatur; & si labra valde discedent, sutura committitur;  
 & si sanguis multus effluxerit, aliquo puluere vim astringendi habere, aut ligatura sistatur, & nõ ovi albu-  
 mine, aut aceto, aut tenuiori medicamento maioris frigiditatis. inde linamentis, vel stupis sicis plaga op-  
 pleatur, & manu superposita fascia conuoluatur, & alligetur, & membrum commodè colloceatur, ac inde  
 euacuato corpore, victus regimen instituat: postmodum in secundis visitationibus omnia primùm præ-  
 parantur, quæ ad medellam faciunt, & æger intra teclum, modò hyems fuerit, ad quintũ vsque, aut septi-  
 mum morbi diem sese continere; nam si eo vsque nec phlegmone quadam teneatur, vacetque prorsus  
 dolore, & nullam sentiat tensionem, in posterum tutus erit: hoc interim locale medicamentum sit resina  
 larinica, quæ vitur loco terebinthina, cum terebinthina veræ copia non affuit his nostris regionibus,  
 & experimento diuturno comprobatum sit, larinicam præstantissimam esse, nec à Græcis cognitã, & hæc  
 actũ sit calida, non tamen vehemens caliditatis; nam in primis semper est cura habenda, ne quid ex his,  
 quæ vulnus contingunt, valde calidum, aut frigidum sit, omnia tamen quouis modo applicanda qualitati  
 bus calida sunt: guttatim tale medicamentum in vulnus iniiciatur, ac de super lata petia eo madefacta im-  
 ponatur, lichina verò, aut turunda, aut linamenta adeo mollia, ac tenuia sint, vt nec nervum contendant,  
 nec dolorem inferant: partes, quæ in consorcio apparent, oleo masticino, de semine lini, ac camomellino  
 lubricato foueantur: aliquibus peractis diebus, vulnus, ac si simplex & recte foret, solo fasciandi modo  
 regatur; quare adhibito barbaro, aut palmulato emplastro, ad cicatricem perducatur.

## De neruorum transuersa sectione. Cap. VIII.

**N**unc de transuerso nerui vulnere, quod Arabes gauziratum vocant, agamus: illud  
 namque, aut ex toto, aut ex dimidia parte neruorum secatur: quod si totus præcisus fue-  
 rit, metus nullus instat, debilis tamen affecta particula remanebit, præfercim si disse-  
 ctus nervus insignis magnitudinis fuerit, & eius curatio cum ea, quam paulò su-  
 perius explicauimus, communis est: si nervus ex dimidio præcisus, conuulsio-  
 nis maior metus impendit, phlegmone scilicet à dissectis fibris ad non dissectas  
 communicata: ceterum conuulsione ab ipsis non secus excitata: cum nervus ex sen-  
 tiendi, quod obtinet, acumine, dolorem excitet, & inde ex necessitate inflammationem, quam vix plurimũ  
 cõuulsio sequitur, nisi quæ statim dolori medellam inuenierit, & phlegmonis generationem prohibuerit;  
 detrahare largius sanguinem, ac tenui magis, quàm in alijs, vt videtur, in quiete hominem continere, iu-  
 bet Galenus, & ac oleo calenti vberius, & sæpius in die, si in manu, aut brachio fuerit vulnus, axillas, colu-  
 lum, ceruices, & spinam inuergere: si vulneratus nervus ex his fuerit, qui in crure, aut pede habentur,  
 inguina, pectus, apoplex, spinam, & collũ sæpè humectare; quo facto, vt pariter mala symptomata præ-  
 cauamus, vt locus affectus corroboretur, et mala temperatura tollatur, si quid instuit, inlubetur, & si  
 quid fluxerit, vt discutiat, studere operæ præcipuum est: huic nostrates Chirurgi per tres digitos supra lo-  
 cum

- 10 cum affectum simile medicamentum inhibitorium, ab eis defensum vocatur, adhibere solent. Recip. Olei rosmari omphacini, masticini an. vnc. ij. succi plantaginis, centinodiz an. vnc. j. aceti albi. vnc. s. verum in ser refrigerium vino locorum vnc. j. bulliant simul, donec acetum, & succus fuerit consumptus; & adde boliamme ni, terz. lemnia, sandalorum rubeorum an. drag. ij. iterum parum bulliant, & addita pauca cera, fiat linimentum: vulnus loricina, seu Terebinthina resina actu calida replatur, non tamen, ut nimio calore aduratur, nam in nervo denudato, ac transuersim secto visque ad quartam dicm. exstare bis, & hyeme semel adhibita, erit salubre medicamentum: transacto hoc tempore, si qua accidentia non apparuerint, vulnus basiliconi regatur, & tripharmacone sigilletur. verum si ichor aliquis, aut subtilis humiditas a vulnere emanauerit, ad ficiotia transire licet; nam ea que viriliter exciscant, etiam quod nervi expoliati ea non ferant, in transuersalibus vulneribus admittuntur: adhuc quia de necessitate plerumque huiusmodi vulnera sanantur, & nervi secti a carne cooperiuntur (nam per transuersum vulnere accepto cum ligatura nihil prodesse potest) sola sutura totum absoluitur, has suturas nisi quis altat, fecerit, musculi partes inglutinatae remanent; quare altioribus suture vti expediat, haud ignari carnosam musculorum partem periculo vacare: caute ergo in iam consuto vulnere, praesertim magni lacerti, in quo ad eundem ferre ordinem ac tendines procedunt, sortiori medicamento vti quis audebit, nam perpetuo in his passionibus maxima malorum humorum copia gignitur, que pariter vehementiorem siccitatem requirit, hac ratione in duris corporibus nequaquam verendus est sulphuris, aut euphorbij visus; veluti, Recip. Terebinthinae clarz vnc. j. olei hypericonis vnc. j. sulphuris ignem non experti, non petrosi, sed clari ac levis, subtiliter puluerizati drag. ij. misce, & aliquantisper bulliant, & vtere, celebre quidem medicamentum est: aut Recip. Terebinthinae vnc. j. olei anetini vnc. j. sulphuris, ut dictum est, praeparati drag. ij. misce, & vtere: aut Recip. olei de terebinthina, masticini lumbriati an. vnc. ij. euphorbij recentis in minutissimum puluerem redacti vnc. iij. croci scrup. s. misce ut supra: aut Recip. olei abietini, hypericonis, masticini lumbriati an. vnc. j. resinae pini vnc. s. sulphuris viui, euphorbij recentis an. drag. ij. croci parum. misce, & lento igne parum bulliant, & vtere sic, ut ad vulneris vltimam differentiam penitus penetret, & omnis excisicetur humiditas: porro praedictis defensivis, vnditionibus, ac vnguentis non contenti, ut a dolore & inflammatione hac vulnera tuta reddantur, expedit aliquod cataplasma superaddere, cui sit infusa virtus corroborandi, excidendi, putredines prohibendi absque multa stipticitate, & coarctatione, & ut hec parari possint, multa simplicia a Galeno probantur, nempe dictamum, matricaria, polium, chamaepithea, centaurea maior & minor, stoeas, fertula campana, consolida, iuta, betonica, terebinthina, lumbri terebrestes, farina lupinorum, fabacea, foenogracum, oleum masticinum, camomellinum, rob. lixiuium clarum, & similia: sed quia, ut decet, diuersimode paratur ratione sedis affectus, & symptomatum fortitudine, interdum calidioris, interdum frigidioris naturae esse debent. Si ergo alicuius inflammationis initium apparuerit, expedit aliquod emplastrum huiusmodi componere, ut materia, que fluit, reprimatur, & que fluxa est, dissipetur. Recip. florum rosarum, myrti an. m. j. betonicae, camomillae an. m. s. decoquantur in vino nigro tenui, & pistentur, & adde farinae hordei vnc. iij. fabarum vnc. s. olei rosati, masticini an. vnc. j. lixiuij clari q. s. misce, & fiat emplastrum in bona forma: procedatur sic visque ad septimam, nam hic terminus est communiter malorum accidentium: nam cum bona apparuerit concoctio, & nullum aderit symptoma, vulnus, si expedit, aliquantisper abstergetur, & ad hoc mundificatum de melle a multis laudatur, cuius compositio est talis. Recip. lithargij vino albo loti vnc. ij. olei masticini, cerae, mellis an. vnc. j. misce: his omnibus postea dimissis, vino tentanda est, quare salubre medicamentum pulvis hic est. Recip. pulueris lumbri corum terrestrium preparatorum, graec. tindorum, equiseti, olivani, aristolochiae an. partes aequaliter, misce, & fiat pulvis, sicut alcohol per petiam transmissus, quo sinus impletur, & desuper, aut barbarum, aut diapalma, aut graecum emplastrum adhibeatur; verum si in fine tensio aliqua, aut durities, remanserit, tale medicamentum, quo nos vti mur, applicetur. Recip. Cetaurea minoris, lanceole, cynoglossi, pifolles, consolida maioris & minoris, caudae equinae, millefolij an. m. j. verum terrestrium preparatorum vnc. ij. olei masticini vnc. j. vini albi odorati vnc. x. vij. aceti rosati vnc. iij. maceretur omnia simul per dies octo, & adde sepi calstrati vnc. xij. picis navalis, resinae pini an. vnc. ij. bulliant omnia simul visque ad vini, & aceti consumptionem, & cola, & adde ammoniaci, galbani, opoponacis in vino soluti an. vnc. ij. terebinthinae clarz vnc. iij. olivani, masticis, farcoole an. drag. ij. croci drag. s. deinde omnia lieto igne simul bulliant, palmea, aut salicea spatula perpetuo agitanda, inde addita cera quoad sufficit, fiat vnguentum in communi forma, aut vtere cerato oxycroceo. His medijs vulnera haec sanantur, resistentur: si vero, ut saepe contingit, prae supra scriptarum accidentia, ea seruanda sunt, quae singularim in eorum curatione a nobis inferius suo loco demonstrabuntur.

# DIGRESSIO.



Vbi in cura vulnerum transuersorum partium nervosarum quod ad eorum futuram, & sciendum nonnulli diuersimode excogitantur, nempe si aerius, aut tendo ex toto praefixis sutura agglutinari possit, hac pauca in hac methodo cogimur in medium afferre. Credunt aliqui, & suis rationibus, experimentis, ac auctoritatibus probare nuncur, pernum ex toto diffectis sutura coiri posse, nec aliter curari debere: asserunt tamen nervorum capita vna cum extremitate musculosa carnis

a. f. Guido de  
Castiglione Lan-  
franco Medico-  
lumen, Guilhel-  
mus de Salento  
Beatis &  
alij.

debere assui, & illico rodeolo superposito partes sic unitas fasciâ opportuna cõseruari, affirmat<sup>1</sup>, quod ex tali modo curandi melior cõsolidatio contrahatur in ipsum neruum, qui si aliter curatus, aut ex toto, aut ex maiori parte motum amiserit, eundem ex futura redimere potes, & membrum fortius redditur, nec dolor ab acu productus timendus est, tollitur enim, quamprimum a rosaceo tangitur, probat hæc op<sup>2</sup> rationem ratione à praxi sumpta, & à Galeno confirmata, dicentes, sicut peritonæum, siue fimbriæ mem<sup>3</sup> brana quidem nervosa inter abdominis, seu mirach musculosa substantias confusum vniuntur, sic pariter & cæteræ partes nervosæ inter substantias carnosas conglutinantur, & consolidari perfectè possunt, & sitalis vni<sup>4</sup> core proprio ac elementari, siue (vt dici solet) per viam primæ intentionis non fit, eorum tamen medio aliquo eterogeneo, & carne mediante, & alligant, quod in pueris apertissime videri solet, in quibus nec ui vulnerati perfectè vniuntur, & quamuis aliqua eorum operatio destruitur, obstructione in eis facta, vñ de spiritus per eos transire nequeunt, non tamen motuam virtutem amittunt: præterea sicut ossium fra<sup>5</sup> cturæ occurrunt, quæ restaurata, ac in propriam sedem redacta, & facta, vt ait Hippocrates, iusta natura fa<sup>6</sup> cilis à callo, siue alroboth, aut poro sarcoide alligantur, & perfectius vniuntur, & citius sanantur, sic fe<sup>7</sup> ctis nervis, ac sutura conuenienti vnitis euenire potest, & si ossa callo ipso alligantur, nerui per musculo<sup>8</sup> rum partes consolidantur, & inde proprias exercet operationes, testimonijs denique quamplurimis hoc affirmare mouetur, & Rasis præsertim, & Auicennæ, siquidem ab eis dictè est: Si nervus secundum longitudinem sectus detectus fuerit, stude, vt carne cooperiaris, sicuti nempe medicinis, ac opportuna<sup>9</sup> fascijs, & si vulnus secundum latitudinem insiguitur, tunc sutura vniatur, nam aliter sanari nequit, credunt pariter & Galenum hoc in tendonibus concessisse, ergo & in nervis, nam hæc sunt eius verba: In casu<sup>10</sup> Gladiatorum; Etenim in vulneribus iuxta membri longitudinem factis deligatur vulnerati musculi parti<sup>11</sup> bus inuicem cõtrahendis sufficiens per transversum vulnus et accepto, cum deligantur nihil prodesse possit, ex sola sutura totum aboluitur. Paulus<sup>12</sup> etiam istius opinionis esse affirmat, cum dicit: Si transversum vulnus est, maior convulsio nis metus impendet, & nonnulli in vulnere recenti adhuc furoris vii sunt, & medicamentum conglutinatoriois etiam equisetum, si illi viatur, nervos quoque præciso iungit, affirmat<sup>13</sup> adhuc Guidonem à Cauliac, & alios vidisse, ac ab alijs audisse, perfectè nonnullos à vulneribus neruo<sup>14</sup> rum, facta in eis sutura, sanitati restitutos, nullo habito in arbitrario motu detrimento. Hæc sunt rationes, ac testimonia asserentium nervos, aut tendones per transversum diuisos sutura vniiri debere, secus autem vñ cum veritate quamplurimi tenet, philosophorum, ac medicorum auctoritatibus moti, nam dictum est: Cum discissum fuerit os, aut cartilago, vel nervus, aut genæ particula tenuis, vel præputium, neque<sup>15</sup> augetur, neque coalescit, deficientes vtræ partes, quæcumque ex sanguine ortum habuerint, corrigi rati<sup>16</sup> oem non est impossibile, quæ autem ex femine, propemodum est impossibile: enim respondentis qua<sup>17</sup> ditione de peritoneo secto, ac confuso dicamus, talem vñtionem fore per accidens, & secundum quid, & non verè, ac stabilem, sed mediocribus alijs partibus, nam vñio hæc inter partes abdominis cõseruatur, quæ<sup>18</sup> futuram ferre possunt, non autem est ipsius membranæ vñtio, quam non admittunt nervi nec tendones, Ossium rationi dicamus cum Galeno, à qui credentibus ossa fracta perfectè agglutina posse aut & hæc<sup>19</sup> enim seu vñio, seu mortua si quis inspicere voluerit, dilectando manifestè videbit à callo quodam (velu<sup>20</sup> tunc vinculo circumscripto) partes ossium discissas contritas esse; quas si abraferit, fracturæ profundum videbit non conglutinatam: verè nullibi, nisi in ossè fracto, callum à natura factum perspicue videri po<sup>21</sup> test, quippe fundamentum, ac totius corporis sustentaculum ossa sunt. Auctoritatibus iam adductis sic re<sup>22</sup> spondere oportet, talem suturam in carnosis tantum substantijs conuenire, & non in nervo, ob id quia in transuersis vulneribus sutura communis est operatio, præsertim in quibus partes magno diuor<sup>23</sup> tio disgregantur, hæc ratione dicebat Galenus; Altonibus futuris vsus sum, haud ignarus carnosam<sup>24</sup> fam musculorum partem periculo vacare, non autem tendones & nervos. Paulus etiam dicebat, sutu<sup>25</sup> ram alius molliri conuenire, ne quæ in imo sunt conglutinata, desiliant: rursus, magna cura adhibenda<sup>26</sup> est, ne ab acu nervus compungatur, ergo nervus conglutendus non est, sed musculorum partes, porro cre<sup>27</sup> dibile est in confuso vulnere partes secti nervi magis unitas cõseruari, quam in confuso, & per con<sup>28</sup> sequens in eius consolidatione minus detrimenti in motu voluntario reperiri, ex quo perpetuo neruæ<sup>29</sup> partes inter carnosas sutura cõseruantur: quod experimento compertum fit, sectos nervos vñioni resti<sup>30</sup> tutos modo, vt supra, concedimus, & si alicui hoc acciderit, non est medicæ considerationis, nam erit de his, quæ tardè contingunt: omnem siquidem particulam, aut organicum membrum, aut an omittit, vñio quoddam principale membri habere, quo naturalis, aut arbitrarie operationes exerceat, cui quamplu<sup>31</sup> rima alia in ea operatione de seruiunt, quod à Galeno confirmatur, cum dicit: Si puncto musculi capite<sup>32</sup> consulsio, quæ nulla conuenientium medicamentorum vi remittitur, superuenit, præcisio toto muscu<sup>33</sup> lo per transversum consulsione quidem sanaueris, aliquid tamen ex particule motibus vitaueris: ad<sup>34</sup> eundem modum iam neruum puncto sæpè cogimus transversum præcedere, quousque vel consulsiones, vel deliria, vel ambo magna, & græque sanabilia superuenire vulnerationi cernimus. Hæc veritas in ipsa<sup>35</sup> præagnoscenda est, dum nervi ex toto discissi reperiuntur, illico quidem contrahuntur eorum partes, & si giunt, ac à sensibus elongantur, nec in vulnere ob sanguinis deluxum dignosci possunt, nec minus<sup>36</sup> adiungit hæc ratione audiendi non sunt, qui pro vulnere horum curatione, ac consolidatione igno<sup>37</sup> vñtur,

a. 7. 78. conu<sup>1</sup>  
men. cap. 1.  
b. 9. Cap. de cu<sup>2</sup>  
ra vul. ner.  
c. 13. Xausoni.

d. 1. lib. 4. c. 74.  
lib. 4. cap. 17.

e. 1. Nicolaus Flo<sup>3</sup>  
ren.  
Donus Floren.  
Petrus Argilla<sup>4</sup>  
12. Theodorus.  
Joannes de Vi<sup>5</sup>  
ca. & alij.  
f. 14. Hippo. lib. 6. A.  
p. 10. 19. 7. Apho<sup>6</sup>  
12. 25. 6.  
g. Art. 1. de nat.  
ant. cap. 13.  
h. Galib. 2. de su<sup>7</sup>  
mine c. 8. lib. de  
constit. med.  
ca. 7. 1. art. par.  
med. cap. 83.  
i. meth. c. 6.  
k. Anat. 1. 1. diff.  
5. cap. 1.  
l. 19. d. Apho. c. 1.  
m. h. Xausoni. vñ  
de emplu. qui<sup>8</sup>  
guan 3. macho.  
cap. 16.

n. 1. 1. 1. 1. 1.  
o. 1. 1. 1. 1. 1.  
p. 1. 1. 1. 1. 1.  
q. 1. 1. 1. 1. 1.  
r. 1. 1. 1. 1. 1.  
s. 1. 1. 1. 1. 1.  
t. 1. 1. 1. 1. 1.  
u. 1. 1. 1. 1. 1.  
v. 1. 1. 1. 1. 1.  
w. 1. 1. 1. 1. 1.  
x. 1. 1. 1. 1. 1.  
y. 1. 1. 1. 1. 1.  
z. 1. 1. 1. 1. 1.



- 10 tur, nervorum capita vrendo, nam manifestè videtur, quòd quamprimum nervosæ substantiæ ignem sentiunt, excruciantur, contrahuntur, & convulsæ fiunt. & ideo princeps Avicenna dicitur, Caveat ille, qui vitæ terramento ignito usq; ad nervos & tendones, ac copulas pertranseat; & si id, quod vitur, fuerit vit caluaria, tunc cave, ne cerebrum ferueat, & ne membræ ipsæ convellantur.

a 9 Gal. 7. Aph. com. 14.  
b 4. c. 15. Ar  
Bo. 1 de nervis  
num. cap. 15.

## De Nervorum Punctura. Cap. IX.

- D**E TERTIO vulnus, quod nervis, aut tendonibus evenire possit, punctura angusta est, nam ex simili parva quippe laesione ob sentiendi eorum facultatem, dolores, inflammationes, convulsionessue facillimè excitantur: & ea quidem punctura maius detrimentum afferre solet, quæ occurrat, & subtilis est. quod attestantur Gale-  
ni verba, cum dicit: Nervus verò, & chordæ punctura propter sensus vehementem ( & quoniam hæc pars principio continuatur ) prompta est ad nervorum convulsionem excitandam, ac tunc præsertim, cum nihil extrorsum expirat, occurrat cutis vulneri: aperendum igitur, atque excidendum substantia tenui, quæ usque ad ima nervi offen-  
si penetrare possit: plurimum ergo confert oras angustiorum vulnerum puncturam esse apertas, ut ca-  
lidum medicamentum extrinsecus applicatur per eas vapores educat, attrahens humiditatem circa af-  
fectum locum in alto latentem, qua de re in huiusmodi puncturis orificium in cute duabus sectionibus rectis dividere oportet, ne in ea coarctatus humiditatis, prava oriatur symptomata: rationabile ergo erit, cutis vulnus apertum, & agglutinatum custodire, quò per id ex secto nervo virus perpetuo  
30 eluatur & expiret, & totum corpus superuacuis humoribus liberare, atque si expediat, sanguinis missio ne inane, utique si valida fuerit virtus, victusque tenuior adhibeatur, vinum merito prohibendum est, & reliqua serventur, quæ in regimine sex rerum non naturalium superius descripsimus: in reliquis pun-  
cti nervi curatio medicamenta expostulat, quæ de tepidam calorem excitem, & valde siccem, cum quæ ex substantiæ suæ natura, & attrahendi vim habeant, & tenuium sine partium; siquidem nudato ner-  
vo, omnis curationis consilium eò dirigendum est, ut minima cum rosiione succedat: hæc siquidem propria, ac vera indicatio est: a nervi punctura accepta, dictum nempe à Galeno est: In pharmanis omne consi-  
lium directi, ut eorum facultas esset tam tenuis, cum modicè calefaciens, & quæ admodum siccare ci-  
tra dolorem posset, cum sola hæc trahere ex profundo saniem neque contracta, neque demorsu parti-  
cula possit: Sed ante omnem operationem, si qua iniuxa nervis inhaerent ( ut acus acumen, vitrum, os,  
40 de simile quid ) extrahantur, quæ aut ratione iniuxa evellantur, paulò inferius explicabimus, & si quæ fue-  
rit difficultas, cutis proinsum aperitur, & vulnus inglutinaturn custodiatur, cauendo, ne afflicto affli-  
ctio addatur, & secto nervo minus præstetur nocumentum: nec sectionem amplam facere decet, ne  
nervus detectus reddatur, præsertim corpore cacochymo, aut plethorico existente, ne inde vehemens  
dolor excutietur: quæ igitur plethora, vitio soquè succo laborant corpora, quæ tenera carne prædita,  
& ad sentiendum insigniter habilia sunt, facillè ex morfu, seu rosiione phlegmonem recipiunt. in horu  
numero habentur mulieres candidæ, pueri, eunuchi, qui vitam in ocio degunt, aut regionem frigidam  
incolunt; secus verò qui calidum locum inhabitant, aut laboribus valde dediti sunt: Hæc ratione ( ait  
Galenus ) visus sum primò in pueris, mulieribus, & generaliter ipsi, qui molli sunt carne, refina terebin-  
thina per se, cum sulphure, aut euphorbio in ijs, qui dura sunt carne i diximus itaque terebinthinam, id  
50 est cyprinum terebinthum, qui si non aderit, communi terebinthina uti expediat, id est refina laricina;  
aut humida illa de pino, communi voce larga dicta, aut refina friza, aut abietina, oleum abietis, aut la  
chrymum vocitatum. at si villa inveniri nequit, ab omnibus oleum sabinum, aut clarum, & expurgatū  
antiquum probatur ( nam recens pingue est, ac obstructions gignit, & materias, vaporemque malos aut  
ipsa cute duci cui prohibet ) aut oleum commune anetho, aut ruta decoctum, aut oleum balsaminum, aut  
illud, quod ex vitellis oorum extrahi solet: nos verò tunc aut de hypericone, aut de terebinthina  
viti soliti sumus; tale crudum non sit, ut omphacinum, nec atringens, ut myrrinum, sed dulce, cla-  
rum, maturum, & subtilius partium: ad eundem modum, si sulphur vium non reperitur ( quo  
Zoar illicò puerum à nervi punctura liberasse asserit ) aut euphorbium optimum, quod nisi in ma-  
gnis & nobilissimis civitatibus reperitur, eius loco calcem aqua dulci, aut marina, aut de beronica, aut  
60 de salvia sæpius elotā, ac diebus canicularibus calcem admodum potivimus, aut eius loco pona-  
phlogiston, id est tutiam, cam præsertim, quæ ex Alexandria deferretur, locum nempe, de aliquo tenui me-  
dicamento diluam: si verò hæc prænarrata auxilia non fuerint in promptu, ut Galeno ruri evenit,  
tunc aut sagapenum, aut opoponax, aut sinus columbinus sylvestris visui servetur, multò magis in sic-  
cis, & duris corporibus: vigente verò necessitate, si aliquid horum non adfuerit, fermentum tri-  
ticeum vetustissimum, præsentaneum remedium est, temperatè calcit, mirè efficit, & materias in  
imo insertas euocat. nos autem Feltria sæpius quamplurima nervorum vulnera sola terebinthina in vul-  
nere, ac desuper vinea ( id est musco arborum ) superposita, facta convenienti, ac stricta deligatura, sana-  
vimus: inter dum solo visu propolis, hoc est fœcis, quæ in fundo visorum apum reperitur, ac desuper  
fermentum acre masticatum, quæ si durior fuerit, paulillo oleo hypericonis molliendum esse iussit Gale-  
nus,

e 9 Libart. par.  
med. c. 91. d. me  
th. cap. 2. 4. j. de  
comp. m. in ge.  
Aur. 1. 14 c. 27.  
Paul. lib. 4. c. 14.  
Rosa. 7 ad Alm.  
cap. 1. Auz. cap.  
de ca. vel. rei.



pus, quamplurima alia medicamenta, quæ ab antiquis probantur, describenda forent, sed hunc laborem cæteris relinquantur, tantum nonnulla composita, laudata nimirum, in medium adducemus, medicamentum ex sulphure, Recip. terebenthina clara, olei hypericonis, resine pinæ an. vnc. iij. sulphuris ignem non experti, subtilis, & non petrosi vnc. j. aut in ea quantitate, dum ex omnibus in tenuibus corporibus mixtum esset, sordium haberet crassitudinem, in valentioribus verò, ac durioribus ad mellis spissitudinem, croci scrup. s. misce, & omnia simul aliquantisper lento igne bulliant, quæ ebullitio magis probaretur, si in duplici vase celebraretur. Medicamentum diacuphorbium ex tercio Katageni, quod facillimè ad imas partes vulneris pervenit. Recip. olei antiqui vnc. xij. cere novæ vnc. iij. euphorbij clari recentis, & odorati ac tritii, & tenui cribro exculsi vnc. j. misce, & parum bulliant, aliud ex sexto Methodi, & euphorbio, cera, resina, terebenthina, & pice græca fiat oleo, sit hoc modo. Recip. cere vnc. i. terebenthina, picis græcæ an. vnc. s. euphorbij drag. ij. misce. tale præsidium, inquit Galenus, mirabile est in angustis vulneribus, habita utripe diligenter consideratione in eorum operatione, si exsiccatum imbecillis fuerit, aut sulphuris, aut euphorbij mensura pro imbecillitatis ratione augeatur, si verò fortis, eorum additio minoretur, hoc diligenter examinatur, an euphorbium recens sit, an vetustum, nam vetusti dosis sit ad duplum respectu recens. recens enim in quarto gradu scitatis collocatur, coloris subalbidi, substantiæ densæ, aliquantulum etnæcis: vetustum, colore pallidum, aut liuidum, aut nigrum secundum eius antiquitatem præ se fert, siccum ac fragile in siccando non valde potens est, nam eius virtus iam diffusâ est. solent huiusmodi corpora ob eorum siccam naturam, difficulter ad imum penetrare; quare interdum aliquo tenui medicamento ea attenuare oportet, nempe oleo antiquo, aut sabino maturo, aut aliquo magistrali, siquidem his vitium olei, tanquam commodò vehiculo, tenuitate enim, quæ pollent, alius se infinuant, alia valde exsiccantia secum deferantia, & sic succiatos nervos summo tempore illius possunt, verumtamen oleum simplex esse non debet, id est ex solis oleis, sed sicut illud, quod ex seminibus exprimitur, aut quod ignis vi affertur, aut ex plantarum, aut animalium, aut mineralium decocto paratur, aut simile. Recip. masticis vnc. j. sulphuris, dragani an. vnc. j. terebenthinae claræ vnc. iij. misce, & omnia per clambicum desillentur. aut Recip. terebenthina clara, vino albo lotæ vnc. vj. masticis vnc. ij. sordium hypericonis m. ij. omnia in vitro vase sub æstuo sole diebus canicularibus per dies octo marcescant, inde viriliter exprimantur, & quod expressum est, hoc modo utendum. Recip. prædicti liquoris vnc. iij. sulphuris vivi, aut euphorbij recentis vnc. s. misce, & parum bulliant, de guttatione in angustio vulnere imponendo, & de super vnguentum excellentissimum genitoris nostri, longius visu comprobatur, cuius descriptio in sequenti libro, capite de Thoracæ vulneribus, poterit videri sub hoc titulo УНОВИТЪМ sanctum, & incomparabile, aut eius loco utatur emplastro de gummi elchmi Conciliatoris, aut illo de Centaurea Guidonis, aut de fermento Momecratus, aut illo Aureæ naxæ farina fabarum, hordei, orobi æqualis portio decocta in lixivio & oxymelle. illudque est memoriam non excidat, in talium medicamentorum applicatione, vulnere angustio existente, quod partes, quæ vulnus circumscribunt, minime tangantur, caleant, & inflammationem inducant; quare expedit eas corroborare, ac ab omni noxa tutas reddere, oleo nempe rosaceo, mastichino, aut camomellino humbricato, atque hoc interim, si superiores partes vulnus occupaverit, nempe manum, aut brachium, procius eorum, spinam, & axillas calenti oleo camomellino, liliorum, & rosaceo delinire expedit. Si verò nervus ex ijs sit, qui in crure sunt, inguina statim, pubes, & partera circumiacentes prædictis oleis abundè imbuiere expedit. nec desunt quamplurima alia medicamenta, quæ necessitas loco vii possemus; nempe ex plantis, ditamnus, gentiana, centaureum, aristolochia, amaracus, & id genus multa alia: quæ in pulverem tenuissimum redacta, aut per se, aut addito liquido aliquo convenienti, & cera, sub emplastro forma præstantissimum esset præsidium.

## De Nervis contusis. Cap. X.



**S** Nervus duplici forma nervi, aut tendones contrundi solent, nempe soluta cute, & ijs solutus, quæ tam sequuntur, aut ipsa integra remanente, & nihil, quod sensui affigat, à natura recesserit, sed tunc tumor quidam eleuatur, dolor ingens à sanguine per anastomosis percolato à venis minimis oritur, & locus affectus livescere incipit, cum ecchymomate affinitatem tenet, & morbus hic scissuris, aut puncturis interdum deterior esse solet, nec curato facilius ita redditur, ut contusa carne evenerit solet, quæ facillimè suppuratur, & sic contusio absque multo dolore discutitur, denuo quæ regeneratur, quod secus est in contusis nervis, qui non, nisi acerbissimo cruciatu, & longissimo tempore, ob eorum naturam, in sanem vertuntur, nec potest facti amplius augentur, aut coalescent. augentur enim quæ deficiunt coalescent autem, quæ diuisa, aut separata sunt, quare inter mollesas, & cacobeticas passiones hæc enumerari solet, à Galeno semel tantum visâ, ut ipse affirmat sexto Methodi, capite tercio, ob id præclarissimè iubent medici, ut in omni nervorum attritione, aut contusione prima intentio sit evacuatio: & quia in cõtusis, aut ab alio delapsis prima operatio est sanguinis missio, vena, nulla prohibente causa, aperiat, victus tenuis instituat, & omni

- 10 & omni ingenio doloribus, ac fluxionibus infistatur, præsertim in momentaneis contusionibus; nam leues, & non solutas tollit citò fomentum ex oleo rosaceo masticino, aut camomellino, aut vnguento alabastrinum, aut illud, quod ex succo althææ paratur, prædictis oleis solum; valent etiam discutientia, veluti camomellinum, anethinum, sambacinum, jirinum, & rosaceum completum, superposita lana hyssopi: hac ratione ea quæ pus mouent, non ad mouenda consensus; siquidem hæc calida & humidum sunt, ac putredinem faciendam maxime apta, quæ in nervis vulneratis cuitari omnino oportet. huiusmodi enim, sicut caro, suppuratorem non admittunt, & in sanici generatione vehementissimis doloribus cruciantur. igitur præcepto Hippocratis & Galeni, has contusiones computrescere non est necesse, sed eas solum, quæ carnosus partibus occurrunt. Sed si cutis dissecta, exulcerataque fuerit, ea medicamenta opportuna sunt, quæ exsiccant, at simul fluxiones prohibent. quare, dicebat Auicenna, si vnâ
- 20 cum contusione plaga fuerit, medicamenta adhibere oportet, quæ valide siccant, & disgregatas partes vniunt, dolores sedant, & inflammationes prohibent; quare in vulnere imposita terebinthina, ac hypericonis oleo, illud cooperiatur emplastro ex sabacea, & lentice farina, oxymelle tunc pauca accotistratis, & sapa cum puluere lumbricorum terrestrium, & masticæ, aut emplastro ex betonica, masticino, oleo soluto, aut fiat emplastrum Dioscoridis, ex cinere fermentorum, adipæ & oleo: tota siquidem se des contacta, quæ in via alicuius putredinis est, valde exsiccare debet, vt quæ lana est, præferuetur: nec ab re est pro temporis intervallo medicamentorum varietate vti, modò exsiccatum, modò discutientibus, modò anodynis, vt morbi essentia exegerit: & si aliqua vulneris cruditas apparuerit, & dolor non quiescit, præparetur medicamentum ex terebinthina, pice liquida, manna thuris, viello vni, & croco: tota regio affecta oleo camomellino, de lumbricis, masticino, rosato completo, ac de
- 30 semine lini, corroboretur: & si aliqua inchoauerit inflammatio, sanguis mittatur, & tota indicatio in doloris sedatione, ac fluxionum prohibitione versetur; quare diuersiones omnes omnino probantur, & dimissa aqua tum calida, tum frigida, in oleorum resoluentium administratio flare oportet, & medicamentum superponatur ex sapa, oleo rosato, & farina hordei, & modico aceto, in quo infusa sit lana hyssopi, & locus cooperiatur, aut talis præparetur compositio. Recip. vnguenti alabastrini, farinæ fabarum, pulueris lumbricorum, vini nigri parum, & cum pauco oxymelle fiat emplastrum: & si aliqua putredo apparuerit, ea quippè tollenda est medicamento ex melle, aut lris celeberrimo, aut per se, aut alteri admixto. Si autem articuli contunduntur, absque cutis solutione, solent nimirum materię quædam plurimę pituitosæ ac locum affectum desfluere; quare expedit in re notabili corpus à tali succo expurgare, & si decet, sanguinem mittere, ac victus regimen instituire; & facta prædictorum oleorum ampla inunctione, tale superponatur cataplasma ex rosis, myrtis, betonica, camomilla, farina fabacea, vnguento dialthææ, lumbricis terrestribus, lixiuo claro, & sapa, aut ex alijs rebus, exsiccantibus, discutientibus, ac dolores emulcentibus, vt diffusæ hic inferius dicturi sumus, vbi de symptomatum correctione tractabimus.

## De Symptomatum correctione. Cap. XI.

- 10 **R**atio admodum in faucibus nervis (præsertim in punctura) rationales medici, præterquam apparëtibus prauis symptomatibus conuocantur; ob id omni laude digni sunt, qui opportune ea corrigunt, & remouent; nec illi indigni, qui omni adhibita diligētia, ea præuidet, & se tuos reddunt à futuris, quæ à triplici causa produci solent, nè pè à natura sedis affectæ, quæ nobilis est, ac sensus instrumentum, aut à prauo patientis regimine, vnâ interdū cū mala totius corporis habitudine, aut Medici operantis negligentia, aut ignorantia. Illis ergo, qui ab initio conuocantur, due principales occurrunt intentiones, quarū prima est, vt magis ad morbum, & eius causam incumbant, quā ad mala accedētia; & hæc præsertim dici potest, de qua superius abundè dictū est, & sit, ne morbus augeatur, accidentiū causam tollendo sanguinis missione, ventris subductione, inedia, & huiusmodi auxilijs, quibus facillè tale opus celebratur; altera, vulneris est curatio, quatenus tale est, secundū eius opportunas indicationes: quod autem ex vulneris natura, ac sedis affectæ præstantia, symptomata mala provenire possint, docet
- 20 Galenus a his verbis, Vulneris, quod in articulis acceptum est, ac vbi tendones, & nervi vulnerantur, dolores, vigiliæ, ac consulationes causare solet. ideo Auicenna b dicebat; Et quando vulnus est in loco, in quo oportet, vt vehemens fiat dolor, & apostema, sicut sunt capita lacertorum, & eorum posteriora, ac propriè illorum, qui nervosi sunt, ex vulneribus enim quædam sunt, de quibus timendum est, sicuti vulnera in nervos cadentia, & extremitates lacertorum, & multoties ea sequuntur accidentia mala de caloris iteratione, & casu pulsus post spī sīrudinem & paruitatem, & perducunt ad syncope, & calum virtutis, & quandoque sequitur spasmus, & similiter ea, quæ cadunt ante genua apud rotulam, quoniam sequuntur ea accidentia mala, à quibus pauci liberantur. Quod autem mala temperatura totius praua accidentia inducere potens sit, dictum est à Galeno c; nam ex sola acus punctura in corpore succo prauo scaten
- 30 re, superuenire solita sunt; quod etiam d à malo Medico id fiat, quotidianæ demonstrat experientia, præsertim in Athletis, & qui crapulæ dediti sunt, ac prauo succo nutriuntur; Et multi (dicebat Auicenna) pro


a 93. mnh. 9.

b 94. mnh. 9.

c 93. mnh. 9.  
d 94. mnh. 9.  
e 95. mnh. 9.

pe salutem, dum frigido aeri se exposuerint, atrocissimo dolore correpti, ad deteriore dispositionem devenire. quod Galeno evenit, dum vni medelam præstaret, qui, cum bene se haberet, ex frigore repenti nè conuulsus est: Vtus etiam malorum medicaminum id facit, vt in empiricis operationibus videtur, nec dubium est, ex malo victus regimine, vt omnes attestantur medicis, in vulneribus compositis, aut membrorum nobilium euenire: malo etiam medendi modo, aut medicamentorum incompetencia id occurrit, teste Galeno \* in casu pueri, qui cum in ludo literario ab altero in domestica brachij parte ipsa vulneratus esset, ac Empiricorum quidam medicamentum emplastrico eum curare aggressus fuisset, puer ipse inflammatioe correptus, repenti sexto die conuulsus periit: de altero adhuc mentionem fecit Galenus, & Auicenna, qui in manu ab acuto relo vulneratus, leso nervo, ac ab empirica manu ex Theffali sedâ curatus, superposito emplastro ex farina triticea, oleo, & humidis rebus putredinem inducentibus, maximam inflammationem incurrit. Sed quia varia sunt accidentia, quæ his vulneribus superuenire solent, quibus omnibus, nisi consilium fuerit, vulnus sanari nequit, ea potissimum describere intendimus, quæ secum maiorem adducunt timorem, veluti est tristis sensus dolor vocitatus, inflammatio, putredo, conuulsio, & arbitrarij motus impedimentum.

## DE DOLORE.

 I alicui particulæ vulneratæ dolor (pathos siquidem est) præter naturam violenter, & astatim incidens, superuenerit, causâ illic perquiratur, quæ cognita, quamprimum dimoueat: verum si coniuncta, aut extranea fuerit, ablata quippe, cessabit dolor. extranea appellamus non tantum quæ extrinsecus adueniunt, sed quæcunque nostræ naturæ contraria aliquo modo sunt, nec ab ipsa seruari possunt: si autem alicuius medicamenti acuitas, aut acredo hoc fecerit, sæpius diem ac noctem vulnus curetur, medicamentis omni nempe mordicatione expoliatis. Si vero succus aliquis prauus, aut acutus mordicauerit, aliqua plenitudine apparente, medicamentum bilem ducentem, corpus densum euacuare oportet, nam sic præcipit Hippocrates: Inedia instruitur, & victus frigidus & humidus sit, mala sedis affectu temperatura alteretur rosaceo, myrtino, & violaceo, aut vnguento rosaceo ipso adhibito, aut cataplasma te inflammationes arcente superposito: at si ex angustia vulneris cruciatus apparuerit, virus, aut icor alter malus in eo retentus, sic cutis Ferro ampliatur, aut ignito cauterio, aut more Galeni tertio de comp. med. in genere, orificio duabus sectionibus rectis diuiso, vt prauus ille succus absumi possit, & melius laniæ effluat, & commodius medicamentorum vires ad profundum perueniant: sic enim egit Galenus in iuvene illo effeminato, cum quæ causa abdita, ac abscondita fuerit, calorem sedis vulneratæ corroborare oportet, vncionibus, fomentis, ac emplastris efficacantibus, dicuntentibus, ac putredinem sistentibus, donec dolor ex toto tollatur. nam si is vehemens fuerit, et iam in corpore ab excrementis fuor, fluxiones irricat, particula omnis, quæ dolore affligitur, succum copiosorem, quam illi sit ex vlu, trahere solet, unde frequenter inflammationes excitantur. Tolluntur huiusmodi dolores, aut saltem mitigantur, adhibito ad particulam fomento, vt iubet Galenus, & Auicenna, ex pannis calidis, aut ex rosaceo, vel communi oleo calido, diu nempe, vt doloris causa euaporetur, aut dictantur vnciones autem sit tale oleum, aut saltem cum radice liliorum alborum, aut lumbricibus terrestribus bullitum: porro ex methodo est, vt cutis vulnus perpectu apertum, in locutatum quæ custodiatur, quò per id ex nervo vulnerato sanies effluat, & totum corpus à superuacuis humoribus liberetur: deinde, ne quis dolor vulneratum partem vergeat, elaborandum est. medicamenta igitur excogitare oportet, quæ vulnere imposita, utrunque mirum in modum respiciant, tum vt dolore mitigent, tum etiam vt exitum saniei patefaciant. eligatur itaque oleum vetus trium, aut quatuor annorum, cuius generis sabinum est, id quippe quod recens magis per halitum digerit: quodque magis est antiquum, magis digerere potens est, verum dolores minus sedat; quod crudum est, reprobatur, vt omphacinum, & quod denique astringenda vim habet, vt myrtinum, & quod crassam obtinet naturam, vt hispanum. nam talia nervos vulneratos nihil iuuant, qui subtilia medicamenta requirunt: quia sabino oleo, quod in regione Romana exprimitur, caremus, eo vitumur, quod ex rosis, & oleo maturo sit, aut completo vocato, aut camomellino, aut liliaceo, aut ex femine lini, aut eo mirabili, quod ex terrestribus lumbricis, & oleo antiquo paratur: atque omnia, quæcunque applicanda sunt, calida esse debent, non tamen, vt mordeant: quæ frigida enim sunt, neruis vt in inimica, ita & quæ calida sunt, eis non profunt; ob id dicebat Princeps; Noli dolores locorum neruorum calida aqua remittere, sed oleis subtilium partium calidis, vsque ad terminum non superflue caliditatis nam calidum aut frigidum in summo non conueniunt: calidum siquidem acû disculsiuor, ait Hippocrates, ad dolores sedat, ac conuulsiones remouet: in hoc affectu duplici de causa oleo vti conatur, nempe vt medicamenta attenuetur, & vt dolores demulceantur: sedecus verò aqua, & oleum his vulneribus aduersantur. possunt valde longo vlu halitum prohibere, & putredines inducere: hac ratione emollientia omnia scitis neruis aduersantur; verum vigente necessitate, quia oleum dolores sedat, ac mineralium medicamentorum mordicationem minuit, vlu seruat: In oleo, dicebat Galenus, idque simul consistunt facultates, mitigatoria videlicet, & quæ valida pharmaca obundant, siue acris, siue austeri sint virtute prædita: ergo his, quæ iuuat, bis, rursus in die loci fouere cõpetit, quin etiam in nocte, interim, si expedit, abstergerat: quàm leuissimè vulnus bombice, aut lana sape tepida insusa, & expressa, inde aliquod opportunum me-

c. 1. 1. 1. 1.

c. 1. 1. 1. 1.

c. 1. 1. 1. 1.

c. 1. 1. 1. 1.



triticea, fapa, & oleo rosato, & si hoc, quod triapharmacum vocant, non iuuerit, illud paretur, quod tetra  
pharmacum, aut encepharmacum à Græcis nuncupatur: sanie iam collecta, vbi cutis tenuissima se ostendit, tumor aperitur, postmodum quod residet, præparetur, & linus, vt decet, curetur: si vero dolor affectum sedem occupauerit, anodynis vti expedit, non in vulnere, sed in eius consortio, veluti emplastro, quod paratur ex medulla panis, & lacte, aut ex maluis decoctis, & butyro, aut ex virellis ouorum & rosaceo, aut ex his omnibus, aut aliquibus: ea verò, quæ ex metallis, & aceto conficiuntur, probantur ab antiquis, at non in vulnere, quod medicamenta omni mordicatione expoliata exposcit, sed circa ipsum vulnus: hoc interim negligendum non est, sed requisitis indicationibus curandum. Vnum adhuc aduertendum omnino est, in dignoscendo loco suppii ante, præsertim in sedibus cartilagineis, choridis, nervis, & ligamentis scitendum; nam Medici in his locis ad sectionem venientes sæpe errant, isque error interdum duplex est, & quod oculo modo ibi pus inueniatur, cum hæc loca multo crassiora sint, quam opinentur, & ea videantur suppurare, quæ mucosum humorem in se continet, quod euenire solet, quoniam huiusmodi humor, vbi tangitur, cito elabatur, ac inundare videtur.

## DE PUTREDINE.



Oportet taro in faucibus nervis, occæto cutis vulnere, ac humiditatum prohibita transpiratione, praua symptoma oriuntur, quod etiam medicorum ignorantia, aut iocundia cœnere solet, nimia nempe producta putredine, quod facile cœnere: nam nerui ex humida materia geniti sunt a frigido coagulata, coque magis, si affectus calidis, ac humidis medicinis curatur, à quibus putredines egiuntur, quæ, dum apparent, sed em ipsam læsam, aut phlegmone laborare, aut in via corruptio nis esse ostendunt; & tunc humiditates in tanta copia à vulnere effluunt, vt scire incredibile sit, aquosa nempe, ac subtilis à Græcis ichor, & vulgo virulenta nuncupatur. multoties etiam talis materia crassior, ac glutinosior est, subalbida, mellique albo subtilis; fertur hæc ex vulneribus, vbi nerui circa articulos hñi sunt, & inter hæc loca, maxime ex genibus, necliceria vocatur, & sapit pituitæ naturam; siquidem nerui à frigidis, & glutinosis humoribus replentur, ex quibus etiam nutriuntur, porro solura eorum vnitæ, imbecilles redduntur, & simile nutrimentum non concoquunt; quod inde sub tali forma per vulnus expurgatur, & vehementissimus eget excicationibus: hac ratione dicebat Auicenna; Si in vulnere multa humiditas apparuerit, tenuis, & virulenta, non abire erit vñus trochiscorum colchotar, aut Andronij, aut pralsium vino decoctum: quod etiam Galeni præceptum est, qui dubitare nequit, etiam decoctis neruis, nimia apparente humiditate, celebres illos Andronij, aut Polijde, aut Palsionis trochiscos applicare, præsertim vino solutos vsque ad mellis ipsitudinem: allensens Polijde pastillos quia temperatiori natura præditi sunt, tenuioribus corporibus magis conuenire; Andronij verò secioribus, oñulominus in hoc symptomate medicamentorum quatuor formas probare videtur. quarum Prima ex aridis mineralibus confecta sub triplici modo describitur, quorum alter validior est; nam imbecillior sic fit, Misi, chalcitidis adusti, niri an drag. j. squammæ aris drag. ij. misce; validior sic paratur, Misi, chalcitidis, eruginis an drag. j. comburantur omnia, ac pistentur, & additis squammæ aris drag. ij. ceræ drag. iij. fiat medicamentum; magis valida recipie chalcitidis crudi drag. j. misi crudi drag. ij. squammæ aris drag. ij. fiat pulvis subtilissimus. Secunda ex liquidis medicamentis fabricatur, ac pariter sub duplici compositione congeritur: prima continet opoponacis drag. ij. picis drag. xij. aceto vnc. ij. bulliant simul aliquantisper, & est opportunum messoribus, ac militibus; tenuioribus vero, ac et loco, oleum antiquum imponatur: secunda. medicamentum diaeuphorbium est, sic fit, Euphorbij recens vnc. s. ceræ vnc. j. s. olei antiqui vnc. vj. bulliant parum. Tertia, amidoem est ex agrestium columborum simo, interdum aceto, interdum oleo antiquo soluto. Quarta, medicamentum est mire, quod neruis denudatis, ac corporibus effeminatis saluberrimum est, sic conficitur, Resing, terabinthine vnc. ij. caldis viue pluries lotæ drag. j. olei malticini lubricati q. s. at si materie quamplurimæ crassæ, ac à putredine non alienæ apparuerint, ab Auicenna commendatur, & valet scirapinum cum orobi farina: verum si foetor aliquis percipitur, istud medicamentum vitandum est, & si putredo dignoscitur, nō est excusatio ab ægyptiaco, aut per se, aut alteri admixto, nempe regali, aut basilicone, quod mirifice locorum nervosorum vlcera cor rosos, aut putrida corrigit. probat tamen Galenus, & Aetius in hac putredine farinam orobi, fabarum, ac eruinam cum linio stillacio cum oxymelle, aut syrupo acetofo decoctam. si autem substantia nerui decreta, ac putrida exierit, tunc expedit, ait Princeps, eam omni diligētia amputare, inde vulnus, ac si recens esset, curare.

a Gal. com. 2. de ac. et si in hunc modum. cap. de vulnere. b Gal. meth. c. 4. meth. cap. 2. d. 4. de exp. meth. j.

e Gal. Aph. com. 26. d. 6. b. de utculo.

f Gal. de comp. med. p. v. vbi de medicinis ex metallis, d. 6. meth. cap. j.





ambarum manuum consulsione affectus est. Dantur adhuc alie consulsionum differentie quam plurime, nonnullæ nimirum à causis denominatæ; nã aliquæ materiales, aliquæ sine materia producuntur, aliæ quæ proportionatæ, & aliquæ non proportionatæ vocantur; aliæ humidæ, aliæ siccæ sunt, multæ per se, & multæ consortij lege, vel ex affinitate producuntur, de quibus omnibus inferius multa dicturi sumus.

## CONVULSIONVM CAUSAE.


**M**ultæ consulsionum causæ potissimæ, seu affectus omnes, qui consulsiones pariunt, sub duplici ratione à medicis collocantur, nempe sub diversarum humiditatum nimia copia, & plenitudine, quæ instrumenta arbitrij motus repletur, & occupantur, ut à magnis inflammationibus euenisse conpertum est, aut earum defectu & inanitione, ut ab ardensissimis febribus, aut nimio sanguinis fluxu à plenitudine quidem ita sit consulsio, nervorum genus crassius, & glutinosius materiæ nutritur, ac repletur, repletum verò intenditur, & extensione trahitur ac abbreviatur, non secus quam fiducialis, id est cithararum chordis, euenire contingit, quum in loco humido seruantur: quapropter repletiis nervis, aut nervosis partibus aliena humiditate, consulsio è repletione procreatur: ex inanitione verò quando ex humidi penuria exsiccantur, & breviores fiunt: verum & si tertiam non inveniunt causam consensit Galenus, secus tamen credit ad insectum Hippocratis, & Platonis, nam & tertia videri solet, non primò in cerebro, aut mēbris consulsionibus destinatis, sed per affinitatem, aut horum membrorum consortij lege cum alijs membris aliquo morbo affectis, ut à læso ventriculo euenire solet, dum acuto aliquo humore, aut acrimonia medicamento, aut veneno pungitur, aut mordicatur, aut dum altera corporis pars veneno affigitur, & inde consulsiones subsequuntur, noxa si quidem cerebro contrahant iam communis, & hæc consulsio non proportionata vocatur.

## CONVULSIONVM PRODUCTIONS.

**A** dictum est, quòd hoc symptomata in virtute moria, aut ex repletione, aut compariendi societate, hoc est cerebro, lege commercij patiente, produci solet, præsertim in singulari aliqua parte, dum fortis quis morbus, ut maxima inflammatio est, eam occupaverit, nam si illius sedes lacerti, aut tendones, aut nervi, nimia humiditate aliena repleti fuerint, contrahuntur, & consulti fiunt: quod sedis nervi, aut tendonibus æquissimè occurrere solet, occidit nempe vulnere, nulla ve aut discussio, aut evacuata virulenta humiditate, quæ facillimè acui ipsi, aut tendones, repleantur, quo fit ut tumeant, & breviores fiant, ac nucham versus, aut cerebrum à quibus originem ducunt, contrahantur, ducuntur nimirum secum imbibitis superfluitatibus, unde nobilia hæc membra noxam evitant contrahuntur, & ad suam recurrent originem, quæ tunc interurbantem causam expellere, unde ex tali motu expulsio cerebrum in se contrahitur, & hic motus à epileptico assimilatur. cerebrum quippe in se ipso contrahitur, nervos omnes, ac nervosa omnia illi annexa, & alligata, aut secundum eorum originem, aut nucham, medullæ, contrahit, & uniuersalis consulsio producietur, si quidem à ob cerebri nocumtum & merui, qui ab ipso oriuntur, de necessitate affiguntur: ob id sequitur, quòd consulsiones, quæ laucatis nervis occurrunt, præcedente aliqua inflammatione, perpetuè fiunt, in genere quidem sic nervorum distensiones, cum ipsi musculi primò ac præcipuè seipfos, deinde partes, ad quas perveniunt, ad suam iniquam contrahunt: porro ea membra primò intenduntur, quæ è directo inflammari opponuntur; inde, quamprimum affectus cerebro communicatur, per totum corpus consulsio extenditur: sic enim produciatur illud symptomata in vulneratis, quod consulsio ex repletione nuncupatur. Nimis à vini viis nervos pariter replet, & consulsionem facit, dictum est enim: Si ebrius quispiam repente obmuerit, consullus moritur, nili fibre corripitur. Consulsio ex inanitione, id est ob humiditatis penuriam, generatur nervi exsiccantur, exsiccantur nempe, dum proprio alimento priuantur, interdum ex nimio æstu sub ardentissimo celo: porro dictum est: Ab aridibus fortibus consulsio, aut distensio, namque: verum præpositis fortibus aliqui ardentes febres exponunt, nam febrem consulsioni superuenire melius est, quam febri consulsionem. alij ambientis aeris fervore, & multi cauteria intellexerunt, & omnes verum dicunt, frigis vehemens, & intensum, consulsos reddit homines, summam enim dictum est: Frigus consulsiones, distensiones, fluores, ac rigores febiles facit: si cui enim non deceat nervorum substantiam à nimio calore dissolvi, sic nec vitra modum convenientem, refrigerari: post febres etiam consulsus nervi exsiccantur, nam dictum est: In acuis febribus consulsiones, & circa viscera dolores fortes, malis febres enim vehementes, veluti ignis, nervos exsiccant, atque consullunt, & propter hoc, malas affertur consulsiones: consulluntur nervi, dum propria humiditate priuantur (nam dictum est): Vbi sanguis plurimus effluerit, singultus, atque consulsio, malum, nec solum in hac, sed in alijs evacuationibus verificatur hæc aphorismus: ex superflua enim evacuatione consulsio, non singultus superueniunt, italem, idem facere solent longa inedia, superflue vigiliæ, copiosi sudores, multi vomitus, ac quæcumque naturales nervorum humiditates attenuare, ac dissolvere possunt, nam famæ corpora liccat, & in vigilia consulsio mala: multa vigiliæ ex his sunt, quæ vehementer corpora sicant: sicut enim lora ab igne exsiccant, contrahi videmus, sic & in nervis, aut tendonibus occurrere potest in exterioribus lora, aut cithararum chordas extensas inspicimus, ubi vehementer exsiccantur, aut multa madent humiditate;

- 10 ditare; sic & in corporibus animalium fieri par est, & conuelliuntur. Fiunt etiam conuulsiones propter compatiendi societatem, quæ tamen veræ conuulsiones non sunt, sed accidentia conuulsiva, cum ex a<sup>o</sup> Hipp. 6. Epi- demuræ.  
acerrimo dolore, vt in Harpali hio ex libera Telephone, compertum est. qui cum luxationem in magno pedis digito accepit, inflammatus est, & dolore plenus, & vbi repositus est, dolor remittit, sed postea lumbis doluit, maxillæ ad noctem conferebantur, & episthotonos adebat, salua spumosa per dentes vix foras prodibat, & tertius die mortuus est: aut b<sup>o</sup> acri medicamento, vt Trimonis Damonis hio occurrit, cui dum haberet circa tibiam malleolum vlcus iuxta nervum sanè iam purum, à pharmaco corrosiuo, contigit, vt episthotono moretore: aut succo acuto, c<sup>o</sup> aut veneno, aut causa simili, quæ noxam nervosis partibus primo, inde cerebro, inferre solet, contingere potest, non tamen illico, aut immèdiatè, vt in materiali spatio occurrit: nam in conuulsione conortij lege cerebrum aliorum membro  
rum participatione patitur; aut ab aliqua euaporatione, & mala temperie, & non à Succo diuerso; attamen in hac etiam contrahitur cerebrum, & sunt motus aliqui conuulsui, qui ab Arabibus spasmis non proportionati, & à Latinis per consensum vocantur. Sed quia instituti nostri non est de his sermonem habere, sed de ea tantum, quæ vulneratis nervis interdum occurrit, hæc nunc sint finis.

CONVULSIONVM NOTAE.

-  **O**mnem notam in aliquibus conuulsis ita dignoscuntur, quod clarè conuulsionem à ple-  
titudine productam esse, indicium præstant, nempe<sup>4</sup> cum violentè ac repente apparuerit:  
praefertim in morbi initio, & diu perdurat; aut cum tremor, aut contractio, aut ægra, seu diti-  
lis membri dimotio inchoauerit. nam corporis<sup>5</sup> motus, & vires in nervis, musculis, & ossibus consiste-  
re videntur: portendit pariter conuulsionem aliqua colli tensio, dum magna cum difficultate ceruicis  
agitantur, & partes quæ transglutindæ ac expendi operationibus inferunt<sup>6</sup> affliguntur: sepe labra  
contrahuntur, aut per petuò patientes ridere videntur, aut vna cum dentibus ita coeunt, vt cum patiens  
nutrimentum recipere nequeat, necessariò vitam cum morte commutare cogatur: ait Hippocrates<sup>7</sup> si  
ex vulnere tetanus, aut diffusio nervorum intorsum, ac retrorsum fiat, æger hæc patitur, maxillæ cõ-  
gelantur, ac rigent, veluti ligna, os interdum aperire non potest, oculi frequenter lacrymantur, ac di-  
trahuntur, dorsum induratur, & crura scdere non potest, neque spina: cum verò le-  
thalis fuerit, potus, & cibus, quos prius accepit, per nares quandoque redduntur, sitis multa hominè  
opprimi, quem necesse est febre corripit, lingua exasperatur, & sicca fit, color totius primum palli-  
dus est, progressu vero temporis nigrescit: dicunt vulneratos interdum nullum verbum proferre pos-  
se, vt illi euenit<sup>8</sup> magnæ naus Gubernatori, cui Anchora digitum indicem, & inferum os dextræ ma-  
nus congregit, inflammatio successit & febris, post septimum diem sanies exibat lenis, postea maxima  
cum difficultate, lingua dixit se non omnia posse enuntiare, prædictum est episthotonum superuenire, &  
tertia die totus conuulsus in posteriorem partem, sexta à prædictione cum sudore mortuus est: per-  
ueritit nonnumquam facies, aut os, & oculi strabi sunt, perpetui adfunt dolores; singultus, & aliena  
rationes: at si noxa membris anhelitus communicatur, & seipsum patitur, cordis temperamentum cor-  
rumpitur, febris oritur, pulsus diuersus extensus & durus percipitur, vrina turbida, & magna cum dif-  
ficultate, aut involuntariè redduntur, vltimò vulnerati magno cruciatu suffocantur. Potissimum indi-  
cium conuulsiones humidæ ab Hippocrate<sup>9</sup> sub hoc separato sermone denotatur; Quibus tumoribus in  
vulneribus apparent, non conuelliuntur maximè, neque infaniunt, verum his euanciscuntibus, repetitè qui  
busdam à tergo conuulsiones, & distensiones sunt; quibusdam autem infania, vel dolor lateris acutus,  
vel suppuratio, vel difficultas intestinorum, si tumores sunt rubicundi: hac ratione si humor illo, qui  
tumorè faciebat, ad aliquod principale intestinum remeauerit, in posterioribus nervosis conuulsio-  
nes, in anterioribus venenosas infaniam, si fertur ad caput; si ad thoracem, lateris dolorem (pleuræcin  
vocat) generare solet. Ipsi sumus verò hi suppurant non discusso humore. Adhuc dictum est: Si in  
vulneribus prauis, & toribus existensibus tumor non appareat, ingens malum ita nempe vulnera præ-  
tata dicuntur, quæ in capitis, aut sinibus musculorum, & maximè cerebrosum occurrunt, nam in eorū  
initio nervi, & in sine tendones multi oriuntur, ob id sequitur<sup>10</sup>, quod qui vulnere affliguntur propè ge-  
nu in sine coxæ, repemè moriuntur; ibi namque in partibus genu anterioribus magnam videmus cito  
damna quæ per compatiendi rationem, rationabile est magis fieri conuulsionem, quam alibi in poste-  
rioribus, vbi partes ferè omnes carnosæ sunt. Huius symptomatis rationes assignat Galenus<sup>11</sup>, dum in-  
quit: Vulnera, quæ conuulsiones afferunt, non suppurantur omnino, siquidem nihil mali potest adue-  
nire vlceri pus generanti; nam laxa vulnera bona sunt, sicca verò mala, & bonitas hæc penes natu-  
ram concoditionis, siccatas penes quantitatem consideratur. nam suspicandum est, ne humores ad vulne-  
ra defluant ad partes principales transmittantur, præsertim vbi dolor aliquis appareat. maximè aut  
tem patitur dolor partes nervosæ: cumque igitur in vulneratis nervis tumor appareat, idest opimæ  
sanies copia, secus de inflammatione credendum est, neque conuulsio, nec aliud symptoma verendum  
est. Notè autem, quæ siccam conuulsionem esse affirmant, interdum à morbi longitudine funtuntur,  
talisa repente non fit, sed post chronicas passiones, aut arduas & siccas egritudines, quæ tandem pa-  
tientem tabidum reddere possunt, substantiam humiditatem corporis abluentes, unde alicuius fe-

a<sup>o</sup> Hipp. 6. Epi- demuræ.

b<sup>o</sup> Hipp. ibid.

c<sup>o</sup> Gal. 5. part. Aph. com. 1.

d<sup>o</sup> Gal. 4. aph. com. 16. 4. aph. com. 50.

e<sup>o</sup> Paul. 3. c. 19. f<sup>o</sup> Arist. 1. Ethic. coram. Gal. 6. de vult. par.

g<sup>o</sup> Lib. de diob. auctor. h. de v. uer. affert. Cell. lib. 4. c. de spul. synoco.

h<sup>o</sup> Hipp. lib. 5. de morbo. popu.

i<sup>o</sup> Epidemia rum. 8. f. Aph. 65.

j<sup>o</sup> Epidemia rum. 8. f. aph. 66.

k<sup>o</sup> Gal. 5. aph. com. 65. aut. 4. cap. de vlt.

l<sup>o</sup> Aphorif. com. 1.

m<sup>o</sup> 5. aph. 67.

n<sup>o</sup> Gal. 5. aph. com. 1. Paul. 1. 3. cap. 19.

dis siccus spasmus, aut membri ariditas subsequitur, qui crudelis & acutus, sicut humidus, non est, inter-  
terdum ab exquisita euacuatione (nempe copioso sudore, nimia alui expurgatione, larga sanguinis he-  
morrhagia, immodico vomitu, longa inedia, multis vigilijs, & perpetuis laboribus, ab arida æstuosaq;  
febre, aut ambientis calidi actione, aut ignito, & non ignito cauterio, aut similibus causis maximas ari-  
ditates inducentibus) produci solet: potissimum verò indicium eius essentia est, siccitas membri, quod  
iustam non se ruat naturam, aut illorum ancylositas, quibus motus secundum electionem perficitur.  
Indicia convulsionis ex affinitate, & consortio in vulneratis deprehenduntur à causis procacitatibus,  
nempe atroci dolore, qui crudeliter laborantem excruciat, à medicamento rodente, ab acri frigidityte,  
à nimio æstu, ab epoto veneno, aut extetius adhibito, aut simili, ut supra explicauimus.

## CONVULSIONVM PRAESAGIA.

30

h<sup>1</sup> Li. 3. de mor-  
bis. & aph. 6.  
Cels. lib. 4. ca. 1.



**V**ICINQ; à distensione corripuntur, ait Hippocrates, \* in quatuor diebus pereunt: si ve-  
rò has effugerint, sani sunt: distensio, siue tetanus, convulsio est ex illa, quam Graeci empro-  
sthotonon, id est anteriorem contractionem, & ex illa, quam epitrotonon, id est posteriorem  
distensionem, vocant, composita, & morbus peracutus est, in quo citius fit indicatio: non tolerante na-  
tura longius spacium, in primo circuitu dierum criticorum passio indicatur: si ergo validior natura mor-  
bus fuerit, patiens ante quartam peribit, secus verò transacta quarta, aliqua apparente significatio-  
ne, ac consumpta materia. siquidem morbos, quicunque à explezione sunt, curat euacuatio, & qui-  
cunque ex euacuatione, repletio, & aliorum contrarietas, quod experimento, & scriptorum testimonijs  
comprobat. nam febris, & quae convulsioni superuenit, eam soluit: quia humores frigidos, & glutino-  
sos partibus nervosis insertos, ex quibus frequenter convulsio produci-  
uit: hac ratione dicebat Hippocrates, <sup>4</sup> Qui à convulsione, aut distensione nervorum tenentur, febre su-  
perueniente, liberantur: porro omnis convulsio talis de replezione censetur, quia euacuatione sanari po-  
tест, praesertim si secum optime conditiones aduerint, ut in sequētib; dicemus: secus vero de spasm-  
o sicco credendum est: siquidem spasmus disproportionatus sanari nequit, atque minus, si marasmus,  
id est vltima siccitas, membrum occupaverit, non enim heca & arida membra novas humiditates reci-  
piunt, neq; opportuni spiritus ad ea transseant. igitur tepleri minimè possunt: hac de re <sup>1</sup> convulsio ex ina-  
nitione acutissima & perniciosissima est: si verò noxa à masculis thoracē mouentibus cōmunicatur, mors  
imminet, nisi plures laedē partes respirationi obseruetur: deplorata <sup>2</sup> est illa convulsio, quae maxillas occu-  
pat, & dentes constringit, ita ut os aperiri nō possit, & fame perire necesse sit: adhuc <sup>3</sup> quae in viro ge-  
rentes, pueros lactantes, & decrepitos detinet: spasmus absolutus, siue confirmatus utroque modo cu-  
rationem non admittit, & ille mortalis est, <sup>4</sup> qui fauciatīs partibus membrorum nervosorum superue-  
nerit. nam dictum est à Galeno: Nervi, aut chordē punctura, aut vulnus, propter eorum sensus vehe-  
mentiam, & quoniam has partes principio continuantur, praeterea sunt ad nervorum convulsionem ex-  
citandam, praesertim cum nihil extorsum respirat: adde praeterea, si tumor apparuerit, ac repentinè eua-  
nerit: correlariè spasmus absolutus & confirmatus, aut humidus, aut siccus, periculosus incurabilis est:  
qui ex siccitate non adhuc completa, raro, & non facili, curationem admittit: qui verò ex replezione  
fit, interdum, sed multis requisitis indicationibus, sanari potest.

h<sup>1</sup> Hipp. lib. de  
nachs. de na-  
tu. hum. 3. Aph.  
33.

h<sup>1</sup> Hipp. 5. A-  
phor. id. & A-  
pho. 57. Alibi,  
de mortis.

h<sup>1</sup> Lib. de loc.  
in hum. lib.  
de Coac. praer-  
not. lib. de lud.  
canonibus. 4.  
aphor. 57.

h<sup>1</sup> Gal. 5. aph.  
eom. 36. lib. de  
Tide. 7. & 15.  
perich.

h<sup>1</sup> Gal. 5. Aph.  
eom. 70.

h<sup>1</sup> Gal. 4. Aph.  
eom. 61.

h<sup>1</sup> Gal. 5. aph.  
eom. 5. de  
37. 38. aph. 35.

h<sup>1</sup> Hipp. 5. A-  
pho. 5. lib. de  
Co. praenoc.

## De Convulsionum curationibus. Cap. XIII.

50



**A**s duas dubitationes diffusè pertractare decreueramus, quar nā facilius, an  
humida, an siccā convulsio, nervosis partibus vulneratis occurrat, & qua-  
le vulnus id sit, quod patientibus maiorem noxam inferat, & varia excitet sympto-  
mata: sed quia ad curationis methodum nihil facere videntur, & longo egeat ser-  
mone, eas siccō pede (ut aiunt) transire decreuimus: sit igitur, quod vniuersali  
opinio, humidam convulsionem post aliquam inflammationem, sedis nervi sus-  
peruenire concedit, quae multoties post pituitosorum humorum copiam, quae nervi,  
aut tendones nutrir, ac repleri solent, generatur, & puncturam (praesertim occętatam & angustam) de-  
teriorē esse, & maiorem asserre molestiam quare humida, siue materialis convulsionis curationem ag-  
grediamur, cum & faciliorem curationem admittit.

60

## CONVULSIONIS EX PLENITVDINE CVRATIO.



**V**ENADMODVM ceterae passionēs, quae à copia humiditatis produci solent, opportunis eu-  
acuationibus curantur, sic & humida convulsio interdum sanari potest, adhibito nempe in sex-  
rebus non naturalibus optimo vietus regime, & cōuenienti topicorum medicaminum appli-  
catione, quibus vis infusa sit, non tantum in vulnere, sed in tota sede affecta, omnem succum noxium ex  
siccare, ac discutere. Esto igitur illud primum, vulnere in habitatione, & aere calido & sicco, ac molli  
culcitra collocare, qui si talis non fuerit, arte alteretur, igne ex Lauro, iunipero, ac cypresso perpe-  
tuò accenso: aer omnis si frigidus, praesertim tempore antelucano, quo praecipue frigus intenditur, aut  
intem-

- 10 intemperie, siue malo odore affectus euictetur; longus somnus malus, longæ vigilie pessimæ, ille nam que valde humectat, & caput multis vaporibus replet, hæ verò corpora exsiccant, & vires imbecillas reddunt: ac exercitj loco leues frictions extremis partibus, ac locis vulneri oppositis adhibeantur: partes verò, quæ contrahuntur, aut conuulsæ sunt, immobiles coniceantur; siquidem inordinatis motibus resistere oportet. victus ratio tenuis sit, nam & fames corpora siccat; & si virtus debilis fuerit, aut symptoma aliquod inediæ non admiserit, effa sicca sit, videlicet panis opirus, & bene coctus, moranæ aucula, syluestres palumbi, lepores, capreoli, & carnes eiusdem naturæ magis assatz, quàm elixatz, probantur à Galeno vnde com. de simpl. m. facul. vbi de carne Viperina, quiniis fecus credidit Aristot. quarto Meteororum: si verò mandendi facultas opprimetur, alimentum sit ex condro, panico, pane loto, aut ex ouis forbilibus; nam cibus quiniis mandendus, vitandus est. forbitionibus vitandum, & ius aliquod assumendum, vinum album antiquum, & non vaporosum in quantitate decenti ab antiquis commendatur; nam tale eadem ratione & potentia, qua febris conuulsionem sanat, eam iurare poterit: nos autem in vulneratis aliter sentimus, cum caput, & nervos facillimè repleat, Celsi auctoritate moti, qui dicit; Celerius panis mandendus, quàm vinum gustandù, siquidem huius vici periculosus, ideo in longum tempus distrahendus, aliter interdum concedi potest: vinum tamen omnibus, dum febris, aut inflammatio adest, interdiciendum. virgente verò necessitate, & in morbi desitescencia, illud iam descriptum concedatur; aliter aqua cocta potus esto, pauca salua, aut iua, aut calamenti, aut acori radice, aut cinnamonò, aut nucis myrsificæ quantitate addita: brevis cæna imperetur, nam optimum medicamentum est opportunè cibus datus: porro à morbi essentia sumpta indicatione, euacuatio conuenit, nec repulsionem existente. igitur euacuare oportet, nempe à toto corpore, & ab ea parte, quæ conuulsæ est, à toto corpore bifariam corpore pleno existente, aut sanguinis missione, aut pharmaco pituitiam educente: sanguis mittendus est, vbi plurimum abundat, aut inflammationis initium apparuerit, quæ conuulsionem excitare solet: tunc enim si vulneratus sanguinis redundantiæ expertus non fuerit, modò nihil obstitit, secta vena à directo vulnere contraria, & situ longinquo, sanguis mittatur, præterquam in morbi consistencia, dum squiora accidentia apparuerint. tunc enim phlebotomia euacuatiua esse debet à sede propinquo, & semel tantum; nec in magna copia sanguis mittendus est, ne vires languescant, sed validè contra morbi causam agere possint. dictum est enim à Galeno d; Si quis simul cum febre distentione nervorum laborauerit, & sanguinis missione egerit, nec, huic tantum mittere oportet, quantum exigat morbus, sed etiam aliquid accidenti est relinquendum, cuius causa sæpe sudores eueniunt, & vigilie molestant, & vires debilitantur: ita etiam si vehemè tissimæ vigilie, aut dolor intensus ægroti infestauerint, cauenda sunt subite, ac multæ euacuationes. quod à Cello ex antiquorum testimonij affirmatur, iubentium sanguinis missionem vitandam esse, eo quod maxime tunc corpus calore egeat, isq; sit in sanguine: atamen hoc aliqui falsum esse credunt, nec enim natura sanguinis est, vt vtiq; caleat, sed ex his, quæ in corpore sunt, hic celeritè vel calefit, vel frigescit: atamen Asclepiades, mittendum esse sanguinem, credidit, quod etiam concessit Galenus, & Celsus in spasmò cynico, sub his verbis; Sanguinem mittere optimum est: etiam verò quantitas sumenda est ex redundantiæ modo, & reliquis, quæ in venæ sectione considerantur, nempe ex virtute, ætate, consuetudine, regione, sæcu, & anni tempore. nam dicebat Galenus; \* Ambientis aeris temperatura loco cuiusdam accidentis habenda est, quando exquiritur calida, ac sicca fuerit, qualis est tempore medio inter Canis ortum, & Arcturi; atque ideo omnes, quibus, nihil omnino de temporum statu cogitantes, cum sanguinem abstulerint, interierunt: si etiam valde frigida fuerit tempestas, sanguinem mittere est formidandum; verò tamen vbi plurimus sanguis abundauerit, mittatur: si aliqua plethora, aut cacochymia apparuerit, & corpus aut pituita, aut serosis humoribus repletum fuerit, per aluum purgatio emollienda est; solent nimirum conuulsiones magna ex parte, à pituitosis, crassis, & viscosis humoribus provenire, ergo frequenter pharmaco educantur, quale est Hierapicra, electuarium Diasenes, de dactylis, agaricis, pilulæ cochiz, de Agarico, de Hiera, & de Euphorbio, & acrim clysteriorum vltis summo perè probatur; nã si alius sæpè educa superiores partes resoluit: sic huiusmodi clysteres parentur. Rec. Camomillæ, faluziz, stachodis, centaureæ maioris & minoris, althææ, parietariæ an. m. ij. fiat decoctum in aqua maris, aut addito sale, & adde Agarici pulverizati drag. ij. Colocynthidis in petia alligatz drag. ij. iterum bulliant, & Recip. prædicti decocti vnc. x. Hieræpicæ, electuarij Ieniciui an. vnc. s. olei camomillæ
- 60 lini, mellis crudi an. vnc. ij. oorum vitellos num. 3. misce & fiat clystere: aut Recip. Stoechades, origanibetonicæ, faluzi, radicum pooniz, calami aromatici an. m. i. folliculorum fenæ, epithimi, cubebarsi an. s. pulpæ colocynthidis, agarici, turbitan. drag. i. fenugraci, vnc. i. feminij cartami vnc. s. fiat decoctum in aqua maris, & facta colatura, Recip. prædictæ decoctionis vnc. x. electuarij diasenes, hieræpicæ an. vnc. s. mellis crudi, olei sisamini, costini an. vnc. i. salis gemmæ drag. iij. oorum vitellos nu. ij. misce, & fiat enema; hoc iterum die, noctuq; interpositis tamen quibdam horis, ceruicis, axillæ, spina, inguinæ, & tota conuulsæ sedes calenti oleo communi inungatur, aut lilaceo, aut costino, aut spicato, aut laurino: quibus interdum addimus, aut castorei, aut Euphorbij parum: probatur etiam oleum vulpinum, de lateribus, seu Philothophorum, ac superposita lana molli ac succida, membrum fascia auoluitur; & omnia quouis modo applicanda qualitatibus sint calida: si verò hoc symptoma perferuerit

n Hipp. 7 Aphor. com. 62.

b Gal. 7. Aph. com. 1. Auct. 1. 8. sup. de cura pituit.

c Lib. 4. ca. 1. in fine

d 9. ad Glanc. vbi de cura fe. b. conuulsar. d.

e 9. ad Glanc. conuuls. & 9. me. di.

(Cels. 4. c.)



- 10 curare oportet. Recip. Terebinthine claræ vnc. ij. euphorbij recentis clari, & trixi drag. ij. ceræ vnc. s. misce, & aliquantisper bulliant. ex hoc vulnus repleatur, ac desuper vnguentum nostrum sanctum applicetur, cuius descriptio in sequenti libro, Deo fauente, videri poterit: celebre etiam medicamentum est ceratum Philagrii, ex decem rebus paratum. Recip. Ceræ citrinæ vnc. ij. olei irini, costini, de ben, de cinamomo an. vnc. ij. styracis liquidæ vnc. j. euphorbij, castorei an. vnc. s. hyssopi humidæ vnc. i. pinguedinis vulpinæ vnc. i. s. & secundum artem fiat ceratum. aut Recip. Coelæ numero sex, humicorū tertestrium vino lotorum vnc. ij. fermenti vnc. j. mirrhæ, olivani, sarcocollæ an. vnc. s. furinæ volatilis voc. ij. mellis, quod sufficit pro emplastro: probatur pariter emplastrum, vocatum vulgo grana Dei, & illud de gummi eliiemi, aut palmæ, aut illud celebre barbarum: residuum verò curæ perficitur, ac si vulnus recens esset, secundum communem intentionem, hoc perpetuò seruato, quòd cuneo ligneo
- 20 dentes adinuicem discent, ne superior maxilla ita inferiori annectatur, vt tandem conuulsus fame pereat, quare decet maxillarum articulos sæpe euphorbio ardenti aqua soluto fouere.

## CONVULSIONIS SICCAE CVRA.



OMVLSIO sicca, idest sine materia, raro admodum, nisi post copiosam sanguinis effusionem, aut post longam, asiduum, & ardentem febrem, aut à causa veneno prædica, vulnera paribus evenire solet: acutissima passio est, curationem raro admittens, sicco paucæ de causa mus dicturi. Eius curatio humectatio est, ac exsiccatarum partium humectatio, & repletio: hac ratione, nulla competit evacuatio, nulla inedia, nulla sanguinis missio, nec localium medicamentorum exsiccatio, ac discussio. Porro si ex sanguinis hæmorrhagia sicca conuulsio oritur, lauræ patiens alatur, eo nem

- 30 pe nutritur, quod optimum, & copiosum sanguinem procreat, veluti sunt ova foribilia, ius capivi, tuli, ha di, agni iuuenis, phasianorum, columbarum, & similibus: panis optimus sir, & vinum album, tenue, & odoratum. tale enim facillimè penetrat, humectat, ac pro corporis nutritione distribuitur. siacula sint ius, aut panis in iure infusus, aut condrum, aut hordeum in iure decoctum, pauco sale addito: hoc pariter probatur, & quæcumque humectat & possunt. longus somnus, ac quies omnis laudatur: si quidem ad virtutis robur, ac totius corporis humectationem conferunt. Evacuaciones, quæ huic morbo opitulantur, ex lacte, iure, vitellis ouorum, butyro recenti, oleo violaceo, & maluarum decocto parantur, & per clystere imponuntur: prodest adhuc, si patiens in labro prædictis oleis, & humidis decoctis pleno diu permanens, aut eum in aluco olei calidi dimittamus, nam sic præcipit Gal. a. de sim. m. fac. cap. 7. exsiccatur etiam membrum decocto extremis animalis crebro fouere expedit, additis maluis, violis, nenupharis radicibus, & alchæz: adhæc oleo violaceo, amygdalarum dulcium, pinguedine gallinæ, vituli, butyro recenti, & per ipsum irrorare conuenit. præstantissimum etiam remedium est totam spinam, & artus omnes, ac emunctoria tali medicamento linire. Recip. Olei violati, amygdalarum dulcium, pinguedinis gallinæ, vituli an. bulliant in decocto maluarum, alchæz, & seminum cydoniorum, donec decoctum evanescat. postmodum coletur, & addita pauca cerâ, fiat linimentum. si verò febris aliqua patientem molesta fuerit, nutriatur præfana, aut panatella, addito seminum melonum lacte: ac in reliquis regatur, quemadmodum in huiusmodi febrium curatione, regi solet.

## CONVULSIONEM EX AFFINITATE CVRANDI METHODVS.

50



I conuulsio ex sympathia, aut compatiendi societate oritur, causa statim perquiratur: quæ si procaciter alia fuerit, remoueatur, si acutus quispiam dolor, demulceatur, & si aliqua alia causa vigeat addita, tollatur medicamentum aliquo narcotico, quod sedis affectæ sensus acumen laebet. nam maius periculum conuulsio minatur, quàm singularis stupor: si verò, vt contingit, ex ictu, aut veneno extrinseco conuulsio oborta fuerit, venenum illico aut cucurbitulis, aut phlij ore euacuare oportet, inde membrum ad temperiem reducere: ac si expedit medicamentum aliquo citra calefactionem vti, quod vehementius ab alto euocet, ac extrinsece venenum extrahat, illud nempe experietur, sin autem, ignito ferro, vulnus totum aduratur: si verò medicamenti acrodo, aut acutæ conuulsionem excitauerit, illo diuerso, alteri temperationis naturæ, quod magis conueniat, adhibeatur: dum autem acris, aut mordax quis humor ventriculi os, aut vterum, aut sedem aliquam neruorum mordendo conuulsam reddiderit, statim vomitus citandus est, aut totum corpus purgandum, ac victus regimen instituerendum, vt succi illi mali ad benignos permoneant, inde partes languentes corroborentur: caput verò detonsis capillis, nuchæ, spinæ, & emunctoria oleo camomellino, masticino, liliorum albuminum, rosato complexo, additis humicis terrestribus, ac modica Theriaca inungantur: & per os aliquid huius medicamenti fumatur. Recip. Conseruæ violarum, buglossæ an. vnc. j. plussicorum recentium vnc. s. carniū testudinum præparatarum vnc. ij. specierum, electuarii resumptius, diarmagariæ frigidi an. drag. ij. sacchari in aqua violarum soluti, quod sufficit, & pastilli ad vnciæ medietatem fortentur, atque, vt dicam summam, in omni conuulsionum cura, alijs non consentientibus remedijs, ad duo confugiendum est, vel ut patiens in vase oleis pleno diu totus quiescat, vel ut neruus, aut lacertus vulneratus, ex quo conuulsio orta est, transeuerfim ex toto præcidatur.



## De Ancylolithatis, id est diminuti, aut ablati arbitrarij motus curatione. Cap. XIII.

a Hippo. lib. a.  
prodict. Coll. 1.  
c. 16.  
Gal lib. de motu  
muc. to. de  
m. d. comp. se-  
condum loc.  
Rati. y ad Alm.  
cap. 1.  
Aure. 3. q. 1. m. 1.  
ca. 13. q. 1. m. 1.  
q. cap. 1.



**R**artuum, aut nervosarum partium vulnera, aut contusiones, iam contracta et cicatrice, membra sic affecta, aut consulti, aut mollia, aut arida & sicca remanere solent, ac eorum peculiaris motus, aut diminutus, aut ablati ex toto residet; dimi-

nuitus, cum virtus motus, quæ à cerebro, tanquam ab eius fonte & principio, per nervos ad lacertos, tanquam ad organa voluntarij motus, demadatur, transire nequit. ablati, cum membrum sicum efficitur substantiæ humiditatis, ac spiritus vitalis per nura, sectis nimirum vna secti nervi, ac arterij, quart pars lesa opportunè alimentu

no recipit, aut in ea durities, quæ tactui ac cōpressioni non cedit, occalluerit, Græcè poros, Arabicè tal-  
lus, & Latine topus vocatur, unde fit, ut instrumentum motus patiatur, & imperio patientis non pa-  
rii, quod evenit plerumque, ubi præcesserit aliqua inflammatio, difficilis tenuioribus partibus, & cras-  
sioribus, in articulo remorantibus, ac in contumacissimam scirrhositatem permutatis. quod ubi factu  
fuerit, articulus in priorem statum exactè reverteri minime potest, & inde salutis nullâ reclinquitur spes; in  
dicium est, quod vulnerati membra dura vel seclere, vel extendere, vel extollere, vel demittere, vel  
convertere statim nequeunt; eodem modo & frigidi abscessus, & contusiones, & calli, & putrefactio-  
nes, durities cicatricum efficiunt, præsertim in cubito, & genu; interdum etiam partes aliquæ ob eorum  
compositionem, & quia nimio sensu præditæ sunt, facillimè tumore aliquo vexantur, & ex nimia hūm-  
ditatum copia, molles ac laxæ redduntur, & est symptoma, quod Græci paralyisin, & Latini mollificati-  
onem, aut nervorum resolutionem appellant: Nunc verò de Ancylolithate, id est nervorum contra-

b Gal. 7. de c.  
po me. in gene-  
re  
Pauli. 4. c. 55.

c Gal. 7. Kara  
genu in prescep.  
Pauli 7. c. 19.  
de lig. c. 76.

ctione, aut articulorum duritie, aliqua dicere expedit. Ancylas, seu Ancylotes, Græci vocant diffi-  
ciles artuum motus, & ligationes recenti cicatrice contractas membra igitur, quæ propriam, ac natura-  
lem humiditatem non servant, magis conveniens est, ut sicca quam dura, dicantur. sicuti dicitur in nimia bi-  
umiditate pirurola replentur, mollia, ac tremula, sic & tensio, & siccitas à validis exercitijs, à severis So-  
le, ab ingenti inedia, à magnis frigoribus, à febre ardenti, à medicamento siccante sine refrigeratione, ab  
inflammationibus male regulatis, à scirrhosis tumoribus, à nimia vasorum nutritionis obstructione or-  
tum ducit; porro in articulis iam contracta cicatrice, motus difficiles redduntur, non tamen vita prius  
tur, nec sensu destituntur, quod advenit ex duritie iam contracta, aut in nervis, aut in musculis, aut in  
toto articulo; hac ratione sumpta indicatione à natura symptomatis, quod à siccitate induratum est,  
humectari expedit. Post accepta vulnera, membra ad arbitrarium motu destinata impotenter remanent,  
quia potissimum musculi, aut nervi, aut tendones, qui ab eis oriuntur, ex toto secti fuerint, aut quia nimio  
humore pirurola repleri sunt, qui in eis occalluerunt, aut quia proprium alimentum non recipiunt, quo  
nutriti possint, ob duritiem contractas cicatrices; quæ verò à lento, crasso, humore indurata sunt,  
calida & sicca medicamenta exposcunt, non tamen quæ valida sint, ac violenta, sed ea probantur, quæ  
secundum, aut tertium ordinem calefaciendi, & primum siccandi non transgrediuntur: quæ verò  
valde indurata sunt, malaestica medicamenta, id est quæ valde molliunt, requirunt; malagnata, si-  
ue malaestica medicamenta medici Græci vocant, quæ partes supra modum induratas emolliunt; cali-  
diora omnia temperantiora mediocri prædita, non tamen exsiccantia, quæmadmodum nec manifestè hu-  
mectantia; nam cum medium quandam ordinem inter has qualitates servant, emolliunt: siccitas verò  
aegritudinem adauget, & humiditas vna cum caliditate putredinem inducit: servetur igitur ordo quidā  
in his mediocriis, calefaciendo, & humectando, nec talia adhiberi debent, ubi humorum multitudo ad  
est, quæ obnoxia putredini fuerit, sed ea iuvare videntur, quæ eorum caliditate oculos meatus aperiant,  
et tempera humectatione siccitatem adquant: communiter autem ea, quæ scirrhosis tumoribus opi-  
tulantur, articulorum contractionibus, aut ligationibus profunt. Nunc verò tempestivum est, habita sem-  
per consideratione ætatum, habitudinum, ætatum, exercitiorum, ac sedis affectæ naturæ, ut singularem,  
quæ secundum varios gradus à medicis probantur, describamus ex Galeno nempe, Paulo, & Rasi. Pri-  
mò igitur manus hydra leo calido inungantur, ac diu membrum sensum fricetur, ac perpetuo de eo  
gutturim per vas angustum super tensum membrum percoletur, deinde emplastrum medicamentò ex  
adipe unatina, oleo liliorum alborum, modula crurum vituli, & cera citrina: secundò talis destillatio  
fiat ex decocto radicum althææ, hyssopi, acanthi, & cucumeris agrestium in oleo antiquo, aut fiat deco-  
ctum in hydra leo ex seminibus lini, fenugreci, radicibus althææ, branchæ vrsinæ, & foliorum malvæ,  
& facta longa fomentatione, aliquod ex Acopis medicamentis applicetur, ex his præsertim, quæ ad  
infarctas articulos durities conferunt, Acopa Aranita vocata, ex Galeno adipis iuvilli vnc. xxiij. sepi-  
taurini, resinæ colophonis, hyssopi humide, coræ recentis an. vnc. xxi. galbani vnc. ii. Aliud ex Acrio, bde  
lli iudaici aqua soleni vnc. iij. radicum malvausum decocti vnc. ii. liliorum alborum capas nune. i. rob  
q. s. Aliud ex Rasi, immergatur membrum tentum per horam in decocto, siue iure capiti, pedem, ac in-  
testinorum veruccis, aut agni, corticum mediorum vlini, radicum althææ, fertule campanæ, fenugreci  
& malvarum, inde linteo absterigatur, & inungatur vnguento dialthææ, aut agrippæ oleo cyprino,  
quod

d Gal. 7. Kara  
genu.

- 20 quod ligustrinum, aut de alchana vocant, soluto. huic addunt aliqui butyrum recens, vrsinum ad-  
 ptem, & medullam crurum vituli; Tertiò ex Scribonio fircis olei liliorum alborum, seminum lini an.  
 vnc. ij. pinguedinis vrsi, cerui, anferis an. vnc. j. bdelij, styracis, galbani, opopanax, ammoniaci an. vn.  
 s. gumme vino solvantur, inde in mortario deducantur, & ad lentum ignem secundum artem fiat vn-  
 guentum sub tenui forma. Ex Galeno, ceræ, ammoniaci an. vnc. v. j. terebinthinae, bdelij, galbani an.  
 vnc. ij. olivani, myrrhæ an. vnc. s. gumme vino solvantur, & ammoniacum aceto, medulla crurum vi-  
 tuli, pinguedinis vrsi, Taxi, Anferis an. vnc. j. olei cyprini q. s. pro molli vnguento, quod in morta-  
 rio marmoreo fieri debet pitillio dicto oleo inuncto, deinde ad lentum ignem fiat medicamentum in  
 bona forma, quo membrum tensus se peiungatur, & lana celsi superposita opportuna fascia obuo-  
 lutum quiescat. Postremo inter approbata ab antiquis medicamenta sunt emplastrum ex vaccino ca-  
 30 leo, acris, & antiquo, in iure suilla carnis salitæ decocto, donec emollierit: aut illud visci seruerit,  
 quod ex pyritide paratur, & diapyrites vocatur, aut illud, quod coracon, corax, & corus dicitur:  
 aut illud celebre, quod diatymnon nuncupatur; Galenus tamen in tendonibus, & ligamen-  
 tis duris sic agebat, & ait: In aceto accerrimo lapidem candidem tatingoo, eumque pyritem, si ha-  
 beri potest, qui certè in magnis viribus rarus non est. sin eius copia non datur, molarem acci-  
 pio, Græci myliten vocant, ex quo molas, quibus molimus, faciunt; deinde ascendente post insu-  
 per lapidi acetum vapore calido, in hoc dimoveri scirrhosum ligamentum, vel tendonem cogo, atq;  
 exinde rursus medicamen, quod molliat, impono, ac oleo quotidie laborantem particulam perfundo;  
 esto autem id oleum haudquaquam astringens, sed planè tenuium partium, cuiusmodi fabicam est. in-  
 coquimus autem interdum in oleo althææ radices, & sylvestris cucumeris, & siqua sunt huius generis  
 35 alia, & hoc vtor quotidie: vitio iam adulto, & cum preparata iam sub mollientibus pars affecta fue-  
 rit, liquidem aceri vis, modò quis modicè, & debito tempore vtræque salutari eiusmodi affectibus  
 est. sin vel immoderatus, vel in tempore non idoneo, tenuiores partes violenter absumens, id quod re-  
 liquum est, lapidefcere sinit: ob id igitur nec sapè; ac inter initia, nec longo tempore medicamen-  
 tis, quæ ex aceto componuntur, ad ligamenta, & tendones est vendum. Nos verò ad inueteratam artum,  
 aut musculorum duritiem hæc experti sumus præsidia, & est nostra praxis. Recip. vnguenti dialthææ,  
 agrippæ, mariani an. vnc. ij. diachilonis compositi, butyri recentis, hyssopi humidæ, pinguedinis ca-  
 40 strati, vrsi, cerui an. vnc. j. olei liliorum alborum, costini, de spica an. vnc. s. specierum diamolchi, serup.  
 ij. ceræ q. s. pro molli vnguento. aut Recip. emplastri diachilonis maioris vnc. iij. mucilaginum  
 althææ, semugraci, seminum lini an. vnc. j. s. pinguedinis cerpi, medullæ crurum vituli, sebi hircini an.  
 vnc. ij. olei de alchana, amygdalarum dulcium an. vnc. s. propolis q. s. pro emplastro sub bona for-  
 ma: membrum affectum diu detineatur in decocto radicum althææ, cucumerum agrelium, & tolio-  
 rum malux, parato in vino albo potenti; & postquam caluerit, pannis ficis abstergetur, & oleo de  
 cera pingui inungatur, ac superposito supradicto emplastro super corium hædum extenso, fas-  
 cia opportuna auoluatur: insuper summo opere aduertendum est, quòd si patiens antea morbo gal-  
 lico laborauerit, primò adhibitis prædictis inunctionibus, tale ceratum applicetur, quod nobis sæpe be-  
 45 ne successit. Recip. emplastri diachilonis maioris vnc. ij. ammoniaci aceto soluti, pinguedinis cerui an.  
 vnc. s. hydrargiri salia optime extincti, ac per panis medullam transmissi, ac depurati vnc. j. misce ad  
 ignem lentum, & hæc secundum artem emplastrum sub bona forma, & extensum super corium hædum  
 adhibeatur, & diu conseruetur. His peractis, si ægri consualuerint, sat erit; sin minus, in vinacis, si da-  
 50 tur modus, ubi vinum recens, & potens bullierit, membrum affectum diu detineatur, ac illico extractò  
 aliquo ex prædictis linimentis inuoluatur: probatur adhuc affectam sedem inter intestina veruicis, aut  
 vituli, & illico inungi: eodem modo plurimum valet membrum duritie affectum in luto Thermarum Pa-  
 tauine Diocesis quotidie immergere, & ibi diu conseruare, inde aliquo linimento inungere, præser-  
 tim in luto diui Bartholomæi, qui bituminosus est, & mirriticè emollit. ille verò, qui sancti Petri nuncu-  
 parur, multum in discutiendo probatur. alij autem, quia aut sulphurei, aut ferrei sunt, reprobantur.  
 Quare indicatione sumpta à maiori noxa, interdum operationes diuersas adhibere oportet, nempe in-  
 ter diu magis mollire, interdum magis discuere, præmissa semper vniuersali euacuatione, ac adhibito  
 vitæ conuenienti regimine: at si pars affecta vehementi dolore molesteur, inungatur oleo rosato com-  
 60 plecto, aut vnguento rosato Mesue, si aliqua apparuerit inflammatio: fecus verò, oleo illo mirabili de  
 hypericone magistrali, quod sic paratur. Recip. Terebinthinæ claræ vnc. ij. olei de terebinthina drag.  
 vj. olei rosati odorati, vermium terrestrium vino locorum an. vnc. j. s. rubæ tinctorum, quaterri  
 tropanum vocant, seminum hypericonis an. m. j. torismarini, centaureæ maioris, millefolij an. m.  
 s. contendantur omnia simul, præter lumbricos, & bulliant cum paucò vino albo odorifero, & aqua  
 betonicæ, donec vinum, & aqua distulerint. coletur, & adde florum hypericonis m. j. & ad Solem  
 sub Canè per mensem quiescat, flores semper immutatio, donec reperiuntur, & serua: cumque ali-  
 qua hemiparalytis, siue debilis quedam mollificatio membrum aliquod occupauerit, eo vtemur  
 præsidio, quod summo perè à Mesue cõmendatur, erat sanè secretum magni Guidonis de Caniaco,  
 formatur hoc modo, Recip. Myrrhæ, aloes, spicæ, sanguinis draconis, olivani, mumiz, opoballami, bde-  
 81j.

29 Gal. 7. litta-  
 gen. An. 2. 11.  
 cap. 47.  
 Pauli. 3. 7 f.  
 b 9 14. meth. c.  
 j. & 3. ad Glau.

c 9 Vbi de pul-  
 sonibus. ord.

lij, carpobalsami, ammoniaci, sarcocollæ, croci, masticiæ, gummi Arabici, thoracis liquidæ an. drag. ij. laudani, succi castorei an. vnc. ij. s. muschi odorati drag. s. Terebinthine claræ vnc. iij. pulvis fiant, quæ pulverizanda sunt, & vni cum terebinthina fiat mixtio, ac in vase vitreo lenxo igne secundum artem fiat distillatio, & quod distillauerit, seruetur sic, ne euanescat insensibiliter. Aliud medicamentum in comparabile cunctis, quo diu visus est Iosephus à Cruce, honestissimus genitor noster, vir iustus, & pius, qui Venetijs non sine summa laude, ad annum septuagesimum secundum vsque vixit, & in hac Medicinæ parte diligentissimus experimentator semper habitus est. Recip. Terebinthine claræ vnc. xij. olei laurini. vnc. ij. misce, & iterum Recip. galbani, gummi elihmi an. drag. v. gummi hederæ, thuris albi, ligni aloes an. drag. ij. masticiæ drag. j. myrrinæ, aloes, castorei, laudani an. drag. iij. pistentur omnia subtilissimè, ac additis alijs rebus, fiat optima compositio, quæ per triduum sic marcescat. inde Recip. galangæ, gariophyllorum, cinnamomi, nucis myristicæ, zedoariæ, cubebæ an. drag. iij. aquæ 30 ardentis, aqua vitæ nuncupatur, vnc. iij. ac densu per triduum fiat nota infusio, postea per vitreum albicum paulatim oleum sub triplici colore extrahatur; siquidem primum colorem album seruabit, secundum citrinum, tertium nigrum, singulatim in vasculis tribus vitreis colligantur, ac in eis optime obstratis diligenter conferuentur. nam Deum testamur, quod exsiccando, discutiendo, & corroborando mirabiliter operantur. nigrum verò, & citrinum, & albo vehementius auxilium præstare solet, præsertim in doloribus frigidis, tremore, paralyti, & consuisione: si autem euenerit, quod membrum aliquod extenuetur (quod dignoscitur ex ista natura, si alteri comparatur) causa inquiretur, & cognita tollatur: nam si ex vitioso nutrimento euenerit, illud permittetur ad bonu, nempe quod nutriat perfectè, & nihil superflui continet: si ex viarum obstructione, illæ quidem sunt aperientiæ medicinae attenuantibus, & discutientibus, ut motiua virtus permeare possit: si ex profunda consolidatione, aut concreta cicatrice, qua terè callum contraxerit, ut in ossibus fractis contingit, illa quidem molliatur. præsidij superius enarratis, & sic ad laudem magni Dei, qui perpetuo sit benedictus, huic tertio libro 30  
finem imponimus.



## CHIRURGIAE

IOANNIS ANDREAE  
A CRUCE, VENETI

MEDICI.

## Tractatus Secundus.

De vulneribus.

## LIBER QVARTVS.



## De thoracis vulneribus, ac eorum differentijs. Cap. Primum.



**P**ARTVS, ex quibus humanum conficit corpus, alie quidem tam conseruare sunt nobilitate in se, cum manere suo fungi nequeant, mortem subsequi necessarium sit, quae vel cito sequitur, vel ad aliquod breue tem poris spatium prorogatur: aliae vero maximum negotium medicis facillime, atqueque sanitati restituuntur: quaedam etiam, & si timenda sunt, non vehemens tamen periculum secum afferunt: id euenit, cum illi aliquo morborum genere corripiantur, soluta praecipue vitare, quae cum ipsis accidunt, indicationes ob locorum diversitatem variari contingit, rationalique methodo ad eius agglutinationem progredi oportet: conseruantur autem partes haec cum a supremo, tum a medio, nec non infimo ventre. Verum cum superius sermo à nobis de vulneribus capis, & de soluta cranij viuitate abunde habitus sit, nunc de pectore, seu thorace, vel medio ventre, aut chyano vulnerato, ac in eo contentis secundum antiquorum opinionem, qui de partibus his ictu sectis parce locuti sunt, agere intendimus, ac instar artificis si identici, qui subiectum tanquam prius naturae passionibus circa ipsum versantibus mente concipit, deinde ad eas noscendas transiit: sic nobis thoracem, tanquam subiectum, agnoscere, postmodum illius sectiones in vniuersum, & singulatim perquirere, par est: porro per thoracem, seu medium ventrem totam illam accipimus partem, quae à costis vtrinque circumuoluitur, ac à superiori furcula & iugulis, vsque ad sepi transuersibus diaphragmatis circumferentiam continetur: eius vero extremitas in huius anterioris sedis, bifurcalis illa cartilago est, quam Graeci xiphoidem, Latini ensiformem, & vulgare malum granatum, aut inferiorem furculam appellant. Altitissimus ergo thoracis terminus clausus sunt: quemadmodum humillimus praecordia, quae inieptum vocatur, & si per thoracem Aristoteles eam partem accipiat, quae à collo ad pudenda vsque extenditur. Pars, quae in medio locata est, septem ossibus fabricatur, septem veras costas excipientibus, à Graecis thorax, & sthernon, à Latinis pectus, ab Arabibus fersafu vocatur, cuius fini cartilago illa triangulari adhæret, quae in motionem gladii modo exaccitur: adsume & sparsa, intercostalia vocata, quorum singula distinctimata habere arteriam, & venam. Diuiditur autem interior secundum mediam sui longitudinem in duas partes à validis quibusdam membranis, quae anteriori parte ossi pectoris, posteriori, spinæ vertebrae inferuntur, à Graecis diaphragmades, à Latinis mediastinum nuncupantur: ve si forte magno vulnere in alterutro eius partem accepto, respirationis munus illius partis perierit, reliqua venter inuolumens didimul sal-

47 Hipp. lib. 1.  
prædic. Gal. 3  
meth. c. 10.

48 Aristot. de  
part. anim.

49 Aristot. 1. de  
anima. com. 2.  
Auer. 1. Con.  
cap. 1.  
d. Gal. 1. de ag.  
gr. anat. & 6. de  
vita par.

50 1. de nat. ani.  
mal cap. 5.  
1. Gal. 1. de ag.  
gr. anat. & 7. de  
vita par.

51 Gal. 1. de vita  
par.

a Gal. 4. medi.  
cap. 6.

tem actionis retineat, nec propter hoc duo ventres, sed vnus tantum est, nam <sup>1</sup> locus, qui inter collum, & crura est, in duas maximas capacitates diuiditur, prior sub thorace, secunda sub membrana, quae abdo-  
mini subscinditur (peritoneon Græci, Syphac Arabes nominant) continetur, in eo medio ventre spiritua-  
lia membra conferuntur, C O R aliorum rex, eius capsula, pulmones, phrenon siue diaphragma, panni-  
culus, picura, mediastinum, vena cava ascendens chilis ducta, arteria atheri, trachea, aspera arteria vocita-  
ta, esophagus, suæ meri, ac suspensoria multa. Membra hæc, aut quia primaria sunt, aut primus deservien-  
tia, læta nempe mortis periculum minantur, præcipue vero si inimico offenduntur: quæ etiam cautam-  
tem non attigerint, potissimum verenda sunt, nam <sup>2</sup> sedes dorsum constituentes, admodum nervosæ,  
& quæ thoracem componunt, & manibus, laccetis, multis nervis, arterijs, quæ plurimis fere con-  
textæ, maximeque circa thoracem sensus existit. Affliguntur hæc partes diuersimode, nempe à  
causa externa, quam Græci procatæricam, & Latini primiciam appellant, quales <sup>3</sup> censetur, quæ  
possunt vulnerando perforare, incidere, abrumpere, contundere, ac discidere, veluti ab ense inciden-  
te, sagitta perforante, lapide contundente, globulo abrumpe, & fune diffidentem: ex vulneribus <sup>4</sup>  
intima penetrantibus nonnulla nil aliud, nisi penetrationem, demonstrant, plurima autem internis, ac no-  
bilibus membris noxam inferunt, porro ex penetrantibus ca magis timenda sunt, quæ dorsum offendit, nam  
ibi nucha, spinalis medulla, & nervi motui multi ab ea producti locantur: videntur <sup>5</sup> etiam pulmo-  
nes tam magis replere partem, quam anteriorem, & venæ, ac arteriæ insignæ in eius fundo pertransire:  
variantur etiam hæc llesiones locorum diuersitate, cum aut anteriores, aut posteriores, aut laterales situs  
occupant, aut rectè, aut obliquè, aut sursum, aut deorsum tendant, aliæque veneno præditæ, multæque  
sine veneno reperiantur. Sed quia dictum est, <sup>6</sup> nullam exteriarum cautelarum curationis indicem esse, cū  
à nulla earum, quæ adhuc non permanet, indicatio sumi possit, nec accidentia, aut morbi forma, eius es-  
sentiam, quam isti naturam dicunt, minimè insinuat, sed indicationem ab ipso affectu, & eius essentia  
initium habere, igitur diceret opere pretium est, primariam <sup>7</sup> horum vulnūrum differentiam, quæ eis essen-  
tiam constituit, à qua curatiue indicationes sumuntur, simplicitatem, ac compositionem fore. Verum <sup>8</sup>  
quia potissima indicatio in his sumitur à penetratione, & ab ijs, quæ non penetraverint, cum ferè omnia  
non penetrantia pro simplicibus, & penetrantia pro compositis habeantur, ideo de his, quæ totum non  
penetrant pectus, veluti de simplicioribus, in primis oratio habenda est.

b Gal. 1. Aph.  
comm. 4.  
c Hipp. lib. de  
nerv. lib.  
d Gal. lib. 4.  
par med. ca. 10.  
f. meth. 1. & 2.  
de sympt. caus.

a Gal. 8. de  
nat. animæ.

f Gal. 4. meth.  
cap. 3.

g Gal. 3. in  
di. cap. 1. Aul.  
h 1. cap. 8.  
i Gal. 3. in  
di. cap. 4.

### De Thoracis leui, ac Simplici vulneris notitia & cura. Cap. II.

i Gal. 3. me-  
th. ca. 4.



**T**HORACIS vulnera <sup>1</sup> sola, ac simplicia sūt, si nec affectus vllus simul adsit, nec sym-  
ptoma, nec propria causa vna fuerit, sed per se stant, nec possunt, nisi seipsa dem-  
strare, ac vna, & communi tantum indicatione reguntur: erit nempe talia conti-  
nui solutiones non tantum summa curicula, quam epidermidan Græci vocant, vel  
cuius totius, sed carnosæ particule etiam citra vllus portionis avulsionem, postu-  
lantesq; tantū agglutinari, sicut & illæ, quæ acuto aliquo telo sunt perforatæ. cū  
igitur pectoris vulnera huius fuerint naturæ, nihil proprii in eorum curatione habe-  
re medicus <sup>2</sup> omnino constituitur, sed maxime communem fore eorum curam affirmant, quæ à duobus  
perficitur, nempe à natura, tanquam à præcipuo agente, & causa effectrice adiuta suis viribus, & conue-  
nienti alimento, ac medico ipsius naturæ ministro, quatuor intentiones in animo habente, easque subal-  
ternatim, dum opus suum exercet, obseruante, vt tandem curationis propositum finem assequatur, quar-  
tum prima est, si quæ extrinsecus inciderint, amouere; secunda separatarum partium labra simul coherere, tertia  
partis læsæ substantiam tueri, cauereque, ne quid labris vulneris intercidat, quoniam sepius euenit, vt pilus, <sup>3</sup>  
aut oleum, aut humida alia interueniant, earum, quæ copulandæ sunt, partium, vitæatem impediunt,  
quarta, si quæ accidentia succedant, ea propulsa. Extranea diuelluntur, aut manibus tantum, aut oppor-  
tuno instrumento, aut aliquo medicamento attrahente, sed raro committuntur partes adinice, aut vin-  
culo ex duobus initijs circumdato, aut sutura, aut fibulis, quas Græci anclæras vocant: porro bifariam si-  
mul manent quæ commissa sunt, aut per se, aut aliorum ope: per se omnia mollia & viscosa, etiam quæ  
concreverunt, ac coalescere possunt, talia sunt tum caro ipsa, tum quæcunque ex carne consistunt: ope  
verò aliorum, omnia sicca, duraque, vt ossa. Carnosa igitur pectoris partes si vulnerantur, cum sepe cor-  
pore solum fuerit citra succum vitæ sum, aut externam fluxionem, aut intemperiem, aut inflammationem, aut  
quodlibet aliud vitium, proculdubio rore proprio, ac elementari, & fine medio eterogeneo coibant. nā  
in corpore boni sanguinis, ac optimæ temperaturæ, coalescere facit ea, quæ inuicem distant, ac pristina <sup>4</sup>  
refluerit vitæ: cum ipsa natura, veruntamen & si communiter hæc indicationes, simplici, vel potius simpli-  
cissimo cuidam vulneri opulatur, nonnunquam tamen læso pectore non sufficiunt, cum sepe corpori-  
bus repletis, & prauis succis scatentibus occurrant, & huic sedi læceri multi continuis motibus dedicati  
sint, qui ad sanguinis fluxum, & tardam vulneris agglutinationem faciunt: quare mirum non est, si in-  
ter dum bono vitæ regimine, ac topicorum varietate cœcitate, cōdum nulla agnoscat penetratio,  
sanguinem oui albumine, aut pulueribus ad hoc destinatis, sistere oportet, nempe si nimis effundatur im-  
moderate, tunc ad mouendum est pulvis ex aloë, mallice, bolus armeno, thure, draconis sanguine, additis  
leporum

b Hipp. 1. Epi-  
dem. 1. Cel.  
lib. 1. ca. de glur.  
vol. Gal. lib. 10.  
per med. de im-  
1. meth. 1. 3. meth.  
c. 1. Aul. lib. 10.  
c. 34. Paul. lib. 4.  
cap. 3. 6. Retic. 7.  
ad Almea. 3. p. 1.  
lib. 1. de 1. 34.  
Aul. 1. 1. 34.  
de 3. 4. cap. 3.

c Gal. 3. in  
di. cap. 4.

d Gal. 3. in  
di. cap. 4.

10 leporum pilis, de super verò oculo candidum aliquantulum agitarum, & lecti stupa exceptum admoveatur, deinde talcia membrum circumvolvatur. expedit autem, ne mollis nimis sit, quo videlicet tutò cōtineat, nec dilabatur, neque ita vehemens, ut premendo dolorem excitet: porro eiusmodi medicamenta ante tertium diem amoveri non debent; nam parva vulnera his medijs duorum aut trium dierum spatio, sanari solentur, si hoc pacto agglutinari nequeunt, curanda erunt ad quartam, aut quintam usque medicaturā, glutine alborin, id est resina terebinthina. expedit enim hanc claram, mollem, & odoriferam esse; siquidē ad omnes requisitas intentiones de melioribus medicinis apud antiquos enumeratur: lichinia, seu linamenta, aut penicilla, vel turundæ, quas Græci tacrimata, & vulgares tentas appellat, quibus medicamentum imponitur, ita mollia, & accommodata sint, ut nullum inferant dolorem: partes verò coadiacentes rosaceo, camomillino, ac mastichino oleo tepido infingantur. quibus interdum addi potest bolus armentus, aut terra sania, & non ab re, cum & sanguinis profusum supprimit, dolorem sedat, & phlegmonas fieri prohibeat: cumquē in vulnere optima apparuerit concoctio, siccum applicetur medicamentum, quod Græci Sarcoticon, & Latini carnis productum vocant, quale est emplastrum barbarum Galeni, aut balsicon Mesue, aut citrinum visuale, vel aliquod ficius, donec vulnus ex toto repletum fuerit. postremò cicatrix inducatur emplastro diaphanico, quod palmarium, diapalma, diachalcicos, & diacolocothar vocatur, aut quod de minio, aut tripharmacum dicitur: si verò vulnus tale fuerit, quod eam exigiturationem, quæ per consuetudinem fit, & partium agglutinationem, fiat, sed in his cauere oportet, quod plerique chirurgorum faciunt, cum non recte anatonem calleant, quodcumque thoracis vulnus dilatare, penetratio nem sine indicij, & ratione verentes.

Haecenus de simplici vulnere dictum sit, cui addere non graui sumus nonnulla, quæ etiam his, quæ dicenda veniunt, conferre possunt.

De thoracis vulnere penetrante, & de eius dignotione, & prognostico. Cap. III.



RENYRATIONS vulnere pectoris, quas syntrefin Græci vocant, varijs sensibus dignosci solent, tactu præcipuè, veluti ex digito, aut specillo, siue radioli, quod instrumentum huius ætatis Chirurgi stylium, aut exploratorium vocant, impositione; ob id in obliquis, aut angustis penetrationibus, ut magis secuti possit, ex plumbo fabrica turrida quæ pariter ceræ candela interdum facere solita est, & tutò, sed digitus verus est iudex: in amplis verò visus id præstat: sæpe etiam auditus, dum effluus aer sufflans per vulnus exierit, & crepitus quidam sentitur, & ampullæ multæ ebulliantur, præsertim si per lineam rectam ad centrum vulnus pervenerit: si autem oblique, aut tortuose ingresserit, aut angulum fuerit, aut costā aliquā fractā, aut depressā apparuerit, vel panniculus costas intus subcingens, pleura vocatur, aut vocati intercostales musculi, siue illi, qui exterius pectus circumscribunt, ne unuerint, aut coherint, quod medicorum negligentia crebrò evenire solet, dum vulnus dum absque lichinis permanferit, talem notitiam non ita facile admittunt, nec plumbeus radius, aut ceræ candela quæ te ingredi valet, & in hoc operatoris sæpè decipiuntur: quapropter, ut eam penetrationem agnoscat, lo inspecto, à quo veritas interdum sumitur, varijs vtantur experimentis, & e primò xylī, siue bombacis

10 optimè carpinati, aut lane focculorum porriunculam accipiunt, illamque quam leuissimè super vulnus apponunt, & retento aere iam inspirato, ore & naribus clausis, si patiens sufflare voluerit, aer per vulnus aggreffiens, quæ illi opposita sunt, mouere solet: hoc idem candela parua accensa, & ex obiecto vulnere applicata facit. nam exeunte aere, flamma ventilat, & mouetur. speculum etiam lucidum, ac ab omni immundicie purgatum, si angusto vulnere obijciatur, proculdubio, si minimus exierit aer, tingitur: verum, quia hæc interdum medicos decipere solent, tutius est aut à digito, aut à specillo tale auxilium expectare, si minimus aliquantisper vulnus dilatare, inde omnia experiri. Prohibetur 4, inspiratio interdum in amplis vulneribus thoracis, & sine voce remanet homo, statimque obturato vulnere, illico & respiratio, & vox redire solet: quod etiam cunctis, spinali medulla incisa, & si vtrunque lateris consossium fuerit, voce simul tota, ac respiratione planè delibetur animal. Hæc omnia prima die diligenter examinare consentaneum est. siquidem paulo post quamplurima vera indicia manifestantur, nempe dum pus, aut sanguis in pectoris cauitate coaceruatur, indubiam, quod sit ibi vera penetratio, fidem præstat. nam laterum dolor & grauitas, pondus iuxta falsas costas, sputum purulens, scotens anhelitus, tussis molesta, & febris asidua patientem infestant: idque potissimum agnoscitur, si ab vno latere in aliud patiens se conuerteret, commearē aliquid sentiat: sanici multitudine ibi contentæ: si verè in præcipiti sunt, quibus visque ad cauitatem membrorum intus conditorum laisiones pervenerint, tum h quia aer externus, & nos ambiens, non preparatus, per eas ingrediens, internas partes valde offendit, cum etiam internus per easdem admodum exhalat, quo sic expirent, & euanescente, virtutis robur insigniter laeditur, dissoluitur, multoque in becillus redditur. Accedit huc, quod huiusmodi vulnera haud commodè detergi possunt, eaque tandē in fistulas degenerant, ac empimata, id est purulentas collectiones, excitant, unde & mors ipsi vulneratis





uentibus anterus, ac in medio positum, in quo principium vitæ, omnisque motus, & sensus esse censetur: natura quidem nobiliter eum collocauit, & conseruat. Cor solum (dicebat Aristoteles) inter omnia viscera vitium nullum patitur, cum vitæ principium existat, ac membrum tribuens, non recipiens, omnibusve alijs partibus suarum operationum principia donas, & ad virtutes proprias disponens: in eo etiam irascibilis animæ vis inclusa est.

413  
Aristo. 3. de  
part. anim. c. 3.

VENAE CAVAE, AC ARTERIAE AHORTAE

PERFORATAE NOTIONES.

**X** O I S T A, iecoris parte, omnium totius corporis venarum maxima illa prodit, quæ ob eius magnitudinem causa dicitur, per totam animalis longitudinem excurrat, sursum ad cor tendit, deorsum ad spinam progreditur, in qua sanguis purus colligitur, cumque hæc vena, quæ etiam magna, & chilum nuncupatur, læsa fuerit, sanguinis nigri & crassissimi maximo profluvio expectare oportet, vulnus in dextero latere vergit, venæ languescunt, facies decoloratur, extrema frigidæ, vires deficiunt, & non multum post æger moritur. si autem arteria ahorta, quæ omnium maxima est, ex sinistro cordis ventriculo exorietur, spiritum vitalem in totum animantis corpus deferens, nationumque calorem per diaholem, & sistolem temperans, vulnerata fuerit, sanguis floridus, ac tenuis copiam effunditur, vulnus in sinistro tendit situm, articularum motus variant, & concidunt, extrema frigida fiunt, animi de quibus crebro succedit, postea febris asidua, cordis palpitatio, & mors statim subsequitur: occurrit interdum, quod arteriæ ramus aliquis vulneretur, & quamprimum vulneris partes coierint, ac sanguis ille spirituosus fuerit retentus, circumiacentes sedes tumore expanso vexantur, ac ita tædium arenulis, aut vitris in minimas partes reductis plenus esse videtur, quod symptoma futuram mortem præfigere solet: de eo tamen adhuc vllum verbum legere potuimus, & multos vidimus vulneratos, potissimum circa iugulos, quorum plerique tandem vitam cum morte permutarunt.

SECTORVM PVLMONVM SYMPTOMATA.

**V** L M O N E S I D I quia spirandi officio delegati sunt, spirandi difficultas oritur, sanguis ex plaga spumans, clarus, rubeus, sine dolore, & non valde calidus, effunditur, ex ore interdum tussendo, subitò multus, spumosus, & rarus emittitur: sæpe etiam ex vulnere spiritus, cum sono fertur, in vultu inclinati iuuat, quidam sine ratione surgunt multi, si in ipsum vultum inclinantur, loquuntur, si in aliam partem, obmutescunt; ceruicæ conuelluntur; facies modo inflammatur, modo dealbescit; interdum accedit color, dentio recedit. vltimò pallida remanet, si intus pulmones vulnerentur; lingua alium colorem assumit, ægri crebro inspirant, frequenter tussium, vulnus tenet, sed copiosum pus, ex purgato non dollet, qui tussis affecti sunt, siquidem pulmones sensu priuantur: diu interdum viuunt, sed raro conualescunt; promptissime quidem sedis pulmones malas temperaturas ac inflammationes excitant, quæ si semel eos occupauerit, vulneris glutinandi exigua spes remanere solet: præterea dum expiratur, aut inspiratur, perpetuò aliquid acris, qualiscunque ille fuerit, recipiunt, à quo sectæ eorum partes læduntur: adde quod ea, quæ sanandis vulneribus idonea medicamenta sunt, attingere pulmones integris viribus non possunt: accedit insuper, quod respirando moventur, & tussiendo lacerantur; cumque igitur cum spirandi difficultate, ac tussi sicca, aut cum spatio sanguinis non multum resonans angustia, & pectoris grauitas coniuncta fuerit, acuta quoque febris accesserit, pulmonis, aut ligamenti alicuius, à quibus thoraci conuocantur, inflammationem declarat, aut in eis profundissimum vulnus inesse manifestat, ex vulnere penetrante lateris sinistri. interdum pulmones nocumenta euadere solent, ob id quia à collis illius partis aliquantisper distant, quod locus se habet, ex affectu sedis oppositæ.

TRACHEAE VULNERATAE ACCIDENTIA.

**A** O A arteris, quæ Græci tracheam, idest asperam, & Latini bronchum, & gurgur vocant, pars est ipsius pulmonis ad inspirationem, & respirationem necessaria, ac tertium eius vas, & proprium instrumentum vocis; à pharynge profectum, exterius cartilaginofum & rotundum, ne facile ab extrinsecis lædatur; quæ verò parte interiori a pharynge tangit, carnosum & membranofum est, ne ipsum cōprimendo, cibum ingredi prohibeat. Hæc arteria, dum vulneratur, interdum sensibus dignoscitur, sæpe verò occultatur: Sed quomocunque sit, nunquam ab ea aut calidus, aut ruber, aut multus effunditur sanguis: interdum dolor, sed paucus, iuxta exulceratum locum percipitur, acutus verò ex pectore ad dorsum: fauces lateres sanguine, aut sanie repletur: nunquam etiam foetidis oris odor, vocis rauedo, & faucium siccitas causatur: huiusmodi accidentia raro pulmone vulnerato videri solent; inde ad paucum tempus per spumum purulentum quædam, ac cruenta reiciuntur, & febris fortior fit, & in pulmones defluunt excrementa, & patiens empycus fit: alia vulnera, cum exteriorum & carnosam ledunt tunica, potissimum quæ summæ eius parti est vicina, sanari non inconueniunt: & nos, dicuntur medici, non paucos eorum, qui ita affecti sunt, sanauimus: cum verò effatu digna sunt vulnera, præsertim, quæ cartilagineam occupant, perraro sanitati restituntur, ob id quia sedes hæc dura & exanguis est, cōtinuò mouetur, ac humiditates frequenter ad eam defluunt, quæ sanè vni cum asidua eius respiratione, impedimento

b9 Cels. lib. 9.  
cap. 3. d. Gal. in  
cap. d. Pau.  
lib. 6. cap. 38. Al.  
lib. 6. a. c. 96  
c. 9. Arist. 3. de  
part. anim. cap. 6.  
Galen. d. de vlt.  
part.  
d. Hipp. de Ca.  
ac. part. 1. A.  
phor. 1. 3. Gal.  
2. Aphor. com.  
a. a. Act. lib. 1.  
cap. 9. Pau. lib.  
3. cap. 31.  
e9 Gal. d. de no.  
loc. aff. cap. 9.  
f9 Gal. d. de loc.  
aff. a. 1. & 2.  
g9 Hipp. d. de in.  
ter. aff. c. 1.  
h9 Gal. 1. meth.  
cap. 1.  
i9 Galen. a. d.  
de no. loc. aff. cap. 9.  
k9 Gal. 1. meth.  
cap. 11.  
l9 Hipp. lib. 3.  
de morbo. Arist.  
3. de part. anim. c. 3.  
m9 Cels. lib. 4. ca.  
1. Gal. lib. 1. art.  
part. med. ca. 12.  
n9 d. d. cap. meth.  
o9 Hipp. lib. 1. de  
inter. aff. c. 1. Gal.  
3. Meth. ca. 1.  
p9 d. d. cap. 1.  
q9 Gal. 1. meth.  
cap. 11. Act. lib.  
8. cap. 6. 4.

sunt, quominus labra vulneris coalescant; & si casu aliquo tumore afficiatur, meatus clauditur, & patiens suffocatur, aut asphogus ira comprimitur, quod humore deglutire non potest.

## SEPTI TRANSVERSI OFFENSI INDICIA.

a Galen. 7. de  
vita part.  
b Cels. li. 4. c.  
8.  
c 3. de part. ani.  
cap. 10.  
d 1. de not.  
loc. ad cap. 1. de  
vita part. in li.  
ne 8. de aggr.  
nat. & lib. de vo  
ce, & anhel.



O c membrum à Platone, & senioribus Philosophis phrenas, siue phrenum, id est mens, vocabatur, à Latinis verò, & his, qui Platoni succellere, septum dicitur, ab Aristotele cephirima, id est succinctoria, à Galeno diaphragma, & præcordia; musculus magnus est, ac rotundus, qui subtenditur interno toti spatio thoracis; & terminus, quo inferior thoracis pars finitur, septum dicitur, quasi sepes aut paries, nobiliores partes ab ignobilioribus segregans, & animam conspicibilem, quam Plato in Hepate permanere dicit, ab irascibili, quam in corde ponebat, separans, & vt animæ sentientis origo inoffensa seruetur, nec exhalatione cibi, & caloris aduentitij copia, faciliè occupetur. Annotatur hoc septum seu cingulum costis, parte sui altiore, carnosiore, ac validiore inferna summam perit onas tunica: media autem membrana exiliore consistat. Ergo cum circa purias costas penetratio occurrit, aut si paulò alius sit, & descendendo procedat, huius particule lesionem timere oportet, & quia c spirationis instrumentum est, sanguis spumulosus fertur, spiritus rarus est, spina dolet, & præcordia sursum contrahuntur, si ingens vulnus fuerit, aut membrum inflammatione attingatur, vehemens apparet inspiratio cum gemitu, & dolore per totam humeri partium compagem, magnaque tussis res forans cum dolore, & strepitu, & vomitus, & sanguis spumans per os fertur, & qui sic laborant, difficulter comedunt, ubi enim à vicinis partibus excrementiij succi, ac varij humiditates attrahit fuerint, continuo mentem perturbant, vnde delirium sequitur, & vulnerati homines inestant loquuntur, ob id nullius s partis, præterquam cerebri, aut septi vitio delirium continuum homines inestant: iccirco veteres hac parte inflammatione affecta, homines phreneticos deuenire putarunt. ob id phrenas, id est mentem eam vocantur, tanquam sapienti parti quidpiam acciderit: febris etiam acuta ex maximo cordis consensu oritur, & si quid cibi assumptum est, id redditur, præsertim media eius parte secta. Huius visceris vulnera, nisi incrimine peruenierint, interdum, sed magna cum difficultate, solidantur, eius motu non obstante. si autem nervosis, & exanguibus hyeme partibus, res abique villa spe iudicandum, facilius sanantur, grauiusque curatio eorum etiam est, quæ carnosius inlunt partibus, atque magis si per phlegmonem occupauerit, potest non in ipso modo diaphragmate, verum etiam omnibus, quæ intra pectus sunt contenta: adde etiam hanc curandi difficultatem ob eam rem, quod in his vulneribus sanies perpetuo defluit, quæ sedem vulnerum agglutinari non sinit, nec ad ea loca medicamenta, nisi tardè, transire valent. Hac scire signa, in fulscentibus membranis, & mediastini magnis lationibus apparere solent.

e Cels. lib. 7.  
cap. 16. Paul. lib.  
6. cap. 88.

f Galien. 7. de  
præcor. & pulm.  
g Galien. 7. de  
loc. aff. cap. 3.  
h Aristot. 3. de  
part. anim. cap.  
10. Galen. 7. de  
not. loc. aff.  
i Gal. 5. meth.  
cap. 9.

k Arist. 1. de  
part. anim. cap. 4.  
l Gal. 11. de aggr.  
nat.

m Cels. lib. 5.  
cap. 16.

n Hipp. lib. 1.  
de morbis. & 7.  
de Coac. præno.  
n 11. de vita  
part. & 8. de aggr.  
nat. & lib. 4. inter.  
cap. 5.  
o Hipp. lib. 1.  
de Coac. præno. &  
lib. 5. prædictio  
num.

p Galen. 4. de  
symptom. nat. 8.  
de aggr. nat.

q Galen. 1. de  
loc. aff. cap. 4. de  
vita part.  
r Arist. 1. de  
part. anim. ca. 3.



V ENADMODUM à corde magna arteria, quæ ahorti, & ob hepate causa vena, quæ chilis vocatur, ortum ducit, ita à cerebro truncus magnus producitur per totam spinam extensus, qui spinalis, dorsalis, cervicalis, & lumbaris medulla nuncupatur, à vulgo verò nucha dicitur. Hic validiorum nervorum principium est, sensum, ac motum omnibus partibus sub ceruice consijutus, præterquam visceribus, præstans. Hac ratione cum nucha, quæ cerebri viciat, est, aut medulla, que in spina confertur, vulnus in media dorsi regione infigitur, nervi resoluuntur, aut discedunt, sensus intercidit, ac vis sentiendi interdum digitis non insunt, dolores, qui affectam particulam continentur, intensi admodum sunt: interposito tempore aliquo, inferiores partes sine voluntate vel semine, vel lotium, vel alium excremunt. Alienam interitum, qui sic affecti sunt ex cerebri consorcio, & sæpè aliqua mollitudo parte. Talia vulnera, vt plurimum seruari nequeunt, nam his similia sunt, quæ cerebro occurrunt: porro huic imbecillitas accidere solet interdum cerebri vitio, vt pote à quod sentienti, & mouendi facultatem recipit; interdum ipsa duntaxat spina primario affectu laborante, veluti cum eius soluitur continuitas, quæ si profunda fuerit, seu adduci accidit, & tandem vulnerum permittit. verum si spina principium lædatur, solæ partes capitis, quoad vixerit animas, & sentire, & moueri possunt, quod si cerebro quoque noxa acciderit, qui sic afficiuntur, omnium partium & motum, & sensum illico deperdunt.

## MERI APERTI NOTAE.



A M partem, quæ inter fauces, & os ventriculi media est, Graeci Esophagion, Arabes meri, & Latini gulam vocant: gula enim est, qua cibis & potus deuoratur, consistit ex nervosis & carnosâ parte. ex nervosa, vt extendi possit, cum cibis ingreditur, ex carnosâ, vt molli sit, & cedat, ne lædatur asperitate cibi descendens. Extrialia sunt eius vulnera tum quod cibis, ac potus per eam transit, qui agglutinationem impedit, tum quod eiusmodi vulnera coactum medicamentorum in transitu tantum transeunt, sicuti & quæ in ore, seu ventriculi orificio consistunt. Dignoscuntur hæc vulnera à siqu, interdum sensu tactus, sed vt plurimum ab excrementibus. defertur enim per lineam rectam membrum hoc ad spinæ longitudinem sub aspera arteria. molle est, rotundum, & paucissimis venis à mesenterio ortis contextum: cumque vulnere tentatur, sanguis, aut pus vomitur,

ac per



a Gal. p. de loc.  
a Cr. s.

na membra ab omni uoza defendantur : inde ægrotus pedibus suspendatur, vel hincinde concutia-  
tur, donec, quod in eo congregatum est, exeat: dormiat super vulnus, ac in die quiescat. interdum à  
pulmonibus claudicatur vulnus, quod specillo, aut obruta fistula aliquando patefacere ausi fuimus,  
sic pulmones propellendo, vt materia liberè exeat; peractis aliquibus diebus, si nec creber apparuerit  
anhelitus, aut cordis tremor, aut febris intensa, aut aliquod malum accedens, & reliquas eius bonas no  
uerimus dispositiones, vulnus illud saluum esse opinamur. præstant igitur medici officium est, sedem  
vulneratam illico diligenter considerare (quod ex anatomie deprehenditur) an ibi magna, vel parua in  
sitæ sint venæ, & arteriæ. nam statim à magnis multus, à parvis paucus emanare sanguis solitus est. qui,  
si minimus fuerit, ab innato regulatur colore, & insensibiliter discoloritur, aut per porarios meatus, siue  
per communes canales expurgatur; venæ siquidem quàmplurimæ, ac arteriæ, per apicem inferiorem  
musculorum intercostalium, percurrunt. Suppresso igitur sanguine, vulneris partes\* aut fascia duplici  
modo inuoluta, aut vinculo\* Solstrati, aut Amyntæ, aut ad formam literæ X (quod maxime conue-  
nit, vbi pectus, vel dorsum, aut latera deuincire voluerimus) aut suturis, vel sùbulis vniuntur, & sicci-  
ac glutinantibus medicinis regantur.

b Gal. 3. meth.  
cap. 4.  
c Gal. lib. de  
fasciis c. 5. l. 8. s.

## DE SECVNDA INDICATIONE,

*Qua, ne à toto corpore ad sectum locum succi alieni defluant,  
inhibere insinuat.*



N magnis, & profundis vulncribus, licet viscera sana fuerint, medendi ratio est, vt primò san-  
guis cohibeatur, deinde, ne à toto corpore ad ipsum vulnus aliena defluant humiditates, pro-  
hibere, quod multis celebratur ingenijs, nempe afflicta partis subitantiis, & habitudine con-  
seruando, camque à dolore, inflammatione, & ab omni alio symptomate prauo, quod his vulneri-  
bus accidere solet, præcussit, inflando, quippe sic fluxiones prohibentur. Igitur primis diebus admo-  
tis in vulnere linamentis ex oui albumine solo, aut luteo addito, extra verò ex rosacco, vino nigro,  
aut rosacea aqua admixto, frequenter immutando languis comprimitur altera die à sede vulncri oppo-  
sita sanguis mittitur à lecoraria vena, quam nigram, axillarem, & basilicam vocant, quæ bis, terque  
vulnerari solet: porro Chirurpi in recensibus, & nuper acceptis vulncribus sanguinem detrahunt, nec  
solum, ne pars fauciata, aut circumposita loca phlegmone teneantur, sed vt impetus quoque ruentis  
sanguinis cohibeatur; siccirò in secunda visitatione præmissis enemate leniente, ac deiecta aluo, sum-  
mo mane, virtute, ac ætate consentiente, vena aperitur. iuxta eundem etiam quàm citius potest, & sanguinis  
copia pro robore, ætate, consuetudine, ac anni constitutionibus meriti conuenit. per se quidem, aut sal-  
tem bis in die extremitatibus ligaturis, frictionibus, aut cucurbitulari admotione fluxiones reuellantur: at  
si alius astricta fuerit, ea alteris diebus indita glande, aut clystere iniecio, subducenda est: cum his tenue  
regimen, ac probam victus rationem insinuat oportet, atque magis in iuuenibus, aut si vitiosus in toto  
corpore succus (cacochymium vocant) vel succorum æqualiter se habentium exuberantia, quam pletho-  
ram dicunt, apparuerit; quare septem primis diebus, quibus vt plurimum à febre, & inflammatione vulne-  
rati tui esse solent, aer purissimus eligatur, qui confosso thorace, magis, quàm in alijs vulncribus, ob eius  
inspirationem considerandus est. tenuissima seruetur diæta. hoc tamen seruato, quod sciri victus ratio  
in capite vulnerato talis esse debet, vt caput vaporibus, & malis humoribus non repleatur, ita in thorace  
affecto agendum est: quare à principio, si virum imbecillitas non obstiterit, tenui victu semper vtendum  
est. sin autem, virtuti autem omnia consulendum: at tamen in thoracis læsionibus ob nimiam spirituum reso-  
lutionem liberalius est agendum, præsertim in biliosa habitudine, & virtutem concoctricem validam ha-  
bentibus: perpetuò tamen tutius est, vulnere magno existente, patientes sine vino, carnibus, ouis, caseo,  
piscebus, oleis, fructibus, & similibus nutrire. sed sat sit illis panem lotum iure parvæ pulle insutum co-  
cedere, aut hordeaceam pitamam, addito saccharo, parare. cibaria verò salsa, acuta, pinguis, acerbæ, at o-  
marica, aut sanguinem augmentia sunt vitanda. vtendum quippe est amygdalato, hordeato, passulis: & quæ  
thoracis continent: cibi attingentes in initio dimittantur, ne difficilem reddant anhelitum, & sanguinẽ  
si quis in cauitatem delapsus fuerit, astringit aqua hordeacea his potus esto, addito zulepio violato, aut  
saccharo candido, aut decoquatur cum iuibis, & glicirrhiza. & si tulsis patientẽ molestat, addatur syr-  
pus de glycyrrhiza, quæ si augeat, melicratum probatur, vt quiescat, iubendum. optimum quidem me-  
dicamentum, quies esse nec valde anhelet, sed fliceat, ac dormiat super latus diuinum, nisi multus emanare  
rit sanguis in cubiculo iaceat, aeris temperati, malorum vaporum immuni; venerem deuitet, & cum nimium  
colloquium, & pariter iram, clamores, ac omnes vehementes animi motus: ceterum vbi vulneratus à  
phlegmone, febre, tussi, & malis accidentibus fuerit tutus, plenior victu vt poterit, ac ad pristinam con-  
suetudinem paulatim redire: si verò vitiosi succi abundantia in corpore subsistat, vel vulnus prævalidum sit,  
ea quidem lenientibus medicinis tollenda est, sic iubent medici\* (sub his verbis) Purgatio ventris deorsum  
plurimis vlcibus confert, & in vulncribus, quæ in capite, in ventre, & in articulis sunt, & in quibus cor-  
ruptio-

d Gal. 3. meth.  
cap. 6.  
e Gal. lib. de  
cura per sang.  
mitionem, l. 1.  
ad Glisc.

f Gal. lib. 3.  
de cur. ar. lib.  
g Hipp. lib. de  
inter. aff.

h Hipp. lib. de  
vitiis. Cr. lib.  
5. c. 1. s. 6. s.  
le. 4. meth. c. 6.

30

50

60





b Hipp. 1. Aph.  
11. Gal. 4. Kru-  
gmi.  
c Hipp. lib. de  
Veneribus.

lius extrahi possit, & hęc prius in terebinthina calida infundatur, nam dictum est Medicamenta omnia  
qualitercunque applices, calida actus, & qualitatibus alteras nec audiendi sunt, qui rosaceo, aut humido  
alio medicamento vtuntur, nam oleum, & quacunque medicamenta lenia sunt, aut olei vim habent, ab  
his vulneribus sūt aliena: nos verò in similibus, & alijs pforatis vulneribus, tale probamus medicamentum  
sine cannulo, aut turundarum aliqua forma, sed exterius tantum adhiberi: quod (Deum testor) in com-  
parabile est, & ob eius sanctā operationē, sanctum vocatur, angusta & penetrantia vulnera mirabiliter  
digerit, & partes, quæ in consorcio sunt, viriliter corroborat, rurò ab inimicis locis immunditie euacuat,  
& tandem vulnera omnia ab acuto telo impressa, quietē abstergit, exsiccat, & consolidat: hoc erat de se-  
cretis honestissimi Patris nostri, qui in hac Medicinæ parte diu magnus vixit ex perimentorum. Medicamē-  
tum sic paratur. Recip. refinā pini recentis, clarā, & odoratā vnc. xij. olei laurini puri, terebinthinæ opti-  
mæ an. vnc. ij. gummi elemi transparentis, grauis, ac boni odoris vnc. iij. ponatur primò refinā & gumma  
in caciola ænea nictida super ignem debilem, & clarum, perpetuò rodicula arundinea aut spatula ænea  
agitur, donec liquefcat: iude addatur laurinum, & terebinthina, ac iterum parum bulliant, semper mo-  
uendo, cum verò medicamentum crassitatem acquisierit, per stamineam, aut tamisium percoletur, & quod  
stillauerit, ac percolatum est, in terreo vase intus vitreato, ac bene cooperto conseruetur; cumque ipso  
viti volueris, super perneam hēdini corij partem, qua chyroihecā parantur (quia admodum tenax est) ex-  
tendatur, sitque corium ita amplum, vt vulnus non solum, sed vulneris proximās partes trium digitorū  
latitudine conuegat: prius verò ex panno lineo subtili, ac duplicato ovalis formæ figura, medium  
inane sit, ad vulneris latitudinem, quæ in propatulo est, reliquum verò auricularis digiti magnitudinem  
sequatur, vt in hac figura videri potest.



in primis petia applicetur, ac desuper me-  
te bis mutari debet, donec vulnus cicatri-  
quod conglobatus sanguis, aut materia  
angustum callem exire nequeat, quare ex-

e 1. de loc. aff.  
ca. 1. & 1. meth.  
exp. 8.  
f Hipp. lib. 1.  
exp. 3.

dicamentum, quod hyme semel, Aëta-  
cem contraxerit. Porro cucurbita solet,  
diuersa crassa in pectore contenta per  
pedit, vt attenuetur, & præparatur, aliquod iniicendo decoctum, quod nempe dupliciter fit, à natura per  
eliquationem, & à medicamento per attenuationem, quale est illud, quod Græci anomeli, & melicra-  
tion vocant, & à Galeno summopere commendatum, fit ex duabus partibus, aquæ fluuiialis claræ, &  
vna melis, decoquendo, donec tertia pars euanuerit: cum verò nulla, aut exigua aderit fibris, nullum,  
quod Larini vinum mellite dicunt, ex vino non admodum potenti, opportunum est, paratur 4 ex vino ve-  
teri non mulum austero, & optimo melle sine sale, & distillat. Nulla multorum, quæ ex recenti vino, sa-  
le, & melle conficitur: sed quia astrictione opus non est, prima descriptio vsui magis fertur. Nosstræ  
verò Chirurgi, quia in rhodomelle non reperiuntur acrimonia, eo hēbentius vtuntur, & magis, aut cum  
vino, aut aqua consolidā, aut agrimoniz, dimissa fluuiali, aut fiat decoctum tale. Recip. hordii mundi, len-  
tiuman. vnc. ij. equiseti, consolide maioris, glycyrrhizæ, hyssopi an. m. s. aquæ claræ dulcis q. s. pro decocto,  
cui adde mellis rosati, aut violari vnc. iij. iterum parum bulliant, & coletur: verum si viciūda, aut tenax fue-  
rit materia contenta, pulmonesque incolumes, præ dicto decocto oxymentellum, aut syrupum acetosum  
addere expedit, & cum iniectorio \* bis, terque lauamentum tepidum, ac donec clarum exierit, pectus  
per vulnus iniiciatur: si verò tale defuerit iniectorium, vesica cannulo alligata, quæ in sinibus, & cuniculo-  
sis viceribus à medicis probatur, vti deest: vel si hęc non habentur, ore vino prius diluto per fistulam,  
aut cannulum, quod syringam vocant, imponatur: postmodum eger se inclinet super latus vulneratum,  
& tussiat, & pedibus erigatur, ac leuiter cōcutiatur: cum verò decoctum clarum exierit, pectus iam inaniss-  
ime declarat: vulnus exterius abstergentibus, & exsiccantibus modis oportet, & tempestiui medicamen-  
tum isis, epigonos, aut cerascos, aut diuascenū est, neq̃ in fistulā, quam coriadan Græci, & syringam Latini  
appellant, transeat, hoc feruato, ne cōstringatur materia: quia illico febris, inflammatio, creber anhelitus,  
& phthisis subsequi possit: loca verò, quæ vulneri in consorcio habentur, extrinsecus irroretur, arbeat rosa-  
ceo & violaceo oleo, hyme verò nardino, id est, de spica nardi, quod Græci hydreleon vocant, aut mel-  
lino, nam sic iubet Galenus. Recentiores verò, vt pectus molliant, oleo camomellino, violaceo, amygd-  
alarum dulcium, ac pinguedine gallinæ iungunt. Coert etiam summo mane serapium aliquod patienti  
exhibere, quale est violacum, iuebinum, de capillo veneris, de glycyrrhizæ, de buglossa, & huiusmodi,  
additis aquis proportionatis, nempe violarum, farfaræ, capilli veneris, scabiosæ, & simili, aut decocto fe-  
torali, cui, transactis aliquibus diebus, addi potest scrup. j. Mumiz, & eritrodani, vt exsiccentur superflui-  
tates, aut saltem, si aliqua inchoauit corruptio, corrigitur: vulnus hyme semel, & astate bis curetur,  
diligentia adhibita, ne spirituum ingens copia discutiatur, quare studere oportet, vt curatiois tempus  
perbreue sit, ne frigidi aer vulnus subintrat, aut interni spiritus resoluantur, & hæc potissima ratio est,  
qua moti nonnulli futuræ necessitatem approbant, præsertim in amplis sectionibus, inis partibus orifi-  
cium dimittendo, vt perperuò materie extraneæ percolari possint. Accepto vulnere, si nullus effusus  
sit sanguis, sed in pectore, ne conglobetur, timor adit, ac inde laboriosè expurgari valeat, ponatur sub  
lingua patientis granum vnum muschi odorati; nam illic à vulnere sanguis emanare inchoabit, & hoc  
secretum mirabile est. Ab omni immunditie exinanito thorace, ac vulnere bene expurgato, nulloque pra-  
uo apparente symptomate, vulnus carne repleatur, & cicatrice includatur.

e 1. de loc. aff.  
ca. 1. & 1. meth.  
exp. 8.  
f Hipp. lib. 1.  
exp. 3.

*Qua quomodo thoracis vulnera internis medicinis regi debeant,  
apertissime demonstrat.*



**C**ASSALIA vulnera, id est quæ pectus perforant, sæpe numero ante corum conuenientem abster-  
sionem, & optimam exsiccationem exterius vniuntur, intus verò aliqua residente humiditate, aut  
nuper producta, ægri empiri, siue suppurati, fiunt. nam dicebat Hippocrates: *i* Quicunque vulne-  
rati in thorace externa vulnera parte sanati, interna verò non periclitantur, aut verendum est, ne suppu-  
rati fiant, de quibus debilis inducta intus cicatrix est, facillè frangitur. suppuratos præcipuè conficiunt Hip-  
pocrates: nominare, qui pus habent in spatio inter thoracem, & pulmones. Dignoscitur verò hæc pas-  
sio ex tussi continua, quæ eam de necessitate consequitur, febre ardenti, pectoris ac dorsi grauedine, spu-  
tu purulento, & fontenti anhelitu. Qui sic laborant, aut nunquam, aut raro sanitati restituuntur, nisi humor  
ille diuersus, qui in thoracis spatio continetur, absumatur; quod fieri solet aut per internas regiones, velu-  
ti per spatum, & asperam arteriam, aut loci copiam, vel alius multam educationem, aut per loca externa; si  
vulneris orificium in superficiem venerit, hic pyulcis, & collyrijs, suctu, & suppuratione exorberi potest,  
cum alia nulla spes relinquatur, vt aliter expurgari possit. Quod verò e tussiendo ex thoracis spatio alio-  
quid interdum expiatur, facillè intelligit, id quæ eas dispositiones considerauerit, quibus ab exterioribus  
ad intima pectoris vulnus penetraverit, siue id ob vulnus non congruatum eueniat, siue ob aliquem  
magnum abscessum vtrique eruptum, quo pacto autem hoc fieri possit, atque per quos thoracis cana-  
les materia in asperam arteriam ingrediatur, hoc modo ad Erasistrati mentem describitur. Ab ea arteria,  
quæ spinæ adiacet, vasa quædam iuxta latus tam dextrum, quam sinistrum, similiter procedunt, deinde ad  
loca vicina multiplici diuisione dispersa, tandem ad eam exigua euadunt, vt sensum lateant, cum itaque san-  
guis in huiusmodi arterias incidit, nonnunquam per concauam arteriam ad loca, quæ circa pulmones  
sunt, atque ad eos nexu, per quos pulmo apud spinam arteriæ coniungitur, ascendit; quippe ea, quæ hunc  
incident, hæc via ad pulmones ascendere solent; Galenus verò hanc ascendendi, ac penetrandi viam re-  
darguit, asserens sanietem eo modo per ipsas membranas ad pulmonum canales penetrare, sicuti nullam  
in thorace iniectam, quæ illic tussiendo expui solet, atque laborans ipse, aquam nullam esse ex sapore  
deprehendit: vulnerato pulmone, ac eius tunicis incis, per eas sanies ad magnos canales ascendere po-  
test, et cum circa vulnus constitutus thorax humorem, qui in eo spatio, quod inter ipsum & pulmones est,  
continetur, vehementer in alperas cius arterias comprimendo cogit, spongiorum exemplo, quæ mani-  
bus exprimitur, inde postea laborantes naturali eo accidente adiuti, quod tussim vocant, quo robustior  
fieret expressio, materias purulentas per eos expellunt. Pulmonum quoque vulnera, & ac suppuratorum fa-  
nies per locum sæpe mundificari solent, ac interdum per egestionem; nec dubium est pectoris sanietem ad  
renes posse deferri, eo quod furcula de causa vena ad renes descendit, & alia magna arteria ad eos deduci-  
tur, proinde nihil mirum, nec impossibile est, ex partibus septo transuerso superioribus pus in ventrem  
defluere, & ex his, quæ eisdem supponuntur, ipsum per renes in vesicam peruenire, cum vrina gibba  
heparis partes expurgantur, atque omnes, quotquot sunt bis superiores: per alium verò pars iccino-  
ris sima, intestina, ventriculus, lien, præter hæc sunt quoque nonnulla, quæ licet raro, per alium ex-  
purgantur, vt partes thoracis, atque pulmones: Et nos (dicebat Galenus) vomica per vrinam, tho-  
racis autem per intestina, & alium expurgari vidimus. porro hi effectus, & accidentia ex his sunt, quæ  
raro contingunt, at tamen, dum occurrunt, Hippocratis methodus seruanda est, quæ ducere iubet, quod  
maximè natura vergit per loca conferentia. Expedi igitur, dum talis materia per spatum mouetur, pri-  
mo saniei coctionem adiuuare fomentis per spongas ex decocto althææ, violarum, bordei, farfaræ, tene-  
nagræ, & similibus, aut emplastris ex caricis pinguibus, farina hordeacea, conuergenti, seminum lini, bu-  
tyro recenti, & oleo amygdalarum dulcium, si autem ad vrinarios meatus, quos Græci vretetes vocant,  
purulenta profusio dirigitur, diuretica medicamenta, id est quæ vrinam cient, exhibere conuenit, quales  
radix illa est, quam Arabes raucedini, & Græci rhabarbarum dicunt, costus, eriodanum, mumia, centa-  
urea, orilla, iochia, polytricum, radices petrolei, semina carui, dauci, & similia, ex quibus aut decoctum  
vsque ad vnc. iij. addito oximellite, aut in subtilissimum puluerem redactis exhibeat summo mane  
drag. j. cum melle, aut in syrupo bisantino nulla verò apparente febre Recip. cinamomi electi, corticum  
cassie, fauiae, an. drag. j. croci scrup. j. misce & fiat pulvis, sicut alcoholi, cuius dosis fit drag. j. cum iure ci-  
cerum, aut cum decocto capilli Veneris, de fluente verò materia per alium (quod rarissimè aduenit) adhi-  
bitis suppositorijs, aut enematis, educatur: ac si nullibi mouetur, aut quia crassa, aut quia multa, aut  
quia illius sedis potentia imbecilla est, & seua apparent accidentia, & morbus inter extremos enume-  
ratur, pectus ab extra, vbi magis appareat opportunitas, phlebotomo myrrino, aut alio instrumento accom-  
modato, aut ignito, aut frigido secetur, veluti, illud est, quod Cassius manucriolum, & Paulus & Culti-  
lium hydrocebum vocant, aut eo quod Auienna \* bezel gradarum, & Albucasis i spatum latum, &  
spatulum acutum, aut spinosum appellat, cuius effigies inueniri possunt in officina.

*a* Gal. f. de in-  
ven. cap. 1.  
*b* Gal. de Con-  
ac. primo.  
*c* Gal. 6. Aph.  
com. 1. 7. 7. Aph.  
com. 45. Act. lib.  
8. cap. 45.  
*d* Hipp. lib. 1.  
de morbo, via  
de suppuratione, ut  
sit. in principio  
Gal. 7. Aph. 6. 6.  
8. Paul. lib. 1. ca.  
30. Ane. 10. 3.  
tr. 4. cap. 7. & 17.  
*e* Gal. 5. de loc.  
ad. cap. 1.

*f* Gal. 6. de lo-  
at. cap. 4. Ane.  
10. 3. 4. 6. 17.

*g* Lib. de hu-  
moribus in prin-  
cipio. & 1. Aph.  
lib. 1. ca. 11.

*h* Lib. 7. c. 15  
& 16.  
*i* Lib. 6. ca. 45.  
*k* 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.  
cap. 4.  
*l* Lib. 1. ca. 54.  
& 61.

VARIANT hæc instrumenta, siquidem peccoris partes in crassie & tenuitate sunt diuersæ: sic enim 10  
facere soliti erant antiqui. \* locus verò sectioni opportunus sit, inter quartam & quintam, aut quintam  
& sextam costam ascendendo, diligentia adhibita, ne secundo qua venæ, aut arterie magnæ in spatii in-  
tercostalibus per apicem inferiori disseminatæ, diuidantur, nam arterie multæ per ea loca extendun-  
tur. ob id aliqui excellentissimi operatores ex Hippocratis sententia libro de internis affectibus, vbi de  
aqua inter curem, vt costa te ebri perforaret, magis approbant, ad quod opus talia instrumenta oppor-  
tuna sunt, & à multis parata seruantur, vt in officina.

Cumque igitur marcia alibi expurgari nequit, ætate ac virtute consentiente, sic vt rectè sanici lo-  
cus digestus, ibique signum imprimatur, & fiat sectio, ac talis sit, ut cum ea purulenta cogeris egre-  
diatur, de qua quæritur parum educatur absque alia sectione subitò, nam dictum est ab Hippocrate: Si pus  
vnicuius effluerit, omnes moriuntur: verum si parum, siue parum destillauerit, ac album extiterit, 20  
eadem esse possunt: si autem subcreuerint, foeculentum, ac foetidum, peribunt: igitur, postquam materiam  
extraxeris, linamentum crudi lini immittas, & post die rursus exempto, paulatim pus exhaurito, deinde  
rursus linamentum indito, & rursus tertia die, & alijs deinceps pus per diem extrahito, donec reficere-  
tur pus fuerint, cum perforaueris, stude, vt virtutis robur temperatis cibarijs conseruetur: nec confide-  
re febrem, quoniam non eradicabitur, sanie in pectore rebedente, præsertim cum orta non sit ex natura-  
lium membrorum inflammatione, aut ex materia in eis cometa, nec ex obstructiõibus putuerit, sed  
ex suppurato sanguine in loco amplo cum aliqua destillatione admixto. Et si superius diximus inter quin-  
tam & sextam costam sectionem faciendam, id quidem non retinere, si vultus spinam versus vergat: si  
anterior inflicium fuerit, ea nempe faciendi est inter tertiam & quartam, aut quartam & quintam: quod  
nonnulli recentiorum diligentes Chirurgi \* annotant, & ex anatomicæ sensatè dignoscitur. nec obstat, si  
huiusmodi sectiones, aut cauteria interdum in fistulas degenerent, siquidem iuuamentum, nocumenta uē  
excedit. Expurgata materia, si decet, meliierato, aut vino mellis cauias abluatur, & si maiori eget ex-  
siccatione, decoquatur agrimonium, centaureum, equisetum, & betonica in vino nigro, & addito rhodomel-  
li fiat lauacrum. Et quia solent hæc lésiones eacothēs, siue caecothēs, id est difficili consolidari,  
nec fieri, vel quia pulmones laesi sunt, vel materia diuersæ ad pectus perpetuò concurrenti, aut laborum  
ostriacosis iam contracta est, aut costa fracta, vel carie affecta extiterit, ideo cūlibet horum sympto-  
matum propria remedia, vt suo loco dicemus, adhibenda sunt: Sed si fluxionum copia apparuerit, & medi-  
camenta exsiccano imbecilla erint, vel tardè ad ipsius vulnus peruenierint, compelluntur esse, potio-  
nes, & decocta, quæ à recentioribus pigmenta dicuntur, vulnera exhibere, eaque magis in diuturnis,  
sistat, loas, & malè morigeratis audacter vitur: verum si valida apparuerit febris, primis diebus, nec val-  
de cauidu, nec astringenda esse debent, nec ante decimam quartam propinanda: aliter post septimam in-  
terdum ea exhibere non est inconueniens. Porro nulla ad hoc propinque simplicia, aut succida, glus-  
tinandi, & astringendi vim continent, sicuti est Trinitas, Caryophyllata, Stellaria, Piloella, Hypparis siue  
equisetum, caudam equinam multi vocant, eritrodanum seu rubium, quam isti rubeam maiorem, aut tin-  
ctorium vocant, ea geranijs species, quæ vulgo herba Roberti nuncupatur, geranium, quod à nostris herba  
ris pes columbibus vocatur, Symphyton aperta voce Latini consolidam vocant, Canapes renaz, aut  
eorum loco semina, Rhaponticum, si adfir, sin autem centaurijs magni radices, Centaurea minor, Virga  
aurea, Brasica rubra, Tormentilla, Persicifera seu Verbena, Fragaria, Pentaphyllon, Cynoglossa, Extr  
miratè rob, Pimpinella, Mellilolum, Momordica, Agrimonium os mundi species filicis est, Plantago,  
Salsia, Stoeas, has, Ius, Arceutisia, Tanacetum, siue Athanasia, Betonica, Phu seu Valeriana, & similia omnia,  
quæ consolidandi virtute prædita sunt: Hæc diuersimodè parari solent, nec sive medicorum auctoritati  
bus, siquidem Galenus \* tale probat decoctum. Recip. betonica, Agrimonia, Fragifolia, Asfari, Violari,  
Lingue bouis, Ambrosia, Plantaginis minutæ, Pentaphyllon, Hypericon, Phyllis, Pimpinella an-  
drag, j. aque claræ libras iij. mellis libram, bulliant viquequò tertia pars absumatur, & coletur, & ad-  
de de pipenis grana x. ac iterum parum bulliant, & vtere. A Mefus s. pariter ad vulnera sananda mixta  
quædam in hunc modum paratur. Recip. Gariophyllata, radicem Artemisiæ, Pimpinellæ, Pentaphyllonis,  
herbæ Violarum, herbæ vent, Caulium ruborum, canapis renata an. vnc. j. Rubæ tinctorium, quantum  
de omnibus bulliant simul in vino, si sanguis non fuit, vique ad medicatis consumptionem. colo. & vte-  
re: Multa insuper, ac diuersa apud posteriores h vna cum suis orationibus, ac benedictionibus descriptio  
nes leguntur, quæ ab excellentissimis Medicis \* huius ætatis commendantur.

At quia Teutonici quatuor tantum herbas in his operationibus extollunt, quas summopere Theo-  
phrastus commendauit, idè vultus eas teutonicas herbas appellat, nempe Stellariam montanam, quam  
ipsi fanichel, & sinai vocant. Nos verò achmilham, & leonis pedem, aut Teutonica voce corrupta fan-  
cula dicimus: fanicula verè stellariæ species est: Gariophyllatè benedictum vult, & sculem nuncupat, nos  
verò samandudè & diapseniam vocamus. Clematidè, quæ ipsi fingier, vinegerun & vngun dicunt, nos  
hloemal, Vincam, & proiniam denominamus, quartam, species Trifolij est, Trinitas vocatur. Hije  
Galli addunt Eritrodanum, & nos terrestrem hedera, ac perariam: quam illi pirolam vocant: huius-  
modi simplicia semper parata veniunt habentur à diligentissimo Aromatario ab Angelo Calchio Mar-  
tincello, qui hæc temperatè, inter simplicissima excellentissimè iudicatur: decoctum in vino albio montano  
paratur

d Hipp. 4. Epid.  
in Asclepiade  
Philidus filio-  
de suppuratis  
d. 4. Epid. 4.  
Leonides.  
Antul.  
C. 1. h. j. c. 2. 10.  
d. 4. Epid. 4. c. 2.  
d. 4. Epid. 4. c. 2.  
d. 4. Epid. 4. c. 2.  
d. 4. Epid. 4. c. 2.  
d. 4. Epid. 4. c. 2.  
d. 4. Epid. 4. c. 2.  
d. 4. Epid. 4. c. 2.  
d. 4. Epid. 4. c. 2.

e G. 1. d. de Ca-  
lucio. & Geli-  
cio. de Salu-  
ceno.

f Lib. maiori  
de diuin. lib.  
de plagis.  
d. 1. Lib. 1. 1. 1. 1.  
e. vltimum de  
no. libro.  
h. Guido in sua  
parata thuris.  
per a. c. 9. & ca.  
de vultu. theos.  
Theod. 1. i. 1. 1.  
pred. c. 1. 1. 1. 1.  
v. de Argelata  
lib. 1. 1. 1. 1. 1. 1.  
de modo opet  
di in fractura  
crani. Geli-  
cio. de Salu-  
ceno.

i I. I. I. I. I. I. I. I.  
n. I. I. I. I. I. I. I. I.  
m. I. I. I. I. I. I. I. I.  
o. I. I. I. I. I. I. I. I.  
p. I. I. I. I. I. I. I. I.  
q. I. I. I. I. I. I. I. I.  
r. I. I. I. I. I. I. I. I.  
s. I. I. I. I. I. I. I. I.  
t. I. I. I. I. I. I. I. I.  
u. I. I. I. I. I. I. I. I.  
v. I. I. I. I. I. I. I. I.  
w. I. I. I. I. I. I. I. I.  
x. I. I. I. I. I. I. I. I.  
y. I. I. I. I. I. I. I. I.  
z. I. I. I. I. I. I. I. I.

- 10 paratur aut aqua, aut vino, indicatione sumpta à patientis habitudine, & symptomatum natura, & addito melle claro sub aurora tepidum per horas quatuor ante cibum, patienti scilicet, aut vnc. iij. exhibere soliti sunt. Herbar in montanis locis colliguntur sub Cane, & sub vmbra exsiccantur. Rurarij quendam Chirurgetum Feltrie nouimus anno Domini 1545. in quo tempore has institutiones Chirurgicales in vnum redigimus, qui mane, ac vespere cyathum vini albi optimi cum drag. iij. pulueris caulium rubeorum in vmbra exsiccatorem patientibus propinabat, erat quidem iste in his vulneribus admodum fortis natus. Alium adhuc cognouimus senem empiricum, qui in chronicis & antiquis vulneribus fistulosis, & cacothicis omnium locorum, præterquã sub magnis æstibus, aut dum ardens apparuisset febris, hæc potionem exhibere solitus erat. Recip. cinnamomi, Gingiberis, Caryophyllorum, Piperis an. vnc. iij. quantisper frangantur, inde in sex mensuris optimi vini albi vique ad terræ partis defectum bulliant, colectur, & quod colatũ est, seruetur, & Recip. Caryophyllarũ, Valerianæ, Pilosellæ, Centauræ maioris, Rubæ tinctorum, Artemisæ, Pimpinellæ an. m. s. exsiccantur, & fiat pulvis subtilissimus. & Recip. pulueris huius drag. ij. decocti prædicti cyathum vnum, aut vnc. vj. & summo mane tepidum quotidie, aut alternis diebus dabit, & multi absque Medicorum opinione sanabantur. Nos verò hoc puluere sæpe vsi sumus, qui profecto mirabilissimè est operatus. Recip. Caulium rubeorum, seminum Canaphi, Consolidæ minoris, Caryophyllarũ, Pilosellæ an. m. j. Rubæ tinctorũ m. ij. misce, & fiat pulvis subtilissimus. dosis est drag. j. cum vino albo. Dum hæc sunt, vulnus, prout eius requirit natura, regatur, siquidem præparationem, vt dicitur, digestionem, medicamentum ex Terebinthina, qui luteo, manna thuris, & croco præparetur. si ab strictione, eam adimplebit mundificatium de melle, aut de succo apij, aut vnguentum Damascentum, aut isis epigonos. siqua verò substantia deperdita fuerit, refarciatur vnguento Barbaro, aut Aureo, aut Citrino, aut Regali, vel Basilicone, aut altero eiusdem generis: postmodum cicatricem inducit emplastrũ Palmulatum, aut Græcum, aut alterum eiusdem virtutis.

DE QVINTA INDICATIONE.

*Quæ viscerum, siue internorum membrorum affectus, sanandi modos declarat.*

- 40 **N**ON omnes, qui locis extrinsecis occurrunt, ac sensibus subiiciuntur, ex eorum, quæ ipsis insunt secundum naturam, permutatione, nempe magnitudine, figura, numero, situ, colore, leuitate, duritie, calore, & frigiditate dignoscuntur: qui verò visum effugiunt: præcipue in soluta continentia, ex operationum lesionibus, aut his, quæ excrementa, aut doloribus, aut tumoribus, aut situ, aut horum quibusdam, aut omnibus comprehenduntur. itcirco cum de intertribus vulneribus, quæ sub thorace cõseruatur, nonnulla dicere decreuerimus, prius de pulmonibus scõsis sermo habendus est, quibus accidit, vt tantum eorum lobes, siue fibræ, aut pennæ, vel pinguale ledantur: nec ob id eorũ canales vulnus patiuntur, & tunc non multa sanguinis expulsiõ, sed solũ spaciũ tinctũ sine plura tussis apparer. Si verò sectio ad amplas peruenierit vias, tunc & per vulnus, & per os sanguis multus fertur, clarus, spumofus, & sine dolore: quippe consentaneũ est sanguinem substantiæ illius membri, à quo educitur, figuram, & colorem præferre, idcõ conueniens est, sanguinem, qui in pulmone est, pulmonis naturam aliquo modo sapere: est autem eius natura, & substantia spumofa, leuis, rara, mollis, aerea, foraminosa, valisq; quàm plurimis veluti contexta, alimentum & purum, vaporosum, ac tenue, à corde præparatum, recipiens, ærem, seu spiritum ab alpera arteria extrinsecus attractum. Cordi immutans: quare necesse est sanguinem à Pulmone venientem, clarum, & spumofum esse: cum sanè talis aliunde prouenire non possit: nam ipsa ex spiritus miscella cum re humida, aut glutinosa gignitur, aut ex magno & assiduo motu, vt in lebetè bulliente, aut maritimis vndis inspicitur: porro cum Pulmo non ex se, sed à thorace moueatur, nec graue, nec densum esse oportuit: & quia tenuem, æreum, & purum sanguinem suscipit, idcõ sanguis ab eo effluens leuis, spumofus, & clarus esse debet: at cum nihil in Pulmone, aut thoracis cauitate contentum, expui possit, nisi per Pulmonis substantiam transierit, igitur tussis has sanguineas expuitiones associat, quæ à Pulmone educuntur: qui busuè circa dolorem sanguis est reiectus, eius proculdubio exitus à Pulmone fit, qui cum vulneratur, Medico quidem negotium, ægrotò verò periculum non minimum affert: nam si eius tardatur consolidatio, raro, aut nunquàm sanitati postea restituetur: quod & experimento, & ratione confirmatur. experimento, quia nemo expertum quemquam vnquam eorum, qui ita sunt affecti, si natura vidit: ratione, quia inter viscera Pulmo propter anhelitum perpetuò mouetur, cum h vtiq; membra quietem requirant, quæ sanitati idonea sunt, ac eam possant: præterea Pulmonis vulnera mundari, nisi excreta bis per tussim mittendis, minime possunt: sed filere, quiescere, quàm minime anhelare, & non loqui, in consolidandis his vulneribus vile est: ergo huiusmodi vulnera ægris tussientibus vniui nequeunt: quo-circa anhelitus, ac eius continua motio non erit tantum causa vulnerati Pulmonis curationem impediens, sed & hoc quoque: quoniam putredo, & sanies, quæ in eo generatur,

Tract. 2. de vuln.

L

tur,

a Lib. ar. par. med. cap. 77. & 80. & 1. de loc. aff. cap. 1.

b Hipp. lib. de Coac. p. 100. & 7. Aph. 13. Cel. 1. 2. 3. Gal. de v. loc. aff. 9. Acul. 1. 2. cap. 1. 3. Gal. 4. de v. loc. aff. 1. 2. Gal. 4. de v. loc. aff. 1. 2.

c Gal. 3. reg. acut. com. 1. 1. 2. par. aph. com. 4. 5.

d Gal. 4. de loc. aff. cap. 9. & 1. meth. ca. 8. & 1. meth. ca. 8. & 1. meth. ca. 8. & 1. meth. ca. 8.

e Hipp. lib. de v. loc. aff. 1. 2. Gal. 4. de v. loc. aff. 1. 2. Gal. 4. de v. loc. aff. 1. 2.

f Hipp. lib. de v. loc. aff. 1. 2. Gal. 4. de v. loc. aff. 1. 2. Gal. 4. de v. loc. aff. 1. 2.

g Hipp. lib. de v. loc. aff. 1. 2. Gal. 4. de v. loc. aff. 1. 2. Gal. 4. de v. loc. aff. 1. 2.

q Gale. lib. de  
oc. aff. cap. 1.  
h Hipp. l. de  
h morib. & pri.  
Acho. 1.1.  
e Gale. de usu  
p. res. 2.2. cap. 1.  
f. morib. & pri.  
1.1. cap. 1.  
e Gale. 1. de  
loc. aff. cap. 1.  
e Gale. 1. morib.  
cap. 1.  
f Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
1.1. 3. 4. ch. 11

tur, potioribus, ac alijs ingenijs mundari non potest. & si interdum aduenit \* (quod raro contingit) ut  
per totij copiam expurgeur, hæc regio nõ est ei concedenda, qui quidẽ b quæ ducere oportet, per loca conue-  
nientia ducere expedit: insuper epora medicamẽta sero ad affectum sedem perueniunt, ob id eorum vires  
minuuntur: præterea c nutritur Pulmo sanguine acuto, & subtili: ficcus est, vias amplas, ac venas,  
& arterias multas habet, citoque d ob aduersionis humiditatis corruptioni, & ab acutis ladicur, unde e fa-  
cillimè phlegmone occupatur. His igitur de causis Pulmonum vulnera, si cito solidantur, & cicatricem  
inter inducunt, sana euadunt, vti ùm negligencia adhibita, tumescant, aut dura fiunt, nec vnquam sanan-  
tur. Quæ verò f vulnera rariùm pectus offendent, his, quæ Pulmonibus occurrunt, salubriora exitiũ,  
quamuis assidue moueatur, nam pectoris venæ angustiores sunt eis, quæ in Pulmone, & pectus carno-  
sus eo est, ac fanicus, quæ in pectore creatur, ad immum eius descendit, & hinc est, quod accidentia mirio-  
ra fiunt, & eius sanatio securior.

20

## De Pulmonum vulneratorum curatione. Cap. V.



VAMPRIUM ex symptomatibus proprijs Pulmonũ vulnera dignoscuntur, præ-  
missis euacuationibus, vt ẽ est venæ interit, quæ iuxta cubitum est, facta proxi-  
ma sectione, à qua bis, ter quæ diuertit occasione, paulatim sanguis est detrahẽ-  
dus, humorum retractiones cum artuum frictionibus, ac deligationibus fiant, sed  
his partibus, quæ longius absunt à vulnere, & quæ in vijs communibus iam con-  
gelata materia est, acri chyliere euacuatur: crura, manusque calefacienti pharmaco  
plurimum fricentur insuper infirmo iubere licet, vt cauet ab omni causa, quæ flu-  
xiones commouere possit. nam dictum est, Quæ ad Pulmones currunt superfluitares, non nisi rursus deo,  
expurgari, quas b triplici præsidio cauere decet, purgatione, victus regimine, & medicamentorum

30

q Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.4.

i Hipp. lib. de  
morib. aff.

h Gale. de loc.  
aff. cap. 9. 1.1.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

h Gale. 1. morib.  
cap. 1.1. Auct.  
lib. 3. cap. 1.6.

via, illius præsertim, quod Diapheraton dicitur, aut eius loco Diacodon, & ipsi capiti prouidendo: ic-  
circo stare oportet in tenuissimo victus regimine. nam si pulmo ex mala nutritione, inflammatione  
affligatur, nulla b inde curationis spes relinquitur: porro in curationis initio de nulla re aqũẽ esse solici-  
tatum, opus est, quàm q neque patiens tussiat, & nequid ex capite in Pulmones defluat, neque magna  
beatat respiratio, sed semper silentium agat; nam huic conducit, vt quàm maximè quietem intus ha-  
beat: parçẽ i nutritur, abstinendo ab acidis, acris, salis, aromaticis, & pinguib: vulnere iam inue-  
terato, montant Lepores (veluti perdicæ, turturæ, palumbæ, & parue auiculæ) concedantur. ex terre-  
stribus, Capreoli, ac Vulpes affati, aut sine sale elixati, præsertim in aqua chalybeara, aut in qua bullie  
rint mala cotonea, aut pyra, aut iolia palmarum, vel symphyti, aut minoris plantaginis: ex piscibus da-  
bat Hippocrates m squarinas, pagrum, & galeum magnum album, rhoe, aut origano conditum: ex fer-  
culis o, oriã, alica, & chondrum probatur: panis sit opus, paucio sale admixtus, & bene coctus: potus,  
estio fluminalis aqua, in qua chalybs igneus extinguitur, addito sirupo rosato, aut myrrino: verum im-  
becilla apparente virtute, vinum exhibetur nigrum, clarum, & pauciferm: nec dubium est de vini vĩa,  
quod cauendum lit, pariter & carnes, oua, & similia, vbi aliqua phlegmonis suspicio adest, aliis vĩa  
dari nihil vterar, nam illud concedit Hippocrates, nigrum nimium, vetus, clarum, sed iucundissimum, id  
quæ magis aliqua apparente indigentia; multi o enim ex profusio sanguinis intermorientes ante vilana  
curationem vino recendiunt sunt, quod alioquin inimicissimum vulnere est. Topica verò, siue localia  
medicamẽta, tũ per ea, quæ interiorius assumuntur, tũ per ea, quæ exteriori applicantur, fortis exsiccatio  
nis esse debent: degluenda p eligantur, veluti alimenta, siquidem ad cicatricem perducere, aut gluti-  
nare vulnus studeamus, tum aulera, tum glutinosa, sed quæ minimè mordeant; ob id metallica omnia,  
aut sal habentia, & si extrinsecus vulneribus opitulatur, internis oportuna non sunt, cum difficillimè  
ab innato regantur calore, atque minus, si aliquo fuerint veneno pedita, sicut ergo, & vĩa, plumbi  
cremarum, cadmia, cerussa, lithargyrum, chalcitis, pompholix, & alia eiusdem naturæ: si autẽ emun-  
dare volueris, quæ modicè abstergant, vitæ, quod manus mel non coctum præter cetera præstat:  
quæ verò medicamenta ruo interiorius sumuntur, ac vulneribus opitulantur, sunt, veluti hipocitis, ba-  
laustium, malicorium, gallæ, citrini punctorum, rhois, acacia, figulum lenium, bolus armenus, mas-  
tix, dragagranum, gummi arabicum, rububarum, maius centauium, & alia id genus, quæ nullam  
visceribus noxam inferunt: danda verò hæc sunt ex aliquo astringentium decocto, vel mali cidonei,  
vel lentis, vel summarum rubi, vel miri virenum ramorum, vel idemque ex vino aliquo austero. In-  
firmus supinus iacet, & medicamentum in ore teneat, ac gule lacertos lætos dimittat; nã aliqua pars  
ipius medicinæ ad canales Pulmonum defluit. Nec o obliuiscaris in omnibus pectoris, & Pulmonis  
medicamentis mel admiscere. nam si hæc iolia stipicia dabis, moram in via facies, nec penetrare pote-  
rum, prodestque mel, eo quod est dilectus naturæ cibis pectus mundificat, spumam faciat, & nullo  
modo visceribus noxam præbet: guttatim, ac lambendo talia assumuntur medicamenta, ne nodi, aut  
rustum procreent. Verum quia huiusmodi medicamenta per os sumpta patientibus iniucunda, & odio-  
sa esse solent, non ab re qui huius vitæ has aggrediuntur curationes, eorum loco diadragano albo,  
aut rubeo, addito bolo armeno, aut trochiscis de terra sigillata, vti soliti sunt, vel per se, vel cum deco-

40

- 10 *ito equifeci, tormenilla, pilosella, consolida variisque, Cariophyllata, fanicula, extremarum rubi, pimpinella, & litulium plantarum, aut omnium, aut aliquarum, aut saltem cum sirupo myrrino, aut rosato de rosis siccis: vel trochiscis ipse frequenter in ore seruetur. nam emplatrica, & que vi astringendi prædita sunt, semper in his atque celebrantur, inter que apprime opportuna ac idonea esse creduntur, quæ propterea, quod ex feminibus fiunt, Diaspermaton Græci dicuntur. Hoc medicamentum apud Galenum celebre semper fuit, ac in pectore vulnerato perpetuo vñs est; sed quale id esset medicamentum, aut ubi eius reperitur descriptio, faciemur, nos nunquam habemus nouisse, præsertim quod illius exsiccatur virtutis, ac potencie existeret: quamplurimum tamen apud antiquos medicamentis ex feminibus descriptioes adfuit, quæ pulmonibus scdis nullius valoris esse iudicantur; vñam tamen in quodam antiquissimo Nicolai manuscripto codice reperimus, quæ fortassis his vulgaribus præsidium opportunum esse posset, & tale sic formatum medicamentum. Recip. ameos, hyoscyani, seminum anisi, fœniculi, apij an. drag. vij. opij drag. ij. radicem consolida maioris, malcorij, balautiorum an. drag. iij. s. maceris, ligni aloes an. drag. iij. boli orientalis, boli armeni an. drag. ij. mirrillorum drag. viij. mellis quantum sufficit pro electuario; datur ad pondus drag. iij. mane, seroque tribus horis ante cibi assumptionem, vt Galeni ac Pauli medicamentum diaspermaton pernoscat, sic reperitur rescriptum. Recip. seminum apij, ameos an. drag. viij. anisi, maracri an. drag. iij. calisig nigre, opij an. drag. ij. fiat mixtura cum aqua ad pondus drag. j. sub trochiscorum, sive pastillorum forma; formatur hoc medicamentum, quemadmodum quamplurima alia, quæ ab antiquis parari solita erant, veluti trochisci di corallii, apiriodisali triphercici, & similes, qui eo quia gustui satis ingrati sunt, nulli sunt in vñs, sed illi frequentius, qui ex terra sigillaria, ex diadraganto, aut ex duplici papauere conduntur, quippe à diacodione non multum variant, nec sine ratione probantur. nam dabit Galenus in pulmone affecto medicamentum ex feminibus, quod diaspermaton dicitur, & secunda, & tertia die, vt somnum conciliaret, & sensum doloris leuaret, ac siccatum potestate polletet. quæ actiones, ac potencie non immerito in diacodione reperuntur. nõ ab re igitur loco electuarij de feminibus diacodione utebatur magnus Guido de Cauliac, Iamernis, & alij, qui hac tempestate Chirurgiam exerceant: nam dicebat Galenus à vius medicamenti diacodion est in his, qui somno indigent, & possimum his, quibus à capite in asperam arteriam facilis est defluxus, non permittens dormire: quare non minoris vtilitatis assuntur aliqui diacodion fore in hoc affectu, quam diaspermaton, præsertim cum papauer tenues destillationes à capite insipiet, mel autem humores ad pectus iam delapsos, reiectu faciles facit. Sed quia diacodiones ex veterum sententijs diuersimodè parantur, & varij à Galeno describuntur, quorum aliqui simpliciores, aliqui vero copiosiores componuntur, & horum omnium quam plurimi nullibi parantur, hæc de re experimento ducti, hunc magis probamus. Recip. papaueris albi capita num. 20. nigri num. 10. iungularum, scabestæ an. num. 6. seminum lactuce, maluz an. drag. ij. scariolæ drag. iij. cyoniorij drag. iij. contendantur omnia, & inundantur in sextarijs quinque, videlicet in lib. xij. s. aquæ pluuialis per diem naturalem, deinde bulliant, donec tertia pars consumpta fuerit, & addæ myrrhæ, croci, hyopocitis, succi acaciæ an. drag. i. omnia hæc in petia claudantur, ac in lebeate suspendantur, & iterum bulliant, donec tertia pars absumatur, & addæ diadraganti albi vnc. 6. glycirrhizæ razæ drag. ij. mellis lib. j. iterumq; bulliant usque ad mellis consistenciam, & coletur; cui addæ sacchari albi quantum sufficit, & fiat confectio in rotulis, quarum una aut in forma sigillata, aut ex posca diluta patienti mane, seroq; exhibeat: cum uero tale decet medicamentum, eius loco diadragmum album, aut rubrum, uel trochiscos de terra samia, aut diarrhodion, aut diacorallii, aut ex cornu ceruino, aut aliquos ex his, qui à Pauli celebrantur, patientibus dare conuenit: citra mordicationem etiam præclarè omnino delicatè bolus armenus, ut nihil eo magis hac parte præstet. datur ex eo dragg. cõsidentem cum aqua hypypuris aut symphyti. Diuersi etiam alijs præsidijs recentiores utuntur, inter quæ rhabarbarum celebratur, varijs modis præparatũ, veluti Recip. Recubari electi, erytrodani, mumiz an. drag. j. terre sigillatæ drag. s. fiat pulvis subtilissimus, de quo datur vulneratis quotidie summo mane, cum decocto radice ponticæ, aut maioris consolida drag. j. si autem oportuerit exterius lociones in uulnere inijcere, hæc præstantissima iudicatur. Recip. radicum tormenilla, symphyti, Cariophyllata, Centauræ maioris, rase an. m. s. myrrillidum, foliorum oliuæ an. drag. ij. Myrrhæ, aloes, sac cocollæ an. drag. j. aquæ hordeaceæ quantum sufficit pro decocto, & Recip. prædicti decocti lib. j. syrapi myrtini, rosati de rosis siccis an. vnc. j. mellis rosati vnc. ij. misce, & semel tepidum cum iniectione imponatur, ac sæpe inuerso giro educatur. deniq; inijciatur, ac pariter euacuetur, sed ex ipso aliquid intus relinquatur, & vñus claudatur sinamite imbuto aliquo medicamento abstergeretur, & filo sic deligato, ne introcedat. de super uero petia satis lata medicamento barbaro cooperta, aut argideæ, aut de gummæ ellami, aut palmulato, aut nostro sancto incomparabili applicetur. Hic curationis modus seruetur, donec à prauis symptomatibus tui euaseris, ac viscera cicatricem contraxerint, & thorax penitus mundificatus. Hic à ubi sanus fueris, neque celeriter ad ventum currat, neque equum, aut currum confcendat, neque etiam vociferationes, iacundias, coitum, ac victus prauum regimen fugiat; periculũ enim est ex praua diæta, ne reuertatur morbus: abstinere à similibus per annum ab ebrietate, & ne nimium impleatur, neque manibus laboriose labo-*



a Hipp. de sup.  
puris.  
b Galen. r. de  
loc. ad cap. 8.  
c Libr. 1. cap.  
quomodo vul-  
nus ligare con-  
ueniat.  
d 6 Aph. com.  
18.  
e 1 Libr. 3. sup.  
præd. cap. 8.  
f 1 Libr. 2. c. 17.  
g 1 Hipp. lib. 1.  
de morbo. & 6.  
Aph. com. 18.  
Aph. com. 18.  
Aph. com. 18.  
cap. 1. Auer. 7.  
eoll. cap. 31.  
h Hipp. lib. de  
Coar. p. 10. Cel.  
lib. p. 2. de vul-  
n. v. 10.  
i 1 7. Aph. 15.  
16.

ret hic enim morbus, qui curatione multa eget, difficilis admodum est; & si quis curatus, ac sanus factus, se ipsum non custodierit, plerumque illi reuertitur morbus, causa fit interitus: porro si occurrerit, ut pulmonem aliqua penula è vulnere exierit, & ab extrinseco aere alterationem acquireret, illico pars male affecta leui sectione tollatur, statimque quod de seculo remanserit, bis, terq; igitur catenatio aduratur, ac quamprimum intronitur, quippe Celsus dicebat: In visceribus nihil mouendum est, nisi aut si quid ex iecinore, aut liene, aut pulmone duxat ex extremo pendat, præcidatur: seruari enim non potest (ait ipse) leui pulmo medius percussus est. De iecinore dicebat Galenus, non solum profundum vulnus in eius fibris factum, sed etiam fibræ abscissam, aiunt, fuisse sanatam, & verum dicere videntur Rolandus Paræmentis, & Theodorius, qui affirmant, Vgonem Bononiæ Pulmonis fibræ vulneratam sanitati restituisse, postquam exierit, & eam resecasset. Hoc etiam fecisse consuevit egregius nostræ ætatis, ac huius in clare ciuitatis Venetiarum chirurgus Franciscus Strata de Burano, Aloysius de Burano, eius Socerum, nec mirum est, nam præclaris medicis antiquis, dum affecta membra, quæ mortis magnum afferunt periculum, enumerassent, nullum quidem verbum de Pulmone secernunt, aliter tamen, quod si Pulmo medius fuerit sectus, aut vulnus amplum, aut inflammatione affectum, qui sic afflicti sunt, de necessitate moriuntur. Decet igitur ut leui vulnere Pulmonis, cum præsertim rationabilis adhibita fuerit curatio, salubriter interdum promittere, verum cum intus fuerit vulneratus, maximam sanguinis copiam effundit, & inde vulnus lethale iudicatur: dictum est enim, post sanguinis sputum, puris sputum, post puris sputum, phlegma: verumtamen quia multi sine vlla spe ab his, & similibus vulneribus superstites permansere, igitur, & qui Pulmonis vulnere cruciantur, a curatione deservendi non sunt, nam interdum magis Dei auxilio sanati restituntur.

### Detrachæ incisæ cura. Cap. VI.

h Aristot. 3. de  
part. anim. c. 34.  
Galen. 7. de v. 10.  
p. 10. sine.



**Q**uia Trachæ, siue aspera arteria pars est ipsorum Pulmonum ad respirationem, & inspirationem necessaria, iccirco de sectionibus huic parti occurrentibus hic sermo fit. vulnera huiusmodi periculo non vacant, & quia diu quæta permanere non possunt, curatio difficillima sunt; & si inflammatione molescant, patiens nec commodè deglutire, nec opportunè respirare potest, ob id sæpe suffocatur: Tunica eius interior acutissimi sensus est, & eius substantia, dura, ac chartilaginea existit. Earum curationis modus sic habet, vniuersalibus indicationibus (ut de secis pulmonibus dictum est) præmissis, infirmo iubendum est, ut vitam silentio agat, nec tussiat, nec moveatur, diuq; cum in hac quæta consensu oportet, supinum tamen reclinatum, sed quæ eius capiti subiiciuntur, febribus sine infirmitate: Medicus omnibus modis operam det, ut quam citissime vulnus ad cicatricem perueniat, foris loco affecto agglutinantia medicamenta imponendo, arteriæ Græci vocant, quale est illud celebre barbarum, aut illud ex falicibus, siue lolijs appellatum, vel ex altero ei simili: vulnerato cubanti supino, aut reclinato, humidum aliquod ex his medicamentis idoneum, quæ ad huiusmodi vulnera faciunt, exhibito, iubendo id in ore aliquantulum conservare, paulatimq; permittere, ut in asperam arteriam deuant, nonnunquam etiam illud sub lingua conservare, quod hypoglossi Græci vocant, ut paulatim liquefactum in trachæ ipsam delabatur, ac sensum, & sensum destillet, diu detinetur in faucibus: cauendo, ne largius infundatur in aqua chalybeata, nempe equiseti, consolidate maioris, vel centaurij, aut centinodij, vel morsus gallinæ in quod colloquatur, aut diadragantum, aut diarsimphyton, aut diacodon, aut quid simile ex iam dictis, aut si opus fuerit, tenuiori ac liquidiori præsidio. Eclegma aliquod, idest lambitrium, sub hac forma præparare oportet, radicum consolidæ maioris, sub prunis coctarum vnc. iij. pulueris tragacanthæ, gummi arabici an. drag. ij. boliameni Orientalis drag. j. specierum dragantæ frigidi drag. j. s. syrapi rosati de rosis secis, murtani an. quantum sat est, misce, & decoquantur ad consumptionem tertie partis deinde consentur, & ex hoc lambitrio crebro abluat eger sibi fauces: siquidem ex his, quæ bibuntur, aut in ore deridentur, semper aliquid in asperam arteriam labitur. porro si sectio ampla fuerit, sutura angusta, & profunda variatur, & ut partes coeant, vna conservetur, adhibito barbaro simplicioris temperaturæ. verum si opus fuerit, præparentur medicamenta ex therebinthina clara, aqua consolidate lora, vitello oui, mastice, thuris cortice, & croco, & optimo pure iam confecto, vulnere imposito sarcocoto puluere, idest carnem productivum, vulnus carne repleatur. & sciendum, quod inter ea, quæ intus affluntur, maioris cautæ, & terre sigillatæ inest curatio magna: vltimo cerato diachalceos, aut miniatum ad sigillationem perducatur. Si autem tota trachæ secta fuerit, cum sit membrum ad hominis vitam valde commodum, unde spiritus aëreus ad pulmones, & cor deducitur, ex quo vitales refocillatur, aut diffunditur, aut tardè, aut ut plurimum nunquam ad sanitatem peruenire potest, sed qui sic affecti sunt, moriuntur, præsertim ubi circa fauces venæ, vel arteriæ magnæ præfixæ fuerint.

16 Gal. 4. meth.  
cap. 7. Auer. 8.  
cap. 6. Auer.  
10. 11. 5. cap. 6.

m Galen. 9. de  
com. med. c. 10.  
dum loc. circa  
præd.

n Hipp. lib. de  
vuln. ad Auer.  
4. 6. 10. 7.

De meri secto, & eius curatione. Cap. VII.



**V**ulneratur interdum Meri, siue Aesophagus, aut gula, & est passio lethalis, coque magis, si aut transuersale, aut alius magnitudinis fuerit vulnus, tum quod cibis, ac potus per eum transit, qui sane agglutinationem prohibet, tum quod eiusmodi vulnera tantum contactu medicamentorum in transitu trahunt, sicut & quae in ore, & in ventriculi orificio consistunt: siccirco iubent Medici, vt medicamentum nec semel, nec totum simul assumatur, sed paulatim, & assidue, quando ex transitu, ac contactu vulneribus, quae in meri sunt, vitilias accedit, non ex continendo, & diutius adhaerendo, sicut ijs, quae in ventriculo sunt: hac igitur de causa, quia gula transitur quidam comestorum, bibitorumque est, remedium qualitate eget, quae adhaerere, & vndique quasi con crescere, ac agglutinari possint, non autem quae elui, ac desuere sint prompta: at circa partes eius con crescent quae crassa sunt, agglutinantur quae lenta exsunt. Quare, vt patiens supinus iaceat, & quam diuissimè medicamentum in ore teneat, ac lacertos, qui illic sunt, omnes relaxet, remittatque, summè còuenit, insitui enim paulatim de medicamento aliquid in ipsa gula, & residet. Verumtamen si per initia sanguinem sistere opus fuerit, trochisci de spodio, aut de sigillo Dianae, aqua portulacae, aut centinodiae attenuati, interius paulatim exhibeantur; & si non adfuerint, aqua chalybeata, aut decocto radicis consolidae, aut equiseti cum diadraganto rubeo vtendum est: si verò absterisione aliqua opus fuerit, hydromelitem, aut zuluspium rosatum, aut vinum de granatis, aut de cydonijs, aut lac acetosum butyro extracto, ad ministrabimus, aut pariter decoctum tale, Recip. hordei mundi m. ij. pasallurum, iuiubarum, glicirhizae an. drag. vi. centaureae minoris, equiseti an. dra. ij. bulliat omnia in aqua chalybeata, & vino, donec conspersa fuerit tercia pars, & adde syrupi rosati drag. iij. mellis rosati vnc. ij. iterum parti bulliant, & coletur, & scias (ait Auicenna) quod si sordes rota non mundificatur, non succedit iuuamentum alterius curae, neque ad ministratioris consolidatio, ac si vis tota curae in optima mundificatione consistat, quod munus (ait Galenus) meliù estum præter cetera praestat, & quia raro tracheae arteria, aut aesophagus vulneratur, quin prius vulnus collum ostendat, vbi lacerti quamplurimi notabiles, interni & externi situantur, ac meri multi à scato pari orti, & arteriae magnae, carotides & saporariae dicuntur, in quibus magna pars vitae consistere videtur, hac ratione sedes haec facillimè inflammatione vexatur; siquidem laxa ac mollis est, & fluxiones recipit. ob id exterius ea auxilia adhibeantur, quae repellant, & corroborent, prout splicina sunt, vino nigro austro, & rosaceo, aut mirrhino oleo imbuta & madescentia, saltem vsque ad quartam, aut septimam diem, aut quousque ab inflammatione tueri fuerimus. Cum verò in partibus meri, aut oris stomachi medicamenta carnem facientia administrare voluerimus, tunc in eis glutinantia imponemus, sicut gummi, dragagantum, & mastice, extra verò eadem adhibebimus medicamenta, quae tracheae dissecatae opitulantur, quorum omnium Virtutes, Deum testamur, in medicamento nostro sancto reperiri, praesertim dum vulnus angustum fuerit, aut Recip. Terebinthinae clarae, aqua ardenti, aut consolidae lotae vnc. iij. pulueris subtilissimi, mirrhae, thuris, aloes, boli armeni an. drag. s. misce & fiat vnguentum, aut Recip. thuris optimi, myrrhae, mastice galbani an. drag. ij. chalcitidis, aluminis rostrati, spumae argenti an. drag. ij. resinae terebinthinae drag. x. olei myrrini vnc. ij. cereae q. s. & fiat vnguentum secundum artem: enim in his turundae, siue lychnia non imponuntur, sanatio magis tuta, aut saltem breuior fuerit, quae summo opere quaerenda est, & ab omnibus probatur. igitur multi emplastro tantum barbaro minori, aut palmulato, vti aui sunt exterius.

Gal. 5. de mor. loc. al. cap. 4. in fine. Auz. 13. 3. 4. ca. 13.  
b. 9. Gal. 4. me. cho. cap. 7. metho. cap. 4. Auz. 13. 3. 4. ca. 14.

De Spinae vulnerata curatione. Cap. VIII.



**V**ulneratur nucha, aut spina, siue spinalis medulla secta fuerit, vulnus his simile est, quae cerebro occurrunt: nec seruari possunt, nisi raro, quibus cerebrum, aut spinae medulla percussa est, aut saltem vox perit, quibus ea spinae pars, quae in ceruice est, fuerit affecta: ipsa verò ex transuerso incisa, si tota fuerit dissecata, omnes, quae sub ipsa sunt corporis partes, sensu motuque priuari necesse est, vt pote suscipiente spinam à cerebro vim sentiendi, tum etiam mouendi pro arbitrio, & tandem sic affecti moriuntur, puncta verò, aut perforata interdum sanari potest: nonnunquam etiam relaxantur partes lateris vulneratae, mereditamen debemus, cum sic afficitur, prima die vitello oui admixto thure, munnia, & masticæ, vt sanguis quiescat, & dolor sedetur: tenuissimè pariens nutritur, & corpus nullo modo agiteturi altera die singulis, si decet, à communi vena mittatur. Alius fluida sit, & omnia vsque ad inflammationis, aut conuulsionis securitatem, vt de cerebro laeso dictum est, canonicè regantur. Si autem spina fuerit vulnerata, abluatur terebinthina, aqua benonice, aut vino albo, & addatur recentis oui luteum spermate emundatum, parum thuris minutissimè puluerizati, & croci, & vulnustali regatur medicamento vsque ad diem quartam, partes verò circumiacentes, & emundatoria omnia, ac tota spina saepe rosaceo, masticino, ac camomellino oleo, addita axungia, inungantur; &

Hipp. lib. 2. praed. & li. de Coc. praem. Cels. li. 5. cap. vuln. Gal. de v. part.

cum quarta pertransierit dies, nec scia apparuerint accidentia, prædicto medicamēto addatur aliquid rhodomellis, aut syrupi rosati, myrrhæ & aloes, & quā leuissimè adhibeatur sic, quòd nullo modo dolorem, aut molestiam inferat. qui, si supernarius fuerit, remittatur oleo de terebinthina, aut de vitellis ouorum, & Hypericonis pauco; & si res postulat, vimini polenta Hippocratis, ex farina hordei, & oleo rosato, aut masticino; vel fiat emplastrum, & Recip. florū camomillæ, fertulæ campanæ, rosarum, stichados, betonicæ an. m. s. farinæ hordei, seminum lini, lentium an. vnc. j. fiat puluis subtilissimus, olei rosati, masticini an. vnc. ij. croci scrup. s. rob. quam siccit, & secundum artem fiat emplastrum sub bona forma. Scdato dolore, vulnus medicamēto aureo, aut basilicone minori, aut sanitarem perducat; sigilletur postmodum cerato de betonica, aut palmulato. scire tamen oportet, quòd modernorum opinio est, vt regio spinæ supra duodecimum spondile vulnerata, eandem requirat curationē, quæ cerebro vulnerato competere videtur: quæ verò intra eam situatur, similem exposcunt, quæ nervi fauciatīs adminiculo sunt: etenim sublimior cerebro multum assimilari videtur; si quidem mollis, & alba est, à qua nervi multi sensibus destinati originem ducunt. Inferior verò nervosa, & dura existit, & multam nervorum moventium propaginem producit.

### De Nucha secta, aut perforata, & sanandi ratione. Cap. IX.

**S**I NUCHA secta, aut perforata fuerit, ea in vniuersum seruanda sunt, quæ paulò ante de spina lesa diximus, singulatim postea, suppresso sanguine, Recip. terebinthine claræ, aut eius loco olei de terebinthina vnc. ij. olei rosati omphacini vnc. j. aquæ ardentis vnc. s. misce, & guttaim in vulnus tepidum imponatur, desuper verò petia lata, siue linetolum ita amplum, vt vulnus non solum, sed vulneri proximæ partes in trium digitorum latitudine contegat, cum vnguento diaphinicone, aut de betonica applicetur. Si verò vulneris dispositio farctotica, & cephalica eguerit medicinis, ea quidem secundum indigentiam administranda sunt. Aliqui calcem aqua dulci sæpè elotam hinc & vulneribus applicare aui sunt, quod fortasse in morbis extremis, ac omni spe delitatus felici successu euenire possit.

### A D D I T I O.

a ¶ Lib. 1. prædicti.

b ¶ 3. de loc. aff. cap. 10.

**E**D VILA spina, ait Hippocrates, si aliquo modo malè affecta fuerit, homo sæpe cruribus impotens fit, vt neque, si tangatur, percipiat, & ventre, & vesica, vt circa prima tēpora neq; sterqus, neque vrina egerat: cum autē vetustior factus fuerit morbus, & sterqus, & vrina prodit: moritur autem postea non multo interposito tempore. præterea, ait Galenus, Vbi per transuersas spinæ in cisiones ad medium vsque secundum longitudinem secaretur, non omnes suppositas corporis partes, sed eas duntaxat, quæ e regione sectionis erant, resolui. dexteræ quidem, dextera spinæ parte dissecta, sinistras verò, vbi reliqua pars esset incisa: vbi verò media eius processus pars, fuerit affecta, non omnes inferiores partes resoluntur, sed vel sinistra duntaxat, vel dextera. si uerò ex toto dissecta fuerit spina, aut moritur gger, aut omnes inferiores partes resoluntur.

### DE SEXTA INDICATIONE.

### Quæ modum corrigendi accidentia manifestat. Cap. X.

**V**ARIA sunt ea symptomata, quæ thoraci post accepta vulnera euenire solēt, quibus secundum temporis institutum subuenire oportet: quare hanc sextam indicationem, quæ est accidentium correctio, seu prodigatio, assequimur, remedia cuique propria, prout res desiderat, admoendo. Porro hæc fieri solent vel ratione sedis affectæ, vel vulneris magnitudine, vel patientis inobedientia, & prauo victus regimine, siue medici imperitia. Sunt hæc denique, copiosa sanguinis emanatio, vulneris angustia, spūm sanguinolentum, conglobatus in pectore sanguis, tussis assidua, destillatio, dolor crudelis, loci manifesta inflammatio, & vulneris ostracosa dispositio. Et sciendum, quòd ille, cui occurrit vulnus in vtre suo, & accidit ei nausea, aut singultus, aut ventris solutio, aut aliqua conuulsionis species, moritur. Et quia nihil adeo omnē manuum operationem in corpore hominis turbare solet, sicut sanguinis fluxus, ideo de hoc symptomate, tanquam de eo, quod indicias non admittit, nonnulla in primis dicere aggrediamur.

c ¶ Anic. 4. f. 10.  
d ¶ Coll. lib. 1. cap. de situ sing. Gal. 7. de aggr. anis.

De Copioso sanguinis fluxu. Cap. XI.



**O**PIOSVM sanguinis profluvium contingit aut à vena secta, aut ab arteria diuisa, aut ab utroque vase simul vulnerato, nonnunquam verò ex pluribus, aut maioribus aut minoribus, sanguinis eruptio etià interdum accidit ex eo vulnere, quod cū amissione substantiæ sit; sæpe etià ex eo, in quo nihil substantiæ deperditum est, sed solum in eis angustum quoddam vulnus occurrit, adhuc vniuscuique fluxus, aut à causa interna, quam Græci proigienam, aut ab externa, quam procata dicunt vocant, provenire solet; si ab extrinseca, aut apparens est, & vna cum vulnere refidet, ut sagitta, telum, globulus, aut quid simile, unde maior profluvij abundantiæ sequi solet; aut non apparens, ut vulnus, contusio, erosio, sphacelum, & huiusmodi. Hæ quidem sanguinis fluentis causæ, ac præcipuæ differentiæ sunt, à quibus curandi indicationes sumi debent: porrò de interna, siue antecedenti (velui ruptura illa, quam Græci anastomofin vocant, cū scilicet vasa imbecilla sint, aut sanguis impetu quodam ruerit, vel aliqua acri qualitate prædius sit, aut illa, quæ ab eisdem diapedesit dicitur, cum sanguis sudoris vice transcolatur, tunica venæ rarefacta, aut sanguine attenuato, aut gracilibus vasis adaptis) hic nihil sumus dicturi, cum alibi copiosè omnia conscripserimus, sed de exteriori, quæ necessariò in his affectibus occurrit, sermocerari institimus. Exit interdum sanguis multus à spatis intercostalibus; in quibus singularium disseminata est vena, & arteria, interdum talis ad causam descendit, & sanorum causa est: accidentium: multoties effluit à venis internis magnis, & causam mortis producit. Supprimitur sanguinis fluxus, obturato orificio, à quo emanat, quod fit euisa primò, si qua ipsa causa coniuncta aderit, quam Græci synechicam vocant. secundò si valis orificium aded vniur, ut inde deduci nequeat: porrò scire licet, quòd si à vena defluerit, interdum supprimitur, præsertim si ex magnis venis non fluxerit; si verò ample fuerint venæ, & maximè profluvium apparuerit, lunari eas difficile quidem est, in arteria verò non solum difficile, sed etiam quòd fieri omninò fors tale non possit, à multis indicatum est; nam arteria de illis est, quorum consolidatio non creditur; & si eius partes interdum vnitæ videntur, non ob id verè coeunt, sed caro eam circumdans, & continens, solidatur, unde sanguinis hemorrhagia prohibetur. ex duplici tunica componitur arteria, quarum vna cartilaginis naturam quoquomodo sapit, ob id curationi rebellis redditur; in pueris tamen, mulieribus, ac tenuibus corporibus experimento, ac ratione cōprobatum est, vulneratam arteriam consolidationem contraxisse, eius duritie, motu perpetuo, ac sanguinis spirituosius replezione non obstante; ex perimento, nam id euenisse in fronte, malleolo, brachij articulo, & summe manus medio compertum habetur: ratione, siquidem arteriæ natura diffusilem quidem durioris naturæ suæ conglutinandæ prorsus indicat, non tamen eiusmodi, quæ euinci omninò nequeat, neque etiam ita sicca est, duraque, ut os vel cartilago, immo longè his mollior, ac magis carnosa, quo utique minus de vnienda eius sectione est desperandum, ubi tum ipsa sit parua, nec admodum lacerata, tum infirmi corpus natura molle, & boni habitus. Dignoscitur arteria adaptata ex sanguinis fluentis colore, substantia, & modo fluendi; siquidè sanguis arterialis in colore, rubicundus, aut floridus, & clarus est; in substantia terrens, subtilis, rarus, & spumofus: in modo fluendi, quia cum saltu, impetu, & pulsu effluit, interdum per circuitus, ac interpollatè mouetur; qui verò à vena emanat, quietus, crassus, ac nigredinem declinans, & multus est. Omnis sanguinis euacuatio, præsertim arterialis, verenda est; & magis si delirium, singultus, aut consultiu aliqua subsequitur: ubi verò fluentis sanguinis effluxus causa defierit, primum silere sanguinem expedie, postea laceratum vulnus secundum eius opportunitatem regere. Silicet sanguis (ait Hippocrates) animi deliquio, figura alterata, interceptione, linamentis lotoris, oppositione, & deligationibus; quod etiam inquit Galenus sub duplici modo, & primus localis dicitur, nempe obturato, scilicet quod perruptum erat, & clauso vulnere, aut eius labris, quæ dissident, in idem adductis, præsertim opera, manu medici, ubi vulnus ad manum se exhibet, aut convenienti deligatione, aut ijs remedijs, quæ refrigerant, & asstringunt, aut osculo vulneris obturato & obstrueto, sanguine ipso concreto, qui thrombos Græcè dicitur, aut ijs, quæ foris illi imponuntur; veluti carnosæ partes circa vulnus ortæ, aut in nonnullis ipsa cutis, vel his medicamentis, quæ comminiscimur, sicuti linamenta, aut medicamentum emplastica, quæ ex lentæ, crassaque substantia consistunt, quare meatus obstruunt, aut crustam faciunt, quam Græci echinarum dicunt, sicuti ignis, aut ea medicamenta, quibus ignea vis inest; porrò his præsidijs, ac ingenijs vti soliti sumus in contusis, ac laceratis venis, aut arterijs, præsertim carne attrita, ac diuisa existente: secundus modus diuersius vocatur, & hic duplex est, nam auertunt nonnulla, & ad contrarium trahunt, citra vllam extra corpus euacuationem, ut sunt cucurbitulæ fixæ, aut cum flamma adnotæ, frictions, & ligatures, primum in propinquiorebus partibus factæ, deinde in remotioribus, balnea denique, & oppositis vulneratæ sedis sitis. Auertunt quippe alia cum manifesta euacuatione, atque ad alia membra conuertunt, tum ad proxima deriuando, tum ad contraria reuellendo, ut venæ incisæ, quæ profluvij è directo respondent, ac ipsis partibus sanguinè fundentibus coniunctæ sunt: cucurbitulæ pariter scarificatæ, scarificationes interdum leues, interdum profundæ, vomitus etiam, ac

a Gal. 1. met. cap. 1.

b Galen. 1. de mor. lib. 1. cap. 1. & 1. de 1. cap. 1. & 1. de 1. cap. 1.

c Hipp. 1. Aphor. 1. de 4. d. 1. de mor. prop. 1. Gal. 1. de 1. cap. 1. & 1. de 1. cap. 1.

a ¶ Gal. 5. meth.  
cap. 3. i.

alui copiosum profluuium: derivatio \* ad latus, & ad proxima loca fit, reuulso ad contraria, & remotio  
ra, illam parocheteufin, hanc antispalin Græci vocant: accirco non est inconueniens interdum pectore  
vulneraro, saphenam aperire, & tenuissimo vicus regimine vti, & semper filere nam \* thoracis disrumpa  
vasa, à quibus sanguis expulitur, magna ex parte glutinantur: cohibetur \* verò extrinsecus effusio sola  
oui parte candida contusa, applicata; aut addito aloë, maffice, bolo armeno, farina volatili, ac leporu  
pilis minutissimè incisis, aut fiat pulvis ex minuo thure, aloë, gipso, & colcothar, additis leporinis pilis,  
quam mollissimis cum oui albumine confuso vsque ad mellis consistentiam. Si verò \* interius ex tho  
race manauerit, patiēti exhibebatur lapidis hemaritis scrup. j. cum succo portulacæ, aut \* d. femine hyo  
scyami albi ad pondus granorum duorum hordei cum aqua mellis, aut \* fiant trochisci ex acacia, rosif  
siccis, balauftijs, gummi, & tragacantha cum aqua plauiali. Aut Recip. radicem consolis vn. 6. balauftio  
rum drag. ij. aque sextarium vnum, coquito ad tertias, expressioque succo, adicio amili drag. j. gummi  
spēdidi dra. ij. datoque potui cū aqua plantaginis, aut portulacæ ad pōdus duarū dragmarū laudatur  
trochisci de Karabe, de terra sigillata, & diadraganti cum bolo armeno. Probatur summopere poru  
laca, cctinodia, & super omnia saccharum rosatum antiquum: foris autem pectori irrigatio adhibenda  
est, ex vino nigro alstringente, aut ex olco rosato, & myrtino, addito bolo armeno. de ligatura, digni ad  
motione, sutura, venę præcisione; de laqueatione, & vltione, si in profundo deliteant venę, nihil dicit  
re expedit, sed ea tantum sufficiunt, quę ore sumuntur: exterius verò, quę loco afficito applicantur.

b ¶ Galen. 4. de  
loc. affec. 6. A  
me. 10. 3. tra. 3.  
cap. 4.  
c ¶ Gal. 5. meth.  
cap. 4. 8. 10.  
d de long. aut. 1.  
e ¶ Aer. lib. 3. c.  
63. Paul. lib. 3.  
cap. 31.  
f ¶ Auicenn. 4. 1.  
cap. 7.  
g ¶ Galen. 7. de  
comp. med. se  
cundum loc.

## De Vulneris angustia. Cap. XII.



**S** A U T accidit, vt vulnus angustum fiat, aut quia telum lædens acutum & subtile fue  
rit, aut quia costa aliqua depreffa aut fracta reperitur, vel musculi intercostales,  
aut panniculus ille, qui pectus interius circumscribit, pleura vocatus, inuenietur,  
aut vulnus oblique incesferit, aut circa aliqua supernata fuerit, specillum, aut  
cera candelula, aut penicillum, siue aliud instrumentum in vulnus ingredi nequit  
tenetur, vt extra venas existens sanguis, aut materia alia diuersa in pectoris claba  
no coaceruata commodè extrahi, & medicamenta injici possint, angustum vulne  
ris orificium aut incidente ferro frigidò, vel ignito, si deest, aut turandis, siue penicillis, si expedit; aut  
corrosiuis medicinis, si conuenit, ampliari necesse est; atque magis si alicuius pars aliqua exie  
rit, nec in propriam sedem remitti possit, & sua superuenerint accidentia. Porro accommodatum in  
strumentum ad has sectiones illud est, quod Græci syringothomum, Arabes embula, & Latini man  
turiolum vocant; idque pariter quia curuum est, ac lunæ cithigem imitatur, scopolomacherion Græci, ga  
medin Arabes, & sparum curuam Latini dicunt, quorū effigies, capite septimo libri primi diximus in  
officina delineatas sitq; nobis memorig, dō hīce instrumentis secare vulerimus, ne alicui nobilissimū viscerū  
nocumenta præstemus. ob id in eorum cuspide acuta \* ceræ albæ parum applicemus. Turundę sunt ex  
marina sponsia filo circumuoluta, & adeo fracta, vt in turundę formam fuerit redacta. aut  
ex radice gentianę, aut aristolochiæ longę, aut ex medulla surgi compressa, aut alterius rei, quę  
recepta humiditate tumeat, & vulnus latius reddat. Hæ succelluē grandiores fieri possunt, sed  
prius cerea candelula imponatur, & iter preparetur, & per diem intus seruetur, inde turundę immi  
stantur. Si verò costa aliqua aut fracta, aut depreffa fuerit, omni ingenio studendum est, vt eleuetur, aut  
ita struetur, vt callus gigni possit. Si autem caro aliqua aut lacerata, aut superaddita penetrationi ob  
stiterit, aliquo medicamento epirotico, siue corrodente, quale est alumen liquidum, aut aris squamma  
præparata, tollatur. At si patientis timiditas, aut vehemens dolor, aut sedis affectus natura has non ad  
miserit operationes, tunc lichinia, siue turundę imponantur cum rosacco, & oui lucco, donec vulnus ad  
conuenientem dilatationem deuenierit.

## De Sanguine conglobato. Cap. XIII.



**S** I sanguis in cava pectoris parte conglobatus fuerit ita, quod nullo modo inde euel  
li possit, & tussis appareat, latrum grauitas, febris, ac spirandi difficultas, danda est  
patienti, auctore Galeno, posca, aut oxymelletes cum decocto hyssopi, nec obstat  
bis, teruē mane, ac vesperi hanc potionem iterare. aut Recip. ex Guidone, & Alme  
rico radicē caudę equinę vnc. j. olivundi, species filicis est, drag. iij. dragonij dtag.  
j. coquantur cum vino & melle, & coletur, & da huius decocti, vesperi, patienti cya  
thum vnum tepidum. fortassis enim copiosè sudabit: ea medicamenta conuenire dictum est à medicis,  
quę incidunt, & attenuant, & sudorem, aut lotium cient. Exhibent igitur nonnulli & coaguli leporis  
per se scrup. j. aut drag. s. cum aqua hyssopi, aut aceto & melle: probant etiam interdum drag. j. Theria  
cæ antiquę cum aqua scabiosę. Nostrę ætatis Medici laudant thabarbarum, aut rhaiponticum, veluri  
Recip. reubarbari electi drag. s. erythrodani, mumiz an. scrup. j. terre sigillatę scrup. s. aque scabiosę  
vnc. j. maffice, & fiat potio, quę summo mane accipiat: exterius verò hordaceæ aqua cum oxymel  
lite

g ¶ Aer. lib. 3. p. 6.  
h. Paul. lib. 3.  
cap. 41.

10 lre per syringam iniicitur, aut aliquod decoctum, quod magis incadat, veluti hoc. Recip. radicū tormentillæ, Caryophyllatæ, consolidæ maioris an. m. s. hordei cum corticibus p. s. bulliant in aqua scabio-  
sæ, & coletur, & adde oximellis simplicis vnc. ii. syrupi rosati s. vñ. i. & vtere ipse cum iniectione iniici-  
do, ac vltimo aliquid inus relinquendo, donec decoctum ab omni immunditie de-  
mutatum exierit, & quod pectus à superfusiuitibus exinanitum fuerit, certus eris,

De Sputo sanguineo. Cap. XIII.

20 **S** EQUITUR interdum, quod venolæ, quæ in profundo pectoris locantur, vulne-  
rentur, nec perfectè consolidentur, quare paulatim, sed perpetuò sanguinem tun-  
dunt, qui postea per spum rursus expurgatur, & hinc est, quod spum sangu-  
nolentum apparet. Tollitur hoc symptoma medicinis siccis, & astringenti-  
bus, quæ ob id pectori noxam non inferant, quale est diadragantum rubrum, tro-  
chisci de terra sigillatæ, aut de Karabe, aut de Ipodio ad pondus drag. j. cum aqua  
plantaginis, aut portulacæ. aut Recip. thuris, sanguinis draconis an. drag. ij. terre  
sigillatæ, raud senti andrag. j. Karabe, balauftiorum andrag. j. opij drag. x. fiant piluli cum succo ozy-  
mi maioris, aut portulacæ, & quoties vnus cum vino nigro austerò sumatur, aut cum decocto malo-  
rum, vel bacarum myrti, aut alterius eiusdem astringentis, quod mirabiliter etiam facit portulacæ  
comestæ, & succus eius bibitis efficacior exillit. Si verò hæc non proficiant, ad athanasium Nicolai, aut  
ad philonium persicum Melues deuenire oportet, & recens etiam theriaca prodesse solet: mittatur san-  
guis non multus simul, sed per intervalla, ex iccòria vena modò dextræ, modò sinistræ cubiti: diuersio-  
nes à longinquiorebus fiant, ac adiutoriorum, & coarctarum partes sublimiores laqueantur: thorax acetò  
rosato, aqua portulacæ, & oui albumine epithymetur, aut oleo myrrino, rosaceo crudo, & nenupha-  
rino inungatur: pascens supinus iaceat, silcat, & omnino quiescat: victus tenuis sit: aucta, aut hordecum  
cum succo amygdalarum sit eius cibus, superposito pulvere aliquo astringente, nempe nucleorū ma-  
li punici acidi, vel rhoi, vel fructuum myrti, qui præ alijs summo opere laudatur, aut coriandrorum,  
40 & mastice: fugienda tamen sunt quæ ingrata sunt gustui, ac rursus, aut vomitū irritant, verum, si aliqua  
adfectus indigentia, nam vt dictum est: Primum periculum in sanguinis sputo est, ne vltima modò eius  
sint euacuatio. magna enim pulmonem, ac pectoris vasa existunt, ac arteriarum speciem habentia: pec-  
toris, ac extrema animalium in chalybeata aqua decocta concedantur: in caque & pifiana, & pulkes ex  
40 amyli farina, aut hordecæ parentur, pariter & condrum, siue oriza, & cucurbita exhiberi potest. Pos-  
tus esto aqua chalybeata, aut in qua aurum fuerit extinctum, addito zupapio, aut saccharo rosato, aut sy-  
rupio myrrino, aut, vrgente necessitate, vinum nigrum, & pauciferum concedatur, præsertim si sanguis ab  
aliqua thoracis vena prodierit, qui & nigror, & iam in cumulos coactus cum rursus, & dolore, nec abs-  
que foetido aliquo odore, educitur: si verò clarus, lipumofus, ac sine dolore rursus eijcitur, eius  
educio à pulmone fit.

De Destillatione, seu catarrhali defluxu. Cap. XV.

50 **D** E SCENDIT interdum à capite ad pectus materia aliqua subtilis aut baurachina,  
quæ pulmonum vulneris sanationem impedire solet. nã destillatio, siue catarrhus,  
vt Græci dicunt, tulsim cōmouet, quæ vulnus dilatat, somnum impedit, & diges-  
tionem corrumpit. ob id, vt catarrhus fistulatur, & ne amplius deiciat, diligenter  
animaduersionem habere conuenit, eoquæ magis, si aut suffocationem, aut visce-  
rum lesionem timuerimus. Rectè igitur firmabitur, si prius & causa, & humoris  
natura cognita fuerit: sed quia in his vt plurimum fluxio calida exillit, præmissio  
victus regimine, quod tenue esse debet, ad quandam tenuitatem vergente, ac cephalica vena aperta, nisi  
fi aeris admodum destillatio fuerit, adhibitis quæ chlyteribus acris, ac omnibus partibus corporis, capi  
re tantum excepto, contritis oleo vetri, aut cicionio manibus inunctis, omnique industria retractis fluxio-  
nibus extremorum ligaturis, cucurbitulis, & caput purgijs, veluti est violarū, aut hordei aqua, quæ na-  
res dilatat, & viam liberam det, vt materia per has effluere possit, aut butyrum inera nars dato, cui  
60 octaua pars elactery sit adiecta. postmodum destillationem siltere oportet his præcipue, quæ retinent  
& crassum faciunt, nec vulneri noxam ferant, sicuti est bolus armenus, spica, pilus, mastic, succus gly-  
cyrrhizæ, gummi, tragacanthæ, diapenidion, diadragantum, & trochlear bechiche in ore retentæ, con-  
ferri etiam ad hoc syrupus de glycyrrhizæ, myrrinus, violaceus, & papauerinus: vltimo verò huic disposi-  
tionis suffragantur pilule de cynoglossa visque ad drag. j. s. quæ non frequenter, fed rarè exhiberi debet:  
vbi verò copiosa ex capite in pulmones defluxio fuerit, præstat medicamentū diacodion, quod ex me-  
le conficitur. Si autem ex his destillatio non fistatur, de rasis supra coronalem fisturæ capillis, spargatur  
puluis & sandaracha, Arabum masticæ, balauftijs, & bolo armeno: & si hæc nō iuuant, capiti emplastrū  
applicetur ex thapsia, aut ex fumo colubino syluestri, aut fiat cauterium supra ipsam cōmiliturā coronalē.

De



## De tussi molesta. Cap. XVI.

47 Galen. 7. de  
comp. med. feci  
dam locos, & s.  
de sympt. cau.  
Acrob. lib. 2. cap. 4  
Paul lib. 3. cap.  
1. Anac. lib. 3.  
cap. 4. ap. 1.



**T** VESICA vehementissima efflatio est, & motus, quo natura cum plurimo spiritu cellerime foras et impente, imperio suo excremeta à pectore, & pulmonibus expellit: Tulsis est motus pectoris, sicut sternutatio ceteri, ad profigiandum nocua: perficitur pectoris dilatatione, & constrictione, ac suorum velaminum motu, fitque aut propter materiam pulmonum propriam, aut ex destillatione, vel affinitate, & confortio alterius partis: quare cum utroque modo potens causa sit vulneris pectoris sanationes prohibendi, illi accuratissime incumbere licet: quocirca præmatto i regimine in sex rebus non naturalibus, ut de catarrho dictum est, iungatur pectus, si aliqua repletio accit, oleo violarum, amygdalarum dulcium, butyro recenti, pinguedine gallinæ, & mucillagine althææ, aut vitato vnguento pectori conferente. Exhibeatur summo mane syrupus de glycyrrhizæ capillo Veneris, violaceus compositus, aut similis: sæpe in ore saponem teneat, diadragantum, diapenidion, aut hoc de pino, aut de pulmone vulpis. Si autem humor copia apparuerit, ea euacuanda est, aut per internas, aut per externas regiones, ut supra explicauimus. sed cum ab aliqua frigida intemperie originem traxerit, regatur medicinis prædictis, quæ breuiori tempore, quo potest, dimittantur, & vulnus hoc interim opportunè, ut decet, regatur.

## De dolore. Cap. XVII.

9 Galen. 1. de  
loc. aff. cap. 1.  
de comp. med. feci  
quidam loc. Anac.  
lib. 3. cap. 4.



**M**OLESTISSIMA accidens tristis sensus est, qui à Medicis dolor vocatur, siquidem, cum acutus est, inducias non expectat: proinde summa cura protinus adhibenda est, ut tale accidens demulceatur, aut in totum, si fieri potest, absumatur, quod bonus tribus ingenijs celebrari solet, nempe medicinis anodynis, id est, dolores sedantibus, & temperaturam inaqualem permutantibus, aut doloris causam discutientibus, ac dissipantibus, aut membrum stupidum, & sine sensu reddentibus. Iccirco si causa nota fuerit, veluti illa, quam isti coniunctam vocant, tollatur turo, & sine dolore, si autem occulta fuerit, præmissa, ut decet, euacuatione, anodynis uti primò opus est, sub forma inunctionis, aut fomenti, aut cataplasmati. Ergo hyeme, auctore Galeno, locum in orbem oleo nardino, aut melino, aut camomellino madefacto, ætate verò violaceo, aut rosaceo: fomenta sunt adhibita lana oleo communi, aut camomellino calido infusa, aut spongia in decocto acanthi, althææ, violarum, meliloti, & scenogæci madefacta: potro ex his, aut similibus plantis pariter cataplasmata parantur, addito oleo masticino, rosaceo, fapa, farina hordeacea, semine lini, quorum luteis, & croco. Narcotica verò, seu stuporem inducentia, nullo modo probantur: verum, si aliqua de causa fuerint opportuna, non excedant oleum ex nimpheæ, aut de papauere, aut triturentur folia lyoscyami cum oleo violaro, farina hordei & croco. Si autem dolor diu persuerauerit, ad nouas corporis euacuationes redire expedit, sanguinem, si nihil obstat, mittendo, aut aluum ducendo aut agarico, aut reubarbaro, vulpus verò secundum indigentiam regatur, & bis, aut ter in die, mederi oportet.

## De inflammatione, Cap. XVIII.



**D**IMENSIONES præternaturales in longo, lato, & profundo, quas Græci apostema, Arabes dubelæ, & aldubelati, & Latini tumores non naturales, aut abscessus, siue inflammationes appellant, cum thoracis vulneribus occurrunt, pericunq; à natura calida producuntur, & maximum secum afferunt timorem, præsertim si ossa, vel nerui, vel venæ, vel arteriæ, vel lacertorum capita affliguntur, aut vbi parum sanguinis pro vulneris modo fluxerit, aut cum interna, ac primaria membra patiuntur. Ex his, quæ externis nascuntur, sensu visus, ac tactus dignoscuntur: si verò intus oriuntur, à quibus proprijs symptomatibus declarantur: quippe dolores interni in principio debiles, deinde fortiores apparent, horripilationes, febres ardentes, viscerum graniatæ, pulsuum durities, difficultates anhelitus, inquietudo maxima, tussis sicca, & ut plurimum vulneratorum perniciēs. Quoties ergo de aliqua inflammatione occulta dubitatur, statim sanguis è brachio mitti debet, utique si cor pus illi le & robustum, ac exercitatum fuerit, multo quæ magis si ebrietas præcesserit: diata insituitur tenuissima, diuersionum omni genere vtendum, corpus calida, aut manna, aut syrupo rosato solutiuo purgetur, ac tandem ea omnia, quæ in initio inflammationum sunt opportuna, oblerentur. Si autem inflammatio externas occupauerit partes, & causa humæ biliosus fuerit, erysipelas, aut herpes procreabitur, & tunc pariter tenuissimo victu vtendum est, frigiditatem quandam præ se feret: sanguinem ex talo, aut opposita parte mittere conuenit. Si autem corpus cacoehymum fuerit, aut prauis scatat humoribus, medicamento colagogo, id est, bilem educente, euacuetur: rubor verò ipse violaceo, aut nenupharino oleo,

10 oleo, aut rosaceo vnguento saepius inungatur. Porro si phlegmon, id est sanguinea inflammatio, in carne pe-  
rit, mittatur sanguis, & fluxio temperate inhibeatur rosaceo, myrino, & maiticino oleo, addita boli ar-  
meni portiuncula. Si ad statum deuenit tumor, suppurationi praeparetur superposito emplastro ma-  
cedonico, quod triapha-macum vocant, ex rodeolo, farina triticea, & decocto radicum altheae, & cari-  
carum pinguium. Sanie concocta, in loco opportuno hac scitio, inde praeparatur, postea noua carne te-  
plicatur, vitium sigilletur semper vulnere non neglecto, sed diligenter curato.

De Duritie labrorum vulneris. Cap. XIX.

20 **C**um diu permanferit vulnus, neque ad cicatricem deuenit, eius labra duritiem  
quandam obducunt, inde remanet affectus, quem Graeci coriadan, & Latini fistula  
vocat. Sinus quidem est profundus, angustus, cuius labra rotunda, & dura siliu-  
le arundineae formam praefecerunt: Indicia sunt labra decolorata, saniei penuria,  
nullus sensus, & durities manifesta: Quare tunc fistularum more curari debent, du-  
ritiam primo, aut callositatem remouendo, quae vlcus tale cacochetis, id est diffi-  
cilis curationis, reddunt, & est symptoma, sine quo non celebratur hoc opus, sumpta  
indicatione a calli natura, & quantitate, & nunquid in labris, an circa ea consistat, vnguentis, pulueri-  
bus, humidis liquoribus, interdum etiam scitificatione, & cauterijs. Verum in hoc agri animus con-  
sulendus est. Sed a leuioribus initium capiendum, si durities mediocriter fuerit, vnguenta, quae magis pro-  
bantur, & vsui seruantur, sunt damascenum, apostolorum, cerafeos, & lris, quae omnia cognata sunt; for-  
30 tius vero in duriori est vnguentum aegyptiacum, aut cauterij: pulueres parantur ex radice maioris centa-  
urij, asfodelli, Ipondij, nigri veratri, hydrargyro praeparato, quod praecipitatum vocant, ex calcina-  
to vltro, aut squamma aris praeparata, & rebus humilibus: trochisci etiam de minio, qui celebres admo-  
dum sunt, vel radices ipsae, imponentur, quae mirifice operantur. Si haec non iuuant, postquam partes circi  
iacentes proprijs defensus fuerint munitae, alicuius cauterij potentialis portiunculam cum sermone mi-  
scet, aut sublimati granum cum butyro, aut vnguento cerullato compone, & fiat opus: ex liquidis liquo-  
ribus acida muria, aqua aluminis, aqua plantaginis cum paucis arsenico, aqua, quae aurum ab argento se-  
paratur, fortis nuncupata, addita aqua rosacea, aut vino maluitico: haec administranda sunt, prout calli  
consultit durities. Ablumpto callo, patienti aliquod decoctum, aut pigmentum, vt in capite quarto de  
scriptum, exhibeatur, vt adueniat humiditas, quae perpetuo ad sedem affectam defluunt, exsiccen-  
40 tur, & partes internae rectificentur, & patiens ad sanitatem perducatur, quod nobis multoties cum au-  
xilio Dei omnipotentis, & Mariae semper virginis, cum honore, & patientis utilitate, bene successit.

A D D I T I O.

**C**ostae nonnunquam inter costas fistulae subtere xire; quod vbi accidit, eo loco costa ab vtra-  
que parte decidenda, & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur. Solent haec, vbi  
costas pertransierint, sepeum id, quod transversum a superioribus visceribus intestina discer-  
nit, violare, quod intelligi, & ex loco, & ex magnitudine doloris potest, & quia interdum spiritus eo cum  
humore quasi bullante prorumpit, maximeque si hunc ore ille continuit, in eo medicamentum locus  
nullus est, & pingua omnia inimica sunt; probantur tamen manuum operationes, costas, & ossa omnia  
50 corrupta extrahendo, ceteris postmodum, quae vulneribus accommodantur, inde vti licet.

Occurrit etiam interdum, vt ab acuto telo, costa aliqua vtrouique perforetur, & ob id materiam extra  
veras egressa magna cum difficultate euacuari possint, quare non ab re est terebris ad hoc paratis, ori-  
cium in osse ampliare, quae sub formis construantur in officina declinat: inde omnia habentur, quae pari-  
ter in alijs penetrantibus vulneribus adimpleri solent.

Hipp. lib. de fi-  
stula. Cap. 7.  
cap. 4. Gal. 1. de  
loc. aff. cap. 3. de  
7. de aggr. an. 1.  
Ausc. 4. 4. 11. 1.  
cap. 10.

Hipp. lib. de in-  
fernis aff. 10.



## CHIRURGIAE

IOANNIS ANDREAE  
A CRUCE, VENETI  
MEDICI,

## Tractatus Secundus.

## De vulneribus.

## LIBER QUINTVS.



## De Curatione vulnerum infimi ventris, &amp; suarum partium. Cap. Primum.

a Hipp. lib. de  
Ioc. au. homine.  
Puro Thimo  
Gale. 1. de not.  
loc. aff. cap. 1. de  
a. de corp. med.  
secund. loc. os.  
b Gal. lib. 1. de  
pur. med. ca. 77.  
de loc. aff. os.  
cap. 1. de loc. aff. os.  
de. j. de loc. aff. os. 11.



V <sup>1</sup>MANI corporis partes antiqui \* locos appellabant, & quam diligentissime affectus illis euenire solitos, per propria signa noscere studuerunt: quippe pro locorum differentia, affectuum curationem variari contingit: iccirco <sup>2</sup> quia partes in superficie sitae, vna cum suarum passionum natura, quam isti essentiam vocant, facillè sensibus deprehenduntur, nec multa egent perquisitione; quæ verò in imo corporis delitescunt, ac vixum effugiunt, exercitatur cognitio- nis virum desiderant, cum in partis naturæ, substantiæ, actionis, situs, ac exequ- tionum cognitione, quæ ex anatome apprehenduntur, tum medendo opportu- nis indicationibus, & manu operatione consistit. Hac de re cū infimi ventris,

& suorum locorū vulnera, ac eorum curationes explicare proposuimus, primò quid per ventrē, ac in eo <sup>10</sup> contenta intelligendum sit, enarrare decreuimus. Per hanc <sup>3</sup> igitur partem, eam totam accipimus regio- nem, in qua à diaphragmate infra, vsque ad pubis os, naturalia, siue genitalia, aut nutritiua membra, ac his seruientia, conseruantur, nempe Iecur, Venter, Lien, Renes, Intestina, Vetus, Vesica, Por- Vtriusque, Seminis Vasa, Mesenterium, Omentum, Venæ, ac Arteriæ multæ, magnæ, ac profundæ, ad- de & Testes. Membrum, quod hæc omnia continet, cooperit, & conseruat, à Græcis epigastrium, à Latinis abdomen, ab Arabibus mirach vocatur: cōponitur <sup>4</sup> ex duplici cute, exteriori pinguedine copio- sa, membranæ musculo, quem isti panniculum carnosum, & inuolucrum totius appellant, ac lacertis octo diuersimodè procedentibus. huic subiicitur membrana quædam pertensis, veluti aranea, totum subcingens ventrem, & interiora omnia continens, ac si eorum esset marsupium, aut indumentum, à Græ- cis peritoneon, à Latinis abdominis membrana, ab Arabibus Siphac dicitur: ob id affectus in soluta con- <sup>20</sup> tinuitate, qui huic occurrunt ventri, non minorem in curatione afferunt difficultatē ac timorem, quā qui thoracem offendunt, & Solstratus eos insanabiles credidit: attamen id non ex toto ita se habere vsus ostendit: porrò abdominis continuum soluitur tripliciter, cum vel nulla addit penetratio, & vulnus fe- rē simplex sit, vel cum vsque ad cavitatem, siue viscerum lationem peruenit, vel cum interna membra ex accepto vulnere lædantur. Huius lationem prima sensibus facillè dignoscitur, & eam alijs comparando, leuis admodum passio iudicatur, & nisi timidus æger sit, aut valde imbecillus, aut Chirurgus imprudens, nullum, aut paruum potest inferre timorem, quæ penetrant, ac cavitatem at- tingunt,

c Hipp. lib. 1. de  
h. an. m. de. 16.  
Gal. 1. Aphor.  
ca. 11. de aph.  
com. 16.

d Gal. 6. met.  
cap. 1. de loc.  
aff. ca. 1. de  
v. lo. part.

10 tingunt, ob sanguinis maximam copiam, aut internorum alterationem, aut ictum, non nisi vehemens incommodum, ac periculum adducunt. Et quia hæc lisiones sensibus non dignoscuntur, opus est, ut aliquibus propriis symptomatibus manifestentur. Prius ergo signa describenda veniunt, quæ penetrans vulnus ostendere possunt. postea necessarium est, notas subijcere, per quas quid intus factum sit, scire possimus, & quæ viscera læsiantur, dignoscamus: quorum paliones vt rectè p̄noſcentur, eorum situs, magnitudinis, coniunctionis, operationum, ac excrementorum cognitio, admodum necessaria est, ex quibus etiam vel spes vitæ, vel desperatio, oritur.

De Infimi ventris vulnerum penetrantium, signis. Cap. II.

20 **A**RTIONES, quæ ventris cavitatem non attingunt, inter simplicia vulnera numerantur, & sensibusprehenduntur, aut minima quadam inquisitione rectè dignoscuntur, sed quæ ad cavitatem perveniunt, quatuor medijs iudiciantur, nempe visu, cum scitio satis ampla fuerit, aut si omentum, vel intestina exierint: interdum tactu, dum digitus, aut specillus, aut candelula ceræ facillimè intus penetraverit: sæpenumcò coniecturam ab instrumento ludente accipimus, si telum longum, subtile, & acutum fuerit: ac à brachio valido, in deſectio corpore, & tenui abdomine, inhiſsum fuerit: vt plurimum verò ex ſymptomatum natura, penetratio manifeſtatur, cum alicuius internæ leſionis nutrimentum in membrorum aliquod proprium ſymptoma apparuerit, vt infra ſingulam clarè demonſtrabimus, quæ interdum citò, interdum ſerò manifeſtari ſolent.

De Ventriculi læſi Indicijs. Cap. III.

30 **V**ENTRICULUS, ſive ſtomachus, percuſſus eſt, ſingultus, & bilis vomitus inſequitur; & ſi quid cibi, vel potionis aſumptum eſt, id citò redditur. nam ad cibum deſtinatus locus cum vulneratur, illum nec conſicit, nec continet. cibus enim promptuarium alimenta vniuerſa excipiens, & neceſſarium cibi conceptaculum: ab eo non magna languinis erupcio emanat, gracies enim ſunt ſtomacha venę: dolet, & agitur, ex quo facillè inflammari poteſt. venarum motus elanguſcunt, ſudores tenues oriuntur, per quos extremę partes frigeſcunt: interdum chilus, ſive concoctus, ſive incoctus, ſive ſpurium, ſive ſpūm sanguineum, & dolor crudelis apparet, ita vt cor ſibi mordicari videatur, præcordia indureſcunt, & vulnus ſub ſternone, ſive biſurali cartilagine, ac in media regione, imprimitur: hoc diſciſſo, mors citò ſubſequitur, nam inſtrumentum primæ concoctionis eſt. vniuerſum cibum recipit, & illum accuratè elaborat, & quid in eo inutile reperitur, atque excrementitium, deorſum pellit: quod verò benignum, ac vile, ad corporis nutritionem conſeruat. rotundus, ac terò oblongus, & cavius eſt, duabus tunicis contextus, eſophagi tunicis ſimilibus, inter ſis membranoſior eſt, villis rectis quamplurimis deorſum tendentibus intertexta externis carnoſis, & villis tranſuerſis habet: quare ſylueſtris pars vulnerata, redimi poteſt: domeſtica verò, quia nervoſa, aut rarò, aut nunquam conſolidatur, idq; magis, quia varijs perpetuò repletur humoribus, vnde poſtea febris, vertigines, lyncopæ, id eſt, animi deſectus, ſingultus, nauſea, & ea prava accidentia, quæ in cordis aſſectibus apparere ſolent, oriuntur. Hæc ventriculi grauiter, ac intimè vulnerato ſupernaſcuntur.

De Hepatis offenſi notis. Cap. IIII.

60 **L**ÆSIO hepate, vt dicunt Græci, ſeu icteſnore, vt Latini, multus ſub dextera parte præcordiorum effunditur ſanguis craſſius; nam magna huius membri portio dexteræ ſedem occupat: interdum etiam bilioſus accedit vomitus, ructus ſæctidi conſequuntur, & à ciborum acceptione præcordiorum grauitas ſubſequitur: pulſus depreſſi ſunt, ac denſi, ſuntque ægri triſtes, & iracundi, punctorij dolores viſque ad ingulum extenduntur: vulneratorum color cineritius eſt itulſius, ac febre maximè intenſa cruciantur, lotium ſæpe ſanguinem emittunt: interdum fecceſus plurimus apparet, & quæ ex æſtuantur, eruenæ, putrefactæ, ac ſanoſa exiſtunt: vulnus in hypocondrio dextero, & ſub ſpurias coſtas in parte lumbina occurrit. Hoc membrum omnium venarum (quantum ſecus credat Ariſtoteles) initium, ac nutricis facultatis principium eſt: ad cuius deſectum cor patitur: eſt etiã primũ languinis generandi inſtrumentum, ac facultatis concupiſcibilis (ait Plato) principium, cumque extrinſecus lædatur, & ſi gibba eius pars ſana fuerit, maximum ſanguinis profluuium expectare oportet: & ille, qui cadit ſuper hepæ, aut ſplenem (ait Auicenna) deinde currit ex eo ſanguis plurimus, tunc neceſſarium eſt, vt apoſtomedetur, & moriatur: cum verò aliqua in eo oritur inflammatio, tunc febris aliſdua, & ſingultus patientem inuadit, vrinæ conturbatæ ſunt, & focces corruptę, ac variæ apparent.

## De Vulnerati lienis accidentibus. Cap. V.

a ¶ Cel. lib. 4. c. 15.  
Auch. 3. c. 15.

b ¶ Gal. 4. c. 7.  
de v. par.



**S**PLENI (¶ ut dicunt Græci) aut liene, ut Latini, ictero, sanguis niger à sinistra parte, sub hypochondrijs prorumpit, qui & scæculentus, & crassius esse solet: præcordia ab eadem parte indurefcunt, sitis ingens oritur, dolor tenuis ad iugulum, sicut iccinore vulnerato, extenditur. Huius visceris vulnus verendum est, nam eius corpus multis arterijs plenum est, ac laxum, instar cuiusdam spongiæ, quæ ex sanguine limoso, crasso, & melancholico, in hepate genito, nutritur. Sima eius pars, arteriarum multarum, ac magnarum venarum plantationes continet: ob id, cum lædatur, faciliè inflammatur. verumtamen, cum leuiter vulneratur, non tanti est momenti, ut sunt aliq. modò dictæ partes. attamen nec ita leue est in eo collatum vulnus, ut nec vllum incommodum, neque laborem asserere possit. Tardè quidem ad hoc viscus affectum, medicamenta intus sumpta perueniunt.

## De Intestini secti symptomatibus. Cap. VI.

c ¶ Cel. lib. 4. c. 15.  
Gal. 4. c. 15.  
de v. par.

d ¶ Hipp. lib. 1. de morbi. li. de Coac. p. mot. 6. Aphor. 18. 19. 20. Cel. 4. c. 15. Gal. 4. c. 15.

e ¶ Gal. 4. c. 15. de v. par. 3. c. 15. de v. par. 3. c. 15.

f ¶ Gal. 4. c. 15. de v. par. 3. c. 15. de v. par. 3. c. 15.

g ¶ Hipp. lib. 1. de morbi. li. de Coac. p. mot. 6. Aphor. 18. 19. 20. Cel. 4. c. 15. Gal. 4. c. 15.



**V**us intestina vulnerantur, stercus attenuatum, aut eius fortior exire contingit, nonnunquam bilis per os redditur, interdum cibus, aut potus per vulnus emittitur, præcordia densa fiunt, & febris accedit: communes verò iccini intestini, & ventriculi vulnerati, notæ sunt. Scire tamen licet, quod si ex gracilibus fuerint, salutis spes nulla relinquitur, ea quippe tria sunt, & superiora, quorum primum descendendo, pyloro coniunctum, per duodecim digitorum spatium, ad spinæ longitudinem rectè protendit, ab Herophilo dodecadactylon, & a vulgo duodcnū vocatur: secundum, eo quod semper inane sit, iccium dicitur: tertium illud tenue est, quod Græci ileon appellant: maximè verò inter hæc iccium vulnearum insanabile creditur, tum quia exangue est, tum propter vasorum magnitudinem, quæ in eo locata sunt, tum etiam quia eius tunica prætennis, nervosæque existit. adde, quod & bilis syncera ex fellis poris recipit portionem, & omnium maximè iccinori vicinum esse videtur. Inferiora verò, quæ pariter tria sunt, crassam, ac satis carnosam habent substantiam, sicut cæcum, quod vulgus saccum, & monoculum vocant, est enim, veluti ventris crassius, ac ad excrementa recipienda idoneus, hoc in dextro ilio locum tenet. Colon sequitur alijs carnosius, à dextra ad sinistram, ilium attingens, ventriculi fundum superëquitat. Vltimum, quia spinæ è directo incumbit, rectum appellatur, à vulgo Longanū dicitur. Spatiosum excrementi receptaculum est, & ad sedem vsque porrectum, ac valde carnosum. Hæc igitur, quæ in imo situ locantur, quia crassa, ac carne prædita sunt, & quia medicamenta per sedem imposita diu in ipsis retinentur, nonnunquam sanitati restituantur: verumtamen si in eis aut magna, aut per transversum fiat plaga, magni mortis imminet periculi, si verò parua, aut recta, seruari possunt: cum autem inflammatioe affliguntur, vrinæ stillicidium apparet, dolor crudelis oritur, febris augetur, & patient moritur.

## De Vescicæ incisæ cognitionibus. Cap. VII.

i ¶ Hipp. 4. Aphor. 18. 19. 20. Cel. 4. c. 15. Gal. 4. c. 15.

k ¶ Hipp. lib. 1. de morbi. li. de Coac. p. mot. 6. Aphor. 18. 19. 20. Cel. 4. c. 15. Gal. 4. c. 15.

l ¶ Hipp. lib. 1. de morbi. li. de Coac. p. mot. 6. Aphor. 18. 19. 20. Cel. 4. c. 15. Gal. 4. c. 15.



**V**ESICÆ incisæ, vrina interdum supprimeitur, aut pro vrina sanguis, vel ex vulnere vrina descendit: dolent inguina, & quod super pubem est, intenditur: stomachus afficitur ita, ut bilem vomat, aut singulat: vehementes autem dolor pecten, hypogastrium, quæ impediunt, vrina magna cum anxietate sæpe redditur, & post mictum, pus in fundo matulæ residet, squammulæque in ipsa terri coloris, aut laminae circumferuntur: frigus, conuulsio, & ex ea mors subsequitur, præcipue si tota eius substantia secari contingit: porro in eius collo non pauca salutis relinquitur spes: est enim vesica vrinæ receptaculum, duabus tunicis contexta: quarum exterior à peritoneo orta, multum nervosa, ac sensu prædita est: interior verò crassior, & omni fibrarum specie contexta, præsertim obliqua, ne continua vrina, intemperatiorque excretio fiat, eius collum musculis plenum, ac carnosum est: quare vulnera in illud illata, sæpe sanantur, cum profectò quotidie sanari videamus, cum lapides à vesicæ, secto collo, extrahuntur.

De Renum lēſionis cognitione. Cap. VIII.



**S**I vulnus a in renes penetrauerit, vrina cruenta, aut eius loco cruor fertur, nonnunquam penitus ſupprimitur: inde patientes tumidi facti moriuntur: dolor ad inguina, teſticulosque deſcendit; ſed vnum ſignum potiffimum erit nobis, hoc indicat, locus ipſe. nam vulnus in dorſo, raro verò alibi, ſub ſpoadylis, & infra coſtas veras, paululum ſupra ſpurias inſiguitur. cum verò eorum ſubſtantia, quæ denſa eſt, ac ex ſolida carne procreatur, ſolum vulnus patiat, interdum ſanari poſſe, ſed vulnere altius penetrante non niſi laborioſe, ac magno cum diſcrimine ad ſanitatē perducitur. ipſis enim b vterque pori, qui meatus vrinarij, & pori vridices vocantur, firmè alligantur, ac venæ cauę bini rami, ac inſignes, pariter magnę arteriæ duo vaſa, quę emulgentia dicuntur, illis annexa ſunt, per quæ renes c vrinam a ſanguine ſecernunt. ſanguine aquoſo nutriuntur, & ferè conti-  
nuò, aut ſaltem aliquando moriuntur, quę omnia, aut nullam, aut tardam curationem faciunt, & quia prope cauam venam ſiti ſunt, paululum ſub iccinore, vulnera penetrantia ac valdè anguſta, quę in dorſo, & in eorum regione occurrunt, admodum timenda ſunt.

a ¶ Hipp. 4. Aph. 75. Celi. 5. c. 26. Aet. lib. 1. c. 16. 18.

b ¶ Gale. 16. de viti part. 6. de aggr. anas.

c ¶ Hipp. lib. de viti. nat. Ari. 3. de par. an. c. 3. Gal. 6. de aggr. anas.

De Læſi vteri cognitionibus. Cap. IX.



**C**UM vterus, ſive matris percuſſa eſt, dolor in inguinibus, coxis, & ſcromoribus ſuboritur, ſanguinis pars per naturalia deſcendit; febris e & vomitus bilioſus inſequitur: quædam obdureſcunt, quædam mente labuntur, & quædam ſui compoſes ſunt, ſcruorum, oculorumque dolore vteri ſe conſentunt; vulnus in fundo ventris exiſtit, morientesque tandem eo modo, quo quæ corde patiente, moriuntur.

d ¶ Cel. 4. c. 16

e ¶ Hipp. lib. de mod. maluer.

De cauæ venæ, ac arteriæ magnæ vulneratæ prædiſtionib. Cap. X.



**S**ANCTI, qui a magna, ſive cauâ venâ, quam Græci chilin vocant, per quam totum corpus nutritur, cum vulneratur, eſt, non valdè purus, ſed ſaris niger & copioſus, cum extremorum frigidityte, & ſudore glaciæ modo, pulſum imbecillitas, animi deſectus, & ſubita mors ſubſequitur. Sed, cum magna ſecatur arteria, ſanguis ſpirituofus, floridus, aut iuber, & copioſus emanat, quem de neceſſitate ſubita iam ſequitur pernicies. Haſ ſæpe iudicamus læſiones, ſi vulnus aut in dorſo, aut alibi profundè, his apparentibus ſymptomatibus, penetrauerit.

A D D I T I O.



**R**ADITIONES, quę thorace, ac infimo ventre vulnerato, occurrunt, diuerſimodè ſumi poſſunt, nempe a ſede aſſectæ, vt ſupra explicauimus; interdum f a virium robore animalium, vitalium, & naturalium. nam mente conſtare, ac hilari animo ſe habere in omni morbo, bonum, vbi verò virium apparet inopia, laborandum non eſt: ſiquidem natura s omnium opifex eſt, nec dicus verò miniſter. excrementa autem omnia in quali & quanto bene diſpoſita, futuram præſagiunt ſalutem, b præcipuè verò puſiſſum: quæ verò c contrario modo ſe habent, peſſima iudicantur. In vniuerſum d dictum eſt: Morbi tempore breuiſſimo finem attingentes, facillimè dignoſcuntur, vt potè infirmi, qui ad ſanitatē tendunt, faciliè ſpirant, dolore non affliguntur, dormiunt noctu, quietè viuunt, cibum appetunt, ſiti nō moleſtantur, ſi qua febricula eſt, quicquid, & eorum facies ſibi propriam effigiem ſeruat, atque etiam (ſic licet, quod ille medicus plures ſanat, in quo plures conſundit, & ſanitas tantus, ac citius cuenit, ſi medici, rationales, experti, patientes, & beneuoli ſuerint.

f ¶ Hipp. 1. aph. 16. Gal. lib. 2. par. med. ca. 87. & 9. meth. 1. c. 1. 4. c. 1. 2. c. 2. h ¶ Hippo. 1. de morbis pop. 2. aphor. 33. i ¶ Hippo. 1. par. ſag. c. vlt. Celi. lib. 2. ca. 8. Gal. 1. de diff. feb. c. 8. Aet. 3. 4. c. 1. cap. 5. 1. c. 3. cap. 1. i ¶ Hippo. 1. par. ſag. c. 10. Celi. lib. 7. ca. 3. Gal. 1. de crit. 1. 4. Pan. lib. 3. ca. 3. l ¶ Celi. lib. 3. cap. 4. Galen. 3. meth. cap. 4. m ¶ Gal. lib. 2. par. med. ca. 91. 1. 2. c. 10. c. 16. & 4. meth. ca. 1.

De Inſimi ventris ſimplicium vulnerum curatione. Cap. XI.



**A**FFECTVS in ſoluta continuitate, qui infimo ventri occurrūt, vel alteri morbo, aut diuerſo ſymptomati, vel propriæ cauſæ minime aſſociantur, vel quia ad viſcera, & cauitatem non perſtingunt, ſub ſimplicium vulnerum latitudine a medicis numerantur, vnaquæ ſola, ac ſimplici in eorum curatione egent indicatione; dictum m ſane eſt, quod in omni vulnere diligenter attendere oportet, & ſimplices aſſectus a compoſitis diſcernere, cū ſimplici morbo ſimplex adhibenda curatio ſit, compoſito verò non ſimplex. Continuitatis ergo ſimplex ſolutio, quæ huic loco contingit, intentionem quidem vnā tantum requirit, partium videlicet vnionem, quæ in paruis ſaſcia tantum duplici modo conuoluta fieri ſolet; in magnis verò vt hæc firma, ac ſtabilis exiſtat, & alligatio cogens in vnum, quæ diſtans, & ſutu-



re, & fibræ vitæ sunt; ac prius suppresso sanguine sic vniuntur, ac vnitate conferuntur. inde barbaro  
 medicamentum, aut aniceto, vel nigro adhibito, conglutinationi studere oportet. Solent enim huicemodi vulnera, si rectè tractantur, rore proprio, ac elementari faneſcere: verum si in corpore mali habitus, aut vbi virium confluentis sanguinis abundat, tale vulnus acciderit, non simplex vulnus, sed cacoethes, & difficilis consolidationis iudicabitur, quod & etiam ratione legi sitis aduenire solet. nam locus illorum scdus minus timendus est, quam si rus albhere, siue aluorati, vt Arabes dicunt, aut suminis, vt Latini, quod medium corporis est, vtriusque lateris mensura quatuor digitorum ab alborati, id est vmblico: ibi enim lacertis, tendones, & venæ, ac arteriæ multæ notabiles locantur: communiter verò ex non penetrante vulnere, nec leue, nec timidum præſagi adducendum est: non graue, quia nulli mortis periculū sequitur, nisi æger, aut puer, aut decrepitus, aut valde timidus fuerit, vel praua medici curatio subsequatur: nō leue, quia abdominis muscoli, qui octo sunt, ad thoracis motum, ac ad feces expellendas continuò mouentur; vnde conglutinationis aliqua sequitur difficultas, & inflammationis suspicio, præsertim cum homines crebrò à facibus expurgandis stimulentur, & illorum musculorum prætensiones sequantur. Siquidem dictum est, eas sectiones timendas fore, quæ laceratorum capita offendunt. à qui bus tendones originem trahunt: quæ dolores, febres, inflammationes, & conuulsiones subsequuntur. At vulnera, quæ alicuius magnitudinis sunt, eodem modo regenda sunt, quo & alia carnosæ, & simplicis regi debent, nempe sutura, si decet. nam ventris partes ligaturæ vix admittunt, in ima parte orificio dimisso, in quo suppresso sanguine, per quatuor dies lichinia mollia medicamento ex terebinthina, thuris cortice, mastice, & oui luteo parato imponantur, & puluis super suturam inspergatur ex mastice, bolo armeno, dragantis, & myrrha: & superposito emplastro barbaro, fascia membrum commodè auoluatur. & si vulnus hoc pacto non agglutinetur, curandum erit, vt in sequentibus paulò post dicemus.

## De Infimi ventris compositi vulneris cura. Cap. XII.

Vm de vulneribus simplicibus, ac eorum curatione, satis abundè dictum sit, nunc de eis, quæ composita sunt, tractare instituiamus; & hæc talia iudicantur, quæ secundum variam eorum compositionem variis etiam egent indicationibus sanantibus: quippe si cum alio morbo, veluti inflammatione, coniungantur, ab inflammatione ipsa, vulnere non neglecto, indicatio curatiua primò sumi debet: agnoscat verò inflammationis naturam partim colore, partim tactu, & partim laborantis sensu. partium enim, quæ cum aliquo inflammationis genere vulneratae sunt, eodem sensum inflammationis est: si autem cum prauo aliquo symptomate complicatur, prout loci intemperie, aut dolore, symptomati prius diligentiam adhibeto, dyacrasiam ad contrarias qualitates alterando, calidiorē, quam pars sit carnis, habitum refrigerabis, & frigidiorē calefacies, nam quæ per intemperiam aliquam a naturali habitu recesserunt, eorum sanationem per eam, quæ contraria virtus sunt, firri omnino est necesse. Vbi ergo intemperiei affectum iam sanaueris, deinde vulnus ipsum sanabis. Si vero cum propria causa complicatur, procatarractica nempe, & quæ extrinsecus venit, sicut sagitta, gladius, aut globulus, siue plumbea glans, quæ stat sub causâ coniuncta, & morbum ponit in actu, tunc quamuis à nullo eorum, quæ adhuc non permanent, indicatio sumi possit, prima medici actio est illuc eam tollere, si tolli potest, & id prima die vt efficiat, suademus. quod si vel imperitia, vel alia ratione fuerit omissum, non ira facilis deinde illam tollendi dabitur occasio, siquidem iam erit vulnus sensibilibus redditum, & angustius effectum, & inflammationis initium aliquod apparebit. Si vero difficultatis causa fuerit sanguinis fluxus, aut mali succi descensus, huic resistere oportet euacuationibus, remotionibus, ac topicis medicinis. Sic enim ad hunc modum caro, aliæ carnosæ quæpiam pars, quæ fluxu humoris ob imbecillitatem aliquam affligitur, sanari poterit: ad eundem modum, si aut alterius cuiuslibet particule occasione, aut etiam totius corporis, cum in eo sanguis, malitè succi redundans, vitiosum aliquod vulneris partibus influxerit, medendum prius est vel ei, quod fluxus est causa, vel etiam toti corpori, deinde non aliter planè vulnus curari debet, quam si citra accidentia incidisset, porro dolores, cum sub duplici genere causarum continentur, videlicet subita temperaturæ mutatione, solutioneque continuatæ, tolluntur, malam temperaturam immutando, doloris causam euacuando, solutioneque continuatæ, tolluntur, si superius copiosè explicauimus, dictum est enim: si simul duo concurrant morbi, ab eo incipiendum est, qui vnum horum trium proprium habet, vbi non possit sequendum curari, nisi curetur ipsemet, vt apostema, & vulnus, vbi alter alterius fuerit causa, vt febris & opilatio, vbi alter altero affectu periculoso fuerit, vt febris, quæ continens dicitur, & resolutio. Ex quia de his indicationibus alibi sermo satis abundè factus est, hæc sufficiant, cum verò vulnus ob eius penetrationem inter compositos morbos enumeratur, soleris medici est, quamprimum indagare, nunquid aliquod viscum prolapsum appareat, aut scdus fuerit, propterea quod ad eum effectum noscendis, qui omnino toto rationem, tum sensum lateat, sæpe cogitur de affectu sede, & externa causa aliquid inuestigare, aut eorum propria accidentia animaduertere.

## De Egresso omento. Cap. XIII.



**N**ATUS abdomine vulnerato, si omentum leditur, quia \* membrana est seposita, & adipis naturam continet, nullum habet proprium symptoma, quo dignosci possit: nam nec dolore afficitur, nec sanguinis copia ab eo emanari solet. Ipe <sup>b</sup> tamē vulnerato peritoneo, subinde excidit Zirbus, quod membrū Græci epiploon, Latini omentum, Arabes Zirbum, & vulgus reticellam vocat, ex duabus tunicis à peritoneo ortis, densis, & tenuibus sibi ipsis incumbentibus, ac quā plurimis venis & arterijs parvis, ac pinguedine non pauca constatum est, à ventriculi fundo originem ducit, & super omnia intestina extensum longissimè protrahitur. cū verò tale membrum è vulnere exierit, album, pingue, venosum, ac prætenue, expedit mdagare, nunquid aliqua eius portio nūcula ferro rescanda sit. nam dictum est; \* Si omentum excidit, necessariò putrescit. ergo si nudatum extra peritoneum fuerit, non contingit ipsum sanum in propriam sedem reponi, & saluum fieri, quia <sup>d</sup> si minimo nudetur tempore, putrescit: quare omnes medici \* partem illam, quæ nudata est, ac alterata, rescandere iubent: quippe membrana hæc nec primaria, nec ad vitam necessaria est, nec potest ex sanguinis vasorum, quæ in eo continentur, profusione hominem interimere, atque minus si rectè ante sectionem laqueo præcingitur, nam dicebat Galenus; <sup>f</sup> Nos verò, quoniam scimus Zirbi substantiam compositam esse ex pelliculis, siue tenuibus membranis, ac arterijs, venisque quamplurimis, quorum initia ex maxims orta sunt, sanguinis quidem profusio cauebimus; proinde id, quod supra nigricans positum est, vinculo excipimus; quod post vinculum est, amputabimus, curantes, vt vinculi fines extra vulnus pendean, quo nimirum faciliè eos, cum ex vulnere suppurante euomentur, accipiamus: ergo cū denigratum, aut liuidum factum sit, tunc nulla ratione reponendum est, sed hūcā partem totam vsque ad albam, & synceram amputare decet, sed prius pars sincera & sana, quæ in continuo est alterius denigrata, laqueo, aut lineo, aut serico obducatur, diligentia prius adhibita, an parum temporis, vel multum sit, quo omentum egressum fuerit, & si nullam acceperit mutationem, & album appareat, illico ipsum in propriam sedem reponemus, leuiter ac blandè manibus propellendo, ac successiue paulatim impellendo, donec ingressum fuisse percipiat. id celeriter fiat, & si manibus fieri nequit, ob vulneris angustiam, cerea candela vt necesse est; verum, si aliquantisper refrigeratum omentum nouerimus, vino tepido, aut aqua decoctionis camomillæ, & betonicæ foueatur, donec calefact, & molle fiat, tenui ligendo (sapius decocto prædicto madefacta; aut syringotomo ad fistulas secandas accommodato, vulnus parumper dilatetur, cautè tamen, ne intestina lædantur, multi verò delaqueatam partem prauo colore affectam, rescandere solent ferro, aut auro ignito, & sic id, quod de sano remanserit, cauterizant, vt tota absumatur corruptio, ac sanguis supprimatur, & affectum membrum corroboretur. alij, Galenum sequentes, cauterium spernunt, asserentes Galenum nullum quidem verbum de eo dixisse, & nos nunquam cauterio vtimus, ob id, quia quod corruptum est vni cum filo, temporis tractu commodè educi potest: attamen quomodocunque intro ducto omento, vulnus, si amplum fuerit, suarum, parum foraminis relinquendo, per quod filum extra pendeat, & materiae continuo expurgentur: vulnus verò perpetuo rebebinthina adu calida regatur, donec laqueum putrescens exierit inde glutinantis, ac abstergentia applicare oportet, quouque vulnus perficere coierit, & cicatricem induxerit. Quibus verò <sup>g</sup> vilcus hoc extrastrum fuerit, omnes infeliciter concoquunt, & plurimis egent fomitibus. Nec de abdominis futura vereri oportet, ne sanguis, aut alter ichor intus seruetur, ex quo postea praua subsequantur symptomata; quemadmodum superius de thorace dubitauimus. nam si in infimo ventre materia aliqua recluditur, ea quidem ad bubones, & inguina, tanquam ad proprium emundatorium, transmittitur, & ibi tumorem excitabit, qui postea in abscessum conuerteretur, & talis materia postmodum sub sanici latitudine commodè euacuari potest.

## De Prolapsu intestinis. Cap. XIII.



**P**ROLAPSUS abdominis, vt profundè abdomen vulneretur, intestinis illariss, sed exterius prolapsis: ob id quamprimum manifestantur, si valida fuerint, statim <sup>a</sup> vino albo tepido abluantur, & intus locentur. nam si tuncleant, non facilius eorum erit intromissio: id pariter evenit, si multa fuerint, aut diuerso modo alterata, aut vulnus valde angustum. Cum ergo excirari, nisi illis cuiò auxilium præstetur, & intus reducantur, verendum est, ne inflammatione infestentur, aut subortis in eis stacibus tumida reddantur, & per angustum callem ingredi nequeant: etiam maius vulnus fuerit, tū plura necesse est intestina excidere, ac difficilissimè intro mitti: parua quoque vulnera tractatu sunt difficilia; nam nisi quod præcidit, illico in locum suum reponas, inflammatur, surgitque in tumorem. Minus igitur graue in huiusmodi vulneribus mediocre foramen est, quo <sup>b</sup> cuenit, vt pro huius effectus curatione quattuor requirantur indicationes; Prima, vt intestina, quæ exciderint, in suam sedem

a <sup>1</sup> Arist. 4. de par. animal. c. 3. Gal. 6. de egresso. b <sup>1</sup> Gal. 6. de egresso. cap. 4.

c <sup>1</sup> Hipp. lib. 7. de morbis lib. de Coac. p. 100. & 6. aphor. 5. d <sup>1</sup> Gal. 6. aph. com 1. h.

e <sup>1</sup> Cell. lib. 7. c. 16. 11. Gal. 6. de egresso. cap. 4. Paul. ph. 6. cap. 31. Rasis. 7. ad Alcap. 1. Anic. 4. cap. 7. Al. lib. 1. c. 27. f <sup>1</sup> Gal. 6. de egresso. cap. 4. in fine.

g <sup>1</sup> Galen. 4. de v. par.

h <sup>1</sup> Cell. lib. 7. cap. 4. i <sup>1</sup> Gal. 6. de egresso. cap. 4. Paul. lib. 6. c. 31. Rasis. ad Alen. c. 3. Anic. 4. c. 7.

k <sup>1</sup> Gal. 6. de egresso. cap. 4. Anic. 4. c. 7.



10 spiritu circumdata. porro cum secta tantum fuerint, crassiora nempe, & in conspectu venerint, expressis aliunde fecibus, variis futuræ modis vniiri solent, cum ratione modi, tum ratione materie, & instrumenti. Ratione modi, nam aliqui duplicatis intestini labris per punctum, quod aliud sequitur, vulnus consunt, compaginato hic sciendi modus ab aliquibus vocatur: ab Aueniena vinculum dicitur: miniliter verò vulncris, oras leuiter digitis, vel etiam hamulis membranae interiori inieciis deducere debet: hic quidem modus, quia difficilis admodum, nec sine periculo iudicatur, non multum à medicis probatur, quare multi per huiusmodi, quo cetera carnosia vulnera vniuntur, sunt, nec etiam hic securus creditur. nam huiusmodi, quas Græci ancieras vocant, faciliè relaxantur, aut marcescunt: nonnulli vero, & rectè pellionum futura, id est pellium artificum more, quo pelles adinuicem nungunt, aut quo sacci, ceteraque similia fiuntur, vulnerata intestina consunt. Ratione materie, quæ id agi debet: aliqui seniorum a filo serico utebantur; sed quia fecat, ac dolores inducit, hoc tempore improbat. Recentiores verò a filo lineo molli, & æquali, aut simplici, aut duplicato, quod optimum, ac in quotidiano vsu seruatur, vti soliti erant. tale multum à Galeno probatur, nempe quod minime putrescibile est: & Romæ vilissimè venditur, & filum Galetanorum dicitur. quidam verò eorum, qui experti sunt (vt retulit Albucasis) labra vulneris magnarum fornicarum capitibus inuicem coniungebant, quæ cum proprio rostro vulneris partes essent amplexæ, ac eas perforassent, amputabant, credentes tali vinculo eorum contiguitatem permanere posse: alij ex tenui alicuius animalis intestino rem filo similem formabant, & cum ea intestinorum vulnera consuebant. Isti profecto futurarum modi non sunt nisi secundum fiduciæ, & spei viam, absque vlla operationis certitudine. Fornicarum vsus multis non placet, cum nec semper, nec vbique reperiantur, ac breuissimo tempore putrescant, & procidant; & cum earum capita amputantur, statim apprehendendi, ac retinendi facultatem amittunt, quare inutilis hic modus est, nec animalium intestina probantur; siquidem, cum ab humido intrinseco, ac innato calore fibræ illæ aut relaxantur, aut putrescunt, & rumpuntur, vel saltem vulnus putridum reddunt: præclarissimi verò nostræ ætatis aliqui medici membranulam hædi præparatam accipiunt, in qua publici scriptores, quos notarios vocant, hominum testamenta conscribunt, & ad tili celsigiem minutissimè incidunt sic, vt acuum cautitatem ingredi valeat, eamque tepido vino humentant, ac mollem reddunt, & sic eo modo, quo pelliones pelles, huiusmodi vulnera consunt: quidam, a vt, intestina extensa maneat, & conferuntur, ac interior vulnus excisetur, & forces facillimè descendunt, sambuci fistulam in intestino locare excogitant, ibique relinquere, & desuper futuram facere: alij animalium intestina accipere tentant, moderateque inflare, & exsiccare, vt, cum opus fuerit, aliquam eius partem loco fistulæ sambucinae imponerent; multi vtriusque loco anserum tracheas more dicto præparant, & vt prædictæ quæsequantur vtilitates, administrant: quas omnes operationes, viris doctis, ac in hac medicinæ parte eruditis, considerandas relinquimus. hi verò, qui ex cæcitate insequuntur, ac in maritimis vehiuntur clasisibus, valde negotiosi, & multum in chirurgia exercitati, non tantum crassiora, sed & tenuia intestina vulnerata consunt, afferentes perarò, nisi in valde latis vulneribus, hoc opus illis feliciter occurrisse, nam per angustum callem crassa exire nequeunt; iubent tamen vtrunque consueundum fore: crassa namque cum crassioris naturæ sint, glutinari possunt; tenuia demum, & si aliter credat Galenus, conui debent, & omnia experiunda. nam si consuta non conglutinantur, quomodo non consuta conglutinabuntur? igitur & gracilia vulnera si exciserint, consueunda sunt acu subtili, & cui, & rotunda, & filo lineo, forti, subtili, & æquali, non fibulando, sed eo ordine, quo sacci, & alia communiter consui solent, ac breuia sicut puncta. filum verò propè intestinum secari non debet, sed vtraque pars eius extra vulnus pendeat, vt cum putruerit, extrahi possit: postremò vino albo odorato, & tepido intestina abluantur, & super vulnus medicamentum aliquod altringens & glutinans (veluti pulvis ex aloë, masticæ, draconis sanguine, & mumia) aspergatur: inde commodè reponantur, & si difficilis eorum fuerit restitutio, ea adunguè obseruentur, quæ superius explicauimus: exterius vulnus absterगतur vino mellitide nigro, & homo in molli culcitra reponatur, vt dorsum æqualiter gibbò fiat: interdum etiam coxis erectioribus, vt singula intestina in suum locum deducantur, & retineantur: & animaduertendum est, vt nullum reliquorum super la, quæ intus deciderint, comprimantur incidat. Omentum denique consideretur, ex quo si quid iam nigri, aut emortui fuerit, laquo præcingatur, & forcipe excidatur.

DE SECYVDA INDICATIONE.

*Quæ quomodo abdominis vulnus aliquo vniiri debeat ingenio, demonstrat. Cap. XVII.*



DOMINIS futuram, ac rectam eius vniionem, quam Græci gastroraphian vocant, multi fariam, multisque modis veteres medici exercabant: veruntamen ante omnem consuetudinem quinque dubia in medium adducebant: nempe si diuisum abdomen tam altè sit, vt intestinum ex eo procidat, & quemadmodum id reponere conueniat: & si omentum exciderit, abscondendum ne id sit, an non: & an vinculo id excipiendum, an securus: & an sciendum vulnus sit, necne, & si sciendum sit, quæ ratione sciendum: postmodum per omnem operationem

11 Celsi lib. 7. cap. 16. Gal. 6. methica. 4. Pauli 6. c. 12. Ratin. 7. ad Al. cap. 3. Auen. 4. c. 17. Albuc. 3. c. 17.

nem quinque media, veluti opportuna instrumenta, sibi præparabant, quorum primum ministri condi-  
tio est, qui operanti medico auxilia præstet. hic enim prudens, expertus, ac audax esse debet: secundum  
est acum: qualitas in longitudine, crassitie, numero, & formatum est sibi conditio, quo partes vni  
debet: quantum est suture profunditas, numerus, & modus: quintum est punctum distantia, ac coru  
conseruatio: Ministri nihil agunt, præter quàm 9 manibus partes vulneris ad unctas conseruant, paula-  
tim illud detegentes, donec gradatim confusio compleatur: quod verò confusitur, altera manu teneat-  
ur, stringiturque perpetuo sic procedendo, donec opus finiatur. quod faciendum est, auctore Hippo-  
crate. \* cuiò, tuò, lætè, & sine dolore. verum, si expedit, in ima parte spiraculum dimittatur. Acus verò  
in affectibus mirach, triangulata esse debet. talis enim ad faciliorem penetrationem magis prona à Cel-  
so, & Albucasi indicatur, in grossior mediocri. nam subtilis in re dura frangitur, & crassè difficilis  
ineroitus, ac laboriosè penetrationis existunt. in numero, plures sunt, nam operando vna tantum aut  
amitti, aut frangi posset. longitudo saltè sit vnus digiti, & forma aliquantisper curva. sili substantia ex  
lino sit, subtilis, duplicata, & æqualis: quæ si plus, quam deceat, de sior fuerit, curum proculdubio scabiat,  
si mollior, motu ventris frangi posset prius, quàm vulneris extremitates coeant. Sutura profunditas  
mediocri probatur. nam si acus in extremo cutis mittatur, profectò scindetur: si in profundo, extrema  
solidari nequeunt: interuallum ergo, quod singulis acus traiectionibus interuenit, quod ad compescen-  
da pertinet ea, quæ subsunt, breuissimum esse possunt, quod verò ad firmitudinem ipsius cutis necubi  
rumpatur, breuius parum tura est. Quare vtriusque excessu eligenda mediocritas est. Hi om-  
nibus denique præparatis, resupinato homine coxis erectioribus, vbi aer ad temperiem vergat, ac re-  
positus inestinus vultus abdominis consueundum est. Et quia opus tale multipliciter celebratur, primò  
quid de eo dicat Celsus, audiamus. \* In duabus acubus sula coniicienda, eaque duabus manibus tene-  
da, & prius interiori membranae suture iniicienda est sic, vt sinistra manus in dexteriore ora, dextra in  
sinisterrima à principio vulneris orta, ab interiori parte in exteriorem acum immittat, quo sit, vt ab in-  
testinis ea pars semper acum longè sit, quæ retusa est, semel vtraque parte traiecta, permittenda acus  
inter manus fuit, vt ea sit in dextra, quæ fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra continui-  
terumque eodem modo per oras immittende sunt, atque ita tertio, & quarto, deinceps permittatis in  
ter manus acubus includenda plaga est. post hæc eadem sula, eademque acus ad cutem transferenda: si-  
milique ratione et quoque parti vtraque suture iniicienda, semper ab interiori parte acubus venientibus  
inter manus traiectis. dein glutinancia iniicienda, quibus etiam spongiam, aut succidà latam acro imbū  
tam accedere debere, manifestum est: impositis his leuiter venter deligari debet. Galenus \* verò tripli-  
cem suendi rationem proponit, & cum primam describeret, ait, Quoniam coire, coalescereque cum pe-  
ritoneo oportet abdomen, incipiendum quidem à cute est, atque ab externo introfusum acus iniicienda:  
vbi verò tunc cutem, tum rectum musculum totum traserit, præterito, quod ei subest, peritoneo, per  
reliquum peritoneum, eam ab interno extrorsum iniicies, atque inde per reliquum abdomen transmi-  
tes; vbi hoc penitus traserit, rursus ab externo introfusum idè abdomen est perforandū. Mox vbi peri-  
toneū, quod illi quoque sublyret, præterieris, atque ad contrarium veneris, hoc quoque ab interno ex-  
trorsum perungendum, vnaque cum eo totum ipsi coniunctum abdomen. Deinde ab hoc rursus inci-  
piendum, atque id cum contrario peritoneo consueundum, ac rursus vicina quoque cute transmi-  
ssa, iterum ab ea parte acus introfusum est iniicienda, consueundumque abdomen id cum contrario peri-  
toneo, etiam inibi vicina cute transmissa. Atque hæc iterum, iterumque facièda, quoad totum vultus  
similiter consueuerimus: sed quia opus hoc difficile admodum est, vix enim cum abdomine peritoneum  
coalescere potest, utpote hoc nervosum, illud verò carnosum est: præterea quomodo, nisi in valde ma-  
gnis sectionibus, hoc peregerint antiqui, imaginari non possumus. Secunda suitionis ratio à Galeno  
descripta illa est, quam multi celebrare soliti sunt, qui quæ cognata nature sunt, ea committunt, vti que  
peritoneo peritoneum, & abdomini abdomen: id in hunc modum fieri oportet, à vicino nobis abdo-  
mine incipere, atque ab externo introfusum per id tantum acum transmittere. post præteritis vtrisque  
peritonei labris, ex aduersa parte, ab externo introfusum, per vtrumque eius labrum acum reuocare: de-  
inde rursus hanc reuocare, atque ab interno extrorsum per aduersum abdomen trajicere. Tertia abdo-  
minis suture illa est, quæ ab omnibus communis, & in promptu iudicatur, & fibulario dicitur, in qua  
vno adactu, quatuor margines apprehenduntur, id est per quatuor labra acus transmittitur: vnde peri-  
toneum intra abdomen prorsus absconditur, & id hoc tantum à secunda variare solet. Tres hi suture  
modi describuntur pariter à Paulo, & Auicenna, qui vna cum Albucasi, secundam suendi ratione magis  
approbant: qui dissidentium partium coniunctionem, ac orarum adductionem diuerso quodam  
modo assequi videtur, quem in mirach vulnerato nullibi inuenire adhuc potuimus, sed bene in labris  
scissis, quæ isti leporina vocant, inquit Albucasis. Accipias acum, aut numerum acum secundum qua-  
ritatem amplitudinis vulneris, deinde dimitte ab extremitate disruptionis quantitate digiti annularis,  
& fige acum vnam, præter quod intro mittas in eam sulum in duabus extremitatibus cutis, cum duabus ex-  
trematibus siphac, quod est sub cute ab exterioribus, donec facias eam penetrare ad altiam partem, &  
hoc pacto iam aggregasti duas extremitates cutis, & duas extremitates siphac, & sicut quatuor ordines:  
deinde stringe cum hlo duplo in circueu acus aliquoties à duabus partibus simul, quousque sint aggre-  
gata

Epide-  
m. Gale. 14.  
meth. cap. 13.

Lib. 7. c. 16.

14. meth. c. 4.

10 gata duo labra vulneris aggregatione decenti; deinde dimitte crassitum digitum etiam, & sige in eis acum aliam: postea si inge ea cum hilo, sicut fecisti in prima acu, nec cesses facere illud cum eo, quo indiges, ex acubus, donec compleas contrictionem vulneris totius, & sint acus medix inter crassitum, & subilitatem, quoniam si bules valde, eam veloxiter secant, crasse vero sunt difficili introitus: nec figurat acus in extremo cutis, ne scindatur, & vulnus aperiatur; nec profundè, ne consolidatio prohibeatur: deinde incide extremitates acus, ne la dantur infirmi apud fornium suum, & pone in eis pulvillos ex panis ab omni parte, qui cooperiant extremitates acutum, & dimitte eos, donec scias, quod vulnus iam eo solidatum fuerit: & hęc species suturæ (ait Albucasis) convenientior est in vulneribus parvis, quando sufficit in eorum sutura acus una, aut due, aut tres ad summum. Alterum suturæ modum describit de mente Galeni Albucasis, qui verè nunquam illum excogitavit, & inquit: Rectificatur sutura ventris cum 20 duabus acubus, quod est, ut intro mittas in eis utrisque filum vnum, & incipe eum intro misionem ex eo, quod est apud te, & fac eam penetrare usque ad latus aliud secundum eos, qui coria sunt equaliter. Recentiorum verò aliqui talia vulnera eo modo suere consueverunt, quo furores caligas, aut alia indumenta consuunt, & simul adiungunt. Alij eo communi videntur modo, quo omnia, ut facci, & similia sunt. Nos autem ea sutura semper uti soliti sumus, quæ simul vno tempore quatuor extremitates, duas nempe abdominis, & duas peritonci, si eas habere possumus, aggregat, & is verè modus tibulidi est, & non ille, qui hianulis celebratur: servamusque in hac tibulandi ratione, ut inter tibuli, & tibuli vnius minoris digiti distantia relinquatur. Talis postremo sit suturæ profunditas, ut tota abdominis compositio perforetur, & talis vniò conservetur, ut dictum est, ne si rumpatur, inde hernia intestinalis sequatur.

### DE TERTIA INDICATIONE.

*Qua quomodo oportuna medicamenta extrinsecus applicanda sint, manifestat. Cap. XVIII.*



40 **Q**UAMPRIMUM abdominis sectiones equaliter fuerint aut sutura, aut tibuli, aut vinculo duobus initijs circumdario adiunctæ, medicamenta, si opus fuerit, quæ sanguinis fluxum constringant, applicentur; si verò non, quæ cruentis vulneribus accommodantur. talia à Græcis enigmata & emplastica, & à Latinis glutinamenta vocantur. quorum facultas est, diuisas partes coniungere, glutinare, quælibet sunt \* emplastra barbara, aut ea, quæ à filulo colore cartha, & phæa dicuntur; ea etiam, quæ ex biumine & aceto constant, enhamæ barbara à medicis etiam viciantur, valent in exercitiis, & duris corporibus; verum si mulieri mederis, pueroræ, aut denique corpori, quod mollis sit carnis, quod ex chalcite sit, nostri diapalmam vocant, satis idoneum medicamentum fuerit: si verò hæc medicamenta non adsunt, usque ad quartam ad minus glutem albocin, siue resina terebinthina summopere probatur, præsertim si tendines, aut laceratorum extremitates lædantur, expeditque pulvere aliquo tibulationem sicando à putredine præferuare; postmodum agglutinantia adhibeantur. Quod verò inter bubones & axillas est, id totum primis diebus molli lana oleo mediocriter calido imbuta circumdare solent; tale verò si rosaceum, aut masticeum fuerit, magis prodesse poterit. deligatio etiam in his summè est necessaria, quæ vulnera fundum, & 50 ora equaliter contineat, ac sine dolore arctet, saniem fluere permitens, prodest quippe quod circumijciatur, neque molle nimium sit, & algæ ritu fragile, quo videlicet turo contineat, neque rursus ita durum, ut premendo offendar, cum verò ipsa circumductio nec ita laxa sit, ut nihil efficiat, nec ita vehementer, ut dolorem exciet. Hoc si feceris, fueritque vulnus solum sine vicioso succo, aut aliquo fluxu, aut interperie, aut inflammatione, aut alio quouis internorum vitio, proculdubio sanabitur: at si ob sui magnitudinem id fieri nequeat, ut disiunctæ ipsæ partes exactæ ad imum usque sibi coniungantur, videlicet nec sutura, nec tibulus, nec deligatura pertingere ad eas valente, vel etiam sanies iam illic fuerit collecta, vel dolor quispiam adiunctus; huiusmodi vulnus ex sola partium commissione, & exitus tantum applicatione agglutinari omnino non potest, quare id agendum est, quod in composito ventris vulnere utile fore explicauimus.

### DE QUARTA INDICATIONE.

*Quæ viscera à nocuentis præseruare, & affecta curare demonstrat.*

*De sectis intestinis. Cap. XIX.*



**S**I aliquod intestinum sectum fuerit, quæ extrinsecus fieri debent, omnia similiter peragenda sunt, ut supra dictum est; cæterum quod attinet ad sex res non naturales, acris probatur, qui calidus est, & succus; vicius tenuis sit: cibaria pingua, acuta, & sicut plena dimittantur: abstineat pariens ab omni motu, vociferatione, ira, & Venere; eligenda verò alimenta sunt (si quidem ad cicatricem perducere, aut glutinare vulnus studeamus) cum austeris, & glutinancia,

a Scribon. de-  
med. 107. Gal. li.  
7. de 15. Gal. 2.  
Krasen. Act.  
1. 3. c. 7. Paul.  
lib. 7. cap. 17.

b Gal. 4. me-  
dic. 7. Relat. 7.  
ad Alim. cap. 3.  
Zac. 1. Theophr.  
4. cap. 17.



clinantia, tum quæ minimè rodant. Sint igitur cibaria pauca quantitas, & quæ moderatè nutriant, ne  
 varij augeantur humores, & laces multa, ac duræ procreentur. Et quia pharmaca, quæ per alui edu-  
 ctionem corpora euacuant, conferre non videntur, nullum quidem verbum de eis antiqui dixere; quæ  
 purgamentis medicamentis nullus hic electus est locus, ne excrementa in sedes affectas educantur, &  
 ne a bile vulnus lædatur, & intestinum imbecillius reddatur: verum sanguinis mīlto, cum sit vera, ac  
 generalis indicatio in omnium vulnerum curatione, ac vniuersalis <sup>b</sup> humorum euacuatio, si à basilari  
 oppositi lateris, ac in morbi initio fuerit celebrata, summopere probatur: aliqui tamen per cucurbitu-  
 las, frictions, & extremorum ligaturas reuulsiones laudant; quod opus quantum valere possit, sapien-  
 tiori iudicio remittimus, de topicis, siue localibus medicamentis non mediocriter conducit ad opus,  
 cognoscere in qua intestinum parte vulnus consistat: Siquidem in superioribus, & gracilibus, veluti  
 est duodenum, ieiunum, & ileon, ab epotis medicamentis præsidium petendum est, sicuti à reubarbaro  
 infuso, luto armeno, terra samia, dragaganto, diaspermato, & similibus, quæ ad glutinationem face-  
 re videntur. Si verò in humilioribus & crassioribus, vt est colon, cecum, & rectum, chlyster subijcere  
 magis conuenit. ergo si inferiora patiuntur, in eis medicamenta cum argalia imponi debent, quod in-  
 strumentum Græci contenchitis, Arabes lapsedram, & Latini chlysterem oricularium vocant, cum aliè  
 medicamenta conducant ad ea, quæ in recto intestino sunt, vulnera, etiam <sup>c</sup> per vesicam, cui sit fistula  
 ad finem annexa, aut injicere liquatum medicamentum tepidum licet, idque magis, quia podici pro-  
 pinquum est; at si in intermedijs, ab vtraque parte, eo quia à superiori, ac inferiori loco æqualiter sunt  
 remota. fiat igitur chlyster ex vino nigro aultero, & tepido, aut iolo, aut decoctionis magni cētaurij, aut  
 hypuris, addito melle crudo, aut rosaceo. nam in affectis intestinalibus, si emundare voveris, quæ mo-  
 dicè absterpunt, vtriusque modum munus mel non coctum ceteris præstat; olea verò, ac pinguis, omniaque  
 acuta, & quæ dolorem inferre possent, aliena sunt. Et si aliquis dolor apparuerit, chlyster injiciatur ex iu-  
 re intestinorum, ac pedum verucius, in quo bullierint hordium, folia oliuarum, minoris centaury, &  
 mel absque sale. Si verò vehementiori excitatione opus fuerit, paretur decoctum ex maiori centaury,  
 tormentilla, pilosella, balaustijs, aloë, & mirra lotis. neque enim fas est eiusmodi prædictis instrumen-  
 tis crassiora medicamenta insindere, quamuis humidiora possint: iccirco mediocriter sicca medica-  
 menta, pterunque magis sunt idonea, quam quæ liquabilia videntur. huiusmodi verò sunt crocum, &  
 pōmphi-lis, & aloes, & draganum, & ea, quæ cephalica Græcè dicuntur, in fine verò lemania terra, aristo-  
 lochia, & ircos salubre auxilium esse solent.

## De ventriculo vulnerato. Cap. XX.

40

**V**ENTRICULI siue stomachi vulnera perpetuò lethalia iudicantur, veruntamen  
 verbum hoc, lethale, interdum dicitur de his, qui ex necessitate sunt morituri, ali-  
 quando de his, qui plerumque ob tale vulnus perire solent. ob id de ventriculo  
 vulnerato aliqua datur dubitatio, cum nonnullis in eo sauciatis euasisse affir-  
 mant. igitur cum ventriculus vulneratur, ex proprijs signis diligenter inquiratur,  
 an leuiter, an grauiter, an vtroque modo, an circa fundum, an circa os eius vul-  
 nus consistat. graue vulnus illud quippe est, cum tota fuerit eius perforata substantia  
 leue, cum vel vna, vel altera tunica scissa fuerit. poro <sup>a</sup> atque primus necessariò lethalis est, cum vi-  
 sus illud nervosum perpetui morus, & instrumentum concoctionis sit, sine qua homo viuere nequit. si ve-  
 rò exterior tantum tunica, & ea quidem carnosa, scissa fuerit, salus interdum speranda est: interna au-  
 tem, quia membranosa est, & villis rectis quam plurimis supernè deorsum tendentibus, obliquis verò  
 paucis intertextis, mortis maximum minatur periculū: externa carnosior villis transuersos habet, qua-  
 les continent duæ illæ intestinorum tunice, igitur, tota <sup>b</sup> eius substantia discissa perarò sanatur: quæ  
 verò inferna, & carnosa sunt discisiones, curare cum fiducia tentabimus. nam heri potest, vt & bene  
 cedat, non solum quod partes hæ crassiores sunt, sed etiam quod sanantia medicamenta facile hoc lo-  
 co consistant: at que sunt in ore eius contactu duntaxat medicamentorum in transitu fruuntur, sensusque  
 eius acumen, fatiationi obstat, ac cum primum, aut à medicamento, aut alimento pungitur, dolor maxi-  
 mus excitatur, ex quo & inflammatio sequi potest. Quomodoconque igitur ventriculus fuerit vul-  
 neratus, ab omnibus acerbis, & cibis, & foribus abstinere oportet, sed vtrius cibarijs, ac medicinis le-  
 nientibus, ac mollibus, vt potè sit iobionibus sine oleo, aut pinguedine, & his, quæ ex amilo, terra samia,  
 lemania spargide, lacte cocto, vel quæ melle paucissimo cohesunt. cibi sint euchymi, & cocti faciles, sed  
 victus tenuis instituitur, & flatuosa, acuta, & mordicaria omnia tū inirent, tū extrinsecus remoue-  
 tur. ob id patientibus chondrū exhiberi solet, oriza pariter, & panicū in aqua semel chalybeata decoctū,  
 aut vbi radices consolide, aut fumach, aut myrti, aut rubi summatas, aut pimpinella, quæ mirabilis est,  
 bullierint. Sed quia hæc & nauicam, & vomitū concitant, ea exhibere nō audemus, at primis diebus pa-  
 natellam tantum ex pane loto in iure turturum, aut palumborum decoctam, aut in sola aqua chalybea  
 cum saccharo: verum cum inflammationis suspicio præterierit, caro aliqua concedatur, vitulorum nē  
 pe, aut hædonum ventres, vt ait Auicenna, <sup>c</sup> aceto conditi; & hoc forsitan, quia dictum est à Gale-  
 no,

<sup>a</sup> Hipp. lib. de  
 Venerb. Galen.  
 lib. 5. de cruce.  
<sup>b</sup> Gale. lib. de  
 tang. mēd. Aug.  
 4. ca. 10.  
<sup>c</sup> Galen. de de  
 not. loc. aff. 3.  
 4. meth. c. 7. &  
 5. meth. c. 11.

<sup>d</sup> Gal. 1. de lo-  
 a. li. c. 2. 4.  
 4. meth. cap. 7.  
 5. meth. cap. 11.  
 6. meth. ca. 1. 4.  
<sup>e</sup> Hipp. lib. de  
 fistula Galen 5.  
 meth. c. 9. & 10.  
 Galen. cap. de fi-  
 no Paul. li. 4. ca.  
 4. aloue. lib. 1.  
 cap. 5. & 13.

<sup>f</sup> Hipp. lib. 1.  
 de morbi. li. de  
 Coc. p. 10. 11.  
 Aphor. 1. 1. 2. 4.  
 c. 1. lib. 4. 10.

<sup>g</sup> Gal. 4. aph.  
 c. 1. 1. 1. 2. 4.  
 lib. 4. c. 17.

<sup>h</sup> Gal. meth.  
 cap. 4.

<sup>i</sup> Ant. libro. 9.  
 cap. 17.  
 Paul. li. 3. c. 37.

<sup>k</sup> 1. 1. 1. 2. 4.  
 cap. 14.

- 30 no; Communis omnium internarū partium indicatio est, ut ea eligantur, quae animalis naturę maximē sunt familiaria, siue ea cibi sint, siue medicamenta. Siquidem ab eo dictum est; Quale est vnumquodque membrum, tali ipsum nutrire alimentum oportet. hinc est quod Rasis, & Auicenna dicit, qui cerebri vulnera assignant, aslata gallinurum cerebella concedebant: & huius nutrimenti rationem assignans. Auerroes dicit; Cibariorum, & medicinarum confortatiue illę sunt, quę complexionis membri in tota substantia assimulantur, quare quodlibet membrum comestum comedentis simile confortat & nutrit. Princeps tamen de cerebris aliam reperiri opinionem in fracta caluaria consuevit, neque nos autē sumus vulnera totō cerebro, patientes cerebris, quod nimiam eorum humiditatem, & quia vomitum commouent, nutrire. pariter nec animalium viscera ventriculo vulnerato exhibemus, sed bene montanas aues aslatas, addita cydoniorum masa. vinum verō, si expedit, nulla existente febre, nigrum, sipticum, & paucissimum dari potest, aut eius loco vino cydoniorum cum aqua chalybeata uti licet: & si corporis plethora aliqua apparuerit, vena secanda est, si autem cacochymia, bilis præsertim, corpus sola casta fistula, quę ab Auicenna probatur, euacuetur. verum, quia tale medicamentum, statim, & tormina gignit, huius nonnulli discatoliconem, aut radicem barbam in minutissimum puluerem redactam adiungunt: nos verō huiusmodi corpora, medicinis per os sumptis, nunquā purgare ausi sumus, sed clysteribus, suppositorijs, & à longinquis partibus leuibz frictionibus; serapiū summo mane exhibemus, myrrinum quippe, & rosā cum decocto centaury, consolidā, & æquifiti liquatum, cui sæpe addimus scrup. j. trochiscorum de Karabe, aut de spodio, aut de reubarbaro, aut terram ipsam sigillatim, nec ab re est sapius per diem, aut diaconitē sine aromaribus, aut diadragantem, aut saccharum rosarum assumere. ad fluxū verō secundum omnem modum, his vulneribus suffragatur. Et quia omni ingenio vulneris conglutinationē tentanda est, quę vi agglutinandi prædita sunt, crebro assumentur; ex quibus electuarium de feminibus, siue diaspermaton ad pondus drag. vnus aliquo decocto soluium, vel radicis maioris centaury, quam isti consolidā vocant, aut betonica, aut pentaphyllonis, à nonnullis excellentissimis medicis commendatur; præsertim horas quatuor mane, vespere, ante cibū assumptionem, vulnus verō exterius, si amplum fuerit, suatur; quod raro contingit. nam vulnera huiusmodi ferē semper ab acuto telo causari solent: aut in principio, si expedit, regantur thebimbina lora atq; calida, aut perpetuo vnguento nostro sancto, cui cætera medicamenta cedere debent. interea torus venter, dorsum, & lingua oleo rosato completo, masticino, & camomillino inungantur; & si occasio datur, incarnetur vulnus emplastro barbaro, aut basilicone. postremo cerato ex chalcitide sigilletur. Ventriculi verō vulnus naturę dimittatur, & si amplum fuerit, si potest (ut de intestinis dictum est) consuevit; per autem agglutinationē assumentur, & extrinsecus iniectione imponatur lotio ex vino nigro aultero decoctionis æquifiti, rosę, palmulis, minoris centaury, & melle, aut zupapio rosato. Sed lenientia nostra assumamus, melius esse potest nature omnia committere, quę id facit interdum, quod Medico impossibile est.

De Iecore læso. Cap. XXI.



- 30 Sed et quā plurimę in humanis corporibus reperitur, quę est morbo in solu-  
tura continuate assiguntur, earum nocumenta magna sunt, & pereunt secundū  
plerumque, interdum verō non, sed raro, inter quas Iecur, siue Hepar enumeratur.  
ieri enim potest, ut cum leue in eo vulnus occurrat, saluetur: sed cum vas aliquod  
notabile in eo sectum fuerit, nulla salutis spes remanet, sicuti corde affecto, vbi  
nulla speratur salus, quod ex nutritionis defectu languet, & moritur. Hepatis v-  
erō non solum profundum vulnus in eius fibris factum, sed etiam hbram abscessum  
fanaram fuisse affirmat: attamen si in eo vulnus aliquod illarum alicuius magnitudinis, aut pro-  
funditatis extiterit, aut vena, quę in eius gibbo originem trahit, caua, magna, & chilis dicta secatur, aut  
ea, quę in eius cauo committitur, vena portę nuncupata, inciditur, aut ramus eorum quidam, quorum  
repletur Iecur ob largam eorum sanguinis effusionem, priusquam vulnus agglutinetur, eger necessariō  
moritur, idque magis quia ob alimentī inopiam cor patitur, & sic tandem perit animas, sed non illico  
interdum, cum per longa temporum spacia in huiusmodi affectibus via protrahi possit. Sapius qui-  
dem breui temporis intervallo, ex iccoris percussione multi occumbunt. nam, ut refert Hippocra-  
tes, iucidam Astili, percussio iecore, statim color cadaverum se se sparsit, oculi introcesserunt, mole-  
sta, difficulata ferendi, ac æstusio confecta est, & eadem die vitam cum morte cōmutauit. Alter puer  
à Mulo in Hepate percussus, quarta die mortuus est. Spiritum densum habebat, nec quicquam intellige-  
bat, ac febre cruciabat: ob id cum grauius Iecur læderetur, qui sic affecti sunt, prognosticis, ac presbyteris  
relinquuntur, cum cæterarū omnium hæc affectio periculosissima sit, & modica omnino ægris sit spes  
salutis, & morbus hic à Medicis lethalis iudicatur; attamen leui existente lęsione, ex qua non magna  
sanguinis copia egressa fuerit, aut aliquis alius ichor non multum effluerit, eius sanationem tētare opor-  
tet, in primis verō tenuissima adhibetur diætā, ne sanguinis multitudo augeatur, & ea commendatur,  
quę agglutinandi vim habent; ob id chondrum, aut oriza, aut hordeum in iure pedum lædi, aut parui  
virtutē decoquantur, additis folijs boraginis, lupulorum, intybi, & plantaginis; aut fiat panatella in iure  
tali

talē oua verò, carnes, & laetitia primis diebus, aut donec inflammationis omnis fulpcio praterie  
rit, dimittantur. vinum pariter; aquam enim potare conuenit, in qua bullierint coriandri, iuiube, & ci-  
chorium; aut saltem ea sit in qua ignitus chalybiter, aut quater fuerit extinguis, addito serapio rosaceo  
ex rosis siccis, aut saccharo rosato. Secetur vena, potissimum iccoraria, oppositi lateris, à qua, virium  
robore apparente, bis, terque sanguis paulatim, & interpolatè detrahendus; aut fiat leuis euacuatio cal-  
sia, aut diacatolicon, & rhabarbaro, syrupus quotidie summo mane exhibearur, veluti ille de rosis siccis,  
& de lupulis, aut de cichorio cum radice barbara, liquatus cum decocto hepaticæ, consolide, caudæ  
equinae, aut betonicæ. Si autem vulneratus, saltem alternis diebus, ventris beneficiū, & alui expurga-  
tionem non nouerit, ei clyster imponatur, ex decocto maioris centaurei, consolide, & equiseti, addito  
saccharo rosato, oleo myrrino, & rhodino, & parum quid electuarij diacatoliconis. diuerfiones à longin-  
quis paribus probantur, nempe leuibus frictionibus, cucurbitulis, aut ligaturis: iram, clamores, ninsu  
motum, contum, & vnamquæ causam, quæ sanguinem alterare possint, fugiat patiens. verum, si ali-  
qua indignis apparuerit indigentia, caro autem montanarum, aut hepata paruorum animalium, & vi-  
num nigrum clarum, oligophorum dari potest. Et quia ea, quæ contortant, ac huius visceris solutio-  
nes agglutinant, per os omitteri possunt, confectiones in rotulis ex spodio, gummi arabico asso, rhabarba-  
ro, dragaganto, balsamij, terra sigillata, & bolo armeno cum saccharo parari solent. quæ manes, & sero  
paticum exhiberi possunt: rhaiponticum pariter, & rhabarbarum in minutum puluerem redactum, visque  
ad scrupulj, cum decocto arnogiostæ, aut pentaphylonis secundum omnem modum, optimum præficiū  
est, probatur trochiscis summo mane, visque ad dragulj, de spodio, de reubarbaro, & de rosis cum spo-  
dio soluti in decocto centaurei, intrybi, & equiseti: Vultus verò hypochondri, aut abdominis, si in eo  
sanguinis hæmorrhagia apparuerit, primò medicinis sanguinem silentibus regatur: deinde aut tere-  
binthina actū calida, aut vnguento nostro sancto, ab initio visque ad vulneris sigillationem regatur: aut,  
si licet, transecta quarta, ipsi terebinthine addatur bolus armenus, & mumia: postremò mastice, turis  
mannam, & dragagantum admiscere licet. partes verò vulneri coadacentes, inguinæque, subasciellæ, ac  
spina oleo rosaceo, masticino, ac de citonijs vnā cum sandalis albis, & rubeis, ac eboris ramentis, & in-  
trybi domesticis seminibus minutissimè tritis cum pauca cera, sub linimenti forma tñungantur, potro, si  
expedit, vt medicamentum exterius impositum fibras hepatis vulneratas attingat, nec magna sangui-  
nis quantitas efflueret, illud quidem formetur, quod scetas fibras confringat, & agglutinet, quale est  
hoc: Recip. succi equiseti, pentaphylonis, pilosellæ, polygonij an. manne thuris, mumie electæ, reubarba-  
ri optimi, radicis maioris centaurei, sanguinis draconis ex lacryma an. q. s. pro collyrio, quod per se,  
si vultus amplum fuerit, aut per iniectionem visque ad iecur bis, terque in die iniiciatur. Amplum vul-  
nus inlui debet, & dimissis in decliui situ orificio, vt superfluitates perpetuò expurgari possint: supra vul-  
nus verò aut barbarum, aut calcideum medicamentum, aut illud celebre ex chalcidi adhibeatur.

## De liene affecto. Cap. XXII.

**S**I LIEN, siue splen vulneretur, maiori cum fiducia curationem aggredimur, atque  
magis, si vultus intimè non transierit, nam summa huius visceris pars, multarum arte-  
riarum, ac magnarum venarum plantationes continet, ob id si vulnere affigitur,  
nulla redēptionis spes remanere solet: cum verò leuiter in superficie lædatur, eadē  
requiruntur curatiue indicationes tūm in victus regimine, tum in localium medica-  
mentorum applicatione, vt de lecore expositum est: verum vt quoque viscere læso,  
diligentia summa adhibenda est, ne ex calidiorum, ac stupriorum medicaminum  
qualitate humidiores subtilitæ discutiantur, & crassiores exsiccantur, cum ambio hæc membra para-  
ta sint, in scurrum facillimè conuerti.

## De Renibus incis. Cap. XXIII.

**V**M<sup>a</sup> ferro renes inciduntur, difficilis curatio sit, imò<sup>b</sup> moritur ille, cuius renes  
disrumpuntur. verum minoris timoris sunt, quam vulnera Vesicæ, aut locorum  
neruorum. Cum igitur tale vulnus occurrat, exterius curatur indicationibus su-  
perius enarratis, secundum temporis opportunitatem: interius, verò insituito vi-  
ctus regimine, potissimum quod in hac, & vesicæ curatione est, requiritur humorū  
adæquatio iudicatur, quæ interdum fit per venæ sectionem copiosam, aut per sub-  
tilium, ac tenuium humorum solutionem, sine<sup>a</sup> subita euacuatione: ob id proba-  
tur manna, castia, rhabarbarum, & syrupus rosatus solutius. Si verò crudorum humorum copia ap-  
paruerit, vomitus melior est, quo renum vulnera curantur. nam abstergit, euacuat, & fluxiones reuel-  
lit, cæteræ verò humiditæ equationem querunt, solo seri capini lactis stillatio liquore, aut decocto  
iuiubarum, & sebesten, vel lactis seminum trigidiorum maiorum: aliqui trochiscos de alicacabo aqua  
hippuris solutos probare videntur. postremò<sup>c</sup> consolidationem sperantes, amilum, dragagantum, &  
frigidas gummas parientibus exhibent, quos in mollissimo lecto decumbere iubent, ac tenuissima vi  
diata

<sup>a</sup> Cels. l. 1. c. 17.  
<sup>b</sup> Zoon. lib. 10.  
<sup>c</sup> Auz. l. 1. c. 17.  
<sup>d</sup> Auz. l. 1. c. 17.  
<sup>e</sup> Auz. l. 1. c. 17.

<sup>f</sup> Auz. l. 1. c. 17.  
<sup>g</sup> Auz. l. 1. c. 17.

<sup>h</sup> Hipp. lib. 1.  
<sup>i</sup> de mor. ac.  
<sup>j</sup> Gal. l. 4. c. 10.

- dieta præcipiunt. non tamen ad multos dies dieta extendatur, nam vrinae puriores & aciores per indiam reddita, vehementissimos morbus procreant; ob id in morbi initio, forbitionibus tenuibus morbus omnes lenientibus vti expedit, inde victus sit boni chymi, vt puta ex carnis autium nemoralium allatis, ouis forbilibus, chondro, oriza, & panatella, atque inierim acerofa, acuta, falſa, & dulcia, ac omnia aperientia, & diuretica (id est, quæ vrinam ciere ſolent) dimittantur: minor faciendus est omnis potus, præſertim aquæ, ob loci copiam, quieſcat patiens, in ſilentioque vitam ducat; nam metho diu curandum vulnerum renum, quies eſt. porro, ſi decet, per clyſterem decoctum maluæ, & equiſti cum piſſana, & rhodomelle inſundendum, vt ſalrem alternis diebus materia, quæ in vijs communibus reperiuntur, per ſecellum expurgentur, cæterum non multa copia inſundatur, ne viſceribus nimis repletiſ renes comprimentur. Si autem ſecti renes ſanguinis profluuium laborabunt, venam cubiti ſecare conuenit, ſanguinis detractioe repetita, & medicamenta, quæ ad ſanguinis ſputum, & quæ ad ipſius profluuium deſcribuntur, in renibus, & veſica ſanguinem fundentibus per ſyringam iniſciantur, quod prælarè facit ſimphiti radix, & tragacanticum vino macerata, aut polygoni, & plantaginis ſuccus cum poſca, aut ſuccus ſoliorum porri, & plantaginis, qui omnia ſuperat medicamenta: exterius cataplaſma adhibeatur ex palmulis, pane ſiliginæ, acatia, hypocifiſide, & vino aſtringente decoctis, concretus interdum in veſica ſanguis adeo deprehenditur, quod poſt illum vrina ſubito cohibetur, & ſibi quædã ſanguineæ, aut humiditates quædam cruentæ paulatim percolant, quare cum vrina ſuppreſſa eſt, peccatiſ nris, ac ſummiſ partes oleo e ſcorpionibus, amygdalarum amararum, irino, & e cappariſ inſungatur; & ſi hæc nõ iuuant, hiant decocta ex maluis, parietaria, ſaxifragia, agrimonia, & citrach in vino albo, aut ex his cum paſſo, aut oximelle ſiat cataplaſma. Potui etiam datur præſertim renibus, aut poris veteretibus cum repletiſ decoctum eritrodii, polytrichi, ſcolopendriæ, & citrach cum ſyrupo capilli Veneris, aut bizantino. vruntamen horum vſum, quoad poſſumus, fugiamus: fed tantum vrgente neceſſitate vſui ſeruiuntur; Siquidem vrinam viriliter prouocant, & quæ relaxant, adminiſtranda minime ſunt, ſed quæ exſiccando corroborant, à medicis probantur. nos verò cuidam militi Feſtendi vno duntaxat rene vulnerato quotidie dedimus drag. j. optimæ terræ ſigillatæ cum vnc. j. terebinthi cyprij, & parum poſt cyathum paruum optimi albi vini montani, & ſerè ſtatim vinum à vulnere emanabat odoratum, ſed aliquatempus tinctum, exterius verò continuo vnguentum noſtrum Sanctum applicauimus, cuius compoſitionem, ac operandi modum in tertia indicatione deſcripſimus, capite de Thoracis vulneribus, & breuiſſe poris ſpatio fuit ille ſanitati reſtitutus.

De ſauciata veſica. Cap. XXIII.



Vulva veſica, quæ vrinæ receptaculum eſt. præciditur, eius partes ſectæ nequaquã coire poſſunt, ob id quia membrum neruoſum eſt, frigidum, ſiccum, & exangue, & nerui ſecti neque coaleſcunt, neque augentur, & eorum vulnera peſſima, ac omni timore plena eſſe ſolent. Inreſtinum hoc perpetuò mouetur, ac humiditate acuta, acri, baurachina, & mordaci ſerè ſemper repletum videtur, quare neceſſario ille, cui veſica diſrumpitur, moritur. Ergo de veſica funditus ſecta nihil pluſ dicere expedit, quæ pariter, quamuis nonnulli aliter credant, conſui nequit; na ex acus punctura conuellitur, aut ab aere frigido alterata corrumpitur. vt illi euenit, qui ſuper frigidum lapidem federe ſolebat, aut piſcatori, qui in frigidis aquis diu degebat. Si autem eius collum, id eſt, ſed noſtor pars, quæ Latini ceruicem vocant, vulneratur, non ita imminet periculum, nam affectum ſimilem præcipue in his, quibus calculi extrahuntur, ſanari videmus. In hac igitur curatione indicationes illæ in renibus vulnerati expoſite ad vnguem ſeruari debent: pharmaca verò purgantia per os ſumpta, item ea, quæ vrinamciere poſſunt, exhibenda non ſunt, ne materię multæ, ac ſucci mali ad renes, & veſicam deducantur. Dieta itaque tenuiſſima ſit, à nimio potu, & humidiorum vſu caueatur, vinum dimittatur, ſed aqua coriandræ cum vino, aut miua cidoniorum, vel ſyrupo myrtino, aut ſaccharo roſato vſui ſeruetur. Vlnus exterius regatur terebinthina cum tertia parte olei hypericonis, ac deſuper barbarum, aut arpeidum, aut illud viſitarum, ex chalcitide, aut noſtrum ſanctum adhibeatur; nam, vt partes ſimul citiſſimè coeant, ſtudere opere præcipuum eſt; multum enim vrina ad hoc conducit; ergo ſi abſolute lincini impoſitione opus perſici poſſet, id melius eſſe omnino iudicatur; in cæteris æ oportuna ſunt, quæ in ſupradictis carnoſis vulneribus commemorata ſunt, per meatum verò vrinauium decoctum aliquod iniſci poſſet, potiſſimum cum ſyringa, quale eſt hoc. Recip hordei, roſarum, centaurij minoris an. m. ſ. vini nigri optimi q. ſ. pro decocto, cui in fine adduntur rhodomellis vnc. ij. coletur, & vtere. Et ſi maiori exſiccatione, Recip. radicem conſolidæ, maioris centaurij, ſoliorum olivæ, myrtillorum an. ſ. amilli vnc. j. ſ. aquæ chalybeatæ q. ſ. pro decocto, & addito melle roſaceo vſui ſerua. Si verò aliqua aderit mordicatio, tollatur ſero caprino chalybeatæ, aut pompholyge lota, laſte caprino ſoluta, aut trochiſcis de terra ſania, aut de halicababo, aqua conſolidæ liquariſ. omnia hæc, & quæ in vtero ponuntur, actum tepida eſſe debent, & ſtatim non gignant, nam frigida quæuis his viſceribus aduerſantur, ac ſunt inimica.

a Hippocr. de morbis. d. Aph. 18.  
Celi. d. cap. de val. inf. d.  
Auc. 4. c. 1.  
b Hipp. lib. 1. de morbis lib. de Coac primo. 6. Aph. 19.  
Ariſt. 1. de ſeſt. an. m. c. 13.  
Celi. 1. c. 18.  
Gal. 1. de ſem. cap. 8.  
Auc. 4. c. 1.  
c Gal. 1. c. 1.  
d Auc. 1. c. 1.  
e Gal. 1. c. 1.  
com. 18.

## De vtero perforato. Cap. XXV.

a Gal. de lo.  
off. cap. 5.

Art. 3. de c. 88.  
b Lib. de geni-  
tibus.

c Gal. 5. medi-  
cap. 7.

d Hipp. lib. de  
lege.  
Gal. lib. 4. par  
med. cap. 87.  
Aur. 4. 1. cap.  
e Hipp. 6. Epit.  
d. 1. de c. 88.



I vterus si suae matris fuerit vulnerata, quod raro contingit, indicia sumuntur à lo-  
co laeso: nam in fundo ventris inter vesicam, & rectum intestinum sita est, & ab  
excubitibus. nam per sinum muliebrem de sanguis, & ichor emanat; à dolore, qui  
eam partem, & inguina, & foemora, & dorsum molestat; à syncopa siue animi de-  
liquio, ob eius cum ventericulo confortium: à febre, aethiata cordis, ex alienatio-  
ne ob nimiam cum cerebro insertam alligationem. vnde dicebat Hippocrates  
maximam feminis partem à capite procedere; & quod liquorum auriculares venae  
sectae fuerint, à medicis aliud egi quidem, somni, & apoplecticæ diætae iussu  
di redduntur. Eius vulnus lethale admodum iudicatur iisdem rationibus, vt Capite de Vesica dictu  
est. Curantur hi affectus optimo, ac tenuissimo victu, sanguinis missio, praefertim à vena iccoraria, &  
syrupis humorum acuites concemperantibus, ac alijs similibus indicationibus, vt supra in cura diuer-  
sarum internarum passionum explicauimus. Abdominis vulnus primis diebus medicamento ex terebin-  
thina, oui luto, rhodino, & croco regatur: circumuicina verò loca oleo rosaceo completo, è semi-  
ne lini, & è matricaria foueantur. postremò huic medicamento situm thuris, masticis, dragaganti, & ce-  
rae addi solet, & sic farcoticum vulnus sit, & carne replebitur: situs verò, ac iacendi modus talis sit, ne  
intestina vterum compriment: interius, si decet, ea imponantur, quae valde exsiccant, sicut ponpho-  
lix, aloes, anethum vltum, carta combusta, bolus armenus, coccus, & similia succo pimpinellae, aut con-  
solidae, aut agrimoniae liquata, in linimenti, siue collyrij formâ redacta. hæc recto lyphone, siue cathete-  
re, aut vterino clystere, quod Graeci metrenchitas vocant, imponi possunt: si verò abiteris aliqua co-  
euerit, fiat cum vino nigro, mellis, aut sero caprino, aut rosaceo melle maxima pars curationis omniū  
viscerum vulneratorum ipsi naturæ, quæ Dei filia, ac mundi anima est, committatur. nam omnium illa  
opifex est, medicus verò eius minister; ipsa enim non edocet, & nullo magistro visa, ea, quibus opus  
est, facit, quod præter spem mirificè in bonum conuertitur.

## De testibus vulneratis. Cap. XXVI.



I testes vulnerantur, optimo egerit regimine, tum in victus ratione, tum in tópicorum  
applicatione, vt in similibus passionibus superius ad plenum explicauimus. Et quia  
hæ partes maximo sensu prædiæ sunt, maxima cura adhibenda est, ne aut dolore,  
aut inflammatione vexentur. Igitur præmissa vniuersali euacuatione, nempe sangui-  
nè mittendo, vsus terebinthinae loræ, addito hypericonis oleo, summoque probatur:  
& si amplum vulnus fuerit, commodè suatur, orificium in ima parte dimittendo, vt  
superfluitates possint perpetuò expurgari, partes circumferentes vnguento rosato Melse inungantur,  
aut oleo rosato completo, & masticino; inde vulnus abstergetur syrupo aut melle rosaceo, postremò  
basilicone, aut regale medicamento incarnetur, & palmulato, aut cerato de minio ad cicatricem perdu-  
cat: quæ in scroto, aut oleo occurrunt vulnera, his medijs facillimè ad sanitatem perducuntur. Hæc  
pauca ad Dei omnipotentis laudem, amicorum satisfactiōem, & vulneratorum vtilitatem in vnum re-  
degimus, non equidem quòd aliàs à peritioribus dicta nō sint, nec ob librorum penuriam, sed vt sub  
breui epilogo, quæ spartum, ac in diuersis voluminibus ab antiquis enarrata fuere, redigantur.

Si quis ergo in postero æquè studiosus, ac veritatis vehemens amator, veriorē doctrinam, ac tu-  
tius experimētum practicando nouerit, vbi his, & vterusque sit, non temere, ac subito oculi  
tē suam proferat sententiam, sed eam in medium apertè ad laudem omnipotentis Dei, ac languentiū  
salutem, adducere non piget.



CHIRURGIAE

IOANNIS ANDREAE  
A CRUCE, VENETI

MEDICI,

## Tractatus Secundus.

De vulneribus.

LIBER SEXTVS.



## De Sagittarum extractione. Cap. Primum.

10



V MANA corpora, iniurijs exterioribus obnoxia, à telo acuto sepe affliguntur, nempe sagitta, gladio, aut lancea. interdum à rotundo, seu alterius formæ instrumento, nimirum lacerante. aut contundente, veluti à globulo, siue plumbæ glande, dum à Ferentarijs. & tormento aliquo fulminante, magno impetu, ac fulminis instar, eijcitur, & in corpore rehdet; idcirco, quia hi omnes asicctus, non levis momenti sunt, diligentem, ac expertum operatorem, & medicum multis alijs præstantiorem, potissimum his temporibus, & in bello, & extra bellum, exposcunt. verum & si quamplurima de hac operatione in nostris chirurgicis enarrationibus explicauimus: hic tamen, Celfo, Paulo, &

20

Albucasi, fautoribus, in genere, de telis acutis è corpore extrahendis, hæc pauca memoriz prodire decreuimus. Siquis ergo tela simplicia, aut diuersarum formarum, spiculasque sagittas, aut glandes, ceteraq; corpori humano infixæ ac inhærentia ex arte, & solertia quadam, ac sponte aut inuito detrahere, & reuellere cupit, scopi quatuor ab eo præcipue considerandi sunt. quorum primus, telorum materia, ac forma est: Secundus, affectus sedis natura, compositio, situs, & officium: Tertius, instrumenta, alia ve ingenia, quibus hæc omnia extrahi possunt: Quartus, curandi methodus, ac cætera, quæ ad topica, idest localia medicamenta, pertinere videtur. Tela omnia, quæ ventribus illata inius hæserunt, magno negotio, ac non minimo cum timore sepe eijciuntur, suntque difficultates quædam ex generibus eorum, quæ dâ ex his sedibus, in quas illa penetrarunt, & quædam ex forma instrumentorum. vnde sequitur, quod interdum euulsione, seu attractione, interdum propulsione sit vrendum, sumpta indicatione ab ipsorum telorum generibus, & differentijs, postmodum ab ipsis sedibus asicctis. vltimò à symptomatum natura, & quantitate. porro telorum differentia, Celfo auctore, ab eorum materia, figura, magnitudine, numero, habitu, & viribus sumitur. Materia, quatenus ferrea, plumbæ, stannæ, ænea, lapidæa, aut altero metalli genere, aut ossæ, aut corneæ, aut arundinæ, aut lignæ, sunt: Figura, quatenus acuta, lara, sphericæ, triangulata, angulosa, axillata, barbata, spiculata, aut cuspidata, ac cuspidatarum, hæc cuspides posteriores spectantes, habent, quæ, dum extrahuntur, contra desigantur: illa in anteriora, vt propulsata, idem faciunt. quædam obuersas cuspides tenent, fulminis instar, vt dum ipsa trahuntur, propellanturq; in obiecta infiguntur: Magnitudine, quatenus alia magna, alia parua, alia longiora, alia breuiora, existunt: Numero, quatenus vnum, aut plura sunt: Habitu, quatenus aliqua ligno firmiter infixæmanent.

30

Tract. 2. de vuln.

N 2 aliæ



aliatè negligentius, vt in extrahendo separata intus resideant: Viribus, quatenus aliqua veneno tin- 10  
cta, ac delinisa, quæ dâ verò quatenus veneno careant. Hæc igitur sunt telorū discrimina, quæ à medico  
vulnerario, alijs præfatiore, accuratè perpetuò considerantur. Vt verò hæc historia sensatè dignoscatur,  
expedit telorū aliquas imagines delineare, ac sagittarū varias formas describere. quarū aliquæ simplici-  
ores sunt, & caudæ eorum duobus modis parantur: quorum vnus cauus est, in quem hastilis acutius extre-

ma, ingredi possit; Alter cuspidatus, vt in hastilis cavitare inferi valeat. Primus ab Auienna zugi cā  
nularū, secundus zugi caudatum nuncupatur, & quia hæc imbecilliores, & minoris laboris sunt, ac vitro  
bique commodius extrahuntur, alijs præponantur. acutæ sunt, & formari solent, vt in officina cōspici pōt.  
In secundo simplicium sagittarum genere, latæ sagittæ reponuntur, quæ planæ, & æquales sunt, & fa-  
cile in corpus conduntur, ac aliusimè insidunt, & sæpe alia parte, quàm qua veniunt, educendæ sunt, 20  
si prope cutem existerint. earum forma in officina est.

In veteri militia, ac his temporibus, Cretæ præsertim, ac apud Scythas, sagittarum cuspidēs trian-  
gulari formantur, vt extracti, maius inferant nocumentum. formas eorum subiecimus in officina.

Venerit, ac alibi, non belli ratione, sed exercitijs, & voluptatibus, aliq̃ue parantur sagittæ: quarum  
extremitas sine cuspidē, aut acie, brevis, & rotunda est, vt videre licet in officina.

Alia sagittæ forma plurimis angulis munita, inter antiqua tela reperitur. quæ, quia plurimis alis  
circundatur, telum angulosum dicitur, vt in officina.

Eodem modo nonnullæ sagittæ duobus spiculis circumdatæ parantur, quæ retro euoluat, in ex-  
trahendo maiorem noxam inferunt, vt per imagines in officina descriptas facillimè deprehenditur.

Quandam sagittæ effigiem sane proprijs oculis conspeximus, locas verò non credidimus, sed  
potius telum excogitatum opinati fuissimus. hæc multis retro spectantibus alis, siue barbulis induitur. 30  
& ob id barbata sagitta dicitur. eius fabrica in officina posita est.

Apud Parthos, & Indos quoddam sagittæ genus reperitur, quod spiculis varijs, ac vario modo  
procedentibus euoluitur; nēpe aut retro, aut antè, aut utroque modo spectantibus, vt characteribus  
in officina positis facillè demonstratur.

Alteram adhuc sagittæ formam vidimus, quæ ob sui magnitudinem potius ballistæ, quàm arcui  
conuenienter opinatur, Lunæ, aut Falcis imaginem præferet, vt intueri licet in officina.

Formantur sagittæ duarum partium, quarum vna interius torculata est, altera verò exterius,  
vt dum euelluntur, earum cuspidē abscondita intime, remaneat, imagines eas ostendunt in officina posite.

Sagittæ etiam duarū partium sine torculo parantur, quarum vna alteram ingreditur, cumquē  
acuta cuspidē anterior, profunde penetraverit, posteriori parte euulsa, eā, quæ remanserit, in membris re- 40  
sidere necesse est. parari solent, vt in officina.

Quamplurimas aliæ sagittarum formæ, apud varias nationes, & sub diuerso cœlo parantur,  
quas nunc dimittere intendimus, cum satis de eis narratum sit, cōmuniter tamen eo modo fabricantur,  
& arcu, aut ballista circulantur, vt in officina.

## De affectis sedibus, modo operandi, ac instrumentis ad opus idoneis. Cap. II.



EDVNTES ad rem nostram, dicimus, sedes etiam, in quas sagittæ penetrarunt,  
vario modo se habere. nam aut altè telum insedit, vel in summo duntaxat, vel ad- 50  
modum circa medium infixum est. Si in summa carne impactum fuerit, magnas  
venas, aut arterias, aut artus, aut ossa, aut spinam nequaquam læserit. Si verò  
circa medium, sæpe affectum for midabilem imprimit. Sed si altè conducitur, cer-  
te aut ali quod nobilissimū, & interiorum membrorum sauciuit, aut solum pene  
trans erit: porro officialia, ac primaria membra aliquo modo sc̃cta, proprijs indi-  
cijs, vt supra libro quarto, & quinto explicauimus, dignoscuntur. Ex quibus de-  
nique eorum habitu, compositio, officium, & situs pernotatur, ac tandem mors plerique subsequi-  
tur. Instrumenta quoque ad sagittarum extrahendum idonea, & accommodata, differunt. nam aut ma-  
nibus tantum, aut alicuius instrumenti auxilio opus perficitur: aut attrahentibus præfidijs, quod raro in  
his operationibus videri solet, id consequitur; aut signis, verbis, vel incantationibus, quod fieri nun- 60  
quam vidimus, nec credimus, opus absoluitur. Modi pariter ad hoc peragendum concedentes va-  
riant, prout læsæ sedis situs, & compositio, ac sagittæ forma, magnitudinē exigat; idcirco si in sum-  
ma pectoris, aut lumbis parte, sagitta impacta tantum fuerit, nil melius quidem, quàm, qua veni-  
rit, citò manibus eam euellere. Similiter agendum est, si tantum in cauiam partem peruenerit. Sci-  
to tamen, nihil difficilius, periculosiusque ad extrahendum, quàm sagittarum spicula, præsertim  
axillis, aut barbulis, siue hamulis vtrinque hispida, & cuspidata, porro si telum, qualecunque fue-  
rit, in conspectu venit, & commodè eximi potest, protinus extrahatur; Siquidem ea, quæ præter na-  
turam sunt, confectum auferenda esse Hippocrates, & Galenus censuerunt. ne argrum in grauius pericu-  
lum ducant. si tamen sine iactura, & magno dolore, educi valeamus. quo factio, aduertendum, ne san-  
guinis

- 10 quinis fiat non levis aliqua hæmorrhagia, aut parientis vires tollantur. Siftatur ergo eo modo, de quo læpe sermo habitus est. Si verò osium aliqua adsit fractura, aut squamæ quamplurimæ dispergantur, omnes educantur, si ars valere videtur, instrumentis nempe ad hoc munus idoneis, aliter sapienti naturæ id omne committatur: pariter si sagitta infixæ sic intus lareat, vt nullo modo reperiri possit, aut non satis tutò extrahi, tantisper dimittenda est, donec natura ipsam protrudat, & manifestet. Operando verò summa cura adhibenda est, ne nervus, aut vena maior, vel arteria incidatur: sagitta ex corpore euellatur, nò alia est corporis medicina, quam quæ esset, si corpore icò nihil inhaerisset, vnde vulnus ipsum curetur, vt & cætera alia cruenta curari solent, hoc vno addito, quòd qui ab infixæ sagitta alteratus est sanguis ex-primatur, vt vulnus putredine, & inflammatione vindicetur. Si autem in principem, aut aliquam nec-cessariam particulam sagitta desigatur, cum iam notæ lethales apparuerint, & consilio præsertim mul-  
20 tum cruciatum, ac vexationem accersitura sit, nihil in operatione tentandum est, ne præterquam quòd nihil sumus profecturi, etiam consuitandi occasione idiotis præbeamus. verum, quia si telum in his re-linquatur, in præsentancam mortem ægrum præcipitare solet, præterquam etiam artem inhumanam ostendat, quæ de re si eximatur, forè etiam salus subsequitur; igitur præmissis prognostico de perditio-ne, quæ frequenter occurrit, operationem aggrediamur: nam interdum absque vlla spe miraculose ali-qui saluati fuerunt. Tunc ergo eo modo, quo patiens erat, dum vulnus acceperat, siue tur, si potest: sin mi-nus, in lecto ad meliorem modum, quo vulneratus fuerat, ac manibus potissimum, si sagitta suo hastili munia fuerit, tractetur, modò huc, modò illuc agitando, ac leuiter contorquendo, donec tutò exierit. Nihil enim tam facile in corpore conducitur, aut extrahitur, quam simplex sagitta, quæ extracta, viscè-rum vulnus eo modo, quo in superioribus libris explicauimus, regatur. Accedit etiam aliquid difficul-  
30 tatis suo omni icò, si sagitta costis, aut ossi pectoris, aut caluarie, aut spinæ inhaerit. nam si eam attra-hendo eximere tutum est, queratur tunc, si manibus paulatim eam agitando, donec is pello laxetur, qui mucronem momordit, ne ferrum infixum remaneat, extirpari possit: sin autem scalpello, si datur lo-cus, os circa ferrum cauare oportet. nonnumquam carnem prius incidamus, si vulnus instrumentum non recipit. Cum verò sagitta alte, ac firmiter in osse aliquo infederit (quod ex eius soliditate, firmitudine, duritie, ac mæbi magnitudine inspicitur) nulla vi commoueat, præsertim eo instrumento, quod aliqui ar-cum seu ballistam nominant, sed carnem ei circumstantem, aut cultello simplici acuto, aut eo instrumen-to hac tempestate constructo, quod ab eius occulta, ac deceptoria operatione, Forceps deceptoria, aut excisoria duplicata inuersa nuncupatur, in primis adimemus, aut diducemus: hoc instrumenti illud esse opinamur, quod ad ÷ Græcæ litteræ imaginè formatur, & ypsiloideum vocatur: dilatatoriū omnino  
40 est: artamen eius vilitatem, aut operationem, quamuis tam memorarūt Cellus, Paulus, & posteriores, adhuc intelligere non posuimus: Prædictorum instrumentorum delineationes in officina cernuntur. Si autem sagittæ ferrum, per vulnus aliquod angustum, possit infixum tantum remanescere, ac ita firmi-ter illi adhæserit, vt nec manibus, nec alio ingenio euelli possit: tunc ea instrumenta opportuna sunt, quæ ab eorum operatione attractoria dicuntur, & illud celebre iudicatur, quod ab Albucafi terebrum tor-culatum, & à Guidone terebrum inuerfum vocatur. Formetur ex optimo chalybe, aut ex ferro indo, & duas feruet imagines: alterum enim integrum est, ac ima parte torcularum, vt dum in zugi cingulo auoluitur, suo torculari illud amplectatur, & retineat; variè igitur in torculi crassitiem, & longitudinè ob zugi varietatem parentur: alterum diuissum & qualiter ad sui longitudinem fabricetur, teres, con-cauum, per cuius mediū hastula ferrea locatur, quæ mobilis est, vt descendèdo, torculatam partè dila-  
50 tet. vt vno solo terebro, singulariter tale opus adimpleatur, omnia sub duabus figuris, de quibus in offici-na, conspici possunt.

In lato, & amplo vulnere, vt expedit, aliquo vtimur instrumento, quod ab effigie tostri diuersa-rum auium, nomen sibi fortitur, nempe à coruino coruinum, ab anserino anserinum, à ciconino cico-ninum, à gruino gruinum, & communi voce ab attrahendo, omnia attractoria dicuntur, quorum ima-gines, ac vbi de vulnibus Sclopetorum tractabimus, intueri possunt in officina.

INSTRUMENTVM ad hoc idoneum, celebre, apud antiquos illud obseruabatur, & summopere probabatur, quod quia belli tempore ad sagittas extrahendas maximo erat vsui, à Græcis bellucum  
vocalur. Hoc illud esse opinamur, quod Hippocrates b Eraphicum, & Celsus c Dioecum, vocat, a  
à Dioele eius inueniore, qui inter antiquos celebres medicos, à Celfo, & Galeno à cōmueratur. Tale  
60 Dioecum à Celfo sub magna verborum obscuritate describitur, quare hætenus, & si quamplurima alia in nostra chirurgiæ officina delineauimus, hoc adamussim nò intellexisse faremur. Vos igitur, studio si iuuenes, obsecramus, vt adinuenta Dioelis veritate, eam sensate designetis, etiam detracta, vt aliqui dicunt, in Celsi descriptione, voce illa, quæ, vbi legitur in parte inclinari, quæ perforata est: Nos verò, si ferrum in conspectu venerit, cauda eius lata existente, nec ab alia parte educi expedit, ne maiorem noxam, quam sagitta fecerit, inferamus. hoc vtimur instrumento, quod eo quia accommodatum, ac tutum est, Bellucum, aut Dioecum, appellare soliti sumus. eius effigies est in officina.

Vtrum si sagitta cuspidata, aut barbulara, aut spiculata fuerit, prædictorum instrumentorum vsus non probatur, cum sagittæ magnitudo, & forma, liberum exitum sine magno negotio non ad-mittit; ob id si cuspides, aut barbule, breues, ac tenues fuerint, Forcepe, si potest, comminui debent, se

cus verò dimittantur; & ut docet Hippocrates, & Celsus, scriptorij calamis ad longitudinem diuisis contegantur, ne quid remeando lacerent. Hac ratione tenaculæ nonnullæ huic operi satis opportune adinueniæ fuerunt, omnes quippe cannulæ, quarum una quamplurimis dentibus munitur. Alia simplicis cannuli diuisi formam præferunt, ab Auicenna forfex fenilunaris nuncupatur, omnes sagittæ partes amplectuntur, & vulneris labra, ac omnem circumferentiam in qualibet noxa incolumem reddunt, ac cœnentur; probatissima instrumenta sunt, & parantur sub formis in officina positis.

Cumque prope oppositam partem, aut vltcrius, sagitta peruenerit, nec ea parte, qua venit, extrahi possit, diuisa opposita, si carnosa fuerit, & à venis magnis, arterijs, & nervis immunis, per eam sagittâ eximemus, nempe propellendo vltcrius, & in oppositam inhingendo: si verò sagitta ferrum absque suo hastili inens remanserit, & occultè in partibus musculosis latuerit, magnum inde medi co negotium adducit. quod aut cannulatum, aut caudatum extiterit, si cannulo munitur, & illius formæ fuerit, quæ ab vitroque latere eximi possit, eo instrumento impellatur, quod propulsorium mas, aut impellens surdum nuncupatur: à sagittæ hastili non multum variat, sed teres, & acuti capitis est, ut in zugi cannulato ingredi valeat. at si caudatum fuerit, ad hoc illud opportunum erit, quod propulsorium forma minæ, aut cauum dicitur, calami formam retinet, ut in eius cauo, sagittæ caudam recipiat, ab Auicenna impellens cannulatum dicitur. probantur hæc duo organa tanquam necessaria, ob id quia omne telum, quod corpori inferitur, aut ab ea parte, qua venit, aut ab ea, in qua terendit, extrahi debet. est igitur duplex modus, vnus per attractionem, alter per propulsionem, seu per impulsionem, qui adimplentur in terdum tuto, & quæret, sæpe magno labore, longo cruciatu, temporis tractu, & mortis periculo: Hinc ergo sagittæ propelluntur hoc modo, donec ab altera parte, si caro tenuis fuerit, apprehendi, & eximi possint. propulsorium declinamenta in officina reperies.

In qualibet omnium prædictarum operationum, summa diligentia adhibenda est, ne maius ab ea sequatur incommodum, quam vtilitas, & commodum. Turpe siquidem est, dum telum aliquod extrahimus, maiorem noxam inferre, quam telum ipsum effecerit: quare tutius est interdum omnia hæc potenti naturæ dimittere, quæ longiori temporis spatio, partem affectam abscessu occupante, ac dirupto, per eam tela extrahere sæpe solet: extracto telo, sanguis exprimitur, ut vulnus ab aliqua praua humiditate immune reddatur, inde nisi multus sanguis emanauerit, terebinthina calida, hypericonis oleo ad dimidium addito, vulnere infundatur. vicina verò loca, & quæ in consortio sunt, oleo masticino, rosaceo, ac de femine lini irrorentur. aut vitmini (quæ est medicamentum incomparabilis virtutis) emplastro nostro sancto ad vulnera angusta, cuius descriptionem in libro quarto, & tertia indicatione videre poteritis. Hæc, nullo symptomate apparente, ut de alijs vulneribus dictum est, agenda sunt, nempe si recens fuerit, medicamento, quod cruentis vulneribus injici solet, curetur: si verò in cruderit, aut dolore afficietur, aut inflammatione vexabitur, aut veneno affligetur, quæ tunc agenda sunt, in calce sequentis libri planè videre poteritis: verum tamen si plaga inflammatione vacauerit, & ampla fuerit, futuris cruentorum more eam curabimus. si inflammationem experiat, fomentis, cataplasmatibus, & cõsimilibus medebimur, in primis semper de toto considerationem habentes.

Hactenus methodus tradita est sub quadam breui epitome de sagittis & corpore extrahendis:

Post hæc, Deo maximo optimo fauente, quæstiones nonnullas dilucidare intendimus: eamque præsertim, cur sagittæ ferrum, aut plumbea glans, sæpe integra profundè infixæ, ac cica trice obductæ, citra ullam noxam per multos annos, & profundè cõseruatur, quamuis substantiæ humani corporis admodum diuersæ existant, atque omnino præter naturam, deinde sedem ipsam affectam, aut alteram ab illa parum distantem, abscessu occupante, ac in vomica conuerso, exire cogantur. secus verò euenit, si ossis aliqua squisila, aut particula à sede sua fuerit diuisa, ac se parata; siquidem nisi, osse extracto, vulnus nunquam perfecte consolidabitur, ut in caluaris curatione, ac alibi, sæpissimè videre solici sumus,

a Hipp. lib. 7.  
de motus pro-  
pri.  
Paul. &c. 28.  
Abulc. c. 96.  
Alexander Bo-  
no. lib. 4. c. 14.



## CHIRURGIAE

IOANNIS ANDREAE  
A CRUCE, VENETI  
MEDICI,

## Tractatus Secundus.

## De vulneribus.

## LIBER SEPTIMVS.



## De Sclopetorum vulneribus, &amp; eorum curatione. Cap. I.



**R**IA telorum genera, quae corpori humano aliquando insedunt, descripta ab antiquis & reperiuntur, quorum primum (veluti sagitta) acutum, ac subtile est, quae in eo facillimè conditur, & altissimè penetrat: haec sepius ab altera parte, quam qua venit, recipienda est; siquidem sapissimè speculis cingitur, quae magis laniat, si retrò, quam si contra, trahatur. Secundum, sicuti lancea, latum est, quae dum corpori insigitur, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti ipsi vulnere ingentius quoque vulnus adijciamus. Tertium sphaericum, aut angulosum est, prout plumbea glans, siue parua pila, aut parua sphaerula, aut, ut dicunt, globulus, aut plumbeus, aut stanneus, aut ferreus, aut lapideus, quod raro, aut alterius substantiae duræ, quae perrupta cute, & carne integra intus residet, & ea qua venit, extrahenda ut plurimò est. De hoc igitur tertio telorum genere, nonnulla expedit in presenti brevissimè enarrare, cum non raro hisce temporibus in prelijs, ac bello nauali, alibi quæ à diabolico illo instrumento fulminante (quod isti vulgo Tormentum, Archibugium, & sclopetum vocant) globuli, diuersi in homines iaciuntur, qui quidem & magnam noxam, & sepe mortem inferre solent: & si nullam de hoc tormenti genere antiqui cognitionem habuere, attamen Hippocrates, & Celsus in tertio telorum genere, quod homines & laedit, & intimè remanet, glandem plumbeam, aut lapideam connumerarunt, & nullum quidem verbum de instrumento protulerunt, quod hæc tela emittere, ac iaculari solent. Si quidem instrumenta illis non innotuere, sed ea fuses erant, quas isti fundas, aut fundebulas vocant, prae-  
liabantur enim antiqui fundis, & lapidibus, & huiusmodi instrumentis. hac tempestate in eorum pugnis vtuntur pueri, & simili Dauid Propheta Goliath Gigantem necasse, legitur in sacris litteris. Golan

a Hipp. lib. de  
telorum extrac.  
Cels. li. 9. c. 5.  
Pauli. 2. c. 38.  
Aulic. 4. c. 23. 2.  
cap. 10.

**des**, siue globuli magno impetu in homines projiciuntur, & in eis quamprimum compositum vulnus caulare solent, saltem cum ea causa, quam isti propriam, siue coniunctam appellant. ea quippe est, quae vnà cum vulnere frequenter residet, & a gritudine talem actum producit, non expoliatam carnis attritione, aut laceratione, ossium fracturis, intemperie, dolore, inflammatione, aduersione quadam, & aliqua venenosa qualitate, vnde facillimè sedes affecta spachello affligitur. Attritio sensate dignoscitur ob id, quia caro contusa lacerata apparet, & liuidi coloris fit: porro cause ad hoc potentes existunt, nempe obtusa, graues, ac magno impetu transmissa, ac impulsæ, ossium fracturae ex iniusta natura, & arbitrij motus detrimento apprehenduntur: de dolore lauciatos interrogare oportet, nam sanè eius

Tract. 2. De vul.

N 4 ambas

ambas causas ibi perpetuo adesse dignoscitur, veluti continui solutio, quæ oculis demonstratur, & mala  
 temperatura ob ignem impetû, & accensam causam, quæ nõnunquam aliis venenata qualitate tinge-  
 tur: hac ratione in maximis læsionibus interdû, patientis corpus, & mens stupet, vulnerari antonici fiunt,  
 eosque frigidus sudor inuadit, mox æstuant, vulneris ora liuescunt, ac denigrant, subsequitur febris,  
 siti intensa conficiuntur, somno priuantur, difficulter spirant, syncope, & vertigo oboritur, tumultuosius  
 infomnijs, si dormiunt, affliguntur, facies inflammatur, oculi rubent, desipium, atque ablutâ loquun-  
 tur, postremò moriuntur. Telsa autem cuiusmodi intus condita esse, his notis deprehenduntur, inter-  
 na asperitas, aut mollities, aut inæqualitas, aut rotunditas subesse sentitur, plaga rariò omnino in re-  
 ctum tendit, caro confusa, ac liuida cernitur, & dolor, ac grauius locum infestat. Certissimum autẽ  
 indicium est, glandem intus conditam esse, cum ex opposito vulnus non appareat, quo exilire poterit.  
 Porro hæc vulnera varijs indispotionibus complicantur, & varijs indicationibus regi debent, semper  
 ab eo symptomate, quod magis vrget, vulnere non neglecto, initium capiendo. Decet igitur primò si  
 vulnere quid præter naturam inhaerit, id euellere, veluti causam, sine cuius ablatione vulnus raro sanari  
 queat, talis quidem pro symptomate habetur, quod ad se primarias indicationes curatiuas coadducit.  
 Secundò dolores demulcere, qui inducias expectare non solent, siquidem quod dolet, plus aliquid af-  
 fluere facit. atque hinc fit, quòd ex dolore, particula proportionẽ confluentis humoris in eam, in tu-  
 morem attolitur, qui qualis fuerit, ex colore, calore, dolore, & dimensione cognoscitur. Tertiò confusi,  
 ac lacerati vulneris opportuna præparatio, quam isti digestionem appellant. Quarto sinuosi vulneris,  
 ac omnium anfractuũ conueniens absterbo, nouæ carnis productio, & cauituram repletio, postremò  
 æqualis sigillario. Quintò accidenium malorum, quæ his affectibus solent superuenire, exquisita cor-  
 rectio, & profligatio.

### De Globulis, aut alijs rebus omnino præter naturam è vulne re eijciendis. Cap. II.



**C**IRCVRO partem hanc, telis extrahendis dicatam, maximè necessariam fore,  
 decantant Homerus; vnde Galenus hanc Medicinæ partem, homini & eam, &  
 mortem inferre posse, affirmabat. Hac ratione, cum primum Medicus ad vulnera-  
 tum accesserit, cuiusque partis affectû rationem habeat, nam multum interest habere  
 læsæ partis cognitionem, cum partes inter se valde differant, quarum differen-  
 tiæ curationis methodum variare solent; secundò indicem digitum, cum nihil eo  
 præstantius sit, in vulnus immittat, vt quantum, & quale sit, certior fiat. Si verò  
 index breuior videatur, aut crassior, quam peruenire ad telum possit, anfractus omnes, qui in his  
 læsionibus diuersi esse solent, specillo, siue radiolo accuratè perquirat, & an vulnus in causam ali-  
 quam partem peruenierit, & viscus aliquod læserit, aut telum externam tantum partem faucia,  
 uerit, aut ossa fregit, vestiget: & aut inter artus absconditum steterit, atque vbique cognoscat  
 si globulus quidam, aut armaturæ particula, aut indumentorum fragmenta, aut ossa fracta, aut  
 quid aliud diuersum, absconditum detineatur; Siquidem à simili re summi dolores, ingentes cruciatus,  
 ardentissimæ febres, inflammationes, conuulsiones, gangrænæ, & deliria excitantur. quapropter, si in  
 huiusmodi vulneribus humiditatem ingentem copiam effluentem videbitis, aliquid præter naturam  
 detineri iudicabimus. igitur summa cura omnia hæc tuto tollantur, vt inde iucundius operando, maxi-  
 mè in his, quæ circa nervosas partes fiunt, operationibus hanc indicationem adimplere valeamus, &  
 in hoc chirurgus ingenio præditus, experimētis comprobatus, ac instrumentis varijs munitus requiri-  
 tur, nam extranea, in causa sunt, quòd vulnera sanari nequeant. propterea diligentia adhibenda est,  
 vt his, tanquam causa remotis, eorum pariter renouetur effectus. porro ea tantum extranea nõ sunt,  
 quæ extrinsecus eueniunt, sed quæcunque humanæ naturæ aduersantur, nec ab ea conferuari possunt,  
 quamuis prius eas partes extiterint, quemadmodum ossa fracta, caro attrita, aut sanguis extra venas  
 existens. Hac ratione qui in his inquirendis methodicè operatur, aduertat, ne decipiatur; quod facile  
 est. nam in his fulminatis vulneribus, quæ magna vi inferuntur, per multos, ac diuersos sinus læsio tor-  
 tuosè progreditur, ac pila persæpe secum alia terre solita est, ac abscondita relinquit, nempe partes lo-  
 rice, armaturæ hamulos, aut indumentorum fragmenta, & alia huiusmodi, quibus postea pars affec-  
 ta breui temporis spatio tam male affligitur, vt præter naturæ ordinem tumeat, aut sphaeculo occupe-  
 tur, igitur qui sic inquirendo prætenui stylo vitur, facillè decipitur, quare nec nimis tenue, nec nimis cras-  
 sum esse debet. aberrat enim ille facillè ex eius tenuitate, huc atque illuc inter membranas, aut lacertos,  
 aut laceratas venas, aut fracta ossa subintrando, per quæ loca pila frequenter minus transitum facit. ob  
 id digitus in hoc verus iudex esse creditur. Specilli materia interdum argentea, aut plumbea, aut ex le-  
 ni, & flexibili metallo, interdum ex cera, vt pro Medici arbitrio ñectatur, esse debet. Cognito globulo,  
 aut eo, quod intus confederit, ægri corpus eo modo siue tractetur, quo vulnus acceptum; & vires desunt,  
 in lætèo molli, & proximè ad eam figuram, postmodum citò, tuto, ac quàm minimo cum dolore globu-  
 lus, si datur occasio, extrahatur, & prima die, quia qualiscunque fuerit ictus, commodius pertractabi-  
 tur:

10 tur : nam tunc membrum calidum, & cruentum vulnus latius perferitur, ac stupide sentit, & globulus, aut digito, aut alio instrumento facilius tangitur. cum. n. pars affecta ab acre, aut medicamento frigeficit, maiori in operatione afflictor dolore: quod si aut ex imperitia, aut ex impotentia, aut alia causa fuerit omisum, non ita facile deinde occasione dabit, qua id moliamur. fiat igitur prima die, aut secunda, sin autē abstinere oportet, præsertim si ipsa apparuerint accidentia. ne qui arte medicæ optimè callere profiteatur, dum medetur ægrotis, & aliquid agere videtur, morient languentibus inferat, nervos, tendones, aut venas magnas rumpendo, ac laniando. hac ratione & si vulnera vel lethalia sunt, vel ita desperata, vt membri destructionem omnimodam nobis polliceantur, non ob id tamen vulneratus absque auxilij desistendus est, quin omnia aggredi, ac tentare medicus debeat, nempe quæ via arte, & secundum rationem fieri possunt : sed primò alsidentibus confanguineis, & amicis de futuro rei exitu præfagiatur, vt à maleuolis, & inuidis se vindicet. multi enim præter omnium spem modo quodam mirabilij superstities fuere : quare virgente necessitate, quod euellendum est, euellatur, quod duobus modis eximi-  
tur, aut per foramen, quod introiuit, aut ex opposito situ, facta noua sectione, si non longè à cute pila cõ-  
sisterit. Si verò multum ab ea distat, & altius infedit, ac specillo percipitur, per laceratum vulnus, leui-  
teruè, pro viribus extrahatur, omni studio, vt modò celeriter, modò tardiuscule. vt res postulat, & cõ-  
modum apparebit, ac æger tolerare possit, opus perficiatur : verum, si decet, vulnus ampliatur, non tam-  
men maiori sectione, quam glans ipsa requirat, sed ea forma, & quantitate, qua quod ingressum est,  
extrahi possit, ne noua disruptione magis noxium vulnus reddatur. nec prius sectio facienda est, quam  
globulus adiuuentus fuerit. valde enim turpe est, si facta noua sectione, globulus compertus non fuerit,  
nec assequi à Chirurgia quod voveris. vbi autem satis incisum est, relum eximatur, eadem cura habita,  
30 ne sub eo, quod eximetur, aliquid eorum laedatur, quæ tuenda esse proposuimus, quæ verò per dia-  
bolicum tormentum impelluntur, varias effigies seruire solent, vt per figuras in officina positas aperte  
dignoscitur. quæ interdum ex solidioris corporis contactu permittuntur.

Si pila sphaerica fuerit, ac partibus carnosissimis infixæ, specillò in latiori parte conuersò, siue flexu,  
sub forma, de qua in officina paratò, administrabimus; siquidè accommodatum instrumentu indicat, præ-  
sertim in membris amplioribus, ac vbi aliqua datur cavitatis eius imaginem in officina videbis.

Si verò euenit, quod tale instrumentum incommodum reperitur, illud expariatur, quod specillò  
annulare dicitur, virgula argentea est, res, crassitudine specilli, in cuius extremo annulus quidam effor-  
matur, vt pilam quicquid accipiat, eius forma in officina est.

PROBATVR hoc annulare specillum, vbi pectus, aut infimus ventris confossus fuerit, aut vbi cætera  
40 instrumenta ingredi nequeant, antequam vicinæ carnes intumescant, ac inflammatione vexentur, aut  
partes vulneris coerent, si globulus ossi adhererit, illud opportunum est, quod, quia hani eligimus præ-  
se fert, hamulus, aut vncus, siue vncinus retusus vocatur, à Paulo verò cyathicus dicitur. sub duplici  
modo, nempe simplici, aut duplicato, eius formatur imago, vt in officina.

POSSUNT fortassis hamuli, siue vncini in cathenarum, aut globulorum diuisorum, aut partis lori-  
ce, aut similibus rerum extractione valere, non tamen tutò, ac sine molestia, quæ culpides adeò acutas  
contineant, quare à multis reprobantur. Sed illud instrumentum magis vlti seruatur, quod Alphonsi-  
num, ab Alphonsio eius inuentore, dici solet. Instrumentum est, tribus ramis munitum, qui ab vno solido  
corpore originem ducunt, cannulo ferreo mobili circumdantur, qui si cuspidem versus traxeris, ramos  
elaudit : Si contra, eos aperit, qui intus denticulati sunt, vt apprehensa pila, aut eo, quod in vulnere re-  
30 sider, strenuè amplectetur, & teneant: exterius verò lene, & æquales apparent, vt per figuras faciliè cõ-  
prehenditur in officina suo loco descriptas.

Si globus altè infederit, & sedes carnosæ fuerit, illud celebre instrumentum est, quod eo quia rostri  
anterioris imaginem præ se fert, Anserinum merito nuncupatur, præsertim vbi varia rerum fragmen-  
ta occultantur, & corpora quam plurima minima extiterint, vbiq; probatur. Heras fuit huius inuen-  
tor, & eius vtilitas per figuras dignoscitur, in officina suo loco depictas.

NON sine maxima vtilitate parata habemus quædam instrumenta, quæ quia formâ rostri Gruis, aut  
Arcadis imitantur, Gruina, aut Arcadina nuncupantur. formantur in officina.

Si locus vulneratus sinuosus fuerit, & vulnus argustum, Ciconinum instrumentum nostræ inuentio-  
nis, quod frequenter vitum, turum, ac securum esse opinamur, vt potè quod ad extrahenda quælibet  
60 corpori infixæ aptissimum habetur. quippe securè, velociter, & sine dolore operatur, quicquid apprehē-  
dit, tenaciter retinet, facillimè ingreditur, & sine noxa egreditur. duobus tantum dentibus in eius imo  
muniur, quibus plumbeas glandes capit, & ex omni parte commodè extrahit, vt per figuram in offi-  
cina compendat videre licet.

SECTVM, ac quietum in pilis plumbeis educendis Anserinum, & Ciconinum instrumentum iu-  
dicatur: atamen apud quasdam nationes aliqua probantur organa ramificata, quæ varias effigies serua-  
re solent : & quod primò occurrit, ex tribus partibus fabricatur, nempe ex vno trunco, ex duabus par-  
tibus pro quodam torculo vitro, & ex cannulo exteriori, à quo rami quatuor, qui à trunco originē  
ducunt, clauduntur. Sic. n. apprehensa pila, opus totum tutò perficitur. videas in officina primò trun-  
cū diuisum, qui per torculum vitri potest: secundò cannulum, & tertio instrumentū perfectum.



Ad hoc opus etiam ea instrumenta opportuna sunt, si globulus ad cauitatem, aut ventrem deuen-  
rit, quæ apud Teutonicos parantur. formosa sunt, insigni artificio fabricata, tribus alis ramificata, ac  
quam plurimis alijs negotijs vtilia. istis sæpe vimur illius loco, quod Græci Dioptrion, & Dioptera, &  
Latini speculum vocant, ad Vteri, aut Ani pulsiones indagandas accommodata. nobis à Clarissimo And-  
rea Mattheolo Senensi Cæsareæ Maiestatis Medico, donata fuere, ea conseruamus, & vimur. Roche-  
te vocantur, & sub formis effingi solent, de quibus in officina.

Cum in osse aliquo globulus firmiter infixus fuerit, ac ita hæreat, vt nullo ingenio inde dimo-  
ueri possit, Terebro solo, aut cannulo cincto, quemadmodum magis ex vñ indicabis. vt educatur, te-  
rebello globulum perforando, operam dabis: siquidem instrumenta sic parata, apud Chirurgos castra  
sequentes, perpetuò circumferuntur. Cannulum ferreum est, teres, longitudine digni, per medium diui-  
sum, per quod medium hastula teres in imo torculara pertingit, quæ paulatim, & gradatim conuolui-  
tur. sic enim, dum supra plumbæam glandem cannulus firmatur, & terebrum circumducitur, pila ita ap-  
prehenditur, quod amplius dimoueri nequit, & facillimè absque carnis noxa extrahitur. Alterum simile  
paratur, cuius extremus torculara exterius apparet. facit nempe ad pilas, & ac sagittas absque hastili  
euellendas, vt per duas figuras videre expedit in officina positas.

Alia cannuli forma integra parari solet, quæ huic operi conducere videtur, ac plurimum vsui  
seruat, vt ipsa pariter cū suo terebro fabricatur, vt ex tribus figuris apertissimè dignoscitur, quæ sunt  
in officina descriptæ.

Non desunt quàm plurima alia instrumenta, his operationibus accommodata, quæ nunc, ne nimis  
prolixa sit oratio, dimittere decreuimus, sequentes nimirum operandi modum. Si ergo euenit, vt par-  
tem aduersam fecare liceat, vbi caro crassa non apparuerit, ac propè cutem telum quieuerit, nec nervus,  
aut vena, aut tale quidpiam obstitit, quominus ad globulum vsque sine periculo vulnus perueniat,  
secetur; & si globus se ostenderit, tunc aut digitis, aut hamulis, aut rostro aliquo, aut terebris, aut alio  
ingenio, in quo firmati globulus commodè possit, aut quicquid continetur, euellatur, statimque specul-  
lo, aut digito, si intus quid aliud præter naturam remanserit, perquiratur. nam, vt dictum est,  
solent globuli varia secum asserere, ignis, si lorice fragmenta, quia summi infixi, aut minima, aut abscon-  
dita, euelli nequeant, nullo modo viliqua extrahi debent, sed naturæ dimittantur, quæ aut vñ cū pu-  
ris copia, aut orto aliquo abscessu, similia transmittere solita est, ad plenum obleratis, quæ ab Hippo-  
crate connumerantur: Siquidem si affectum summouere non valemus, cauere saltem debemus, ne il-  
lum augeamus, quare cum i. cm. aliter se habere cognoscimus, quàm quæturò per nos tractari possit,  
ab opere abstinere debemus.

### De victus institutione, ac dolorum sedatione. Cap. III.

**H** Vbi globo, si sanguinis profluvium apparuerit (interdum enim in his vulne-  
ribus parçissimè effluere solet) eo modo, quo sæpius dictum est, fistatur. quam-  
uis multoties ipsum emanare, præsidium optimum est. si enim vulnus siccus, &  
ab inflammatione magis tutum redditur. laudatur tamen ad sanguinem cohiben-  
dum, bolus armenus, thus, aloes, & sal, dimisso nempe oui albumine, & posca,  
si decet, quæ ex aqua, & aceto componitur, sin minus, eo vii conuenit. si hæc non  
iuvant, ferro ignito locus pluries aduratur, nam sic & caro attrita abluetur. de-  
inde si dolor atrox membrum infestauerit, qui ad vires potesternendas, morientique ciendam fortis-  
simum (symptoma est, si certè renoueri debet, siquidem vulnus sanari nequit, dolore prius non sedato).  
Huic igitur symptomatico citò, ac totis viribus, incumbere licet. Hac ratione, vulnere vniuerso commodè  
linteolis, aut puluils ex stupa probè pexa repleto, aliquod cataplasma ad hoc dicarum, vt dolores tol-  
lar, & fluxiones inlabat, super dari debet. simile parari potest ex farina hordeacea, fabaceaque, ac pul-  
uere subfississimo rosarum, nirtolorum, pimpinellæ, & consolida: addito vino nigro, oleo rosato, sambacino, & sapa. Porro, vt citò dolor quiescat, nil præstantius oleo sambacino, & sulphure ignem non ex-  
perito: veluti, Recip. olei san. bacini vnc. ij. sulphuris viui drag. ij. parum bulliant, & vtre. adhuc etiam  
præstantissimum remedium esse solet oleum de terebinthina, & illud de momordica, aut hypericonis  
magistrale, semper addito sulphure, vt dictum est. Intemperie aliqua apparente, contrarijs qualitatibus  
tollenda est. Dolores ergo à mala temperatura genitos communiunt, & commodè sedamus in at-  
tritris vulneribus, aut saltem mitigamus, euacuato, vt expedit, prius corpore, factò ad particulâ lasam  
forti, ex sambacino, & rosacco tepido, si præstito fuerit, quod sæpe renouari debet. vel si eorum copia nõ  
adit, ex communi oleo, quod modice incaluerit, quibus, si oui luteum, vbi magna inflammatio, aut ve-  
hemens caliditas non apparuerit, adiciatur, præstantius adhuc efflicies auxilium, valent solani radices  
tritæ, & suilla axungia exceptæ. iuuat etiam emplastrum ex maluis decoctis, ac tenuissimè tritis, additis  
furfuribus tritici cribratis, oleo rosato, oui luteo, & croco, medulla etiam panis, in seruenti lacte de-  
cocta, aut aqua macerata, cum rhodino, vitellis ouorum, & croco, efficacissima est. hæc circa. & supra  
vulnus applicanda sunt, eo prius, lichius leuibus tamen, & quæ ad fundum omnino non perueniant,  
tereben-

- 20 terebenthina, & oleo hypericonis, aut zanetino madefactis, repleto; nam hæc dolores leniunt, innatum calorem corroborant, & affectam partem ab omni putredine vindicant. probatur etiam ad hoc oleum sambucinum, & siliaceum. nonnulli etiam periculosissimi viri affirmant, celebre prædium esse, vinum citoniorum, aut mucillaginem ab eorum seminibus extractam, & verè secretum mirabile est: ac si à malo succo, qui ad affectum consuevit locum, mala aliqua temperatura oritur, siue eius qualitas fuerit, aut redundantis copia, ad finem desideratum deuenire oportet, nempe sanguinis missione, quæ sine mora celebranda est. & si venefici alicuius affectus suspicio aderit, alexiterij, idest medicinis veneno resistentibus per os sumptis, clysteribus, dieta conuenienti, quiete, & similibus tollatur: demum apocrofticis (idest medicinis temperatè repellentibus, quales illæ sunt, quæ aliunde occurrentes sibi succos repellant, & transmittant) affecta sedes regatur; non tamen ut potentius refrigerent, sed ita, ne vis venenifera
- 40 quid remanserit, ad internas regiones remeet, & nè vulneratus locus, ob confluentes humores, intumescat, siquidem in laceratis vulneribus, ob loci imbecillitatem, quamplurimæ ibi aggregantur superfluitates, non tantum ex tarda congestione, sed defluendo, siue à toto, siue ab officiali membro, plenitudine aliqua laborante, ex quo pars affecta imbecilla reddatur. vnde mirum non est, si inflammatione, aut sphacelo, facillimè attingatur. ob id querendum est, ut membri propria habitudo, siue temperies conservetur; quæ instrumentum est, quo natura ad manutendendum quod sibi proprium est, ac familiare, & ad expellendum quod noxiū est, & non naturale, vititur. repellunt temperatè, non absque aliqua corroboracione, vinum nigrum austerrum, cui albumen, oleum mirtinum, rhodiū, hydreleōn, idest aqua & oleum, oxelaēon, idest acerrum, & oleum, ceratum rosatum, aut ex pilulo, bolus armena, terra lemnia, puluis coriandrorum, farina fabacea, & similia. Interdum fasciæ rite conuolutæ, aut vincula (si perius adhibita, quæ nec dura sint, nec graua, ne pressio loco dolores augeantur, nec deest infirmo loco repellens auxilium adhibere, sed superius collocandum est, ut quod transiuit, inhibeat.
- 50 In his omnibus operationibus, cauere oportet, ne pus, aut ichor, siue sanies retineatur, sed defluat, & omni studio queratur, ut medicamenta commodè intromittantur, & quod omnes partes indifferenter attingant. ob id negamus aliquam fore vilitatem in laqueo, quo multi vtuntur, dum ab utraque parte vulnus peruenit, sed turandæ tantæ duntaxat longitudinis sint, ac crassitiei, ut ne vulnus ex toto claudatur, sic vt prohibere possit, quo aptè ex eo pus effluere valeat. Ex quia de maxime alterantibus corpora nostra, est aer, ideo hic temperatus eligatur, victus tenuis, & paucus instituitur. cibaria cruda, acuta, salsa, & quæ humidum succum gignunt, aut multum nutriunt, dimittantur. vinum omnibus, nisi maxima apparente indigentia, interdicitur. aqua cocta potus esto, aut eius loco hordeacea, aut psilane cremor propinquetur. motus fit nullus; nam his quies optimū remedium est. somnus naturalis bonus, vigilia longæ malæ, animi accensus, ac venus semper mala. His omnibus opportunè institutis, vulnus in digestionem, absterisionem, exsiccationem, & alijs requisitis indicationibus secundum temporis necessitatem regatur, hoc addito, quod Chirurgi munus non est, plus minusuè, quam deceat, infringidare, aut calcetere, aut quouis alio modo dolores excitare, ligando, stringendo, cooperiendo, fouendo, cataplasmando, aut lichinia, siue turundis perperam administrando, quæ omnia Empiricis familiaria sunt.

### De medicamentis concoquentibus, & pus mouere potentibus. Cap. IIII.

- 50 **M**EDICAMENTA, quæ accedente calore innato, pus mouent, seu (ut isti dicunt) vulneta digerunt, ex methodo his vulneribus administrantur, ut potè pro dignitate habetur, quod in contuso vulnere, si qua caro ex telo contusa, & dilecta fuerit, curare oportet, quo quàm celerrimè suppuretur; nam & minus inflammatur, & breviori tempore sanatur. necesse est carnes contusas, ac dissectas putrefcere, & pus fieri, liquari, ac consumi, postmodum nouas nasci: non præparata ergo huiusmodi vulnera committi non solent, etiam si adducantur, nec sua sponte coeunt. Horum præparatum medicamentorum opus est, sua caliditate, ac temperata humiditate, in crudis, aut indigestis vulneribus, aut in ijs, quorum pori, siue meatus, aut vicinæ viæ obstruæ fuerint, ad extranearum humiditatum sensibilem euacuationem præparare, caliditatem digestiuam vigorando, materiâ ad alterationem similem illi disponendo, quæ in puris generatione fit. Hæc in vulneribus, coagularum sanguinem, ac illi admixtas humiditates superfluas, obstruæ, & compactas, necnon in extremitatibus venarum notabiliū, ac minimarum partium, videlicet attritarum, ac in locis ipsam attritionem ambientium præparat, digerit, ac disponit, ut sub quadam puris latitudine expurgetur, quippe congelario, & costrictio hæc frigidorum medicamentorum applicatione, ac ambientis aeris actione produciunt; fucus liquidum alieni partium defluendo ex potentia virtutis expulsiuæ membrorum validorum, varias superfluitates ad imbecillia transmittentium, partim per congeriem ex debilitate virtutis digestiuæ, & ex pulsiuæ (idest affectu in vulnere congenerantur, & præparationi, aut quia crudi, aut quia multi, aut quia eterogenei (idest, diuersarum substantiarum) aut quia extra propria vasa sunt, rebelles huiusmodi. hæc de re, præsertim in his contusis, siue attritis vulneribus, hanc indicationem administrare conuenit, potissimū
- si prius

si prava non adfuerint symptomata, quibus illico incumbendum est, vulnere non neglecto. Igitur sup-  
 pressio sanguine puris generationem festinare oportet, & lithinia, siue penicilla quæ digerente, seu  
 (vt rectius dicamus) præparante medicamento illinita, in vulneribus imponere, ac proximas partes li-  
 nimento modicè repellente, ac vi corroborandi prædito oblinere, & superposita lata petia eodem dige-  
 rente munita vulnus talsia sic, vt nullo modo dolorem inferat, obligare, hoc seruato, vt aut per positio-  
 nem situs, aut facta sectione opportuna, sanies liberè perpetuò effluere possit. igitur vulnus partem  
 specier inferiori, vt à consuetibus humiditatibus in mune reddatur. postea, vt patiens quiescat, cu-  
 randum est. Quæ pus mouent, diuersimodè parantur, & quæ primum ordinem seruant, hæc sunt. Re-  
 cip. olei rosati vnc. iij. vitelli ouorum nu j. misce. Secundum, Recip. olei rosati maturi vnc. iij. vitellos  
 ouorum nu. iij. croci parum, misce. Tertium, Recip. resinae terebenthinae vnc. iij. corticum thuris,  
 masticis an. drag. i. j. olei rosati maturi, hypericonis an. vnc. j. vitellos ouorum num. i. j. croci pa-  
 rum, misce. Quartum est Galeni Picatum, aut tetrapharmacum, ex pice colophonina, cera, & adipe  
 taurina, aut viulina. huic addunt aliqui rhodinum, & oui luteum. Huicemodè medicamen-  
 ta non solum pus mouent, sed doloribus opitulantur, vnaque absterunt, & corroborant. lini-  
 menta verò, quibus vicina iniunguntur, sic parari solent. Recip. olei de cortibus sambuci, omphaci-  
 ni, masticini an. vnc. ij. vnguenti sandalini, ceræ an. vnc. j. misce, aut Recip. vnguenti rosati me-  
 fues vnc. ij. boli armeni vnc. j. acetici rosati q. s. pro linimento. aut accipe duos capuculos recens natos,  
 vernium terrestrium vnc. ij. olei violati, rosati an. vnc. ij. coquiro, & percolato: vulnus, donec omnis  
 suspicio præterierit, sic pertractabis, vel donec vllam futuram inflammationem videris, quæ ad septimā  
 vsque, aut decimam quartam diem semper timenda est. Vulnus quotidie, nisi magna saniei copia appa-  
 ruerit, hyeme semel, bis à state curabis. Pure denique in quali & quanto laudabili apparente, indicatio-  
 nes mutare expediet: & hoc vnum aduertendum est, quod in contusis vulneribus, aut magnis attritioni-  
 bus, vel semiadustis, aut aliquo veneno alteratis, non ita velox sit saniei præparatio, veluti in alijs, & pu-  
 rioribus, nec in omni ætate, aut habitudine, temporis constitutione, viuendi modo, & sexu, sed in aliqui-  
 bus citò, in alijs ferius. Et, si vulnera huicemodè vnius mēbris vtrunque latus perforauerit, decet equi-  
 pe ambas partes, donec optime expurgatæ fuerint, & à symptomatibus liberæ, apertas conseruare. igitur  
 duo lithinia mollia, ac tantè longitudinis, vt se contingant, aliquo conuenienti medicamento illini-  
 ta, imponantur: laqueolus vtriusq; ex linco panno digiti latitudine, qui vtranque partem amplectatur, non  
 semper probatur, nisi carnosus pariter tantum perforatis: Siquidem, vbi ossa læsa sunt, aut quid præter  
 naturam in vulnere continetur, solent & dolores, & inflammationes asserre, ac internam corruptionem  
 producere. Nec consolidacionem accelerare oportet: nam hi affectus non curantur, nisi sedes affecta  
 fuerit optime disposita, & à symptomatibus immunis.

## De medicinis abstergentibus, &amp; carnem inducentibus. Cap. V.



VMPRIMUM in vulnere concoctio aliqua, siue digestio apparuerit, quæ futuram sa-  
 lutem præfagiat, nullo dolore, aut inflammatione, aut extensione supernascente,  
 ad alias indicationes transire opus est, nempe ad conuenientem absterfionem, caui-  
 tatis repletionem, & optimam sigillationem, siue cutis inductionem. Sed quia  
 in solutis continuitatibus dux perpetuò producuntur humiditates, præsertim in deper-  
 ditæ carnis regeneratione, altera quidem subtilis, quæ ichor Græcè, & virus  
 Latine: altera crassa, à Græcis elyodes, & à Latinis sordes vocitata, ex tenui, vul-  
 nus humectatur, & ex crassa, sordidum redditur, idque duplici medicamento regi debet, vtique humi-  
 didum siccanzibus, sordidum vero expurgantibus. Ergo cum nullo vnquam tempore natura in hoc ces-  
 set, certè nec tempus vllum erit, in quo non vtrunque medicamentorum genus delideret, vtique &  
 quod siccet, & quod expurget. De necessitate talia vulnera curari sunt, præsertim dum pus copiosè  
 in eis conficitur. nam caro confusa corrumpitur, modò magis, modò minus, pro puris quantitate. insu-  
 per vi quadam globuli carnem introeuntes, eam contundunt, ac attritam reddunt, quæ postmodum in  
 pus conuertitur, & sic cauum vulnus efficitur. Sordes quoque fluentes, vt maius fiat cauum, non medio  
 critet conferunt. ergo in horu curatione absterfio summè necessaria est: italis quidem celebratur medi-  
 cinis, quæ aut nihil, aut parum mordeant, atque magis si febris, aut aliud accidens adfuerit. Quaratur igitur,  
 aut vulnus sordidum sit, à Græcis riparon dicitur, quod debiliori eget absterfione, aut sordidius,  
 quod fortassis nomodes dici possit, & validiorem desiderat absterfionem. quippe sordes tanquam te-  
 gumentum carnis, generationem prohibet. dignoscitur nempe, quia substantia est denia, coagulata, sub-  
 balbida, aut cinerij coloris, aut cæno similis. generatur quidem ex glutinosiori parte humoru cras-  
 sorum, & viscosorum interdu ab imbecillioribus medicamentis, sæpe à carne subsidente colligata  
 exit à magnis abscessibus, & vlcibus concavis, aut laceratis, aut malignis, & praua temperie affectis,  
 cum verò à ratione cautorum vulnerum curationem molimur, loco deperditæ, noua nascente carne,  
 ex ea videlicet, quæ subiecta est, id fieri non potest, si in vulnere sordes, aut copiosa humiditas insit: quare  
 prius expediet vulnus optime expurgare, postea in eo carnem producere, humores siquidem, qui à  
 corpore

a Gal. 3. meth.  
cap. 3.b Hipp. lib. de  
vulneribus.c Gal. 3. com.  
h. Hipp. de fac.d Gal. 3. meth.  
ca. 1. & 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
Aut. 4. 5. 6. 7. 8.  
e Gal. 3. com.  
h. Hipp. de fac.

10 corpore ad plagam feruntur, quia madefaciunt vulneris oras, committi, & agglutinari non sinunt, sed dolores, aut inflammationes concitant, & carnem, quae iuxta est, laedunt. Solent communiter medicamenta haec à Græcis, secundum eorum imbecillitatem, aut validiorem operationem, rhetrica symplicita, & cathartica, & à Latinis purgantia, & abstergentia vocari, eaque ab omni sanie, putredine, crustis, efcharis, squammis, carne addita, & similibus corpus, & vulnus nitidum reddunt, & mundant: at ea proprie purgantia dicuntur, quae folis vulneribus applicantur, ut ea à propriis fupei fluitatibus mundent, veluti sordida à sordibus, virulenta à virulentiâ, putrida à putredine, vermiculosa à vermibus, & similia; & eorū opus est in subtili materia detergere, & exsiccare, & in crassa, attenuare, & dissolvere. Porro abstergent, & vulnus nitidum reddunt medicamenta diuersarum formarum, siquidem alia simplicia, & alia composita sunt: ac inter simplicia enumeratur hordeacea farina, lupinorum, orobi, aloes, aristolochia, gentiana, apium, alumen, & similia, & quibus aliqua amaritudo, & acuitas ineest, præter mel, quod ceteris præstat. Inter composita hoc probatur, Mellis vnc. iij. farinæ orobi vnc. ij. olivani, irios an. vnc. j. succi apij vnc. iij. misce, aut Recip. mellis vnc. i. o. farinæ filiginis, lupinorum, hordei an. vnc. j. myrrhæ, aloes an. vnc. s. succi apij, absinthij an. vnc. iij. terebinthinæ claræ vnc. ij. bulliant succi vna cū farinis, inde omnia addantur, & secundum artem fiat vnguentum. Facit ad hoc vnguentum Ius, quod ab emplastro cerasæ, aut ex duodecim rebus Apostolorum vocitatur non multum differt, aut per se, aut alteri admixtum: nos verò, si magna sanierum copia, aut sordium, siue immunditiei aliud genus in his vulneribus apparuerit, nullum præstantius medicamentum invenire potuimus, quàm simile. Recip. Terebinthinæ claræ, succi apij an. vnc. ij. farinæ orobi vnc. j. vnguenti ægyptiaci vnc. s. & plus, si decet, misce, in tenebris, & delicatis corporibus ad faciliorem ingressum, & ut in omnē finem facilius iniiciatur, cerato humido, aut cerussato colligare aliquod horum medicamentorum expedit: in militibus autem, aut in his, qui laboribus afflicti sunt, aut vitam sub Sole degunt, marina aqua, aut lixiuio: at si lorio aliqua opportuna fuerit, fiat cum vino, aut lixiuio, aut lupinorum decocto, addito ægyptiaco, ea quantitate, ut non admodum mordet. Ex si vna cum absterfione corroboracionem expectabis, Recip. aquæ consolide, centaureæ, caudæ equinæ an. vnc. x. myrtillorum, mirabolanorum, citrinorum, radicum glycyrrhizæ, consolide maioris an. vnc. s. pimpinellæ, tormentillæ an. m. s. thuris, boli armeni an. drag. ij. zuchari rosati vnc. ij. misce, & fiat decoctum, & si expedit adde ægyptiaci vnc. j. Cumque ab omni sorde vulnus denudatum fuerit, carne repleatur, & tunc in eo medicamenta, quæ à Græcis sarcotica, & à Latinis carnem producentia dicuntur, imponantur, ea nempe, quæ primum exsiccacionis ordinem non multum transgrediuntur: & circa hoc quædam contemplari oportet, primò sedis affectu radicale temperamentum, secundò vulneris conditiones. nam si membrum humidè temperaturæ fuerit, vulnus verò non, tunc exigua exsiccatio in primo videlicet ordine fiat criti in membro verò siccò, & vulnere vehementer humido, quæ in secundo, & tertio ordine exsiccant, sunt opportuna: in temperatis postea temperata profunt: porro ab his, quæ vehementer alstringunt, immodicè siccant, ac sua ærmonia mordicant, cauere oportet. Adhuc in noua carnis generatione conijcere decet, ac membrum proprium seruet se periem, & si sanguis, qui fluit, bonus sit, & in quantitate moderatus, nam si membrum proprii qualitatum symmetriam non seruauerit, ad temperiem contrariis qualitatibus reducatur. Si verò sanguis in qualitate peccauerit, serapijs, ac victus regimine conijcere debet: si multitudine, sanguinis missione, & tenui victu corrigatur: sed cum membrum in temperie constitutum fuerit, & sanguis bonus extiterit, ac vulnus ab omni immunditie expurgatum, proculdubio in eo caro bona produetur, quæ ferè absq; medicamento procreabitur, cum natura in optimo persisterit statu, agatque in patiente bene disposito cum determinatis conditionibus. Adhuc scire licet, quod materia carnis est sanguis bonus, opifex verò natura, quæ id spontè efficit, ubi a Medico vniuis ab impedimentis purgatum, ac absterfum fuerit: Medicamenta verò, quæ hoc faciunt, ea sunt, quæ sanguinem bonum in carnem coagulant, & permittant, & sub diuersis formis parantur, aut suffus, siue pulueris, aut loisionis, aut vnguenti: pro puluere probatur thus, iris, aristolochia, mastix, aloes, panax, cadmia, pompholix, farina trui, tabarum, hordei, & similia: profundiores verò sinus ablueri non est inconueniens, decocto centaurij, consolide equiseti, foliorum oliuæ, thuris, irios, & prædictorum in vino dulci, aut aqua theriacali, aut chalybeata, aut aluminosa: aut hordeacea, aut dulci lixiuio, quod Græci siactè vocant, semper addito melle, abluatur leuiter, ne dolor exacerbetur: puluillis inde nec longos, nec crassos aliquo emplastro munitis inferere oportet, veluti illo Galeni, quod circum dicitur, aut diacartu, quod de charta combusta vocatur, aut Macherionis, aut dicroma, aut illud celebre barbarum, vel simile aliud, quod exsicco ea moueat, quæ à tali operatione naturam impedire solent: recentiores verò eo vtuntur medicamento, quod, quia citri colorem præse fert, citrinum vocant, alij ob refinē ingressum resinum; multi basilicum, siue regale laudant: nos verò hoc probamus, Recip. olei mastici vnc. j. s. abietini vnc. j. mannæ thuris vnc. s. equiseti, tormentillæ, pilosellæ, consolide maioris, hypericonis, plantaginis, betonicæ an. m. s. vernium terrestrium lotorum cum vino vnc. ij. vini nigri austeri q. s. misce, & liqueatur ad ignem vsque ad vini consumptionem. postea coletur, & facta forti expressione, adde eere, sepi hircini an. vnc. iij. thuris, myrrhæ, mastici, aloes an. vnc. s. misce, & secundum artem fiat vnguentum molle. desuper verò lintecola diaphanice emplastro, quod diapalma isti vocant, masticio oleo liquato mu-

a Ex Glicone  
anquilmo.  
Ex Scribonio  
Largo.  
Ex Gal. Aet. &  
Pseudo.

b Gal. 3. meth.  
ca. j. Aulic. 4. l.  
cap. 1. & 2.

c Gal. 3. meth.  
cap. 3. 4 Aulic. 4.  
4. cap. 4.

d Gal. ad Glime.  
ca. de sim. 1. de  
comp. medican.  
genia.

a 9. de sum.  
mod. iaculanti-  
bus.  
b 9. de comp.  
mod. Katag.

nita superponantur. Si verò exterius fortiora medicamenta fuerint opportuna, multa ex metallicis 10  
confecta parantur, veluti illud epipasticum,\* aut ex squamis: b lineaeolum verò plurimis in locis per-  
foratum sit, vt vulnus perpetuo expurgetur, sique in ea quantitate, & latitudine, vt saltem per duos,  
aut tres digitos torā vulneris circumferentia amplectatur, ac superposita stupa, duplici panno inuoluta,  
fascia lata, & longa, prout membri vulnerati situs, & magnitudo exigat, vulnus deligabis. Repleto vulne  
re, cicatricem inducunt, quæ carnis superficiem adeo potenter exsiccant, vt ipsam in cutis morem, du-  
rā efficiant, quæ inter senaria membra locatur, ideo neque augetur, neque coalescit, veluti ceratum  
de minio, aut grecum, aut palmulatum: sic enim scilicet petorum vulnerum, præsertim carnosarum par-  
tium, absque prauis symptomatibus, curationem influere oportet.

### De symptomatum, Quæ fulminatis vulneribus occurrunt, correctione. Cap. VI.

20



A 11. a, ac sua symptomata his fulminatis vulneribus superuenire solent, quorum  
a aliqua indicatione sumpta à natura partis affectæ, ferè necessariò occurrunt, quæ  
admodum in partibus nervosis, trillius sensus, inflammatio, febris, & convulsio;  
vel indicatione sumpta à teli impetu, sanguinis copia, contusio, siue laceratio, quæ-  
dam combustio, nervorum attritio, ossium fracturæ, & aliqua venifica dispositio:  
aut indicatione sumpta à Medici mala curatione, membri corruptio, sphacelon  
Græci vocant, aut ancylositas, aut ea ferè omnia superius enarrata; hæc de re, vt  
ea, quæ apparent, corrigantur, fludere oportet: verum quia superius abundè de sanguinis fluxu, trilli  
sensatione, & inflammatione dictum est, sæpè fuerit ea hic pertransire: sed tantum de attritione, combu-  
stione, nervorum sectione, ossium fracturis, convulsione, veneno, & sphacelo, quæ omnia in præsentia, lo-  
co cuiusdam accidentis habentur, nonnulla epilogando dicere expedit, & in primis de attritio, siue con-  
tuso, aut lacerato vulnere narrationem aggrediamur.

### DE ATTRITIONE.

9 Gal. 1. meth.  
c. 14. meth. ca.  
3. Act. 1. 16. ca.  
69. Paul. 1b. 4. c.  
30. Auct. 1. 1.  
doct. 1. cap. 4. R.  
4-4. 2. cap. 4. R.  
3.

V 1. ex violento aliquo ictu, vel alio quopiam valido motu à telo obtuso, carnosæ partes dila-  
niantur, & nervorum, aut tendonum villi, aut lacerorum extremitates iniuncte separantur, ta-  
lis passio attritio vocatur: cum verò nulla continui solutio appareat, simplex contusio dicitur:  
& si laceri substantia separatur, vulnus contusum nuncupatur. Fit itaque simplex contusio, cum caro 40  
sub irridente extrinsecus aliquo violento, valido, & duro corpore, ita colliditur, vt partis læsæ exter-  
na facies integra remaneat, & in profundo multæ, ac parvæ diuisiones occultentur. collisio etiam hic  
affectus vocari solet, à Græcis thlasma, & regmadum verò partes apparètes carnosæ nimirum adeo se-  
gregantur, vt maxima fiat sanguinis manifesta effusio, diapedesin Græci vocant; loci tumefactio, ac vul-  
neris laceratio, ab Auicenna attritio, & dissolutio dicitur. in qua non solum caro attrita apparet, sed li-  
uida, inæqualis, & dolore prædita, vt in fulminatis vulneribus apertissimè dignoscitur, quæ interdum  
admodum rarò externas tantum partes lædunt, sæpè verò profundas aut internas, & vt plurimum ne-  
cancia sunt. Cum igitur ad extrinsecorum curationem accesseris, duæ tibi occurrent indicationes, qua-  
rum prima ad dolores sedandos dirigitur. Secunda, vt quod attritum, aut contusum est, præparetur,  
& in saniem vertatur: nec oportet, vt prima indicatio fiat in attritione, cum redictione continuitatis par-  
tium laceratarum, sed ad remittendos dolores. Effunditur siquidem in his sanguis plurimus, & par-  
tes imbecilliores redduntur, dolent, ac inflammantur; vnde sphacelū veteri oportet, præsertim cū eius  
diffusionem, ob vehementem cutis constitutionem à telo, ab ambiente, & medicinis frigidis, sperare  
absurdum sit. etenim carnes, quæ contusæ sunt, in pus verti necesse est. Vbi ergo dolorem vehementer  
virgere cognoveris, anodyna, & mitigatoria, vulnere non neglecto, exterius applices. Sedato nempe do-  
lore, puris generationem curabis, vt superius copiosè explicauimus: hoc semper seruato, vt, quæ in con-  
fortio situatæ sunt partes, in sua naturali dispositione conseruentur, & ab omni putredine defendantur.  
quare expedit interdum simili cataplasmate vri, sed prius inungantur oleo decoctionis foliorum vli-  
mi, extremitatum ebuli, & lumbicorum terrestrium. cataplasma sic paratur. Recip. farinæ hordei,  
seminum lini, scenugræci an. vnc. ij. florum camomillæ, fertulæ campanæ, fursuris tritici an. m. s. pulue-  
ris carniū dauci, spicæ, comarū absynthij an. drag. j. olei masticini, myrrini, mellis an. vnc. j. s. rob vnc.  
ijj. lixiuij clari q. s. & in fine adde boli armeni, sanguinis draconis, & secundū artē fiat cataplasma, quod  
totā contusam partem contegat: sic enim attritiones, loco cuiusdam symptomatus, regendæ sunt.

### DE COMBVSTIONE.




O 1. interdum (quod equidem mirum est) in his fulminatis vulneribus adustionis species  
quædam apparere, quæ fortassis caro contusa, & denegrata est, & satis molestem symptomam;  
parietes siquidem, quæ vulneris labra, à tali vehemente ictu, humido proprio quoquomodo  
priuantur, ac exsiccantur, quod in eis crusta quædam residere solet, quam Græci elcharam, vel potius  
ephecidan,


a 9 Arist. i. problem 56.  
b 9 Celli li. 7. ca. de adult.  
Act. 2. 14. ca. 6.  
Paul. 2. 4. c. 11.  
Aur. 4. 4. c. 2.  
c. 12.  
Ratio 7. ad Alas.  
cap. 10.

- 10 ephelecidan, vocant, his ferè similis, quæ ab ignito cauterio imprimitur. ob id aliqui talia vulnera inter adufla connumerare videntur. Escharæ enim partes sunt carnosæ substantiæ, aut cutaneæ, quæ à proprio humido relinquuntur, accedente calido aliquo in summo, & violento. Remouetur hoc accedens, sedato prius dolore, ac mala partis habitudine discussa, escharam dimouendo, quæ si debilis fuerit, duplici ratione, vel medicamentis, quæ modicè abstergant, non euidenter calefaciant, aut infrigident, ac moderate humectent, vel quæ membrum à putrilagine præseruent; hæc potissimum nou in ipso vulnere, sed circa vulnus applicanda sunt. Cum ergo vulnus aliquo aduflione affligitur, lichinita, quæ in eo imponuntur, tali medicamento conuoluantur. Recip. ouum totum contusum, & cum luto armeno, & farina hordei, & melle fisti vnguentum; aut Recip. vitellos ouorum afflarum numero ro. iij. ceræ albæ, spumæ argenti lotæ an. vnc. ij. misce. aut cerussam cum farina hordei, thure, & oleo myrtino. aut Recip. aquam, in qua calx extincta fuerit, & cum oleo nucum, cerussa, lithargyrio, & modica cera fiat vnguentum. aut Recip. olei rosati vnc. viij. niri albi subtilissimè puluerizati vnc. ij. ceræ albæ vnc. j. s. corticum internorum sambuci m. j. bulliant omnia, & colentur, & vtere. Circa vulnus latitudine quatuor digitorum rodeolum cum oui luteo, molli lana exceptum, applicetur, aut tale adhibeatur emplastrum. Recip. foliorum plantaginis, rosarum an. m. ij. coquantur, & pistentur, & adde vitellos ouorum numero. iij. olei rosati, farinæ hordei an. vnc. ij. lithargyrii argentei vnc. j. misce. eschara, si qua fuerit, vi dimoueri non debet, sed, vt sua sponte cadat, expectetur; inde vulnus secundum opportunas indicationes, regatur.

DE SAVCIATIS, SIVE ATTRITIS NERVIS.

- 30  A x o à globulis, præsertim diuersarum formarum, conuincum soluitur, quin attritum, aut dilaniatum appareat; vnde & nervosas partes affligi necesse est. nervi verò, tendines, ligamenta, seu sindeismi, quia eiusdem speciei sunt, parumque natura differunt, in presenti sub vno nomine comprehenduntur, vnde ad eorum læsiones, sæua admodum occurrunt accidentia, vt de aliis ceteris nervis superius explicauimus, vbi viciis regimine institutum, ac euacuandi rationes copiosè videre licet. In topicis verò, siue localibus medicinis, duo requiruntur, vt dolores tollant, & vulnus præparent, sed habita naturæ partis ratione, vinctuosa, & humida medicamenta, de quibus paulò ante egimus, omittenda omnino sunt, nisi fortè dolor, aut aliud simile, ad fetotam distrahatur curationem. tunc enim pars tota affecta, oleo masticino, è semine lini, & rosaceo fouere expedit; inde emplastrum superponere ex althea in oxybellitæ, aut lusuio cocta, cum farina fabarum, hordeacea, cruenta, rosati, myrtis, sapa, & oxybellitæ cum modico croco: si quidem in similibus vulneribus adeo attriturus, & lacerantur partes, quod quàm facillimè, & quauis leui de causa, aut inflammantur, aut sphacelo tentantur, quare nec penicillos interdum in vulnus immittere audemus, & siqui requirantur, breues admodum, mollesque sint, ne dolor augeatur. Vulnus primis diebus glutine albore in regatur, pro dimidio hypericonis oleo addito: postmodum tali medicamèto vti decet. Recip. resinæ terebinthinæ, aut abietinæ vnc. iij. olei masticini, hypericonis an. vnc. ij. seminum perforatæ, momordicæ an. drag. iij. sulphuris ignem non experti drag. ij. pulueris lumbricorum terrestrium, sub vmbra exsiccatorem vnc. s. modicè terantur quæ terenda sunt, ac in duplici vase per dimidium horæ bulliant, & colentur, & quod percolatum est, vsui seruetur, & si validior siccitas requiratur, ea quippe medicamenta, quæ superius libro tertio, capite de vulneribus nervorum, à nobis fuere descripta, opportuna sunt: si qua verò putredo, vt solet, in vulnere gignetur, rhodomelle tollatur, aut sapa cum ægyptiaco ita dè soluto: proximas verò partes, modicè replellente aliquo linimento, oblinire oportet, ipsi quæ vulnus deinceps opportuna fasciæ deligare, & quicquid ægrum committere; postremo ea ad vnguem seruanda, quæ in similibus vulneribus enarrata sunt.

DE OSSIVM FRACTVRIS.

- 60  I globulus, siue sphaerula vsque ad os peruenit, ac illud percussit, frangeritque, cum os eius impetum ferre nequit, inde negotio haudquam leui educitur: etenim tantus est huius teli impetus, ac tanta vis, vt quæ ad resistendū magis apta videntur, eadè magis lædantur; nā faciliè per fringuntur, atteruntur: ossa: vnde plerimi, qui liberantur, claudi anchilosi, aut titulosi remanent. dignosci tur fractura digiti, aut specilli impositione, ex inæqualitate, aut asperitate, aut à sede affecta, ex arbitrij motus impotentiâ, aut ex iusta natura, si alteri simili cõparabis, aut ab eius crepitu, aut quia detectū est, aut quia fragmèta exierint, aut apertè per vulnus manifesta sit. Duplici modo à forti ictu ossa frangi solent, vel secundū omnem partē, vel in ea tantū, vbi sedes affecta est, vel in hac, & alibi. Solet sanè euenerit ab huius teli impetu, vt altera parte fuerit ictus, & altera os sillum sit: hac ratione fabrica hominis, siue ossium compositio, quàm sceleton Græci vocant, vobis in mente sit. Porro variæ sunt horum affectus species, quæ, quatenus ad primum scopum attinet, nou sanescunt, quatenus verò ad secundum, quodammodo sanari possunt; nam fractura sic à Latinis dicta, à Græcis verò cragma, pro genere habetur, & est continuitatis in osse solutio, quæ secundum eius effectum diuersimodè nominatur, vt potè si per transversum in medio frangitur, agna Græcè, Latine transversalis, aut virgalis fractura nuncupatur.

Tract. 2. de vuln.

O 2 si verò



si verò finis ossis, qua parte maximè cum alio committitur, abruptus est, apagma Græcè dicitur: si autem secundum longitudinem scinditur, Græcè schidacidon, & Latine linealis fractura vocatur. Interdum à fracturæ forma ei nomen imponitur, aliquorum frustum, aut plantarum similitudine sumpta, nempe ad caulium, raphanorum, aut cucumerorum fractorum speciem, & formam, quas Græci caledon, raphanidon, & cicledon vocant, eas Latini astales, raphanoses, & arundinales dicunt, porro simplices fracturæ esse possunt, ossibus tantum fractis, nulla alia substantia læsa, sed non à causa tali, de qua sermo noster nunc institutus est; vt plurimum verò compositæ, componuntur quippe cum alio morbo, vt carnis attritione, aut diuerso symptomate, vt atroci dolore, aut propria causa, vt globulo ibi existente, præsertim cum intinè caro ab eo laceratur. Altera fracturæ species reperitur, à valde vehemènti ictu producta ad fursum imaginem, Græcè alphidion, & caryedon. Arabicè Sauchiem, siue aluichi, & Latine rimularis fractura denominatur, cum os in multis, 30 tenuesque partes frangitur. Adhuc fractura altera à globulo causata dari solet, quæ Græcè apotraulis, & apocope, Arabicè alkalia, & Latine re fractio, & præcisio dicitur, cum pars ossis per summitatem ruptam, seu superficiè abruptionem detrahatur; ita, vt pars ea, quæ detracta est, & recessit, & supereminet, vt ferè, fit cum squammula ab osse resoluitur. Quàmplurimæ aliæ fracturarum species videri solent, quæ ratione sedis affectæ, vt in primo libro de Caluarie curatione legitur, aliqua propria nomina sibi sortita sunt, quas in hoc loco silentio transire decreuimus. Galenus 40 tamen duas præcipuas fracturarum differentias tantum assignare videtur, nempe quæ per transversum, & quæ per longitudinem contingunt, à quibus potissimè indicationes curatiuæ sumi debent. Apud Celsum tertia reperitur, scilicet quæ obliquè procedit. Cum igitur ab ictu tali, ossa frangi contigerit, curantur & indicatione sumpta à fractura, & modo fracturæ: à fractura, æquatione, & cõ- 30 ueniènti deligatione. quippe Medicus, & luxationum, & fracturarum extensiones quàm directissimas faciat, oportet: hæc enim æquatio iustissima Hippocratis natura est: si verò quid vel huc vel illuc inclinauerit, ad pronam partem vergere iustum est: hæc de causa æquationi primò studere oportet. à modo fracturæ, particularibus operationibus, nempe fasciis, ferulis, splenijs, capsulis, & similibus. porro duæ indicationes sanatiuæ in omni ossium fractura conueniunt, membri æquatio, & ossium vnio, cum fractura fit morbus in forma, & plasmatione: nec aliud est membrum æquare, nisi illud secundum naturæ institutum plasmare, verum ad indicationum executionem, hæc tantum non sufficiunt; sed, & conueniens deligatio, cum membra dura non primò, & secundum primæ intentionis modum vniuntur, rote scilicet proprio, ac elementari, vt viscosa, ac mollia faciant, sed secundariò callo interueniente. ob id necesse est, vt diu membrum plasmatum, ac os, in propriam sedem iussè repositum, conuenienti deligatura conseruetur, præsertim in quiete, quæ in coniungendis partibus fecit admodum prodest, ac optimum medicamentum iudicatur: deambulare enim, aut stare, aut federe, in ossium fracturis minimè conferre videtur. Ergò statim homo in lecto collocandus est, siquidè absque longa quiete ossa non coeunt, nec poro ligantur: ac primis diebus parcissimè nutriatur, sed paulò plenius, cum symptomatum tempus præterierit: nam sat non est sola quies in calli productione, sed & victus ratio conueniens, quippe callus, vt Latini dicunt, aut porus farcois, vt Græci, vel afrobor, siud orasbot, vt Arabes, per se, & nullius alterius interuentu gigni potest. atque magis in viscosis, & humidioribus corporibus, quemadmodum in pueris videre licet. in adultis verò, & siccioribus, qualia sunt iuuenum, militum, nauigantium, & horum, qui sub sole, & in continuis laboribus vitam degunt, separatæ fracti ossis particulæ non per se vnquam, sed duntaxat quapiam substantia interueniente, seu glutine quodam colligari sepe contingit. est autem callus, substantia quædam glutinosa, exterius locum fractum adeo ambiens, vt vix remoueri possit; nam propriè callus ossis dicitur, cuius interuentu ossis fracti partes alligantur. generatur ex crassiore, ac viscosiore parte nutrimenti ossium: si quidem omnis nostri corporis particula sibi propriam, ac familiarem trahit alimentum: os verò crassius, ac viscosius nutrimentum, magis quàm aliud quoduis membrum, ad se adducit, exagipit, ex quo nutritur, ac vegetatur. Sed ibi primò feruet, ebullit, & concoquitur, ossisque substantiam extendit, & in quendam elatam tumorem, more stirpium, in quibus sunt insertiones. nam adinuicem, cum cal mellis sit, quædam ebullitio, postea agglutinatio, & ex tali concretione, ex duabus substantijs fit vnus corpus confertuminatum. sic in osse fracto euenire contingit: quare victus talis tunc esse debet, vt ex eo conueniens nutrimentum procreetur, & callus gigni possit, qui ex ossium nutrimenti superfluitate concrefcit, & ex ea scilicet abundantia, quæ à labris fracturæ perpetuò emanat, & est eius propria materia: producitur ædricæ naturæ, medicæ auxilio, membri æquatione, conuenienti deligatione, longa quiete, & victus decenti regimine. Hæc igitur in genere de ossium fracturis dicta sufficiunt. Singulatim verò si fortè in magnum quodpiam os globulus impegnerit, illudquæ dissoluerit, ac minutas partes reddiderit, aut vniuersum membrum perforauerit, & à sede dimouerit, dignosces primò, si cum sano membro affectum comparaueris, vel si membrum manibus pertrahendo, inæqualitatem perciperis, vel si pungentes dolores æquum affluerint, vel si ossis particulæ exierint. post hæc, digitis diligenter explorabis, nunquid vel globulus aliquis, vel ossis fracti, aut ferri, aut alterius rei frustulum, præter naturæ ordinem in sede vulnerata detineatur, quod, si fieri potest, eo, quo diximus, modo, extrahendum est.

- 19 est, idque magis si globulus solus fuerit, nec vllum prorsus symptoma, de quibus superius egemus, apparuerit: ossium verò particula forcipibus, aut vossellis, aut tenaculis, siue alio instrumento vi extrahenda non sunt: nam si magno conatu diuelluntur, ligamenta, tendines, membranasque, aut vnas, vel arterias lacerabunt: ex quo dolores vehementissimi fiunt, abscessus sequuntur, consilio appareat, & mors sæpe infertur. Sed opus penitus committatur naturæ, quæ cum puris productione, aut nouæ carnis generatione, ea quippe subnascente, tutò omnia extra mittit. quod admonet Hippocrates his verbis. Fracta ossa, nisi ex toto dimota sint, aut dolores inferant, vi non euellas, sed totum naturæ committas. verumtamen productio pure, si à ligamenti natura ossa fracta dimouerit: vel vbi abscesserint, vel vbi ex alimentis defectu à cæteris ossium partibus deciderint, si natura ea non extruserit, aut digitis, quod tutum est, aut alio ingenio euellenda omnino sunt, hoc semper seruat, vt si non iuues, saltem non noceas. Cæterum, si alia ossa simul componi possunt, & ad naturalem statum, siue iustam naturam reduci, aut in propriam sedem reponi, omni studio, vt id facias, nitaris Galeni præcepto in tribus commentariis de fracturis Hippocratis. at si cum fractura luxatio aliqua adfuerit, ea primò accommodanda est: postmodum quàm blandissimè ossa fracta extrahantur, aut, si decet, vniantur. inde in aceto, ac oui albumine additis pulueribus astringentibus splenia stupæ quàm mollissimè imbuta, ac expressa super fracturam inuoluantur: prius tamen non fracturam, sed sedem suprâ, & infra ad laticudinem sex digitorum rosacco, masticino, & oui luteo irrorabis, ac membrum totum idonea fascia, potestate retinendi prædita, vt dicemus, circundabis, deligabisque. penicillum vt molle, & opportunum in vulnus, nisi sanguinis copia emanauerit, cum terebinthina, bolæarmeno, & modico fale immittes, ita tamen, ne dolorem inferas: postremò studere oportet, vt affectum membrum in ea statuatur.
- 30 figura, ne dolore afficiatur, & vt perpetuò materiæ expurgari possint, & vulnus eo modo triduo gubernetur: interim si magni æstus apparuerint, & dies fuerint caniculares, rosacco, addito vino nigro, totum membrum fovebis: si hyems, oleo camomellino, masticino, & de semine lini: pure autem apparente, fascia forcipe adeò diuidatur, vt vulnus totum pateat, & detegatur, à quo commodè pus effluat, & secundum opportunam occasionem topica medicamenta permutari possint. Si autem forularum, aut plagarum, aut spleniorum vltus expedit, membrum concinnè munies, non tamen ita arctè, nec primis diebus, vt noceant: sic procedatur, nisi fortè aliquod insigne peremerit accident, quod & falscia, & ferulas, & capsula remouere cogat. hoc seruato, ne ante diem septimam, aut decimam ferule adhibeatur. multoque minus si timor adfit, ne dolores, aut inflammationes accersiturae sint, vel præsentem, si adeat, exasperent, nec eo nomine vnquam adhibeantur, vt astringant, sed vt aptam figuram conineant, & ossa in suas sedes reposita vtunque fulciant: sed quales ferule esse debeant, & quot sint deligandi modi, petendum est ab Hippocrate, & Galeno. b Si verò globulus articulum, siue concatenationem læserit, ac se se inter duos ossa demerserit, & maximos interat dolores, tunc negotia quàm plurima operanti assent, & ægotanti mortis periculum. quare, quàm citissimè fieri potest, extrahatur: quod si statim accepto vulnere non fit, aut saltem secunda die, magno inde labore expediri solet. igitur adinueto globulo, duo membra, quæ articulum component, duabus falscijs sulcare decet, quæ per has in oppositas, ac diuersas partes per duos ministros diducenda sunt, ad hoc vt ossa, tendones, sindefini, & lacertorum capita extendantur, ac maior in articulo fiat amplitudo, vbi telum receptum fuerit, quod inde minori cum difficultate extractioni parabitur. hoc fiet specilli conuexi auxilio, aut coclearij, aut rostri ciconini nostri. Si verò firmiter adhærebit, terebrum torculatum solum, aut cannulo munitum, summopere ab omnibus probatur: aut quemadmodum magis commodum ex visu esse iudicatur. verùm terebello torculato, globulus perforatur, apprehenditur, & extrahitur, nec scalpello ad os in circuitu excidendum, quo in sagittis ossibus infixis educendis vtimur, egemus: Si quidem globulus suo ictu, & figura sibi locum facit. at si opportuna instrumenta in promptu non habebis, patientem cruciare non debes. nam orta inflammatione, aut cum os contusum exierit, secum globulum adducere solet. os siquidem alteratum tandem, & si diu, carne salefem subnascente, extra mittitur, nec res admiratione digna est, si multo tempore globuli, ac sagittæ intimè conueniant. nam Hippocrate teste, quidam iuxta inguen sagitta percussus, quem nos vidimus, maximè præter omnium opinionem seruatus est, neque tota cuspis exempta est: erat enim valde in profundo, neque sanguinis eruptio vlla memorabilis fiebat, neque inflammatio, neque claudicauit. cæterum cupidè inuenimus nos, ipsamquè exemimus, cum sex iam essent anni, ex quo sauciatus fuerat. & Paulus a ait: Multis infixa tela integra intus insederunt, quæ vulneribus cicatrice obductis, deinde longioris temporis spatio partem eam abscessu occupatè, ac disrupto, exire, approbans hoc Albucaſus a ait: Vidi vultu, cui cecidit sagitta in dorso eius, & consolidatum est vulnus super ipsam, & post septem annos exiit sagitta in radice coxæ eius. At si ictus viscus aliquod primarium, ac officiosum læserit, quorum omnium affectuum causas, signa, prædictiones, quæ ad interitum vt plurimum prædicant, ac curandi rationes in superioribus libris explicauimus, vt quæ ex accidentium proprietate, sedis affectû postura, executionum qualitate, aut operatione læta, quia vix, aut quia viciosè, aut quia nullo modo fit, deprehenduntur: ob id de his ictibus in presenti hæc satis.

a Lib. de fract.  
& l. de luxat.  
b l. de falscia.

c Quinto Epid.

d l. l. cap. 11.

e l. l. cap. 6.

## DE CONVULSIONE.

**N**ON secus à convulsionibus, quæ alijs partibus sectis occurrere solent, ea, de qua nunc sermo habendus est, dignoscitur, præfagitur, & curatur, quare cum satis abundè in superioribus de tali symptomate locuti simus, hic tacite transire licet, & sat est dicere, quod si his fulminatis vulneribus illud oritur, ob patientis nimium timorem, aut nobilium partium noxam, mortem nõ dubium portendit.

## DE VENENO.

**I** plaça, qualiscunque fuerit, veneno aliquo tingitur, adijcienda festinanter curatio est, quæ vel opoto veneno (& sit per medicamenta à Græcis alexipharmaca dicta) vel à serpente, aut quouis alio animante icūs adhiberi solet, & sit per ea medicamenta à Græcis alexiteria vocitata. Interim tota, si fieri potest, aut saltem ea pars, quæ veneno affligitur, abscindatur. dignoscitur quidem, quia à sana, & naturali variat, quippe pallida, aut subliuida, aut emortua apparet. Si verò ex toto leparari nequit, profundis scarificationibus (saltem locus feriatur, ut sanguis malus expurgetur: necideo alienum erit cucurbitulas adhibere, vel ut pillus, siue vilis homo ore proprio sano, sed prius preparato, simulque & ventriculo, elu nempè rubra silvestris, aut salis, rutine, & caricarum, ac aceto abluto vulnus exuat, cui inde tale applicetur medicamentum. Recip. terebinthina: claræ vnc. ij. olei hypericonis vnc. vna: heriaccæ optimæ vnc. s. euphorbiæ recentis, terræ figillatæ an. vnc. ij. misce, & parum bulliant. aut imponatur Aegyptiacum bis, aut ter, cui non est par, vel præcipitatum hydrargirum cum thei iacæ. Loca verò circumcincta luto ipso armento, aut Dianæ sigillo aceto rosato soluto, si præfuso fuerit auxilium, succurrantur. inde medicinis strenuè attrahentibus, venenum euocetur, vel ignito cauterio, si locus neurosus, aut arterijs, venisque plenus non fuerit, sæpe aduratur, donec tota malignitas, quæ talis est, & non simplex venenum, consumpta fuerit; siquidem contra virulentos hos icūs tale præsidium expeditissimum est. vt pote cum ignis cætera viribus præflet. at si vri non potest, à venis cordi, ac vulneri longinquioribus, si vires valide sint, sanguis mittatur: si vulnus angustum fuerit, primis diebus turundæ parentur ex adipe suilla, adeo vt totum impleant vulnus. est sanè in veneno cui rahendo secretum mirabile. Si verò carnem totam à veneno immutatam circumcidere non possit, non ab re fore iudicatur, profundis scarificationibus, circumcinctas regiones aperire, attrahunt potentissimè alteratos humores, ac male naturæ, & quam plurimæ carni infixa aliqua medicamenta proprio calore, aut à similitudine totius substantiæ, veluti sermentum, propolis, arundinum radix, animoniacum, sagapenum, aristolochia, polypodium, ranæ combustæ, adeps leporina, tapia, dictamnus, tuta syluestriis, viscus quercinus, mel, & similia: in his vicibus regimen esse debet, qui opoto veneno exhiberi solet. Alexipharmaca verò parantur ex theriaca, mithridata, trisera, bolo armeno, terra lemnia, & similibus. Alexiteria ex dictamo, ruta syluestri, scordeone, tormentilla, zedoaria, bistorta, aristolochia, & huiusmodi. Sed quia credere coacti non sumus, vulnera huiusmodi absolute veneno prædita esse, circa huius symptomatis profigationem non multum laborabimus.

## DE SPHACELO.

**O**SYRUM symptomata, quod aliquibus vulneribus occurrere solet, est membri corruptio, quam Græci sphacelon, Arabes aschachilon, siue echachilon, & Latini slicationem appellant: pessimum morbi genus est, quod eius crudeli, ac tyrannica malignitate, nisi citò corrigatur, totum membrum citissime corrumpit, ardētissimas excitat febres, virtutes prostermit, & patientem necat: sit frequenter ex vehementissima inflammatione, aut ob eius magnitudinem, aut pessimam qualitatem, aut ex mala velocis natura, aut ex pravo sanguine, aut ex medici imperitia, membrum valde de laqueando, aut suturæ arcuæ, ipsum constringendo, quæ in laceratis, & attritis vulneribus fugienda est, aut humida, & vinctuosa diu vulnere applicando, potissimum verò ob intemperiem calidam, qua partes vulneris eliquantur, & calor naturalis destruitur. sæpe quidem labra vulneris à copia pravi lucci fluentis imbibuntur, & ab imbecilli calore reguntur, & putrescunt, ac proximæ partes corrumpunt, ut quotidie in sphacelo, & phagedæna fieri videmus. Dignoscitur autem, cum partes denigrant, ac malo odore affectæ, adeo languent, vt percussæ, aut sectæ, aut adustæ penitus non sentiant: cumque membrum sic fuerit dispositum, confestim ad eam, quæ viuit, partem, & proxima sanæ fuerit, relecandum venit: si qua verò ratio hoc prohibuerit, profundè, ac frequenter sectiones, quas scarificationes vocant, imprimantur: sunt quippe multum ad huiusmodi curationem efficaciæ: ac ubi sanguis ille corruptus plurimus effluerit, locus marina aqua, aut lupinorum decocto, præfertim in lixiuo, addito sale, & aceto sæpe abluatur; deinde medicamento aliquo putridis, ac noxiis vlcibus destinato, iungatur; inter quæ ægyptiacum cæteris præstat. quod si non iuuat, ignis cauterijs aduratur. at si malus color, ac putredo amplius, fiat cataplasma ex farina fabarum, orobi, lolij, trochiscis Andronij, oxy mellite, & lixiuo, & factis profundis incisionibus, calidum applicetur,

10 cetur. & si malum his præsidij non tollitur, sed vitius procedit, & vulnus phagedenicum euadit, de-  
nuò tota corruptio diligenter aduratur. postmodum el-chara, cum dura euascriit, aut succo porri, aut  
butiro, aut hordeacea farina, hydræleo decocta, donec amoueat, fouere oportet. vbi verò exci-  
derit, curatio reliquis vlcibus communis adhibeatur. Si verò aliqua corporis particula, nempe ma-  
nus, aut pes, adeò fuerit lacerata, aut eius ossa ex toto denigrata, aut corrupta apparuerint, ac de eius  
vita nulla amplius relinquitur spes, illic illam amputandam esse censemus, & runc ea seruanda sunt,  
quæ in secunda nostrorum voluminum sectione, capite de membrorum corruptorum amputatione  
exposuimus. Hæc igitur ad Dei benedicti laudem breuiter de hac curatiua methodo dicta sufficiat,  
ac primo nostrarum sectionum volumini finem sic imponimus. in posterum verò, si nobis Dei bene-  
20 ficio vita longior constiterit, eo fauente, multa ad omnium studiosorum vtilitatem perscribere  
decreuimus. nempe hinc ad paucos dies, in Secundo commentaria de famosis Vlcibus, ac mem-  
brorum singularium, de fistulis, de vlcibus sinuosis, de quamplurimis affectibus cutaneis, ac de  
loe indiana siue diabolica, quam isti gallicum morbum appellant. postmodum de multis operationi-  
bus chirurgicis nos tractaturos vobis pollicemur. In Tertio verò de tumoribus præter naturam in  
vniuersum, & singulatim pertractabimus. In Quarto de ossium fracturis, ac eorum luxatio-  
nibus pariter edituri sumus. In Quinto de secundis, siue mediatis chirurgorum operationi-  
bus agemus. postmodum epitoma totius artis chirurgicæ in vnum redigemus. po-  
stremo Chirurgiæ officinam impressam, in lucem dare decreuimus, vbi ea fe-  
rè omnia instrumenta, quæ diligenti, ac approbato Chirurgo in suis  
operationibus opportuna esse creduntur, concinnè deli-  
neata videri poterunt. Interim valete,  
& nos, vt debetis, amate.

F I N I S.





CHIRURGIAE

# IOANNIS ANDREAE A CRUCE VENETI MEDICI.

## Libri Tertij. Tractatus I.

### De Vlceribus.



#### Quid sit vlcus. Cap. I.



VERBA DRODVM conuinitatis recens solutio, quam Graeci tlasna, & Latini vulnus appellant, morbus est simplicium, & compositorum membrorum communis, siquidem ambabus his sedibus diuersimodè occurrere contingit; Sic & vlcus, iuxta Graecè dictum, affectus est in quantitate diminuta, compositus, sed carnosus praecipue partibus, cueniens & ea ratione, qua vlcus est, alicui humiditati semper adiunctum reperitur. Porro apud Galenum legitur, vnum esse morborum genus, quod soluta continuitas dicitur; quae, dum in carnosa sede imprimatur, vlcus vocitari debet. Amplius scriptum reliquit, vlcus continuitatis solutionem esse, & causam, quae ex amissa aliqua anima

Gal. 1. Meth. 1.  
Meth. cap. 2.  
lib. 2. Medicep.  
cap. 18. lib. de  
morb. diffin. 3.  
lib. de mor. &  
sempt. ca. Antic.  
1. 1. cap. 3.  
Meth. cap. 3. 4.  
Meth. cap. 1. com-  
ment. 1. lib. de  
tra. 1. c. 1. 1. 1.  
Meth. cap. 1.  
Meth. cap. 3.

lis propria substantia est contraria. Vterius ab eo dictum est, quod in omni vlcere cauo duplex excrementum provenire necesse est, quod omnem qualitatis alimentum mutationem sequitur, alterum crassius, alterum tenuius, sordes nempe, & ichor, ex crasso, vlcus fordidum, ex tenui humidum, redditur. Et cum nullo, vnaquam tempore natura cesset in hoc, cesset nec tempus vlcum erit, in quo non ambo haec in vlcere colliguntur; hac ratione purulenta profluuijs vlceri, qua vlcus est, sibi quoddam proprium indicatur, ob id dicebat Aesculapius, Solutio continui plurimum accidit cuti, & vocatur excoriatio; & si accidit carni, quae ei propinqua est, & nondum factum est pus, vocatur plaga, idest vulnus; sed cum pus sit, vlcus dicitur: unde non abre haec vlcis definitio, seu descriptio communiter approbatur. Vlcus affectus inqueraturus est, in diminuta quantitate carnosarum, ac mollium partium membrorum organicorum, cui saepe vna, aut plures complacantur dispositiones, eius sanationem prohibentes; à quo pus, aut purulenta quaedam colluuijs perpetuo excitatur. Cum igitur vlcus affectus, sedis potentias, & operationes impediatur, morbus est, & in diminuta quantitate, aut ablata, aut erosa, alicui humiditati adiunctus. Et differt à cruento vulnere ratione propriae essentiae; siquidem vulnus, vt vulnus, morbus simplex esse potest, nam affectus corporis vnam tantum qualitatem interdam auferit, nempe vnitatem: sicut verò de vlcere dicere expedit, cum plures eius dispositiones tollat. Ratione adhuc partis laesae: nam vlcus affectus proprius est tantum partis carnosae, & organicae; & vulnus morbus est simplicium, & compositorum membrorum communis: Simplicium verò, quae organa similia sunt, & fungitur officio, vt nervus, os, & similia, potissimum dum eorum nutritio corrumpitur; siquidem homogeneae partes aliter laedi non possunt. Ratione insuper causae efficientis; nam vlcus vltimum à causa primitiua, siue interna; & vulnus à prochatartica, siue euidenti causatur. Ratione temporis, quoniam vlcus, antiqua, & saniosa diuortio est, vulnus verò cruenta solutio cauit. Ratione

3. 1. cap. 4. & 4.  
cap. 1. 1. Al-  
balib. 3. 2. 18.



10 In situ, ut in conspectu, veluti in pectore, in locis absconditis, ut in faucibus, in sede occulta, ut in vte  
ro. Hac ratione vlcus interdum dicitur intus conditum, aut exterius apparet, in parte superiori, in  
medio, in fine, secundum longum, aut latum, aut profundum. A numero, & vlcum pluralitate, à  
varietate compositionis, quando plures insimul coniunguntur morbi, ut est vlcus compositum cum do  
lore, tereidine, inflammatione, aut febre. Adhuc particulares aliquæ differentie, quæ nihil faciunt ad  
naturam affectus, & habent omnino suam essentiam à natura vlcis, ut vlcus est, alienam, & curios  
as eas Galenus vocat, variz nominantur, nempe vlcus Chironeum, Telephium, phagedenicum, &  
his temporibus Gallicum, omniaq; id genus. Nam partim ab ijs, qui primum ea sanantur, ut Chiro  
neum à Chirone centaro, partim ab ijs, qui ipsi fuerunt affecti, ut Telephium, à quo Telephium  
Rex, qui à simili vlcere, contracto à sagittis Herculis, diu vexatus est. A fine etiam aliquæ sumun  
tur differentie, quippe vlcera aliqua ad sanitatem facillimè reducuntur, ut benigna, plana, sine ac  
cidentibus, id magis, si in parte carnosa extiterint, & concoctio optima apparuerit: aliqua  
verò, ut cancerosa, fistulosa, tereidinosa, aut cacoethica, sanari nequeunt: quæ autem sani  
tati idonea sunt, aut longo, aut breui temporis spatio, ad salutem reducuntur. Præterea aliqua  
vlcera à natura producuntur sub optimo fine, ut in bonis significationibus occurrit, quæ interdum  
citam curationem non exposcunt, sed præseruationem solum desiderant: aliqua ab arte sunt, vel  
luti cauteria, & diuerticulos, quos isti tontanellas vocant, aut fetanos. Et si differentie hæc valde  
remotæ sunt à natura, & quiditate vlcum, & propriam, priuatamq; curatione non desiderant: nihilo  
minus vlcum differentias ponunt ob id, quia aliæ ab alijs affectibus, aut symptomatibus vlcum com  
plexum declarant, à quo curatiua methodus sumenda est. Porrò omnium harum differentiarum cog  
natio, & ad prognosticum, & ad methodum curatiuum facere videtur: siquidem vlcum omnis cau  
sa, quæ curationem prohibet, primò tollenda est, semper id obseruando, quod compositis morbis in  
dicationes curatiuæ compositæ sunt adhibendæ. Et si apud seniores medicos simplicis vlcis inter  
dum nomen reperitur, non ob id datur vlcus simplex sub vlcis ratione, sed ut inetrigo aliqua, aut  
simplex excoriatio, aut alter similis affectus cutaneus superficialis absq; sanie: sed simplicis illa vulne  
ri potius, quam vlcis, attribuenda est. Quod ex eorum verbis elicere possumus: nam Galenus, cum  
de solo, seu simplici vlcere, quod tantum vlcus est, idest nullum alium affectum adiunctum habet, &  
citra vitiosum succum, aut fluxionem, aut intemperiem, aut aliquid aliud vitium permanet, sermo  
nem haberet, iubet, ut partes diductæ coniungantur, & non id solum, verum etiam coniunctas mane  
re: at si vel præ eorum magnitudine hoc fieri nequeat, ut disunctæ ipse partes exactè ad inum vsque  
40 sibi coniungantur, vel sutura, vel sibi illis, vel ligatura vtendum censet: quas operationes nullo modo vi  
ceribus conuenire opinatur, sed morbo in soluta continuata recentis, qui vlcus dicitur. Paulus  
etiam agens sub titulo de simplici vlcere, ait: Quoniam simplex vlcus coniunctus solum est diuortium,  
si quis partes diductas fascia orbiculatim circumdata commixtat, utiq; citra aliquam aliam indicationem  
coibit. Auicenna pariter dicebat: Omne vlcus necessariò est vel solum, & ipsum per se, aut composi  
tum. solum autem si exiguum fuerit, tunc eius labra vniri debent, ipsumq; fascia constringi. Nos ve  
rò, dum de simplici vlcere loquimur, de eo, quod purum est, intelligimus, cui nec affectus aliter, nec  
symptomata complicatur, sed tantum passio in soluta continuitate est, saniosa, & inueterata. Hi igitur  
sunt veri fontes, à quibus vlcum propriæ differentie sumi debent.

De causis Vlcum in genere. Cap. III.



F'ESTVM in diminuta quantitate, quorum nunc sermonem habituri sumus, Lib. 7.  
causas geminas fore, apud Celsum, & Galenum legitur, nempe internam, & ex  
ternam: eam verò, quæ in ipso animalis corpore consistit, internam, antecedentem,  
& præcedentem Latini vocant, Græci verò proigmentum: quæ verò ex  
intrinsecus occidit, externam, euidentem, & prægressam Latini, & Græci procatartica  
dicunt. Nam quoddam morbi genus reperitur, quod in quantitate partium  
diminuta consistit, & eius ortus duplex est, alter ab erosione, alter ab exci  
sione proueniens: verum excisio, quo pacto eueniat, non latet. erosio si intrinsecus ab ipso animali  
60 prouenit, vitiosi succi soboles est, & cacochimiam, idest malorum humorum vitium, aut abundantiam  
inducit, ut in malis vlcibus spontaneis, aut vomitis, idest apertis abscessibus, dignoscitur. Consi  
tudo siquidem naturæ est, talia in passionibus facere, corpus videlicet mundificare, & materiam erga cu  
m expellere, vnde læpe vlcus efficitur. Succus enim aut quantitate, aut qualitate mala affecti, dum  
expelluntur, aut magnas inflammationes, quæ membri compositiones, & habitudines destruant, aut  
pustulas malas, aut veneno præditas, membri nutrimentum corrumpentes, gignunt. Affectus hi ex  
deprauata victus ratione, aut alicuius vlcis, nempe iccinoris, aut lienis, aut totius corporis mala di  
spositione oriri contingunt. Modi generationis vlcum, inquit Princeps, sunt abscessus disrupti, aut  
plaga, quando facie pus, aut bothor, qui se comedunt. Porrò hæc immediatæ causæ sunt fere omnium  
vlcum. Procatartica verò, siue euidens, aut externa diuerso modo se habet, nam quæ exterius eue  
nit, si

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

Gal. lib. 7. de  
mor. mult. 6.  
Aphor. 38. 2.  
prædictorum.  
Gal. lib. de chro  
nes m.

nit, si telum fuerit, vulnus primò fit: quod dum protrahitur, & inueterascit, purem gignit, & vlcus nuncupatur; si longa membri rei duræ tritatio, intertrigo, aut excoriatio producit; & cum sit pus, vlcus est. Idem facere potest validum medicamentum, vt ignis, aut res igneam potentiam obiens, scilicet picum, aut epiroticum, Græci dicunt. Morfus item animalis, malus aer, contagio praua, & his similia, quæ etsi illicò cum sanie non complicantur, internas nimirum, & humorales causas commouent, vnde postea saniosi euadunt affectus. Generice igitur vlcum cause illæ sunt, quæ non necessariò corpora nostra alterare possunt, pariter & humores illi, qui nostri corporis constitutionem ingrediuntur. Nec obstat dicere, procarctica causa affectum immediatè saniosum non producit, ergo nec vlcus, quod affectus saniosus est; nam sanies simpliciter vlcum causa non est, sed eius effectus, & vlcus compositionem declarat. Et si vulnus, aut contusio immediatè, & primo statim occurrit, cum sanie nõ appareat, aut complicatur, non propterea affectus est absque sanie, quæ paucis peractis diebus in eo manifestatur: sanies enim in vlcibus produci nequit, nisi ob id, quia nutrimentum, quod in eo de mandatur, ad quandam seminaliam transmutationem alteratur, & hoc cum tempore, ob affectu se dis imbecillitatem, in qua à validioribus partibus variè transmittuntur humiditates, quæ ex diuersorum calorum actione in saniem conuertuntur. Ad quod etiam facere videtur vnguentorum operatio, & patientis, ac membri affecti habitudo humida, aut malè affecta; & quales illi fuerint humores, tale vlcus dici solet; nempe si ichorosis, & corrosiuus, tale & vlcus erit; si sordidus, sordidum & vlcus; si putridus aut corruptus, sic & vlcus effici solet. Arbitramur igitur, quòd generice vlcum cause illæ sint, quæ corpus alterare possunt; specificæ, aut antecedentes, aut extrinsecus accedentes, singulares humorum defluentium potentie, & operationes, ac exulceratæ partis substantia, & habitudo, necnon malum patientis regimen in sex rebus non naturalibus.

## De Vlcum indicij. Cap. IIII.



**V**LCUM signa, siue indicia interdum ab eo, si simpliciter, sæpe etiam ab eorum complicatione sumi possunt, tanquam ab eo, cuius essentia, & natura rei; siquidem simplex vulnus tantum continui diuorij est, & per se stat, ac se ipsum solum demonstrat, nulla causa, nullo symptomate, & nullo affectu cum ipso præcedente, inuadente, aut subsequente. Adhuc illud laudabile solum, & benignum vlcus est, quod carnosus partibus tantum occurrit, & quod citò sanescit, in quo pus illud apparet album, lenè, æquale, & minime fatidum. Principalis causa sue benignitatis est totius corporis bona habitudo, virtutis robor, sedis affectus temperies, & nutriment bonitas. Illud vero compositum iudicatur, si cum morbo alio, nempe inflammatione, aut terredine, vel symptomate diuorij, veluti dolore, aut intemperie, aut causa propria, sicuti nutrimenti malitia, aut obstru-  
cositas, & huiusmodi alia. Dignoscitur vlcus, si cum inflammatione complicatur, & qualis illa fuerit, colore, calore, dolore, duritie, & dimensione: singulatim verò ex inflammationis proprijs notis, si cum ossis tereidine signa sunt. eius sit opertura caro, quæ eum ambit, ac tegit; nam mollis, & liuida est; humor emanans ater, copiosus, & fatidus; ossis aspreudo, inequalitas, & tumiditas, facilius specilli ad os ingressus, ac corrupti ossis exitus: simplex verò intemperies calida notescit ex rubedine aliqua, dolore miti, colore modico, ac frigidarum qualitatum beneficio: frigida ex colore subalbido, aut cinerico, dolore stupido, ac loci mollitie, & calidorum auxilio: humida colore pallido, laxitate, & mollitie, ac humiditate plurima & tenui, dolore debili, aut nullo, siccis rebus iuuatur: sicca colore squallido, aspreudo, siccitate, puris penuria, ac eius tenuitate, nullo dolore humectantium re-  
mediorum suffragio. si dolor vlcum locum molestaueit, eius malam arguit temperaturam, aut contumaci diuorij, aut ambas causas simul. si à caliditate, & siccitate originem duxerit, pungitius erit, locus florido colore alteratur, & febris subsequitur. si à caliditate & humiditate, grauius dolor urget, & tumor rubedinis obscure eleuatur. Frigidus humor, nisi diffusetur, dolorem non facit: aut si adest, ille quidem extensius perlenitur: siccus verò stupidum dolorem facit. Notescit hoc symptoma ex se; nam tristis sensus est, & nocius: cruciantur interdum vlcera dolore, ratione naturæ loci affecti, aut fluentis humoris qualitate, aut ob medicamenti acrimoniam, aut propter extranea in eo reperia, vel mala mendendi ratione. Notescit vlcum causa propria, quæ si fuerit nutrimenti malitia, mala apparebit concoctio, & vlcus, aut virulentum, ac sordidum, aut corrosiuum euadit: si mala se dis temperatura, notæ iam explicatæ sunt. Si corpus aliquod diuersum vlcus occupauerit (nempe pilus, vermis, os corruptum, aut quid simile) viuo, aut tactu percipitur: ab ijs igitur & similibus, vlcum indicia cognoscuntur, sumpta quippe ab eorum essentia, effectibus, & causis, tam internis, quàm externis. Post cùm vlcus cuiusque sue sunt propriæ notæ, quibus vnum ab altero distinguitur, sumptæ nimirum ab ijs, quæ eius definitionem ingrediuntur, vt infra proprijs locis singulatim demonstrabimus. Scire adhuc oportet, quòd vlcera sua habent determinata tempora, initium, incrementum, maturationem, & delitesceniam: quæ ratione concoctionum suorum excrementorum consequuntur; siquidem, cum tenuius ab vlere, & aqueæ fere substantiæ crudæque emanat iecor, principij indicium manifestat.

Gal. 4. Meth. ca. 2. li. 6. Aphro. co. men. 47. Paul. li. 4. cap. 38. A. m. 4. li. 6. 14. Galien. art. par. m. cap. 5.

ad 35. de quæ. 100. 101.

10 nescit. cumque hic humor crassescere incipit, ac eius copia minui, incrementi signum est. consistit verò morbus, cum pus optimum apparet: minuitur verò, sed crassius, & albidius euadit, in morbi declinatione, in qua æger non moritur.

De ijs, quæ Vlcærum curationem prohibent. Cap. V.

30 **S**UNT causæ quamplurimæ vlcærum curationem prohibere, veluti corporis totius malus habitus, nempe cachecticus, aut hydropicus; plethora, idest omnium humorum abundantia; cacochymia, idest vnus tantum humoris copia, ex quo sequitur corporis prauus color, aut cinericius, aut obscurus; nimia corporis scabillitas, eius ætas infantie, aut senectutis; affecti membri imbecillitas, aut suæ compositionis natura; aduentitia temperies materialis, aut sine materia; intensa durities, aut nimia mollities; situs decliuis, aut absconditus, aut cauernosus; exercitium, stando, deambulando, aut quouomodo læsum membrum defatigando; alimentei defectus, aut fluentis sanguinis penuria, aut corruptela; sæpe ictericis, aut lienis, aut ventriculi imbecillitas, aut intemperies, ex qua sanguis malus creatur: aut in qualitate, quia adustus, aut frigidus, aut venenosus, aut quia nimius, vnde inflammationes facillimè excitantur: vlcæris insuper complicatio cum alio morbo, aut propria causa, aut diuerso symptomate; veluti cum mala temperatura, dolore, inflammatione, ossis tereidine, vermium copia, carne addita, virulentia, forditie, forma spherica, aut fistulari. Aliquæ etiam sunt, quæ extrinsecus adueniunt, & intus resident: vt puluis, os, lapis, aut oleaginosa substantia. prauus cibus, cæli status, seu ambiens aer malus, mala medici indicatio, aut chirurgia: valde humida medicamentum, aut debilitas abstergentia, aut quæ naturæ membri aduersatur, aut vlcæri contraria sunt, administrando, sed vt magis hæc enumerari eluceat: Dicimus, quod eorum, quæ vlcærum curationem impediunt, aliqua se tenent ex parte causæ antecedentis, quæ multiplices sunt, nempe sanguinis ad partem vlcæratam fluentis malignitas: quod aduenit, aut ratione substantiæ, aut qualitarum. si merito substantiæ hoc sit, aut quia subtilis & acutus, aut quia viscidus & crassius. si merito qualitarum, aut quia adustus, & corrosiuus, aut quia frigidus, & crudus: quod contingere solet ob prauam internarum partium dispositionem, veluti membrorum nutritioni dedicatum; vnde vlcera diuersa producuntur, nempe virulenta, corrosiua, putrida, & similia. Legimus apud Galenum, quod lien interdum, sicut & iecur, male affectum, vitiosi humoris auctor est: quibus antea prouisis, sic tandem ad vlcæ curandum venire oportet. pariter si vniuersus corpus cacochymum, aut plethoricum extiterit, prius cum purgare, aut euacuare expedit, quam medicamentum vlcæri admoveamus: Aliqua se tenent ex parte sedis vlcæratæ, ex ijs, quæ inter oras glutinandas intersunt, aut ob eius intemperiem, in substantia propria, aut in qualitatibus. in propria substantia, si dura: aut obstracola fuerit, aut tereudo adsit in osse, aut cancer locum occupauerit. in qua hiantibus, calidis, aut frigidis, aut humidis, aut siccis: quæ omnia nutrimentum, quamvis optimum, pro corporis nutritione, à natura ad partem vlcæratam transmissum fuerit, alterant, aut corrumpunt.

50 **D**ictum quidem à Galeno est: Quoniam verò vlcera quædam sanici, humorumque vlcæratæ partibus influentium vitio cicatricem ægrè admittunt: quædam etiam succum in ipsa læsa parte influentem quemlibet probum corrumpunt. hac ratione dictum est: Subiectæ carnis affectus causæ rationem obtiner ad id, quod efficitur. ea igitur plane pro natura sua se habeat, oportet. temperatam iñter esse subiectam carnem ad vlcera glutinanda, & carne replenda profus oportet: nec hoc fat est, sed sanguinem, qui confluit, & bonum esse, & modicum quantitate: nam qui corruptus est, tantum abest, vt ad glutinandum vlcus sit utilis: sed nonnunquam corpus erodit, & exulcerat, ad multus humor multæ excrementa in vlcæribus excitat, vnde eius moratur sanatio, atque hi tres ægrè sanabilibus vlcærum modi videntur: qui ex intemperie subiectæ provenit carnis: qui ex vitio confluens sit sanguinis: & qui ex mensura eius nascitur. Hac ratione interdum vlcera curationi diuicilia redduntur, non tantum propter proprium aliquem affectum, quantum propter consensum cum aliquo malo afflicti particulari, aut cum vniuerso corpore. In genere ergo ægrè sanabillum, ac rebellium vlcærum causæ se tenent, aut propter vlcæratæ carnis intemperiem, quæ in qualitate sola naturæ modum egressa est, aut cum accessorio quopiam tumore, aut ob fluentis succi maligniam, tum qualitate, tum quantitate, aut addito osse corrupto, vnde vlcus cacobethes euadit. Huius rei nouem causas Albucius assignare videtur: quarum prima defectus boni sanguinis est. Secunda eius intemperies, aut corruptio. Tertia laborum vlcæris durities, & siccitas. Quarta, humores varij in vlcere reperi. Quinta, vlcæris putredo, aut corruptio. Sexta, eius forma. Septima, cæli status, ac ambiens aeris dispositio. Octaua, praua patientis digesta. Nona, mendendi malus modus. Quod boni sanguinis penuria hoc faciat, notum est: siquidem materia gignende carnis sanguis bonus est, opifex verò natura. cum igitur horum alter defecerit, vlcus nequaquam sanabitur. Effetrix quippe causa, idest natura ipsa, quæ opificis rationem habet, nisi subiecta materia iustum temperamentum obtinuerit, & sanguis, qui ad eam defluit, bonus ac modicus fuerit (idest nec quantitate, nec qualitate vitiosus) carnem in vlcæribus non gene-

rabat. Hac ratione, senum vlcera, præsertim eorum, quorum radicalis habitudo sicca est, serò sanantur. ac leproforum, & cancerosa vlcera, cum ex melancholico putriantur sanguine, nequaquam sanari possunt. Sanguis præterea vitatur, aut quia eius officina temperata, ac vires proprias non feruat, in dictum est color corporis plumbeus, aut cinericius, aut lentiginosus; aut quia pars vlcerata cum corruptis, signum est sanationis mora, & accidentia mala: Quòd sanguis malus, aut ethereogeneus, non finit vlcera consolidari, clarum est: eius verò malitia, aut in propria substantia consistit, nempe quòd sit, aut magis subtilis, aut acutus, aut adustus, quàm debeat, aut in puris qualitatibus: quòd à Gale no confirmatur, cum dicit: Vlcera corrosiva pessima sunt, & eorum causa est sanguis subtilis, aut adustus, aut male naturæ, & vlcera, quæ non serpunt, chronica sunt, & eorum materia frigida, & crassa est: Quòd durities, aut labrosum vlcus obstruclitas, eius curationem prohibeat, in fistulis, & sinibus antiquis, ac vlcetibus scoloratis, manifestò constare videtur: Quòd multa ac varia humiditas hoc faciat, in ipsa, qui hydrops affliguntur, aut corruptiones curationem non admittant, sunt, manifeste dignoscitur: Quòd vlcus putredines, aut corruptiones curationem non admittant, pro confesso habetur: nam gangrenæ, siderationes, & phagedenes, affectus sunt destrucendi, & vlcera sanari nequeunt: Quòd aer malus, aut pestiferus, sit in causa huius effectus, ostendit Hipp. in constitutione pestilentiali, aut ubi ex malorum cibariòrum vii carbonæ, & puluile malignæ produciuntur: Quòd regionalis aer ad hoc concurrat, experientia ipsa declarat, siquidem in valde humido, aut rigoroso aere, vlcera tardè cicatricem admittunt. hac ratione dicebat Galenus: Considerare etiam conuenit & circumdantis nos aeris temperiem; siquidem, veluti medicamentum quoddam, is quoque corporibus nostris forisfectus incidens, ubi immodicus calore, vel frigore est, sanationem moratur: Quòd male vlcus conditiones curationi aduersentur, patet: nam sedis affectus imbecillitas aliunde excrementa recipere solet, atque etiam si quod affluit, quod pro iustis naturæ modo se habet: attamen vires ipsæ partis lætæ, quæ tum propter dolorem, tum etiam ex vlcere ipso imbecilles factæ sunt, non quòd iustum est, serant, sed veluti ab iniusto grauiantur: Quòd vlcus forma, aut spherica, aut fistularis, aut eorum antiquitas, vt thelchia, chyronea, discopulora, aut quorum basis teredo est, aut eorum complexus prohibeat curationem, omnibus notum ex longo experimento esse potest: Quòd mala medella, & prauus viuendi modus non sinant vlcera sanari, quotidie explorant diligentes chirurgi, dum incongrua medicamenta, aut extra tempus, aut quæ summe erodunt, vlcetibus adhibentur. Corelatiè igitur, acin vniuersum dicere possumus, quòd vlcus sanitatem prohibent, malus sanguis, praua partis affectus dispositio, os corruptum, malus aer, inordinatus vitæ modus, ac mala medendi ratio, & empirica chirurgia.

## De Vlcus prædictionibus. Cap. VI.

**V**LCERUM prædictiones, siue prognostica, diuersimodè sumi solent; interdum enim ab eorum simplicitate, aut complicatione, tanquam ab eorum essentia, potissimum à causis, & origine: aliquando à tempore, aut forma: multoties à sedis affectus compositione, & officio: vt plurimum à symptomatum natura, & fortitudine: nonnunquam à patientis ætate, virium robore, sexu, exercitio, & viuendi ratione: saluberrima sunt vlcera simplicia, parua, plana, locorum carnosorum, iu uenium boni habitus, ubi optimi puris indicia declarantur, absq. malis accidentibus: quibus actus; nec affectus vllus, aut fluxio mala consequitur: ac in eorum curatione vnam tantum requirunt indicationem, nempe opportunam, & moderatam exsiccationem, ac cuis inductionem, aut saltem organum vniotionem, & conseruationem. si pars carnosissima tantum, circa vlcus substantiæ amissionis diuisi fuerit, reliquum à natura, tanquam ab ordinato opifice, perficitur: Planities ergo, & patientis vlcus cum prædictis conditionibus salutem indubiam promittit: ætas pariter iuuentutis, aut consuetudinis, in qua vires omnes vigescunt, si patientis optima esca nutriatur, à qua bonus produciatur sanguis, salus ipem perpetuò promittit, inquit Princeps; Corpora, quæ vlcus curationem facillimè suscipiunt, sunt iuuenum, bonæ complexionis, paucarum humiditatum: quæ verò multæ humiditatis aut siccitatis sunt, tardè vlcus rectificationem suscipiunt, vt pueri, & senes existunt. Dictum est ab Hipp. Qui de vlcetibus cognoscere volet, quomodo singula finient, cum primùm hominū species perscrutari oportet: tum eas, quæ meliores sunt ad vlcera sananda: tum quæ deteriora: deinde ætates nosse, in quibus singula vlcera curatu difficilia existunt. locos item in corporibus perspectos habere, ac quantum alijs ab alijs differunt: sed & accidentia, qualia in singulis vlcetibus accedunt, tum bona, tum mala, nosse oportet. si quis enim omnia hæc nouerit, is sanè sciet etiam, quomodo singulorum cultus continget, & quales fines vlcus erunt: Porro potissimum vlcus salutem conuocatio ipsa demonstrat, nihil enim mal vlcus per generant aduenire potest: nam maximum vlcus signum ad fecunditatem, est opti-mus pus: ob id, dicebat Auic. Meliore significatione significantes vlcus salutem, sunt, cum in successione eorum apparet sanies, quæ fit cum medicina faciente sanem, & ex operatione naturæ, quæ est secundum cursum naturalem, & non generatur sanies, nisi à digestionem natu-

- 10 rali; & non associatur ei malum ex accidentibus vicerum malorum, & propriè sanies laudabilis, alba, lenis, æqualis, sine malo odore: Ea verò mala, & prava vlcera dicuntur, quæ in articulis, aut capitibus musculorum, præsertim nervorum, occurrunt; ibi enim nervi adnascuntur, & ex eorum finibus tendones oriuntur. hæc loca facillimè doloribus attinguntur, & quæ in dorso locantur, consensuales excitare solent: vlcera verò, quæ in loco non carneo sunt, apta non sunt, ut citò sanitati restituantur. Quæ verò aut in vtero, aut in ano, aut in obsecis partibus oriuntur, ob nimiam horum locorum humiditatem pessima sunt, & opus habent diligenti curatione. Ait Hipp. Aqua inter cutem laborantibus vlcera in corpore facta diffcultat sanantur. non aliunde hoc provenire solet, quàm ob humiditatum immoderantiam, quemadmodum etiam podice ipso exulcerato, occurrit, cum callis & via sit multarum superfluitatum: vtero vero gerentes ob id, quæ quamplurimas aggregare solent superfluitates, earum vlcera mala sunt. Ea pariter, quæ in corporibus leprosoformi occurrunt, pessima iudicantur; sapiunt quidem carcinomatosis naturam, nam dictum est: Vlcera quæcumque sapiunt naturam atræ bilis, de genere cancerum sunt; & raro, aut nunquam, sanantur: nisi, ut ait Aulic. ab eis auferatur tota corruptio vique ad carnem, & ossa sana. Vlcera senum tardè sanantur, ob boni sanguinis defectum, & quia eorum complexio frigida est, & plurimè sciant humiditatis. Vlcera cum difficultate sanantur, quæ à icore, aut licre, aut aliquo aliorum vicerum male affectuum originem ducunt: timenda verò sunt, quæ veneno tinguntur, aut dolore atroci molestantur, præsertim in pueris: nam aut occidunt, aut inflammationem excitant. Vlcera successione ægritudinum generata, tam dè recedunt; residuum enim corruptionis superfluitatum ad ea natura se pellere solet. Sphærica sunt rotunda vlcera serò sanantur; nam forma hæc capacissima est, nec principium, nec finem continet: quare in naturalem hominis longitudinem ex secari debere, iubet Hippocrates. Vlcera, quæ fistulæ formam præferunt, difficillima sunt curationi; cum vlcera sint profunda, angusta, & callosa: quæ omnia locum affectum imbecilem, & vlcus cacoethæ reddunt: obstracosis in vlcere pessima causa est: quod minus illud sanescat; cum fieri non possit, aut carnis productio, aut sinus repletio, aut agglutinatio, aut cicatricis indutio, nisi remota obstracositare, & ut subiecta caro, & vlcis labra pro naturali modo se habeant: quo fit, ut aliquando hæc sola sit causa, ne vlcus sanescat. Sinus varij interdum vlcerum curationem cōmorant: quorum duplex curandi ratio est, alias tota cavitate dissecata, alias in fundo tantum aperta. Vlcus atritium malum est: ubi enim abicellus tardè secus est, vel medicis imperitia, vel eius, qui curatur, timores & cutis sinu obducta, tenuis, attritisque: velium lacinij similis fuerit, fieri non potest, ut cum carne subdita coire possit. Mala sunt vlcera antiqua, aut saltem annua; nam tunc ossa detegere, & cicatrices causas fieri necesse est. præterea in quibus ossa teredine affecta sunt, pariter quæ pluvius innovata sunt, & reuiscunt, arguunt quippe id, quod subiectum est, finemur non servare: aut id, quod fuit, malum esse. si enim horum alterum vitiosum fuerit, multa incommoda inde oriri necesse est: vlcus etiam, quod diuturnius sit, nequit esse sine vitiosa materia, aut osse corrupto: similiter chironæa, & thelecia. Circumlabra vlcera prava sunt; cum enim pili, aut squamule à circumiacentibus vlcis partibus desint, scire oportet, eos, qui ita se habent, praus humores scaterere, qui vlcus, & eius conviciencia erodunt. Quæ in principalibus partibus vlcera insident, ut omnibus notum est, magni momenti habenda sunt: cum certè magnum vitæ periculum adiciant. Si vlcus prauum fuerit, ut colore, nempe, viridem, aut pallidum, aut liuidum, aut nigrum, malum adducit indicium, id magis, si aridum fuerit. nam dictum est ab Hipp. Vlcus siue ante existit, siue in ipso morbo natum est, diligenter observari debet: nā si moriturus æger est, aridum, & liuidum, aut pallidum ante mortem apparet. Vlcera inflammata, aut varicosa, aut ve micosa, aut putrida, aut corrosiva, aut occulta intemperie associata; et in ipso morbo Gallico asiluntur, apertè dignoscitur: aut quæ corporibus ca coctimis, aut plethoricis occurrunt, cacoethica, & malè morigerata sunt. Vlcera, quæ citò sanantur, aut post indutam cicatricem pluries innouantur, periculum imminet, ne transeat in fistulam, quam Græci coriadam vocant. Vlcera, quæ absolutam deteriorationem experta non sunt, malam ac superfluum carnem producere solent: sic & quæ contusa fuerint. Vlcera non expurgata committi non solent, etiam si abducantur, neque sua sponte eocunt. Si in vlceribus praus tumor non apparet, periculum est, ne humores ad vlcus diffucentes, ad partes nobiliores transmittantur: verum si de repente evanesce, sunt consensuales, aut infaniz, aut dolor lateris, aut suppuratio. Vlcera, quæ partes extremas, nempe manus aut pedes, occupant, sæpenuero phlegmonas in adenosif partibus irritant, plethora præsertim existente, adenes siquidem imbecilles sunt, & rare: vnde facillimè fluxionibus tentantur. Vlcera, quæ totius corporis colorem representant, nempe pallidum, aut fuscum, vitium aliquod estatū dignum membrorum nutritionis, ac insignem sanguinis corruptelam significant. De signis bonis in vlceribus est, ut in circuitu eorum nascantur pili, qui ceciderant, de melioribus, si pus optimum in eis generetur. Vlcera, quæ longo protrahuntur tempore, & sunt corrosiva, aut putrida, non expectantur eorum consolidatio, nisi profunda fuerit. Postremo si medicamenta ex methodo vlcibus adhibita profunt, aut non nocent, indicium est, vlcus illud benignum esse, & ad salutem tendere: secus verò, si noxam aliquam afferunt; indicant enim ea tali morbo idonea non esse. Cæterum quemadmodum plurima vulnerum indicia vlcibus etiam accommodantur: ita & vlcis, de quibus nunc









11 pp. lib. de vl-  
ceribus. Cui lib.  
9. e. de re. vi.  
tal. 1. Mercha.  
p. Aug. 13. 13.  
14.

11 pp. lib. de vl-

peſſimum; loca verò vlceraſis partibus oppoſita leuiter fricare, aut commodè exercere, optimum: 1  
communiter verò in omni vlceraſis curatione quies optimum præſidium eſt. nam pro conſilio habe-  
tur, quod de illis, quæ recta ſunt in vlceraſis curatione, eſt, vt quieta ſint membra, & non mouean-  
tur, præſertim in corpore malis humoribus ſcatente. ſomnus, ſi naturalem modum exceſſerit, malus.  
ſub diu, aut ſuper repletionem, peſſimus: attamen quietus, moderatus, ac in nocte factus dolore  
emulcere ſolet, vires validiores reddit, & concoctionibus auxiliatur. in cauiſ, aut cuniculoſis vlceri-  
bus ſupra affectum locum dormire, ac quieteſcere diu ſuper ipſum, præſentaneum remedium eſt. Ple-  
thora verò apparente, ideſt ſuccorum æqualiter ſe habentium exuberantia, ſanguinem mittere ex-  
pediſt. In cacochymia, vbi viſioſus in toto corpore humor abundat, talem pharmaco conuenienti  
eacquare conducit: ſucci præterea diuerſi ad ſedem affectam conſtuentes, omni ingenio ruellantur,  
nempe laqueis, frictionibus, cucurbitulis, clyſteribus, & vomitu. ab ingluſie, & crapula caueto: co-  
pioſam cibariorum varietatem euitato: Venus præter modum, aut ſupra repletionem abhorreatur.  
Ira, timor, triſtitia, contentio, & clamor, fugiendus: quæ verò vires validas reddunt, eligantur, medi-  
coruſi grauitudo, amicorum conuerſatio, & bene ſe habere ad ea, quæ oſiſerunt, ſummopere probantur.  
His omnibus inſtitutis, ad cauſas abſcindendas, quæ vlcera aut ſouent, aut gignunt, tranſire oportet:  
at in quibus effectrix cauſa adhuc manet, ab ea curatio inchoanda eſt. porro aliquando fieri poteſt,  
vt vna ſola ſit tantum cauſa, quo minus vlcus ſaneſcat, nempe intemperies ſedis, aut varix, aut partis  
inbecillitas, aut os corruptum, aut viciuſi aliquod iecinoris, aut lienis; vnde ſequitur cacochymia,  
aut plethora rotius corporis. non raro etiam quamplures inſimul complicantur diſpoſitiones, quæ vl-  
ceris conſolidationem impediunt: ob id diligencia adhibenda eſt, vt dignoſcatur, an vlcus recens ſit;  
an antiquuſi; ſiquidem raro antiquata reperiuntur vlcera, quin corpus affectum plurimis prauis ſcateat  
humiditatibus, & plures eas dentur cauſæ, quibus omnibus primò incumbendū eſt: ſi qua verò ſecum  
adſuerint ſymptomata, ea primò tolli debent, deinde cauſæ proprię poſtremo vlcus, qua vlcus eſt  
curare expedit, indicatione ſumpta ab eius eſſentia, & modo, in quo reperitur. Cæterum omne vl-  
cus, qua vlcus eſt, vnam habet communem curandi indicationem, nempe mediocrem, & proportiona-  
tā exſiccationē: eius verò, quod cum alio affectu coniunctum eſt, indicatio ſimpliciter talis non eſt, ſed  
prior illius affectus. Secundò vlceraſis curatio molienda eſt; nam vlcus nequaquam curabitur, cui intem-  
peries, aut inflammatio annexa eſt: niſi prius intemperies, aut inflammatio abſumatur. hac ratione,  
cum plures ſimul complicantur diſpoſitiones præternaturales, adhibenda cura eſt, vt id, quod magis  
vrget, primò quā minimo cum dolore ſanetur, nempe quod ſimplex eſt, opportuna exſiccatione; ple-  
num, obducta cicatrice; diſcratiſſimum, rectificatione; doloroſum, dolor ſedatione; inflammatum,  
inflammationis remotione; virulentum, valida exſiccatione; cauum, repletione; ſordidum, abſter-  
ſione; corroſiuum, quietatione; durum, mollificatione; fiſtulare, parietum ablatione; vermicoſum,  
vermium deiectione; teredinoſum, corrupti oſſis remotione; circulare, circuli diuiſione; var-  
icoſum, vitis incisione; cacoethes, oculæ, aut abdite cauſæ conſumptione. horum quip-  
pe vlceraſis, quæ cum alijs affectibus complexa ſunt, quatuor erunt particulares  
curandi rationes, nempe victus regimen, corporis euacuatio, accidentium  
proſtigatio, & vlceraſis, ſecundum eorum indigentiam, curatio: verum-  
tamen nulla harum curationum ipſius vlceraſis eſt, ſed alterius  
affectus complicati, qui vel vlcus gignit, vel certè eum  
ſouet. conſilium Galeni in hoc eſt, vt hos af-  
fectus è corpore priuſi eximamus: vel  
incommodum, quod inferunt,  
vincamus, vt ſingula-  
tim, dum eos  
pertractabimus, ad plenum explicaturi  
ſumus.



# LIBRI TERTII. TRACTATUS SECVNDVS.

De Vlceribus tam simplicibus, quàm com-  
mixtis cùm alijs affectibus.

De puro ac simplici Vlcere, & eius cura. Cap. I.



**V**ulnus vlcus simplex fuerit, id est, ab alio morbo, aut diuerso symptomate, aut propria causa, alieno; & affecta sedes optimè constituta, & languis, qui ad locum defluit, bonus, ac in quantitate mediocris, eius vni tantum est indicatio curatiua, nempe vnitio partium: si decet, indicatione sumpta à soluta continuitate: & mediocris siccatio, indicatione sumpta à morbo in dimi-  
nuta quantitate. nam gignunt carnem quæ primum ordinè exsiccationis non multum transgrediuntur. si verò illud planum fuerit, mundum, & absque vl-  
la profunditate, eius cura est cutis indutio: quod fit medicinis siccis in tertio, omni mordicatione expoliatis, porro dictum est, Simplici morbo simplex ad  
habenda curatio est: composito verò non simplex. Ergo puri vlcis, vt vlcus est, eius curatio est op-  
portuna siccatio: nam perpetuo in omni vlcere etiam puro, dum caro restituitur, excrementum ali-  
quod humidum producit, quod exficari desiderat.

Hipp. lib. de vl-  
ceribus. Gal. 3.  
Meth. cap. 4.  
Pau. lib. 4. cap.  
36. Auz. 4. q. 40.  
3. cap. 1.

Gal. lib. ac. par.  
m. cap. 93. vt  
Meth. cap. 1.

## P R A X I S.

**I**n Vlcere curatione nil tam nobis cuiandum est, quàm medicamenta generis oleosi, quæ Hippo-  
crates mollia vocat: cuiusmodi sunt omnes adipēs, præsertim porcorum, dein resine, postea ce-  
ra, & olea. alia ratione, quæ indurata emolliunt, malactica dicuntur, non con- eniunt, veluti gal-  
banum, bdellum, ammoniacum, stirax, & medullæ: Item alio modo acria, nempe piper, gingiber, si-  
napis, ac multa huius generis alia: nec ea pariter, quæ dolores inducunt, sicut gris nios, & squama,  
calcis, & alumen: sed ea probantur, quæ sine erosione ficcare possunt, qualia sunt mineralia multa  
illora, aut adusta: sicut est sigillum Lemnium (terram sigillatam isti vocant) cadmia, quæ recremen-  
tum est in fornacibus, ubi argentum liquefit, & effunditur, pompholix (turgia dicitur) & est fumus,  
qui his adhæret fornacibus, spodium, & similia: quæ omnia lota, & aceto per quamplures dies sub  
canicula preparata, pro tenellis, & imbecillioribus corporibus probantur: pariter & aloes, myrrha,  
thus, opopanax, aristotelia, farina hordei, tabarum, orobi, & quamplurima huius generis simi-  
lia, quæ à Græcis sarcocica, & à Latinis glutinantia vocantur. Huiusmodi medicamenta, ob id quia  
laborant in corpora varia sunt in natura & compositione, in qualitatibus suis actiuis, & passiuis vario  
modo parari debent, indicatione sumpta à natura sedis laborantis, & à qualitate, & forma vlcis.  
Porro aduertendum est, quod corpora succo vitioso prædita, aut quæ tenella carne munta sunt, & ad  
sentiendum non signiter habilia facit ex erosione aliquorum medicaminum phlegmones recipiunt:  
quæ enim generosè fificant, & attingunt, mordent: unde nemo acria medicamenta, & cruda in puris  
vulceribus vti audeat, sed clois, exulsi, aut alio modo præparatis: vt eorum acrimoniam, & mordaci-  
tatem amittant: siquidem correctæ tunc minus fificant, & ab acuitate priuantur: ob id enim nostræ æta-  
tis Medici huiusmodi prædicia sub emplari consentientiam (quam Græci enphæma, & vulgares vnguen-  
tum appellant) parare iubent, quale est vnguentum ruffum Celsi, aut ex ovo Pauli, aut de lino Aui-  
cennæ, aut arcum Melius, aut illud commune basilicon, aut resinum, porro in topicorum adhibiti-  
one hoc pro axiomate, seu dignitate habetur. Humidiora vlcera, quæ validiora occupant corpora,  
tortiora fiunt medicamenta: secus verò puriora vlcera, & imbecilliora corpora.

Hipp. 5. de vlc.  
Gal. 4. h. 2. ser. 1

## DIGRESSIO DE CVTIS INDVTIONE.

**V**lcera repleto, curis inducenda est: quod per purgatis iam, repletisq; vlcibus, necessa-  
rium est: vera autem cutis (quia à gentura ortum trahit) deficienti materia non regeneratur:  
sed eius loco carnis superficies callo quodam tenui, qui cutis imaginem præferret, & illi similis est, ac  
eius officio fungitur, tegitur, & munitur, vt ab iniurijs exterioribus defendatur: caro quippe eadem  
specie

Cel. 36. r. 116.  
in hunc Gal. 3.  
Meth. c. 1. 7. de  
r. mod. sic c. 1.  
1. de cõpõ. m.  
10. gene. 33. &  
lib. 4. par. m. c. 4.  
Pau. lib. 4. q. 47.



dis medicamentis, vel calidis, & alijs quidem rubor lenis infidet, alijs color magis albicat. Indicia ergo calide temperaturæ sunt, loci rubedo quædam manifesta, dolor ad tactum mitis, & materia, quæ ab ulcere effluit, tenuis, & acuta, ac frigidorum medicaminum vitæas. Frigide qualitates signa sunt, color albus, aut cinericius, frigiditas ad tactum, dolor stupidus, mollities quædam, & cadendorum topicorum beneficium. Humide habitudinis nota sunt, color subalbidus, dolor nullus, mollior manifesta, sanies multa, tenuis, calidis quæ præsidij gaudet. Sicquæ dispositionis accidentia sunt, color squallidus, loci asperedo; laborum siccitas, & sanierum penuria humidis suffragijs manifestè optulatur.

DIGRESSIO.

**Q**UANDO partes viceratæ per intemperiem aliquam à naturali habitu recesserunt, eorum sanationem per ea, quæ contraria sunt viribus, fieri omnino est necesse: tollitur ergo calida vice rum temperies medicinis refrigerantibus; frigida, calefacientibus; humida siccantibus, & sicca humectantibus. Porro viget mirabile illud axioma: Contraria, contrarijs curantur: qualitates verò, quæ ex his mixtæ sunt, mixtis indicationibus remouentur, nempe si frigidior humidiorque locus sit, calefacientibus pariter, ac siccantibus præsidij adiuuatur. sic enim & in alijs ad eundem modum, vincentibus nimirum qualitatibus contrarijs, semper oppugnare oportet: ubi intemperiei affectus iam sanatus fuerit, statim exulcerationis affectus sanabitur, non aliter planè, ac si citra intemperie incidisset. fieri enim non potest, vt in vlcere, vel carnis productio, vel sinus repletio, vel agglutinatior, vel cicatricis induratio rectè vici cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat: Terminus verò correctionis discrasiarum est, in quantum ipse in naturali eorum habitu redierit; itaque temperatam esse subiectam se dem ad vlcera sananda prorsus oportet. Calidas qualitates remittit oleum violarum, rosatum omniteribus, nenupharinum, succus lactuæ, protulæ, plantaginis, & solatri, vnguentum rosati Mef. linimentum simplex, cerussatum, & refrigerans Galeni: si verò rubor quipsiam manifestus, vel omnino calor in circumpositis vlcis partibus exuberat, sanguis mittatur, & phenicino, medicamento aliquo refrigerante diluto, vt mirthinum est, aut violaceum, aut rosatum rude, locum epithimabis: aut eum lenies emplastro ex plumbago Pauli, aut ex litargirio Mesues. immodice verò refrigerantia, veluti hyosciamus, mandragora, cicuta, & id genus alia omnino vitanda sunt; stuporem enim inducunt. Frigidas præterea qualitates temperat oleum chamomellinum, anethinum, cistinum, & rutaceum: vnguentum cirinum, fuscum, basilicum, aut dialthea, aut illud celebre diaspipereon. Si verò humidior, quam pro naturali habitu, caro fuerit affecta, contraria ratio inuenda est, ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda. humidas igitur habitudines tollit oleum mirthinum, de mirthi, de sulphure, & de euphorbio; sponsa, in vino nigro pontico, aut linctiuo claro, aut vrina humana, aut aqua theriacali Abani, quæ aluminosa est, & multum siccant, aut decocto abintibij, ciperi, aristolochiæ, nucum ciperis, & similibus rerum infusa. Optimum est emplastrum istius, ceraseos, macherionis, & ægyptiacum, dicat discrasias temperat, & humectat oleum commune repidum, focus aquæ calidæ, decoctum altheæ, acanti, malug, & hordæi. vnguentum ex oleo rosato maturo, & ouiluteo, aut ex therebintina lora, vitello oui, croco, & oleo rosato. Tunc etiam ea omnia probantur medicamenta, quibus vis aliqua attractiua infusa est: veluti emplastrum basilicum, de pice, fuscum, aut ex succis diachilon nuncupatur. At Paulus; Non suppurantia vlcera, concoquit, maturatque, ex simplicibus, aqua rapida superiusa, farina triticea, condrus, crocus, lachryma thuris, pix, adeps suillus, vitulinus, & cera, & Gal. dicbat: Carnis quidem intemperies, si squallens siccaque videtur, aqua temperata fouens, humectansque corriges; calor quippe inuiles reprobat, sed tepidus esse debet: vt tantum humores in membro compactos fundere, & liquare possit. calida enim in summo discutendo: exsiccat: quotiens verò eo remediò vitæis, esto tibi, ait Gal. perisationis, humectationisque meta: vt cum primum rubescit, atrolliturque particulæ moles, tum desinas: nox verò læpe id agimus, adhibito foci ex hydrolepo, aut ex oleo rosato completo, amigdarum dulcium, pinguedine gallinacæ, medulla vitulina, & butiri recenti, superaddita lana hyssopi. Horum præsidiorum aliqua in vlcere, munda verò circa vlcus applicari debent: si verò mala temperies eius terminum transierit, & alicuius inflammationis initium apparuerit: tunc tale adhibeatur regimen, quale, ubi de inflammato vlcere describimus: si verò mala temperies perseuerare videtur, expedit corpus inane, sanguinem mittendo, alium mouendo, vlcum tenuem instituendo, vinum detrahendo, fluxionibus inhibendo, & id agere, quod magis conuenit pro tali vlcis complicatione, hoc seruato, ne frigiditas actu vlcus conegat: nam scriptum est, frigidum vlcibus inimicari, ac dolores insupportabiles mouere, febres facere, & conuulsiones irritare. Hac ratione volebat Hippocrates, quod nullum vlcus humectandum esset, nisi vino: nam quod secum est, prope sanum est: & quod humidum, prope egrum. ergo nullum vlcus aut simplex, aut compositum humectantibus regatur, indicatione sumpta ab vlcere: à symptomatica autem, aut à causa, donec aut symptoma, aut causa ablata fuerit. vt de sicco, duro, aut calloso vlcere dictum est; siquidem siccitas in vlcibus probatur ad conseruationem siccitatis partis affectæ, & consummatione humiditatis aduentitiæ, & ad præseruationem futuræ dispositionis: siccitas enim est cura vlcis, quatenus vlcis est.

De Vlc. Lib. III. Tract. II.

Q

De

Galien. per. m. cap. 89. & 4 m. th. cap. 1.

Gal. 4. de comp. m. facitum vlcis. form. 1.

Lib. 4. cap. 39. 4. Meth. cap. 2.

5. Aphor. 19. 18. 10. Lib. 3. de fruct. & lib. de vlcis. b. Gal. 3. Meth. cap. 4. 4. Meth. cap. 1. de comp. med. par. 10. 12. 6.



**V**lcres crucians, siue dolore molestatum, illud est, cui associatur prauus sensus rei contrarie subito imprimentis, & talis sensus vnus est ex symptomatibus, quæ vlcერი curacionem impediunt, & remorantur: nec inducias expectare solet, ac curandi consilia interturbat: cum que vlcერი occurrat, & vehemens fuerit, multa incommoda facit, nempe fluxiones ad locum proritat, quæ curationi aduersantur, inflammationes mouet, repentinas facit mutationes, febres adducit, vires prosterne, & sæpe ægrotantem occidit. hac ratione admittendum non est, vt æger diu crucietur.

Generales eius causæ sunt, mala temperatura, aut continui solutio, aut vtraque causa simul: in vlceribus verò quamplures esse possunt, veluti corpus aliquod extraneum in eo continetur, aut acutorum humorum defluxio, aut medicamentum aliquod acre, & mordax: aut vapor malus: aut initium inflammationis: aut affectus sedis natura, & compositio: aut dispositio aliqua occulta. Differunt hi dolores inter se ratione modi, & ratione quantitatis: alter enim pungitius, aut extensius, aut grauatiuus est: alter verò mitis & quietus: alter medicioris, & supportabilis: & alter crudelis, & clamosus, vt plurimum dolor à fluente materia producitur, & tunc pathos Græcè dicitur, nam talis læsa functio transitus est de sanitate ad ægritudinem. Porro materia, quæ fluit, dum sibi loca capit, primum continuum soluit, inde malam temperiem inducit: & tunc fit symptoma, sequens morbum in soluta conuinitate: si verò à mala temperatura tantum sine materia caussatur, continuum non soluit: cum non sit ægritudo pendens à materia, quæ locum requirit. dolores in vlceribus, qui ab acuto proueniunt, loco, pungitius sunt: nec propter hoc dolor est leuio in operatione sensitius: quia non est ablatio sensus, quod est non sentire: neque est debilis sensus, quod est non apprehendere impressionem factam à re sensibili, neque est lentire aliquid, nullo presente sensibili obiecto, vt muscas non exsistentes videre: sicut enim delectatio est sensus rei gratæ. sic dolor est sensus rei contrariæ subito imprimentis: quæ nil aliud est, quàm mala qualitas, aut solutio continui, aut amba causæ simul. Porro mala complexio non est parum quid in dolore generando: sed primaria causa est solutio continui, sed mala qualitas in eo, quod soluit, passio enim, & dolor non sit in his, quæ verè alterata sunt: eo quia in eis solutio continui amplius non fit, nec in eo, quod transmutata est crasis: sed in eo, quod transmutatur, & corrumpitur, dolores sunt. experimentum notum est, quod post membri incisionem, aut fissuram, nullus apparet dolor, sed dum fit incisio, aut fissura: nisi cum inflammationes, aut fluxiones subleuantur: nam, vt voluit mirabilis Hippocrates, dolor tunc corpori accidit, quando à sua natura mutatur, arque corrumpitur, non quando ipsa mutata est, aut corrupta: & idco post tumorum suppuracionem, & febres, & dolores, qui exeunt, siquidem, dum sit pus, viget quidam terminus ebullitionis, à quo soluitur continuum: qui confectio pure, quæ scit, & dolor tollitur. quod principalis causa doloris sit continui solutio, ex Galeno intelligimus. inquit enim: Aqua seruens, si supra carnem apponatur, soluit continuum, donec dolorem faciat: si supra cutem, quia continuum non soluit, dolorem non infert: caro enim mollis est, & cutis dura, & viscida. si enim dolor à sola, vt credit Auer. mala temperatura imprimeretur, cutis etiam, cum alterari possit, doleret vtiq; quod fecus est: quomodo autem caliditas, & frigiditas, veluti qualitates actiue, causant dolorem per se. siccitas verò per accidens, humiditas nullo modo. scire oportet, quod caliditas in summo extendendo, & aperiendo, & frigiditas contrahendo, & congelando (vnde sequitur solutio continui) ob subitam impressionem factam ab istis qualitatibus causant dolorem: quod non facit humiditas, aut siccitas: quia eorum qualitates sunt passiuæ, nec subito imprimi possunt. alteratio enim, quæ paulatim fit, nunquam dolorem causabit: humiditas per se nec magnum, nec paruum causat dolorem, siccitas per accidens: quia tenet aliquod acuitatis.

## DIGRESSIO.

**Q**VAESITIO. Vbi igitur in vlcere producitur dolor, quamprimum inciperit, ad se omnes trahit indicationes curandas: quocirca proutius aut tollendus, aut saltem demulcendus est. tollitur indicatio sumpta ab eius fortitudine, & operatione, aut ab eius causa efficiente, quam semper præsentem habet, & vna cum subiecto coniunctam: Hac ratione generica eius ablatio in male temperaturæ permixtura, aut sensus stupefactione consistit, quæ insignis refrigeratio esse solet. Postmodum loquem tollere medicamenta, à Græcis anodyna dicta: sed ea, quæ verè anodyna sunt (id est dolores sedantia) neque causam ex toto auferunt: neque organum sensus alterant, aut corrumpunt. porro eorum facultas est paregorica, id est leniens, & mitigans, exaltatiendo in primo ordine cum temperata humedicatione, quemadmodum pars affecta, & affectus exposcunt: ex quibus sequitur, quod interdum affectum non sanant, sed dolorem tantummodo mitigant, & quiescunt per alterationem obiecti, & potentior sensitiue, causam doloris mitiorem reddendo, & organum minus aprum ad patiendū: a deo

vt fami-

2. de diff. feb. 31. Meth. 4.

Gal. 2. de diff. 10. cap. 21. Gal. lib. 8. par. me. cap. 7.

Gal. 12. Meth. cap. 7.

Gal. 3. reg. acc. men. 31.

Gal. 3. reg. acc. men. 37.

Gal. 2. de loc. af. cap. 1. 2. Meth. cap. 7. 1. pradi.

6. cap. 1. lib. 2. par. m. cap. 1.

Auer. 1. de 19. de 4. 1. 2. 3. 1. par. Aphor. com. 47.

Gal. 2. de mot. 1. c. aff. cap. 5.

Gal. lib. de inq. quæ. cap. 6.

Gal. 4. de mor. &amp; symp. cap. 6.

de 5. de loc. af. cap. 4.

1. Aphor. 47.

4. de simp. m. fac. cap. 4. &amp; 12. Meth. cap. 7.

3. coll. cap. 31.

Gal. lib. de con. si. m. ca. 9. de.

3. Meth. cap. 3.

Auer. 2. 1. c. 1. c. 1.

Auer. 3. 1. c. 1.

ca. 1. &amp; 5. coll. cap. 7.

Gal. lib. 8. par. m. cap. 21. &amp; 1.

de compo. m. se. cund. loc. ut mor. 1. Auer. 5. cap. 19.

Gal. 12. Meth. cap. 7.

Auer. 4. 1. c. 10.

Gal. 4. de simp. m. cap. 15.



- 10 ut familiaritate elementorū naturæ, partiꝝ affectuꝝ consentiant, & qualitate contraria causam doloris oppugnent adhuc, quibus virtus infusa sit vigorandi naturam calorem, a quo potius doloris causa absumitur. huiusmodi enim anodyna sub triplici forma parari solent, nempe vntionis aut linimenti, fomenti, aut emplastri. Alqua verò medicamenta vsu seruantur, quæ verè anodyna non sunt, sed causam doloris auferunt, & per consequens dolorem, & hæc specificæ doloris ablatio vocatur; veluti si res extraneæ & aduentitiæ vlcus occupauerit, & ipsum dolorosum reddiderit, eam eripere, aut manibus, aut alio ingenio: si medicamenti acrio, ipsum contemperare, aut permutare: si acutorum humorum defluxus, eum recellere, secundum omnem diuersionis modum: si affectuꝝ sedis natura, cum quamplurima membra reperiri maximo sensu prædita, sicuti capita lacerantium ac eorum posteriora; mammae, testes, & omnia loca neruosa, quæ dolores ferre nequeunt, illæ corroborandæ sunt, vbi
- 30 cere non neglecto, sed secundum eius dispositionem gubernato: si alicuius inflammationis initium, mitatur sanguis, vinctus regimen tenuè sit, & alium expurgare oportet: si occulta aliqua dispositio, nempe iecinore, aut liene, aut vchriculo male affecto, eorum affectus corrigendi sunt regimine vniuersali prædicto, præsertim si alterius cuiuslibet particulæ occasione, aut etiam totius corporis, cum in eo sanguis malus, aut alij succi redundant, visiosum aliquid exulceratis partibus influxerit, & dolores exci-  
tauerit: vnde medendum prius est, vel ei, quod fluxionis est causa: vel etiam toti corpori, donec: ex toto dolor, & eius causa absumantur. Membrum stupidum redditur, & sensuum potentiam tollunt, aut organum tanquam ablatum constituunt, vehementes ligaturæ in membri radice, aut medica-  
menta stupefacientia, à Græcis narcotica dicta, quæ diuersorum graduum sunt, vt infra dicemus. Ano-  
dyna medicamenta, sub linimenti forma parata, fieri solent ex oleo rosato composito, violato, simi-  
lino, anethino, chamomelino, amigdalorum dulcium, de semine lini, de lumbicibus, de cera pura lu-  
tea, & de vitellis ouorum: ex his etiam, quæ densiorem continent cōsistentiam; veluti est vnguentum  
rolatum Mesæs, pinguedo gallinacea, anserina, medulla crurium viuali, & butiri recens. Ex compo-  
sitis, oleum rolatum, vitellum oui, & crocum, hyssopum humida, butiri recens, & oleum rosatum, vnguentum ro. M. oleum amigdalorum dul. & lana non lora, decoctum albeæ, maluæ, acanti, meli-  
loti, & fiorum chamomillæ. Emplastra componuntur ex farina hordeacea, semine lini, butiro recen-  
ti, & sapa: aut ex medulla panis in lacte decocta, addito oleo rosato, & oui lreco: aut ex maluis de-  
coctis, oleo violato, pinguedine gallinæ, & vitellis ouorum: aut ex medulla panis, brodio pulli deco-  
cta, butiro, sapa, & farina hordei: lenia debens esse anodyna, & subileum partium, & in primo gradu  
caliditatis, siquidem materiæ ad locum fluxæ sepe sua crassitudine, aut cruditate, aut stauositate,  
40 aut diuersa temperie dolorem excitant: vnde quæ communiter anodyna dicuntur, tenuium partium  
esse debent, & calidiora, quàm quæ symmetra sunt, vt scilicet euacuant, ac digerant, tum rarefa-  
ciant, extenuent, concoquant, & equabile reddant quicquid in partibus dolore vexatis inhaeret, aut  
inclusum remanet, sicuti humores acres, & tenues, aut leni & crassi, aut multi, tenuibus spiramentis, seu  
porositatibus infarctis, aut etiam vaporosi, aut admodum frigidi, exitum commodum non inuenientes.  
hæc ratione nihil prorsus adstrictionis habeant: & si pars, aut etiam affectus, id exposcat, faciant mem-  
brum stupidum (& est dispositio paulò minus, quàm insensibilitas). Medicamenta verò infrigidantia  
primi ordinis sunt, veluti aqua frigida, nix, oleum de nymphea, de papauere, aut de mandragora. Se-  
cundi ordinis est vnguentum populeon, theriaca recens cum opio, folia papaueris albi, succus alter-  
ei, succus solatri, addito philonio. Tertij ordinis est succus mandragoræ, decoctum torpedinis, philo-  
nium Persicum, & opium cum succo mandragoræ. In vehementissimis cruciatibus, & desperatis do-  
loribus nunquam dimittendum est, vt æger diu affligatur: Extremis enim morbis extrema exquisire re-  
media optima sunt. quare alijs non conferentibus suffragijs, ad narcotica interdum transire non incon-  
uenit: siquidem multoties vehementissimus dolor suo vigore hominem necat. à medicis scriptum est:  
Omnis dolor, qui validior fit, interficie. indicia sunt, primò corpori frigiditate, rigore; afferram  
minor redditur pulsus: deinde penitus sentitur: postremò moritur æger. verumtamen, iubente Hippo-  
crate, omnia prius tentanda sunt, & in quantum possumus, huiusmodi præsidia postponenda. som-  
nus inter causas doloris mirigatus refertur, præsertim si cum inedia associetur. inquit Auic. In ca-  
pione curatio vltima, in dolorosis oportet (quæ sunt vehementes doloris) vt sis occupatus, primò  
in sedando dolorem, etiam cum medicinis mollificatiuis, quamuis leni contrarij gliceri: nam cum do-  
lor non sedatur, non conceditur, vt curemus vlcus: cumq; dolorem sedauerimus, omnia inde conse-  
quimur. sequitur ergo, quòd doloris vehementia cogat medicum vi diuersimodè, & mollientibus,  
& narcoticis medicinis, præcipue post vniuersales euacuationes. Correlariæ ergo, indicationes primò  
in dolorum remotione sumuntur interdum pences eorum intensionem, & remissionem. Secundò pences  
causæ efficiētis diuersitatem, ac eius remotiones. Tertiò penci doloris puram quietem, & simpli-  
cem sedationem: ergo dolores tollantur anodynis, si quieti fuerint. si clamorosi, remotione causæ;  
erudeles & timorosi, sensum hebetem reddendo. nam quicquid dolorem mirigat, air Auic. vel tempe-  
rarum immutat, vel materiam dissoluit, aut sensum stupidum reddit: sed in hac vltima indicatione,  
efficacissima coniectura prædicit esse debet Medicus, vt cognoscat, quid nam horum duorum tempo-  
rum diutius perdurare possit, vel virium, vel doloris constantia: ac vter horum affectuum magis læ-

Hipp. 2. Aphor.

Gal. 3. re. ac. en.  
men. 37. A. 10.  
4. 1. Cap. 30.

der, vel dolor, vel nocumentum, ex narcoticis quod oriri suspicamus: ut quod conuenienti-  
ponere, & eligat. fortè enim doloris vehementia occidet, quod fortassis stupor non faciet, quamvis  
aliter laedat. Solent multoties vlcera dolore cruciari, aut quia virulenta sunt, aut quia sordida, aut  
quia corrosiua; qui remoueri solet remotione cause qualitatum vlcerum, proprijs nempe, & particu-  
laribus indicationibus, vt singulatis infra explicabimus. non raro etiam dolent vlcera, dum ab oc-  
culia, aut abdita causa irritantur, vt in Gallicis vlceribus aperte dignoscimus, quæ curationem non co-  
gnoscent, nec admittunt, nisi particulari aliqua illarum operationum, quæ tantum morbum Gallicum  
sanare possunt, ac solent, potissimum illinitionibus, hydrargiro paratis: quod certè secundum omnem  
modum præparatum, præsertim quod præcipratum vocant, dolorosis, & malignis vlceribus summo-  
perè opitulatur: ipsis etiam celeberrimum est vnguentum ægyptiacum, dumtamen doloris causa  
fuerit caro aucta, & mala: sed præstantissimum, & incomparabile est cauterium æchale. nã vltio, quam  
cauterium vocant, efficacissimum remedium est, quod valet ad prohibendum expansionem corruptio-  
nis, & particulam, cuius intemperiem corrigere cupimus, roborandam, materiasque corruptas mem-  
bro infixas dissoluendas, & per consequens dolores tollendos. Sæpius, ait Princeps, error commit-  
titur in doloribus, qui ab extrinsecis causatur, veluti à calore, aut frigiditate; aut eminentia pulu-  
riorum, aut incommodo decubitu, aut praua diæta, aut ebrietate, aut mala chirurgia, & similia,  
quorum causa intrinsecus queritur, & sic decipitur Medicus, qui etiam ignorare non debet, verum  
adit plethora, aut cacochimia, & eius causam tunc corpus euacuare, vt decet, oportet. Dolores,  
qui à flatuoso spiritu procreantur, validissimi sunt, & facillimè discutiuntur, adhibitis fomentis tem-  
peratè calidis, & discutiendis, cum leui quadam cutis tactione, & stacus carminatione.

## De Vlcere, cum inflammatione complicato. Cap. III.



Oportet, quamplurima vlcera, aut propter nimium affectu sedis sensum, aut pro-  
pter aliquod extrinsecum incommodum; aut quia corpus prauis scaturit humoribus,  
& de facili phlegmones irritare, aut tumore aliquo præternaturali vexari: qua-  
lis autem fuerit ille tumor, dignoscitur colore, calore, dolore, duritie, & dimen-  
sione. Harum inflammationum causæ potissimum internæ sunt, nempe corporis  
cacochimia, aut plethora, aut patientis prauus viuendi modus, aut partis vlcera-  
tæ natura, compositio, & situs: sæpe externæ, vt percussio nimia ambientis, aut  
caliditas, aut frigiditas, motus inordinatus, localia acia, aut non opportuna,  
aut male adhibita, aut medicorum ignauia. Sanguineæ inflammationis indicia sunt, tumor eleuatus,  
tensus, dolorosus, & rubicundus; patiens se febre cognoscit, siui molestatur, & inquiet dormit. Oc-  
cupat non raro partes vlcerales biliosa quedam destituxio; Signum est, vlceratus locus incalescit, do-  
lore vexatur, & colorem subrubicundum, aut flauum præfert: qui expansus absque vlla eleuatione  
ad digiti compressionem subterfugit, ac cissimè redit. Harum inflammationum suspicionem præbet,  
naturalis habitudo patientis, anni constitutio, regio, & viuendi modus. Raro alij tumores vlceri com-  
plicantur, præterquam ædematosi, in his præcipue, qui hydropse laborant. Raro vlcera habent,  
aut magnæ varices supernatæ fuerint. Communiter verò partium, quæ cum aliquo præter naturam  
tumore exulceratæ sunt, harum prius tumor sanandus est; fieri enim non potest, vt vlcus, tumore  
manente, ad sanitatem perducatur: quocirca omni studio laborandum est, ne phlegmon, aut quouis  
alius tumor in loco vlcerato excitetur: quod verè fieri solet, fluxiones inhibendo, quæ irritantur,  
aut ratione partis affectæ, quociens calidior facta est, vel propter immodicum motum, aut aliquem te-  
porem ex Sole, aut igne, aut acri medicamento, aut dum particula dolore angitur, vel propter vlcis  
naturam, aut causam extrinsecam, aut propter spiritum flatuosum, aut nimiam obstructionem, aut  
mali aeris intemperiem, aut alicuius veneni, aut abundantem corporis repletionem, aut ex alia, alijsue  
partibus, quando suas ad illam transmittunt superfluitates, aut ex toto corpore affuso, dum ad imbe-  
cilliores partes prauos expellit succos. Inquit Gal. Corpora plethorica, id est, prauis succis scatentia,  
pariter & tenella, ac plurimo sensu prædita, cum dolore molestantur, phlegmones irritare solent;  
quæ cum adhuc in geperatione sunt, eorum causas prius abscindere oportet: quæ verò iam factæ sunt,  
hos solos vtique secundum opportunitatem curare expedit, vlcere non neglecto.

## P R A X I S.

S I duo morbi simul concurrant, ab eo incipiendum est, qui habet vnum trium horum propriorum.  
Primum est, vbi non possit secundus morbus curari, nisi curetur ipse morbus, vt aposthema, & vlcus,  
si coniungantur: primo enim aposthema curabimus, donec mala temperatura, quæ illi coniuncta  
est, auferatur: qua existente, non poterit vlcus curari: mox vlcus ipsum curabitur. Secundum, vbi al-  
ter alterius affectus fuerit causa. Tertium, vbi alter altero affectu periculose fuerit: nam tunc ab eo  
incipiendum est, cuius causa magis turget: interdum enim inflammatio magis, quam vlcus, verenda  
est.

Gal. 1. Met. c. 8.  
4. Meth. cap. 1.  
Liber. par. 1. de  
9. Auct. 1. c.  
10. 4. c. 4. 4.  
11. 4. c. 1. 1. 1.  
12. 4. c. 1. 1. 1.  
13. 4. c. 1. 1. 1.

4. de comp. med.  
lib. 1. cap. 1.  
1. 1.

Gal. 1. Aphor.  
com. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1.

- 10 est. Porro generalis omnium inflammationum curatio in initio fit, causam absumendo, nempe sanguinis detractione, cum is vicerit, aut pharmaco, quod ad sanum bilem, aut pituitum educendum, vim habeat, si bilis, aut pituiti copia redundauerit: at tumore in fieri, aut in incremento existente, quod fuit, temperato prohibere: & quod fluxum est, valenter discutere, opus est. In permanentia vero ubi tumor fuerit in facto esse: tunc eius suppurationem ut plurimum expectare opus est. Particulariter vero hoc tumorum curatio fit, in principio partes vlcis superiores frigidis, ac percutientibus medicinis regere, eas rosaceo, ac mirrhino oleo foudendo, aut bolo armeno aceto soluto, aut vnguento rosato Melsus, addito spodio, & cerussa. Inquit Gal. Si ambientes vlcis partes phlegmonodes quipiam repræsentent, humidum medicamentum latum extrinsecus platifami superaccommodandum est: ex phenicino non simpliciter liquefacto: sed cui plurimum vini astringentis adiectum est, donec humidi cerati crassitudinem obeineat: nec tamen refrigerante aliquo oleo, nempe mirrhino, aut violaceo liquare inconuenit; nam tunc ad arcendas phlegmones accommodatum est: in augmento vero emplastrum illud celebre applicetur, quod ab antiquis ita probatur. Paratur ex dulci malo granato, vino nigro ausifero, incocto & trito: aut illud admodum est, quod recipi lentes cum rosis, decoctis in vino nigro, aut oxocrato. decet etiam inflamatam sedem vnguento ex litargiro argenteo, oleo violato, & aceto nutrito, aut cum vnguento ex plumbagine, aut cerussato Pauli, oblinere: in statu, dum acicidia validiora sunt, & dolor magis virget, doloris sedationem aliquo modo tentare oportet. igitur emplastro ex medulla panis lacte vaccino incocta, ouorum luteis, rosaceo, & croci paulillo tollatur: aut paratur emplastrum ex malis decoctis in brodio pulli, farina hordeacea, serrula cipana, oleo violato, & sapa. Super alia medicamenta, vlcis accommodata, huiusmodi emplastra admodum
- 30 sunt: cumque suppurationis indicia apparuerint, triapharmacum adhibeatur, ex triuice farina, aqua fontis, & oleo oliuarum maturo: huic sæpè addimus malvas decoctas, & suillum adipem. Concocta materia, ea omnia obseruanda sunt, quæ in sequenti tertia sectione, ubi de abscessibus, explicaturi sumus. Verumtamen, ut docet Princeps, oportet, ut obserues in vlcibus apostemosis illud, ad quod conuenitur dispositio tumoris. nam si resolutionis indicia apparent, discussoria medicamenta adhibetur; veluti emplastrum ex floribus chamomelli, melliloti, fursuribus triuici, farina hordei, sem. lini, oleo rosato, vitellis ouorum, sapa, & similibus, si ad suppurationem, ut dictum est, regatur. Si vero bilis sit defluxus erysipelas exstiterit, aduersus ipsum, vel ne fiat: vel si factum est, ut discutatur, intendendum est: vbi cumque igitur eius imminet periculum (quod facillè prælagari potest; nam locus absque vltoratore incalecere incipit, ac florido colore occupari) dolus prurit, & febris accenditur. con-
- 40 fert etiam ad hoc patientis habitu biliosa, acris constitutio ætuoia, & feruens modus viuendi, & regio. hæc etiam inflammatio per initia refrigerari desiderat: verumtamen, iubente sic Hippocrate, cuiuscunque vlcis superuenierit erysipelas, purgare corpus conuenit medicamento bilem ducente, aut vomitu, prout ratio loci vlcisati postulat. si vero in superioribus orta sit inflammatio, vomitus comendatur: si in inferioribus, alui ductio. porro ante opportunam corporis euacuationem vlcisatis partibus nullum quippe medicamentum frigidum adhibendum est. nunquid vero sanguis in simili affectu detrahendus sit, ambigendum est: attamen si exquisitum, & purum fuerit erysipelas, sanguis mittendus non est: in expurio vero, quia aut bilis crassa est, aut materia etherogenea, confert, nec eius concoctio expectanda est; nam tenuis admodum, & fluxibilis est. bile ducta, siquid adhuc illius humoris supererit, tollatur eius acutis fir. de endiuia, de succo acetosæ, & de portulacæ. his addenda est vi-
- 50 tus ratio, tenuis, frigida & humida, absque vino. locus regatur phenicino, medicamento aliquo refrigerante diluto, aut vnguento rosato Mels. aut 3j. plumbaginis 3. iij. spumæ argenti 3. ij. cerussæ lotæ 3. j. cert. 3. viij. olei mirrhini f. ij. s. arida vino leuigetur, & secundum artem in mixturam paretur: si vero pituita locum obficeret (quod in artibus, aut pituitosis corporibus occurrit) ea instituitur diætæ, quæ huic affectui conuenire videtur, qui chronicus est: corpus euacuetur elect. lenituro, aut diafene, aut hiera pachæ. præparetur residuum longa preparatione, fir. bisantino, de epithimo, oximellite, aut rodomele. Topica, virtute prædita, sint incidendi, ac præparandi materiam crassam, & viscidam, probantur vñationes, ex oleo nardino, liliaceo, & chamomellino. quibus addimus aut oximellem, aut oxaline, idest, acetum, & sal: ac desuper spongiam, in decocto calamenti, siliacos, mellilori, & aneti infusam, aut in lixiuo claro, & aceto, superaddimus, ac mediocriter coarctamus.

4. de compo. m. secundum 156. nota. ser. 1.

Paul. lib. 4. c. 38. AUC. 4. 4. c. 6.

Lib. de vlcibus. & lib. de febris. Gal. 4. Meth. cap. 6.

Hipp. lib. 4. de fracturis. Gal. lib. 5. cap. 16. Gal. 3. cap. 5.

De sanie, eius causis, ac differentijs, & de his, quæ in ea considerantur, Digressio.



NIMALIA quæque naturaliter non solum appetunt esse, sed & bene esse, idest, vi tam incolumque, & ab omni noxa immunè, ducere: & tandem sunt, teste Arist. quamdiu nutriuntur: nutriuntur verò, dum substantiam corporis nutriendi alere, & augere possunt. ea quippe est, quæ à membris desideratur, attrahitur, retinetur, concoquitur, & assimilatur: siquidè viuientium corpora perpetuis resolutionibus sunt destinata, & ea ratione perpetuis egent somnibus, & alimentis: ex quibus denique

varie superflue superfluitates, aut ex nutrimenti mala substantia, & natura, aut ex impotentia, sive De Vice. Lib. III. Tract. II. Q 3 imbe

imbecillitate sedis affectè. nam in omni concoctione, quam natura in particulis nostri corporis quotidie molitur, duplex generari excrementum, necesse est; alterum tenuius, quod ichor Græci dicitur, & Latine fumes, à unionibus verò virtus: quod ex alimentis qualitate plurimum redundat, & sæpe in halitum digestum per eam vacationem, quæ sensibus innatescit, excernitur: ac vbi alimentis plurima fuerit affluentia, per eam etiam excernitur vacationem, quæ sensibus dignoscitur, nempe per sudorem. quod ex Hipp. affirmatur in eo separato sermone, vbi dicitur: Sudor multus in somno factus, extra manifestam causam excutatur, argumento est, quod corpus vel nimio cibo vitatur, vel vacatione conspicua eger. Idem fir, si calor natiuus imbecillior factus tale excrementum in halitum digerere nequit, aut si in halitum digeritur, per sudorem excernitur. ob id si qua pars vlcere agrotat, & ea ratione languidior facta est, in eo vlcere huiusmodi excrementum congeritur, & vlcus humidius redditur. Alterum verò excrementum crassius est, quod per cutem extimam excernitur, & concrefens illi hæret, donec abluatur, & detergatur, & id est sordes illa, quæ manifestè conspicitur circa cutem, præsertim eorum, qui negligetiores, & sordidiores sunt circa sui corporis curam: hoc itidem excrementum crebriò in vlcibus congeritur, & illud sordidum facit. Porro in omni corpore, quantumvis sano, ex proprio alimento, præter illam portionem, & maiorem sanè, quæ pro corporis substantia, quod alitur, quotidie concernitur, aliqua pars exquisitè conueni in vitæ, & in alendo corpus idoneam materiam, nequit. nam substantia cuiuscunque corporis mixti, quod alitur, duplici constat materia; altera quidem humida, aqua, & fluuida, quæ continuatim partium merito causa est, & quæ veluti pabulum est caloris natiui: alia verò crassior, & magis terrestris, quæ corpori soliditatem, crassiem, & consistentiam præstat: ita necesse est, vt alimentum, quo corpus itidem alendum est, duplici cõstet substantia, illis duabus ex proportionem respondente: atque ita etiam, vt duplex relinquatur excrementum; alterum quidem ex ea parte non probè concocta, & elaborata, quæ resuuium est, & humidiorum, alterum ex crassiore. igitur dum corpus bene valet, & probè circa victus rationem se habet, talia excrementa nec in multa quantitate, nec in admodum crassa consistentia generantur, neque ita conspicua ex tempore sunt: dum autem ex aliquo malo affectu vires languescunt, præsertim concoctrix magis exuberat, & magis conspicua est istorum excrementorum copia. & hæc sanè ratio est, vt generetur hoc duplex excrementum in corporibus morbo in soluta continuitate afflictiis. cur autem in euidentiori copia, non est istius rei vnica, & simplex ratio: nam id euenire contingit, aut à causa externa, aut ab illa, quæ in ipso corpore consistit. Ab externa, aut à mala curatione, & non recte medicaminum administratio ne, sub duplici modo: vel quia vires inter se diuersas habent, aut humidas, mollientes, & emolliacis: vnde plurimum succrescunt excrementa; vel quia medicamenta detergendo acra, & admodum validata sunt, & sordem augent; eo quia carnem colligant: quæ deinde ex colligatione dissoluitur, & in prauos ichores, & nimiam sordiditatem conuertitur. Ab interna, veluti praua diæta, aut eîca mala, aut alicuius vitæ mala habitudine: quæ priuatim in aliqua sede affecta occasionem habet sua transmittendi locum, aut dum corpus vniuersum multis vitiis quæ humoribus insignitur scateat, & ad vlcerum locum, tamquam ad partem imbecilliorum, eos permuat, quod etiam euenire potest ex aliquo vitio proprio loci affecti: quod in causa est, vt alimentum sibi peculiare, & si probum fuerit, in malum excrementum conuertatur: nam illud quasi computrescit, aut exurit, aut semicrudum relinquit, pro ratione temperaturæ vitiosè diuersitatis in parte affecta contractæ. & in hunc modum, diuersimodè tamen, variæ humiditates excrementiciæ in vlcibus quotidie producantur: à quibus ea quippe, & tamosa, & talia dici solent, ac illis cognomina quædam imposita sunt, nempe vlceris virulentis, ab ea humiditate, quæ ea infestat, & virulentia communiter nuncupatur; sordidi, ab ea, quæ sordes, & sordities dicitur, & similia. & hæc omnes excrementorum species, aut ab agente, aut à materia propria, aut à membri affecti dispositione, aut ab ambiente aere, aut à medicamentorum qualitatibus sic dispositis, & alteratè in vlcibus reperiuntur. porro de agente dictum est, in animantium corporibus triplicem fieri alterationem; vna quippe exquisitè secundum naturam, & hæc fit à calore naturali in iuuatui, & materia admodum familiari, in qua sanè dominatur natura, & calor ingenuis superans; vt in ventriculi concoctione, aut iecinoris sanguificatione perpetuò fit. Alia ea est, quæ huic aduertitur, & planè præter naturam est: cuius actor calor putredinalis existit, agens in materia diuersa, & inutili, vt in omnibus putrescentibus dignoscitur, dum talis olida, & calor similis apparet; siquidem putredo, mutatio est totius corporis putrescentis substantiæ ad corruptelam à calido extraneo in humido suo. Aut dicere possumus, putrefactionem transformationem esse essentia corporis putrescibilis ad corruptionem ab actione caloris præter naturam in materia sic disposita. Tertia inter has medium locum tenet, & est veluti mixta, ex naturali calore, & eo, qui præter naturam est, agente scilicet huiusmodi in materia satis bene disposita, vt in benignis abscessibus, & boni puris generatione dignoscitur. ad veram igitur concoctionem duo requiruntur, nempe calor naturalis temperatus, & materia benigna, ac familiaris, ad putrefactionem, calor alienus alicuius, & omnino præter naturam, ac materia inutilis; in actiuis qualitatibus calida, & in passiuis humida, & turredini obnoxia. ad boni puris productionem iuuatius calor vincens, addito tamen non naturali & aduentitio, agens in materia, nec ex toto benigna, nec ex omni parte mala, sub prohibita transpiratione obclusa, aut in porositatibus carnis impacta; veluti fan-

Hipp. 1. Epidem. loc. 1. Arist. 1. de anima. 10. & 4. Methe. 14. Gal. 1. de tem. sic cap. 5. 1. Aphor. com. 47. & 1. de vit. nat. Auer. 1. colic. 1. Arist. 4. Metheor. com. 16. Gal. 13. Methe.

Gal. 1. de diff. re. cap. 1. 1. de hum. mixt. cap. 3. Methe.

10 guis, dum extra propria vasa transfusus aliam acquirit naturam, & substantiam, ac seminalem qualitatem adeptus est, præsertim si in loco minus transpirabili deineatur. Hæc ratione dicebat Auiſc. Lau-  
dabilis sanies illa est, in qua non est operata nisi caliditas innata, licet non sit excusatio à caliditate extra-  
nea. Expedit igitur dicere, quod à calore naturali, & ab ea potentia, quæ nostrum regit corpus, in vl-  
ceribus simpliciter excrementa non produciuntur; quoniam quod in eis superflui retidet, insensibiliter  
transpiratur: sed à calore, qui planè præter naturam est, in eis putredines quamplurimæ exciuntur,  
præsertim dum talis actor agit in putrescibili materia, id ve magis, si aliqua corporis plethora, aut ca-  
cœchia adhaeret, & talis mutatio sit ad nihil veile; quoniam à calore putredicali elaborata fuit: quæ  
& si talis fuerit, agit tamen in materia inæquali, & diuersa: quæ interdum & magis, & minus putredi  
ni parata est, & omne tale excrementum, sub mali puris latitudine, nempe aut cruda, aut crassa, aut  
20 olida, aut cæno similis continetur: quod aut præuè, aut nullo modo concoctum est. quare materia ta-  
lis interdum loturæ carnis effigiem præfert. A tertio ex utroque calore mixto, secundum caloris  
prædominium, variae suppuraciones, ac diuersæ sanierum species gignuntur: quæ tamen ab aliqua con-  
coctione non expoliuntur, quamvis varias formas, ac substantias, & colores diuersos contingant. Por-  
ro ex purulenta colluies, quæ in viceribus generatur, si tenuis est, à Græcis *ixaiç*, & à Latinis sanies  
vocatur. exit ab ulcere nec recenti, nec iam sanescente, sed inter vtrumque tempus. communiter ve-  
rò hic humor virus, aut virulentia dicitur; si mediocris, sanies; si crassa, fordes, aut: fordities nuncupat-  
ur: sæpè etiam crassa excrementa à Græcis *uivæ*, & à Latinis pus, nominantur. sed quid sanies sit, & quo  
modo ab antiquis describatur, audiatis.

Ex Hippocrate, sanies est sanguis in alienis sibi locos alteratus.

30 Ex Hippocrate æterum, Pus sit ex sanguine alterato, & calescente, donec putridus tactus sit.

Lib. de fluxu.

Lib. de fluxu.

2. Aph. com. 47

4. 4. ca. 3 cap 1

Ex Galeno, sanies est sanguis in seminali qualitate mutatus. Ex Auicenna, sanies est pars  
nutrimenti loci affecti, ob eius imbecillitatem, aut ex medicamentorum operatione, in quandam  
corruptionem conuersa.

Nos verò dicere soliti sumus, quod sanies est pars mali sanguinis, in humiditatem inuilem, aut te-  
nuem, aut crassam, ab actione duorum calorum conuersa.

Ex nunc verò dicamus, quod prima sanierum differentia sumi potest penes eorum nomina; & quod  
hoc nomen, sanies, sit veluti genus quoddam omnium superfluiatum in solutis continuitatibus reper-  
tarum, sub quo continetur sanguis, sanies, pus, virtus, fordes, putredo, & corpora solida: quorum om-  
nium naturam explicat color, odor, substantia, & qualitates.

40 Quæ omnibus notus est: alter tamen bonus iudicatur, nempe calidus, rubeus, dulcis, mediocri-  
ter crassus, & non glutinosus. talis exit à benignis viceribus, & cernitur vulneribus. Alter verò ma-  
lus, dum nimis est, aut tenuis, aut nimis crassus, aut adustus, colore liuidus, aut niger, amarus, va-  
rius, aut eterogeneus, idest, alijs admixtus humoribus. Hic à crudis abscessibus, aut male affectis  
viceribus expurgatur.

Cell. lib. 1. c. 16.

Secunda sanierum differentia sumitur penes eorum qualitates, nam alia bona, & alia mala est.

Ex Hippocrate, bona sanies, alba, lenis, æqualis, & sine malo odore esse debet. exit talis à beni-  
gnis abscessibus, & subleberimis viceribus.

Ex Celso, sanies bona est pauca, colorata, glutinosa, mediocriter crassa, & tenuior sanguine. exit  
ab viceribus in eorum statu, dum ad sanitatem tendunt.

50 Ex Hippocrate, mala sanies nigra est, ponderosa, vata, & mali odoris. exit à præuis abscessibus,  
& malignis viceribus.

Ex Celso, mala sanies est multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut ma-  
li odoris, quæ vlcus, & partes illi vicinas erodit. exit ab ulcere male morigerato, aut phagedenico,  
aut sphacelodes.

Tertia sanierum differentia sumitur penes eorum substantiam; siquidem alia subtilis est, quæ virus  
communiter vocatur; alia mediocris, quæ sanies dicitur, & alia crassa, quæ fordes nuncupatur.  
Alia etiam, quæ putrida est, reperitur, & putredo vocatur: verum tamen eam, quam Græci ichorem  
dicunt, Latini saniem, & iuniores virum, seu virulentiam appellant, apud Galenum legitur, quod in  
viceribus tenue excrementum, Latine sanies, & Græcè *ixaiç*, appellatur: sed quod crassum est, for-  
des, apud Celsum, sanies, & pus quasdam distinctas species habent, & quedam sanies reperitur, quæ  
60 hydrops, & quedam, quæ melicæria nuncupatur. est & pus crassissimum, albidissimum, ac glutinosum,  
& sanguine, & sanie exit ab ulcere iam ad salutem spectante. Est & alia puris species, quæ clareos di-  
citur, tenue, subalbida, quasi vinctum, colore atq; pinguedine oleo albo non dissimile. apparet in  
magnis viceribus sanescentibus: sed id pus prius est multum, tenue, dilutum, & artu, magisque si ab  
initio tale fuerit: itemq; si colore ferro simile, si pallidum, si liuidum, si faculentum est. præter hæc  
si male olet, nisi tamen locus hunc odorem exciet: Hydrops malus tenuis est, subalbida, & qui ex  
lo vlcere exit, maximeq; ubi nervo lèso inflammatio sequuta est: peior verò est multus, crassus, sub-  
albidus, aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, & mali odoris: in sphacelis, aut corruptis viceribus  
talis humor videri solet. Melicæria, seu melicæria, crassior, & glutinosior est, subalbida, meliq; albo

Lib. de tumor.

proventus 1.

Lib. 1. de natur.

facies. de 3. Me-

tho. cap. 3.

subsimilis, fertur hic quoque ex malis ulceribus, ubi nervi circa articulos laesi sunt, & inter hec loca maxime in genibus: at melliceria mala, est multa & percrassa; & ea melior est, quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus, quod ἵκην Græci vocant, inter hæc optimum est, & melior quod minus est, quod crassius, quod albidius, itemque: si leve est, si æquale, & si nihil olet: modo ramen convenire, & magnitudini vkeris, & tempore, debet. Sanierum causa efficiens vna quidem generica est, actio nempe mixta duorum calorum, naturalis scilicet, & præter naturam, in sanguine extraneo. nam sanguis ad hoc ut in saniem vertatur, decet, ut seminalam transmutationem sit adeptus; siquidem à simpliciter mala, si oleida putrefactio, sicut ab optima, partium animalis nutritio: sed quæ saniem generat, medium inter has obtinet locum; neque enim à solo calore præter naturam, neque à solo secundum naturam: sed mixtus quodammodo ex utroque est calor, qui saniem facit. Altera verò causa specifica est, videlicet nutrimenti portio, quæ ad affectum membrum pro eius alimento transmissa, dum ex imbecillitate virtutis concoctis, ac permutatur, aut ex medica menti calidi, & humidii mollientis actione, ad corruptio nem quandam conversa est. Sanierum causa materialis sanguis est, extra propria vasa congestus: aut humores varij mixti, extra venas vnti: aut caro confusa, corrupta, aut liquefacta. Porro ex sanguine tenuiori in concocto, ἵκην seu virtus generatur, & est prima sanguinis mutatio, quæ tenuior est, quæ sit sanguinis corpus; & tale excrementum communiter sanies vocatur ἵκην ergo tenuis sanies est, subalbidia, & sine odore, quæ generatur ex subtiliori parte sanguinis bilioli: ex sanguine vel à concocto, sed in seminalam qualiteram mutato, laudabilis sanies generatur: ex crassiori ac densiori pus, aut purulenta colluvies, sanguis, aut Cellus, ex recenti vulnere, ἵκην ex malo vlcere, & sanies in medio tem pore fluit. Pus verò, quod glutinosus est, & sanguine, & sanie, ab vkere saniescenti expurgatur, ac si icheor aut imbecilliori calore, sanies a moderato, & pus à validiori elaboretur. At cum materia, aut mixta, aut crassa in saniem vertitur, pus illud generatur, quod melliceriam ἵκην vocant. & nos, quia proprium non habemus vocabulum, sordidum dicimus: nam substantia est sanguinea, ac sanie crassior, & glutinosior, & melli albo per similes, vtrplurimum in crudis ulceribus produciatur. adhuc ex materia simili, aut mala, aut adulla, aut semiputrida, pus illud gignitur, quod ἵκην, quasi oleagineum nun cupatur: quoniam pus est quasi vinctum, colore, atque pinguedine, oleo albo non dissimile. Pus hoc à valido calore generatur ex crassioribus partibus sanguinis mali pituitosi: interdum à medicamentorum substantia: sæpe etiam à carne colliquata, ob id interdum substantia crassa est, viscida, densa, inæqualiter cocta: multoties varij coloris, ac odoris ingrati. exit à magnis abscessibus, aut vlcibus concaus, & sinuosis. Non raro in aliquibus vlcibus, ac malis abscessibus aliquæ humiditates excrementicie videntur: quæ, ut fatemur, sanierum nomina non merentur, ut illa est, quæ Græcè ἵκην, & Latine putrilago, vocatur. hæc nigra est, coeno similis, globosa, alpera, foetens, partes sibi vicinas corumpens. exiit à corruptis, aut venenosis abscessibus, nomis, & lacerationibus. generatur ex sanguine malo, corrupto, aut ex corruptione partis substantiæ membri, aut humoribus pravis in eo contri ctis. Solida corpora, quæ in veris abscessibus, & tumoribus omnino præter naturam, & alibi reperi ri solent (nempe linteum, olei limus, vini fæx, vngues, pilli, ossa, lapides, pori, testacea, & similia, vt io atheromatibus, & tumoribus alijs omnino præter naturam) generatur ex crassiori parte frigidiorum humorum, à nimio calore exsiccatorum, aut à frigido nimis constringente, disculsi, nempe lubeilioribus partibus, aut crassioribus exsiccatis, vt in generatione calculorum occurrit. In cognoscenda bona, aut mala sanie, quatuor concurrunt sensus, visus nempe circa albedinem, colores duercos, & eius etherogeneitatem; odoratus, circa fetorem, aut odorem non ingratum; tactus circa tenuitatem, crassitatem, lenitatem, & pondus; gustus circa dulcedinem, amaritudinem, aut acuitatem. Cognos cimus saniem in abscessibus contentam per sensum tactus; si quis enim tangens tumorem cum digi tis vnus manus, & cum digitis alterius, inundationem obleruat, percipit liquidum inundando moue tur: igitur ex contenti puris inundatione absque visu tactus verus index est: itatem in vlcibus, aut par tibus ictu scitis, visus molum constat: interdum locus saniei per colorem dignoscitur; ob id quia si contenta sanies ibi continetur, locus ad albedinem declinat: si verò cruda fuerit, ad rubredinem, aut corporis colorem, aut viriditatem; si corrupta, ad nigredinem, vt in gangrenis: correlarie bona, aut mala sanies à qualitate agitur, aut à dispositione materiæ, aut ab vtraque causa simul provenire potest: interdum etiam à natura, & membri compositione, officio, aut sedis altitæ sita, corrumpente nimirum nutrimenti substantiam, quamvis optima fuerit. Sanies in aliquo sinu collecta, aut ad resolutionem, aut ad concoctionem, aut ad duritiem, aut ad corruptionem terminari solet. In bona sanie nulla con sideratur; color quippe, qui albus, aut albedini propinquus, esse debet; siquidem talis color huma no semini, aut membris ipsius radicalibus assimilari debet; Odor, qui nec suavis, nec ingratu est. nam sanies alba, & sine malo odore, media est inter perfectam concoctionem, & seminalam putredinem. Leuitas, quæ ad tactum percipitur, si materia & calida, & homogenea fuerit; Quantitas, quæ pariter consideratur in abscessibus, cruentis vulneribus, & antiquis vlcibus, aut magnis, aut medicionibus, aut parvis: vel in membris humidioribus, vel frigidioribus, vel siccioribus; Qualitas, quæ à visu digno scitur, dum aut bona, aut mala, aut khorosa, aut sordida fuerit: adhuc eius operatio, videlicet corro siva, putrefactiva, aut venenosa; Tempus, quod passionibus attribuitur, in quibus sanies gigni solet, ve

Gal. 3. Aphor. 47.

Hipp. 3. Aphor. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Gal. 14. Meth.

Anc. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



10 luti initium, in quo ichores (ideſt tenues ſanies) apparet; Incrementum, in quo materia magis concocta, ideſt pus tenue, eſſe videtur; Status, in quo materia ſatis craſſa, & magis alba emanat; Deliceſcentia, in qua materia pauca & laudabilis, ideſt alba, lenis, æqualis, ſine malo odore, & viceri proportionata, expurgatur, multa etiam in mala ſanie excogitantur, vtpote eius propria ſubſtantia, quæ partes continet diuerſas, ex diuerſorum calorum actione, in materia etherogena a gente; color, qui varius, aut niger eſt, dum materia nullam adeptæ eſt concoctionem, ſed à calore præternaturali tantum fuerit elaborata: eius tamen color malus interdum à medicamentis alteratur; odor, qui ingratus, aut fætidus eſt, oritur; cumq; materia aut nimia, aut varia, aut mala extiterit, ac affectû ſedis calor imbecillus, aut ſubſtantia mala.

ADDITIO.

30 **Q**UÆRITUR, cur in puris generatione, & dolore, & febris magis, quàm iam concoctio, ſu-  
geantur. reſpondeatis; pus fieri nequit, niſi ſanguis ebullierit, qui pus fieri debet: in qua ebul-  
litione multi eleuantur vapores, qui tumidas partes vehementius inendunt, & continuum ſolunt, &  
partes difgregantur, quæ vitæ erant, ac dolores ſunt, & ea ratione, qua materia circumſtantes partes  
intendit, ob ipſius fuſionem, ac ebullitionem, & ſpirituum diſſolutionem; cum ipſa maiorem lo-  
cum ambire poſſit, propterea dolores augentur; ſupercaleſcit enim locus à duorum calorum actione,  
& partes internæ quoquomodo putreſcunt, unde triſtis oritur ſenſus. Præterea in ea ſanguinis ebul-  
litione vapores quamplurimi gignuntur, qui ſupercaleſcunt ſibi propinquas partes ſuperaccendunt, &  
inde hæz alia, quoſque cor percingant, quo inflammato, totum corpus illico inflammatur, ac accen-  
ditur, & febris fit. nam febris ſequitur, principio ſupercaleſcitur: ac quæto magis ebullitio augeatur,  
tæto magis dolores, & febres vehementius angunt. febris ergo ob corruptionis participationem, per  
adiacentes arterias à ſode ſuppurata ad cor delatam, generantur. hæc quidem circa puris generatio-  
nem in abſceſſibus contingunt. Pure in eis concoctio, & ſi adhuc remanet materia, dolor quæſcit,  
& febris remittitur, ea ratione; quia in actione duorum calorum circa ſanguinis ebullitionem hæc oc-  
currunt. Exiſta verò materia, ac extincto calore putredinali, quod reſidet ex materia, ſanies fit; quæ  
madmodum ex lignorum aduſſione cinis. Quærenti etiam, qua ratione ſanies bona alba eſſe debet  
dicatis, tenetur ſibi ſeminis humani colorem & formam præſeferre, non tamen eiſdem albedinis: nam  
in ſemine non elaboratur, niſi natiuus calor, in ſanie mixtus. requiritur etiam, quòd fit alba quoniam  
color membrorum radicalium eſt albus; & non aſſimilatur ſic, niſi à natura, potens ſuper eam. edoce-  
mur à Galeno, vim quandam aliteratricem in omni membro eſſe: quæ illi nutrimentum aſſimilat, &  
hoc cum tempore fit: in puris generatione aliqua concoctio requiritur, per quam albedinem acquirat,  
opus nature eſt, omne nutrimentum in determinata membra convertere, præſertim radicalia, & ea-  
quæ à ſemine oriuntur, & vitæ minera ſunt. Cur autem ſanies & levis, & æqualis eſſe debeat, iam di-  
ctum eſt. non additur ei leuitas, niſi quia eſt præparata pati à virtute digeſtiva, & non diſcrificatur  
eius præparatio in inobediente, & obediẽte; ſiquidem cum vna pars præparatur, reliqua verò non, à  
calore innato: tunc ſanies levis non apparet, ſed diuerſa & ponderoſa. Aequalitas conſideratur in co-  
lore, & ſubſtantia; in colore, prout in omni parte externa, & interna, alba, aut albedini propinqua eſ-  
ſe debet, in ſubſtantia, homogena, ac eiſdem nature in omni parte. hæc ratione bona ſanies medio-  
cratam quandam inter craſſietem, tenuitatem, denſitatem, & raritatem obſeruat. igitur bona ſanies  
debet eſſe lenis, & æqualis, non globoſa, non aſpera, non dura, nec ingrati odoris: talis quippe inter  
meiores ſignificationes, ſignificans ſalutem vulnèrum, & vicerum, aſſignatur, videlicet cum in ſuc-  
ceſſionibus eorum apparet ſanies, quæ fit cum medicina ſuppurante, & ex operatione nature, quæ eſt  
ſecundum curſum naturalem, & non generatur ſanies, niſi à digeſtione naturali, & non affociatur ei  
maliva ex accidentibus vicerum malorum; & propriè ſanies laudabilis alba, lenis, æqualis, quæ con-  
ſequuta eſt complementum digeſtionis; neq; affociatur ei fiet or, cum in ea non fit putrefactio. inter-  
dum verò non euacuatur à ſætoze paruo, cum operata eſt in ea caliditas innata, & altera extranea.

Gal. 1. de diff. fe.  
cap. 4. 1. 1. de  
m. & mor. 4. a.

Gal. 1. Pro-  
nem. vlt. A.  
vic. 1. 4. 1. 1.  
cap. 13.

L. 1. 1. virtutis  
naturalium, &  
lib. 2. de ſemina.

Avic. 3. 4. tra. 6.  
cap. 13.

Gal. 4. Aphor.  
comen. 11. A.  
vic. 1. 4. tra. 1.  
cap. 1.

De Ulcere humido, aut virulento. Cap. V.

60 **Q**UONIAM vlcera curare cupienti, primò hoc vnum ſibi proponat, ſi id,  
quod ſanare intendit, Gallici affectus aliquam contineat naturam; ſiquidem ſimi-  
le, non niſi quibuſdam ſuffragijs, illi ſui tantum deſtinari, ſanari nequit de quibus  
multa infra dicturi ſumus. nunc verò de virulento vlcere agentes, dicimus illud  
eſſe, in quo virus, hoc eſt, tenue quoddam, ac liquidum excrementum circa ero-  
ſionem abundat, à Græcis ichoroſum, & à Latinis, humidum, ſanioſum, & viru-  
lentum appellatur: hoc enim, ſeu virus, ſubſtantia quædam eſt tenuis, aquoſa,  
ſubalbida, aut crocea, aut varij coloris, ſine odore, pauca acuatæ, & copioſa. exit à malis viceri-  
bus, poſſimum articulorum, generatur ex ſubtiliori parte humiditatis calidæ, ſeroſæ, ac tenuis, aut  
frigide

frigidè, & humidè, ab imbecilliori calore elaborata. Huiusmodi vlcera à varijs causis contingunt; 10  
 vt plurimum à totius corporis cacochymia: vnde humiditates multæ, subtiles, & ichorose, ad eadem  
 affectum desiliunt, & vlcus virulentum reddunt: hæc partis imbecillitas, & mala temperies, dum eius  
 calor languet, hoc facere solet. mala quoque corporis habitudo (encheziam Greci vocant) prauus vi  
 uendi modus, ac frigida nutritionis ratio, quare nutrimenti plus iusto in vlcere abundat, aut alcutus  
 vlcis particularis affectus, qui tenet excrementum gignunt, & virulentum vlcus faciunt. contem. etiã  
 ad hoc, vlcis siccitas, seu obstracositas, non permittens, nisi tenuem succum, pertransire. præterea  
 caloris innati imbecillitas, aut medicamenti praua operatio, aut incompetencia, existendo, & ab-  
 stergendo; & causæ similes, facientes, vt multoties vlcera ichorosa producantur.

## P R A X I S.

19

**S**i vnâ cum tali affectu, aliqua corporis repleto apparuerit, & vlcus cacochimum existerit (idest  
 virioso succo obiectum, aut fluxione aliqua vexatum): tunc eius sanatio intentionem habet, primo  
 totius corporis euacuationem; siquidem eius cura duplici modo celebratur. genere, opum vñ reg-  
 imine, ipsum parcum, ac tenue instituido; sanguinis, si decet, missione, materierum subtilium per  
 pharmacum purgatione, à partibus longinquis leuibus frictionibus, vomitus iritatione, ac affectu par-  
 tis corroboratione, veluti calidam temperiem refrigerando, & humidam exsiccando, particulariter,  
 vlcus abstergendo, & exsiccando, ac symptomata profligando. Purgant humores subiles medica-  
 menta cologoga, idest bilem educencia, veluti cass. magna, rabarbarum, sirupus rosatus solutius,  
 elect. diaphanus, de succo ros. & rosatum: at si humorum præparatio necessaria fuerit, probatur siru-  
 pus de fumaris, de intubo, de lupulis, de endiuia. concocta materia euacuetur; si totius corporis ma-  
 la adeit habitudo, vt decet, restituetur; si prauus vlcis, nutrimentum ad contrarias qualitates alte-  
 retur; si lenis, aut ventriculi, aut icterici virus aliquod, aut ægræ partis imbecillitas, quæ ipsa quo-  
 que intensâ quædam est imtemperies, quippe fieri aliquando potest, ut & hæc causæ sint, quibus vlcera  
 virulenta reddantur, tollendæ omnino sunt: cum in omni vlcere, manent adhuc eius causæ, quæ eū  
 excitat, aut fouet, tam prius tolli expedit; si laborum durities, absumatur. si medicamenti debilitas,  
 vigoretur; si incompetencia, permittetur. Exsiccant temperatè vlcera simplicia hæc, lentius, ac hor-  
 dei farina, mirtus, balsallum, galli, bolus armenus, mirra, aloes, rabarbarum, æquilectum. car-  
 ta consulti, & rasura panis vtilissimi: metallica etiam multa, lota, aut adusta, veluti elect calcis  
 mis, fori, & diriges, quæ omnia cognata sunt, pariter & q̄ visum, ac hydrargirum præparatum (pre-  
 cipitatum isti vocant) solatrum etiam, arneglossa, summitates rubi, folia vlni. papaueris rubei, balsu-  
 stix, centaurium, aristolochia, folia oliuæ. parantur ad hoc medicamenta sub varijs formis, nempe  
 fomentis, locionis, pulueris, linimenti, & emplastri. fomenta sunt ex decocto prædictarum planta-  
 rum in vino nigro aultero, aut aqua maris; quæ, teste Gal. mirabiliter siccant vlcera, & ea ab omni pus-  
 tredine præseruat. Lociones sunt ex simili decocto, aut ex aqua marina, aut aluminosa, aut viridi;  
 aut ex lixiuo dulci, aut vrina pueri, aut aqua Thermarum Abani, quæ omnia reprimunt, siccant, &  
 abstergunt: quibus semper mellem adiciamus, qui secundum omnem modum vlcis opulatur. vi-  
 guenta verò, quæ vsui seruantur, sint de molibdena, rubem, aut album, camphoratum, irinum, de  
 minio, de tuia, de litargiro, de solatro, de carta. aut aneto combusto, de alga, aut fumide: si quidem  
 necesse est in cura vlcis virulentorum, vt medicinz administrentur exsiccantur; vt exsiccetur virus, 50  
 deinde sit occupatio in nascencia carnis: prius tamen considerare opus est, quod inter exsiccantes, me-  
 dicinas quædam vehementer exsiccant, vt calcantum, diriges, sulphur, euphorbum, & similia: quædam  
 sunt vehementis infrigidationis, sicut iosciamum, opium, & mandagora cortices: alique vehementis  
 calefactionis, vt resina, glucos, & pix. quare prudentis medici interest, has ex proportionem inuicem  
 contemperare, ac admiscere: quæmodum affecti membri natura, & compositio, ac vlcis essen-  
 tia requirit. Adhuc considerandum venit, quod aliqua medicamenta exsiccant, & non exsiccant:  
 quod euenire potest ex ipsarum particularum diversitate, vnde interdum parcus, interdum copiosus  
 exsiccant: indicium, virulentia copia, quæ vlcus occupat: nam si plusculum virulentie apparebit, to-  
 tumque vlcus humidum, intra modum exsiccabit: im purum, & absque humore, cernitur vltra. statim  
 igitur mensuram quoque excessus, defectusque ex tali modo intelligemus: tantoque medicamentum, 60  
 quod deinceps applicabitur, vel siccius, vel non tale admovebimus: imò pro modo humoris, atque  
 ipsa laborantis particulæ natura immutandum medicamentum est, quod perpetuo exsiccatione præditum  
 sit, ab aliqua absterione non expoliatum. Calidum prorsus esse non debet (nam morbi causâ vlti-  
 mum calida est, & effectus, qui apparet, calidi sunt) nec iocundè frigiditatis, nam si talis qualitas quo-  
 dammodo his vlcibus competere videtur: communiter tamen proculdubio vlcibus inimicatur: neq̄  
 extremè siccitatis; nam parum post vlcera dura, & callosa sunt, quæ propter in simili mixtione vincat  
 gradus qualitatibus oppositè qualitatibus inuicem. at si absterione aliqua opus fuerit: tunc medicamen-  
 tum de melle, aut de iros, aut de appio, aut de mirra, aut alterum simile, absque valida mordacita-  
 ne, vt in sequenti capite plenè videre poteritis, ad plenum commendatur. Quo factu, aliquo supradicti  
 Clorum

Lib. 4. vñ. man.  
 cap. 9. Pra. Lib.  
 4. cap. 4. Auz.  
 4. vñ. quæ.

Lib. 4. Meth.  
 cap. 9. Auz. 3.  
 4. vñ. 3. cap. 3.

Gal. 1. Meth.  
 1. 1. de simp. m.  
 lib. 4. cap. 9.

U. p. 1. Aphor.

- 10 horum medicamentorum vlcus regatur: aut tali vtamini, auctore Scribonio. ꝑ. cerę 3. 100. litar. ar. 3. 50. mfi, calicis adustum, aluminis plumę, ceruffę, therebintine. añ. 3. xij. olei mirrhini heiminat, ideo 3. viij. & secundum artem fiat vnguentum. Aliud ex Aquario. ꝑ. litar. ar. 3. vj. olei antiqui. 3. xij. pulueris radicum camelæontis, ciclamini añ. 3. iij. gallarũ, olibanĩ, aloes, iris, añ. 3. ij. & secundũ artem fiat vnguentum. Aliud ex Aetio. ꝑ. ceruffę lotę. 3. vj. litar. loti. 3. iij. squamę æris adustę. 3. ij. calicis 3. i. s. cerę albe. 3. iij. olei mastici. 3. ij. misce. Aliud ex Auicenna. ꝑ. litar. puluerizati. 3. iij. infundatur in aceto per diem, postmodum in oleo, donec albefcat: inde diu in mortario trituretur. & 3. antimonij, æris vsti, balsamium, vermium terrestrium exsiccatum, gallarum, sang. dra. aluminis roche, climię argenti. añ. 3. s. omnia in subtilissimum puluerem redigantur. & addito prædicto litargio, fiat mixtura: & in fine cum pauca cera in catiola ad ignem lentum formetur vnguentum sub bona forma: aut, si lubet, hoc vtamini, quod nos pluries experti sumus, felici quippe successu, præsertim in his regionibus, ꝑ. therebentine clarę, cerę, resinę, añ. 3. s. pulueris aristolochię, mirrhę, olibanĩ, aloes, farcocollę. añ. 3. ij. aluminis roche, climię argenti. añ. 3. i. misce. & secundum artem parerur medicamentum extensibile. quamplurima alia mirabilissimę operationis emplaura ex 4. lib. de compositione medicamentorum in genere, à Gal. de mente antiquorum, inuenire poteris, vbi ait, quod olei, & aquę administratio in his affectibus minoranda est omnino: sed ex Dioscoride mel secundum omnem modum probatur. & Auic. dicit: Cumq; medicamentum aliquod administraueris, & humiditatem minui non noueris, sed potius augeri: tunc scias, quod tale secundum illud corpus siccitissimum non est. quare addatur illi potentia exsiccandi cum pauca absterfione, & omnino tenuitatis humiditatem causam agnosce, & eam quamprimum tolle. & si calor innati imbecillitas fuerit, optimo vi
- 30 tẽ regimine, fomentis, ac emplastris vigoretur.

De Vlcere fordido. Cap. VI.



**V**lcus fordidum illud est, quod eo crasso, & viscido scatet recremento, quod fordes dicitur. id autem est, cum candicat, & quasi crustam productam albam habet. est enim fordes superfluitas quædam crassa, spissa, inæqualis, subalbida, aut cinerica, vtpotius mium ex crassioribus partibus affecti sanguinis procreata: tale vlcus à Gręcis Rhyparron, & à Latinis fordidum vocitur. prius verò, aut ferè nunquam, datur vlcus, quin aliqua abundet fordices: nam perpetuò in omni vlcere duplex excrementum gigni solet. Distert à putrido ob id, quia putridum vlcus cum fœtore, & puritagine serpendo progreditur: fordidum verò sub vna latitudine absque fœtore residet, ac permanere solet. Sordicioris causę variet sunt: non raro siquidem se tenent ex parte superfluitatis, aut malicie: nutrimenti, à calore naturali, & virtute concoctricæ non regulati: vnde mala produciuntur caro, quę dum corrumpitur, vlcus fordidum, aut putridum redditur. hoc etiam euenire solet ex diminuta, aut debili absterfione, aut conuenienti exsiccatione, sepe ex carne ipsa, colliquata à medicamento abstergentis valida actione, cum imbecillitate potentię regitiuę. multoties etiam hoc produciunt res aliqua diuersa, & extranea, in vlcere ipso contenta, nempe puluis, pinguedo, medicamentum vniuersum, & huiusce nature: vt plurimum medicorum ignauia, aut pigritia, ex mala, aut longa medella. Dictum est à Gal. Animo aduertere oportet, vtrum vlcus carne, quę subest, exesa, ac colliquescente fordidum euaserit: an quia medicamen fordidis auferendis aptum requiratur. impositum verò tale non fit. Aliquando etiam caro ipsa colliquatur à medicamento, quę postea in vlcere sub fordidierum forma remanere solet: nam medicina valentior in exsiccando, quam fit infirmi virtus, non solum eam, quę est in vlcere, putredinem mundificat: verum & carnem, quę sub vlcere est, liquefacit: sic, vt fordidum humidumq; vlcus appareat: quemadmodum ex ips, quę minus, ac par est, desiccat. & ideo Auic. dicebat: Serus hoc præceptum in medicis facientibus nasci carnem in viceribus, & non faciat te errare quidpiam. est, vt fit medicamen magis absterfens, quam oportet: quare corrodit membrum, & resoluat carnem eius ad humiditatem currentem, quam existimas esse virus, aut fordes, & addis in virtute absterfionis. & huiusmodi quidem medicamen ponit vlce profundius, & calidius, & magis simile cum apostemoso, & sentit infirmus mordicationem manifestam: hoc quippe occurrit, quia saniosa materia crassa, & viscida, carnis porrofitatibus inheret, & membri substantia corrumpitur, & sensus acuitur, & vlcus fordidum efficitur.

P R A X I S.

**C** Vmque in aliquo vlcere fordes ipsa apparuerit, quę substantia excrementicia est, spissa, coagulata, alba, aut ad cineris colorem decliu; aut est sicut fex, aut crustam quandam albam habet: quę interdum adò crescit, & ita vlceri hæret, quod magna cum difficultate tolli potest, & tunc fordes congenita dicitur: tunc etiã curatius indicatio in proba vlcus obseruatione, & opportuni euationibus consistit, quibus corpus vniuersum ab excrementis, atq; à natura alienis humoribus, expurgetur, præsertim si à viscido corpore vniuerso ob eius plenitudinem, aut cacochimiã copiosa fordes

4. de compo. med. in gen. l. 1. c. 4. Meth.

Gal. 3. Meth. 6. Pr. l. 1. c. 4.

4. s. cap. de vlc. vlt. & cap. de vlc. cancr.

sordes originem duxerit, ratione sumpta à plenitudine ipsa, aut cacochimia. cumq; hoc fecerimus, cunital vlcus sanari nequeat; si in eo sordes, aut copiosa humiditas insit, ad abstergentia medicamenta devenire opus est: à quibus sordes ipsa detergantur, ac in totum aueratur, quæ ipsi vlceri inhaeret. oportet igitur in eis abstergentes medicinas administrare, & ab eis initium capere, quæ vehementer mordicant; ob id quia tunc sensus carnis eam non sentit. est enim fordes tegumentum, quod mordicationi testitur, gradatim postea ad id pervenire decet, quod est leuioris mordicationis, donec cognoscatur, quod caro oriri ceperit. Absterfiva medicina illa est, cui proprietas inest remouendi humiditates viscosas, & congelatas ab oticibus pororum, in membri superficie existentium, ita ut elonget eas à loco, ut tolli possint. ergo ea probantur medicamenta, quæ subtilitate eorumdè substantiæ in forditium ipsam penetrare possint, & caliditate temperata eam attenuare, ac dissolvere: vnde eius crassitie destructa, ac viscositate, facilius à vulnere eius mala operatio dimoueat: quæ porositates membri obstruendo, eius substantiam corrumpit, & sic vlcus fordidum euadit. huiusmodi operatio celebratur per medicamenta siccantia sine astrictione, aut si frigidiore tenuium partium, non tamen caliditatis at trahentis, sed temperata, indicatione perpetuo sumpta à sensu partis, vnde augenda; aut minuenda medicamentorum qualitas est: nec fieri potest, quod vnus sit eorum modus, vel vna natura, huic affectui opportuna, quamvis vnum generale habeat symptoma, quod sordes est, & eget absterfione: nam fordis varie cause sunt, quæ varijs indicationibus tolli debent. verum quantum ad ipsam sordis generalem rationem, habet sane vnam communem indicationem, nempe ut sordes detergantur, & vlcus purum reddatur. Ergo si ex importuno mollicinium vsu succreuerit sordes, exsiccamibus & detergentibus erit opus, atq; illis valentioribus, quatenus & magis fordidum, & humidum vlcus apparuerit, do nec & siccis, & puris euadit: si verò ex acrimonia medicamenti colliquatur caro, detergentibus quidem, sed leuioribus, erit opus: si plethora, aut cacochimia vniuersi corporis forditium creauerit, opportuna moliatu euacuatio, à qualitate plenitudinis indicatione sumpta ab vna, vel pluribus iterum particulis, varia desiliunt excrementa, fluxionem euacuatio, & reuulsionibus interciperi oportet: si verò in ipso vlcere consistat vniuersa ratio fordis, vel ob imbecillitatem concoctricis facultatis, aut ob calorem purificentem, aut vrentem, vitia hæc prius tollenda sunt. subinde vlceribus ipsis occurrendum, & sic de alijs causis internis, & externis agendum est. Medicamenta verò, quæ in superficie sordem auferunt, siue in cute, siue in vlceribus, à Latinis extergentia, & à Græcis Rhypica vocantur, quæ verò poros expurgant subitum partium, sunt & emplastica contraria, à Latinis expurgantia, & à Græcis cepharctica, & eccarthartica nuncupantur: hinc est, quod vitanda sunt, quæ alirungunt, ne sordes pertinacius inhaereat: ac quæ laxant, ne robur partium elanguat: nec valde acria, ne phlegmones irriterent. ergo ea probari debent, quorum vis non multum valida est, veluti farina bordeacea, fabarum, cicerum, orobi, lupinorum, & similis: pariter & aloes, aristolochia, centaureum, gentiana, opium, rabarbarum, alumen, & cætera medicamenta acuitate, & amaritudine aliqua prædita. nam omne amarum est absterfium: attamen hæc omnia cum melle perpetuo parantur, de quo dictum est, quod absterfium habet potentiam, & nullo modo vlceribus obesse solet: imò forditium in eis, & supra totum corpus genitum (quæ à proprietate medicinarum amararum, & baurachiarum tantum absumitur) abstergit à dulcibus etiam, quemadmodum mel est, remouetur. à farina præterea seminum, nempe orobi, fabarum, bordei, lupinorum, & similium euellitur: verum nihil aliud agunt, nisi quod abstergit, & non aperient meatus, ut decet in fordidis vlcere: nisi cum melle, aut appij succo fiat mixtura: in farina verò, quæ sic ex amaris lupinis cum absterfione, est aliquid apertionis. inquit Celsus: Id optime fit cit tinea in melle linamenta, & Scribonius: Omne vlcus fordidum purgat mel per se; iris arida confusa cum melle, terræ mali, aut penacis radix cum melle. & Paulus: Sordida vlcera siue caua, siue plana fuerit, pròbe purgat aristolochia cum melle, therebentina cum melle, iris illirica cum melle, & oliua columbadae illita, & marubium cum melle, amigdale amara, semina vrticæ, & aloes: at quia hominum corpora in arate, lectis, viribus, & proprijs habitudinibus varia sunt: idcirco huiusmodi medicamenta in abstergendi potentia varia esse debent, nempe alia imbecilliora, alia mediciora, & alia validiora, formari debent: quæ autem primi ordinis sunt, sic parantur. Absterfium commune. ʒi. therebentine claræ ʒi. farinæ hordei, mellis rosæ ʒi. iij. miss. Absterfium de melle. ʒi. mellis optimi ʒi. iij. therebentine. ʒi. i. pulueris olibani ʒi. i. miss. Absterfium ex iride. ʒi. mellis ʒi. iij. iridis puluer. ʒi. i. farinæ orobi. ʒi. s. miss. Absterfium ex opio. ʒi. mellis ʒi. vj. farinæ hordei ʒi. iij. succi appij ʒi. viij. pulueris olibani ʒi. s. miss. Absterfium de mirra. ʒi. mellis ʒi. xij. farinæ filiginis, lupinorum, hordei añ. ʒi. i. mirræ puluer. ʒi. s. succi absinthij, appij añ. ʒi. iij. rherebentine ʒi. i. succi vni cū tarinis aliquantisper bulliant; postmodum alia addantur, & hæc vnguentum: sed si aliqua cautus apparuerit, abluatur primò hydromelle, aut lixiuio; aut marinis aqua (cui semper mel addatur, quod si crudum fuerit, vehemens vis abstergit, sed magis ære est, quæ verò secundi ordinis sunt, ac in duris corporibus adhiberi solent, sunt, emplastrum, quod illi vnguentum vocat, ex centaurea Guidonis, aut viride apotholicon Celsi, aut ista viridis Galeni, aut apotholicon ex duodecim rebus Ausc. aut cerasos Melies, aut macherionis Aetij, quæ omnia medicamenta, aut per se sola, aut akeri simpliciori, ac mitiori admixta, sordidum vlcibus opificiuntur: quæ autem tertio loco pro hac indicatione à medicis probantur, & robustioribus

Galen. de cõp. m. cap. 4. & 5. Nich. Paul. lib. 4. cap. 3. Ausc. 4. q. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Diosc. lib. 4. cap. 7. Gal. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Diosc. lib. 4. cap. 7. Gal. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Diosc. lib. 4. cap. 7. Gal. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Diosc. lib. 4. cap. 7. Gal. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Diosc. lib. 4. cap. 7. Gal. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

10 ribus, ac defatigatis corporibus applicanda sunt, hæc vsui seruantur, pastilli, seu troscichi Andromachi, qui à Gal. aidaron, & à Principe andaracharon vocantur; pariter & calidicon, aut illi, qui ex asphodelo parantur. Vltimo loco illi optimi sunt, qui de minio, aut de arsenico dicuntur per se quippe, aut aliquo tenui liquore attenuari, si eum sordicie aliqua constabit putredo, præstantissimi præsidium est vnguentum ægyptiacum Rasis, aut Auic. verum quia mordicare solet, tutum est, ipsum altèri admiscere: veluti digessiuo communi in sordidis, aut basiliconi, aut citrino, aut alteri simili: quem admodum in his affectibus nos pluries vti solui fumus, ratione sumpta à multitudine sordis, & à diuersa eius natura in crassitie, & viscositate. nam sordes tenuis nonnunquam mundo linteo, sæpe recte me le tantum, aut syrupo rosato, ex succo rosarum confectio, aut leuibus lotionibus detergitur: remota omni sorditie, vlcus tale, quale fuerit, indicatione sumpta ab eius esse, regatur: à Paulo verò pro noua carnis regeneratione tale commendatur medicamentum, & mellis crudi optimi s. iiii. theriacenæ s. ij. pulueris iros, marubij, aristol. lon. aloes, an. s. iiii. farina orobi s. j. misc. Aliud, quo vitium, & the rebenting clarè s. ij. plumbi viti, cerussæ locæ, litargini argentei an. s. ij. cineris cartarū combustarum, aluminis liquidi adulti, an. s. j. misc. secundum artem. & si opus fuerit aliqua abstersione, addatur vnguenti istis s. s. & valer. Occurrit interdum, quod crassum ac viscidum excrementum addè copiosum expurgatur, quod totum vlcus, ac sibi vicinas partes cooperit, & corrodit: ac ita eius augetur malitia, quod in vlcus, aut putridū, aut sphacelodes permuratur. indicia sunt, si vlcus cauum sit, & malo colore tingitur, ac prauo odore non priuatur, euenit adhuc interdum, quod crassi humores, quodammodo sanguinis naturam referentes, dum feruescunt, malignitatem quandam, ac venenositatem non parum contrahunt: vnde vlcera malè morigerata nascuntur, de quibus ioh. serapionè habitū sumus.

Lib. divisionis in sine. cap. de curacua gona.

De Vlcere putrido. • Cap. VII.



Le vlcus siue putridum, illud est, quod sibi annexam semper habet aliquam putrilaginem, quæ interdum cæno similè reinet colorem, & substantiam, à qua sibi elcuanur fa tidi vnde odor grauitur olens effertur: tale vlcus, si depascendo non procedit, sapedona Græcè, & Latine putridum nuncupatur. Si verò perambulando vicina loca corripuit, nomas Græcè, & Latine fraudulentum vocatur. dicebat Gal. Putrida vlcera cum ambientes partes depascunt, nomas Græci propriè appellant, & est pessimum morbi genus, & constat, vehementissimis indigere medicamentis, & id potè etiam cæterijs. Putrilago, quæ in eis generatur, excrementum quoddam est, globosum, cineritium, aut nigrum, færens, partes sibi in consortio connexas corrumpens. exit à malis vlcibus, corruptis abscessibus, & sphacelis: generatur ex corruptione partis substantiæ membri, aut humoris constructi in membro, aut longa humidiorum medicaminum applicatione, & ob id dicebat Gal. 3. Meth. cap. 2. Oleum cauo vlc. eri insutum aduersissimum omnium medicamentorū est: nam fordidum, ac malè olens vlcus reddit: tempus quoq; anni calidius si fuerit, ac vicio mali succi homo laboret, aut fluxionibus obnoxius natura sit, aut etiam in vlcus ratione delinquat, ne illi pars ea computrescat, timor est, in qua vlcus est factum, vlcus putridum à sordido differre solet, malitiæ ac fraudulentie natura, & operatione. differt à phagedenico: nam putridum sua putrilagine, fæiore, & corruptione, deambulando, vicina destruit. corrosiuum, siue phagedenicum, absq; putredine, & fæiore corroden do progreditur: Non quicquid corrumpitur, ait Gal. putrescere dicimus: sed id putrescit, quod cum fæiore, & putrilagine consistit. Putridorum vlcum causæ alię interne sunt, nempe humores mali, crassi, sanguinis alterati naturam quodammodo respicientes: interdum varij, corrupti, in corpore adacti, ebullientes, & feruesceti, venenositatem quandam adepti. hi magna ex parte carbunculos, sphacelos, & vlcera putrida producant: externæ verò, contactus rei putridæ, aut veneno affectæ, esse solent: aut aer fætidus, siue alio modo corruptus; vt plurimum praua chirurgia, humida & nimis viciuosa medicamenta administrando, & ea, quæ veneno prædita sunt: aut membrum nimis infrigido, aut in radice contrahendo, aut sine methodo, vel tardè medelam præstando. sequuntur putrida vlcera, tanquam eorum propria symptomata, febris assidua, inquietudo, alienatio, intolerabilis, ac cadauerosus fætor, membri corruptio, & sæpe mors: hæc vlcera pessima sunt, quæ corrigi, & munda dari nequeunt, aut corpori mali habitus occurrunt, aut profundè progrediuntur, aut nobiles partes occupant. inquit Hipp. Nomen terbalissimum sunt. quarum putredines profundissimæ, aut nigrissime, aut succissimæ apparent: hic morbus nisi citò, ac omni ratione sanetur, in sphacelum transire solet: & tunc non solum id corrumpit, quod occupauit, sed etiam serpit, & inflammatio nimia vlcus ambit, & cum dolore procedit: inde vlcus nigrum fit, quia caro eius corrupta est, & færet: idq; etiam vehemètius putrescendo intenditur. ex eo humor pallidus fertur mali odoris, & cæno similis: & qui tali morbo affliguntur, sub nimia anxietate, & frigido sudore moriuntur.

Gal. 1. Krag. ci. 6. s. i. v. m. 4. 1. lib. 14. cap. 49.

de comp. m. in gono circa p. m. s. de comp. m. fac. cap. 14.

Lib. 1. præd. 1.

## P R A X I S.

And. 4. 4. 2. 3. 4.  
cap. 3.

**V**A R I E Ingenijs, ac diuersis suffragijs putrida vlcera curati solent, potissimum exquisita corporis euacuatione, & forti absterfione: quare, plethora apparente, sanguis, si decet, mittatur: caecochimia existente, alius purgetur, pharmaco adustus humores ducente. hæc interim afficere sedis reificatio, & partis corruptæ ablatio tentanda est: postremo vlcis sanatio. In his prauis vlcibus, ait Hipp. tardare malum est: siquidem citò eorum malignitas augeri solet. & quia de alimentari ratione, euacuationibus, & vniuersali curandi methodo multa superius enarrauimus, vlcis hic procedere nō licet. hoc vnum tamen dicere expedit, quòd missio sanguinis in venenosa materia, aut in ea, quæ significatiōis via expulsa est, ab omnibus oon probatur: sed diæta, & acris chistia laudantur. Si corpus ab excrementis immune fuerit, affectum membrum euacuare expedit, & eius malicia tolli scatiificationibus, hyrudinibus, cucurbitulis, & nutritione conuenienti: & non sit in hoc dilatio, led omni ingenio inflammationes prohibeantur, ne postmodum gangræne oriatur. interea humores in venis existentes alterentur serapijs de succo acetosæ, de succo endiuie, de acetositate citri, de buglossa, & similibus: cor eriam epithimatis incolume conseruetur. Affecta pars secundum eius dispositionem, & accidentium naturam regi debet: si plagi aperta, & in conspectu fuerit, ablatur: si minus, scarificare opus est. potro in leui putredine debilia medicamenta, vt de sordido vlcere explicauimus, opportuna sunt. in validiori malignitate vlcus primò ablatur aqua maris; & si eius copia non est, decocto lupinorum amarorum; aut luxiuo claro, addito semper oxalinc: aut acida muria, siue aceto multo, aut falso, aut celebre illo emplastro egiptiaco: quod à Rasi sic paratur. R. ris aris 3. iij. mellis 3. viij. acci 3. iij. ab Aucicna sic conficitur. R. ris gris, mellis, aluminis, aſi. pari portione: postmodum inaspergatur puluis ex calcitide, & fori: aut lini semen cum atramento furorio, aut appij semen tritum, & cucumeris agrestis radix trita, cum melle: medicamentum Celsi de mense Heras. R. mirrhæ, calcitidis aſi. 3. xij. aloes, olibani, aluminis plumæ, aſi. 3. xiii. aristolochiæ, gallæ inmatuæ, aſi. 3. xvij. corticis granatorum 3. xv. fiat ex his omnibus puluis subtilissimus. ex Gal. R. farine erui, aluminis liquidi, panis simlaginei, carnis piscium, aut alterius animalis, verustæ, salitæ, & oon locæ thebeniæ mellis croci aſi. misc. & fiat emplastrum. Ex Paulo Aegineta, R. calcis viuæ, calcinis aſi. 3. ij. auri pigmenti 3. j. & cum melle paratur medicamentum. multa istius nature, ac operationis, ab antiquis descriptur præfida: quæ cum adhibita fuerint, per diem amoueri nō debent: crustam enim inducunt, quæ postea tollitur, aut succo porri, aut butiro, aut medicamento ex therebentina, & oli luteo: vlcus inde regatur medicamento diacartu, idest, ex carta combusta: quod ex Aduario, & Paulo sic paratur. R. ris squamæ, cartæ combustæ aſi. 3. viij. auri pigmenti, sulphuris viui aſi. 3. xij. plumbi vſti 3. vj. mellis, quod sufficit: si putredo perferutare videtur, oſuino quod putridum est, tollatur medicamentis acutis, nempe cauerijs, & igne, aut totali ablatione, ne quid corrupti remaneat: led caro sana tantum, quæ ex bonitate sanguinis apparentis, & eius rubedine, ac partis sensu dignoscitur, aut ex osse, quod album, & sanum est: Nos verò in his affectibus, non aliud præstantius medicamentum inuenire potuimus ægilaco, descriptione Rasi, aut solo, aut alteri admixto. in leui morbo hydragrium optimè præparatum; quod præcipitatu vocatur: celebre medicamentum est: solent acuta præfida dolores inferre, vnde nouæ fluxiones iritantur, & locus inflammatione vexatur, quàm diu scutit polenta ex farina hordei, & alteri semine, vel brastica cum melle, & succo solati: cum verò maiora apparent symptomata, corrigantur, vt capit de gangræna, in tertia nosstræ chirurgiæ sectione ad plenum dictum sumus.

Profr. lib. 4. 2.  
G. 1. de natu.  
4. 1. 6. K. 1. 1. 1.  
de nouis, & pu  
tridis vlcibus.  
Celsi. 8. cap. 1.  
Act. lib. 10. cap.  
1. m. ubi de  
oxalinc.  
Paulus. lib. 4.  
cap. 4. 1.  
Lib. 1. de in fi  
ne.  
Can. de cura gl.  
8. quæ.

Gal. Aic.

## De Vlcere corrosiuo.

## Cap. VIII.



**V**lcus exedens, siue corrosiuum, illud est, quod sua malignitate, ac humoris ac redine sedem, quam occupat, ac vicinas, circumstantesque partes corripit, ac crescendo continuo absumit, ac depopulatur. si cum aliqua purillagie progredietur, Nome Græcè vocatur: lecus vero, phagedæne dicitur; Latine autem depascens, erodens, & serpens nuncupatur. differt tale vlcus, quod extimam tantum partem, ac superficiale primò abradit, & vltimò corrodit, ab ambulatio: quod sua malignitate non modò vicerat partes carnosas, sed etiam sanas viariæ re tollet. ratione causæ materialis, siquidem in corrosiuo subtilis admodum, acutus, ac pertenus humor abundare solet: vnde profundiores partes nō attingit, sed summæ tæstium exedens exulcerat. quare sæpè herpes, aut ignis sacer appellatur. in ambulatio autè adustus humor & feruens peccat: igitur peiores partes offendit. ratione effectus, nam vlcus corrosiuum vario modo, vlcus pluralitate, & veloci quadam actione præcedit. ambulatiuum eodem ordine, vno tantum vlcere, & tardè progreditur. Indicia verò correspondentium vlcum hæc sunt. pruriunt in principio sedes, quæ in confortio sunt, inflammant, virulentiam humiditatem expurgant: pustulas, quas biliosus, & acris humor excitauit,

g. Aphor. com.  
1. 1. 1. 1. 1.  
de vlc. 4. 1. 1.  
Meth. cap. 1. 1.  
di. como. pr.  
1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1.

60



uit paruas, prurientes hincinde producant; perpetuo corrodingo perambulant, ac vlcera plurima gi-  
gnunt. Causæ internæ sunt, veluti succi mali adusti, acuri, aut venenosæ qui propter aduersionem ca-  
coethiam quandam, idest, malignitatem acquirunt: interdum criticè extramissi, qui inter partes sub-  
stantiæ membri terminantes dissipantur, aut corrumpuntur, & eius iam productam substantiam consu-  
munt, aut naturalem humiditatem absorbunt: vnde, deficiente proprio ac naturali nutrimento, reman-  
ent vlcerata. possunt esse & externæ, nempe topica nimis calida, aut multum acuta: quæ suis qualita-  
tibus talem effectum in membro inducunt, vt in herpetibus sæpe videri solet, ac in excedente formica,  
quæ hoc atq. illic serpendo cutim non solum, sed & subiectam carnem depascitur. pessima sunt huius-  
cemodi vlcera; ob id quia à pessimis generantur humoribus. nam dictum est: Vlcerata, quæ serpunt,  
& dilatantur, à bile adusta sunt, nunquã talia suppurantur, idest, nullam gignunt laudabilem conco-  
ctionem, & potissimum indicium bonitatis vlcerum, est pus optimum. hæc omnia phagedænas, idest,  
exedentes antiqui nominabant.

Gal. 4. Meth. ca.  
6. Auen. 3. C. 1.  
Hipp. lib. de th.  
cenis.  
Gal. 5. Aphor.  
c. 22.

P R A X I S.

**V**T verò ad perfectam sanitatem corrosiua vlcera perducantur, triplici genere auxiliorum egent,  
nempe proba victus ratione, conuenienti corporis purgatione ( quæ succo tali prauo, erotione  
in affecta particula excitanti, fit accommodata, præsertim si acris, ac erodens humor aliunde, quam in  
vlcerato loco, sui ortus occasione habuerit ) ac localibus remedijs opportunis. sic enim mali, & acu-  
ti humores ad benignitatem, & temperiem reducuntur, affecta pars rectificatur, vlcus nitidum redditur,  
& corruptio, ne vicius progrediatur, prohibetur. Hac ratione, dicebat Auen. Canon vniuersalis in  
curatione vlcum corrosiuorum, & fraudulentorum est, vt mundificetur corpus, & membrum, si fue-  
rit corpus mundum, cum venosis, & sanguisugis super ipsum, & permutacione complexionis eius cum  
epithimatis, & rectificacione cibi absq. tarditate, & dilatacionem: nam tarditas remedium verbum  
eorum malicia, de sanguinis missione in phagedenico vlcere, præsertim à vena nullum quidem verbum an-  
tiqui prouulerunt; hac ratione, quia bilis acuta, & adusta, omnium malorum auctor, & eius causa ma-  
terialis est: sed clisteria, & pharmaca bilem ducentia, magis probantur. apud iuniores tamen, si materia  
aliquo modo crassa fuerit, venæ sectio admittitur, quæ simul & euacuet, & reuallat: nec victus tenuis  
probat in malis vlcibus; siquidem addit in eorum malignitate: sed frigidas ac humidus viuendi  
modus, qualis omnibus scibetis canis confert, summè conuenit: vinum omnino interdicitur, nisi vir-  
tus languida fuerit: tunc enim ab Hippocrate oligophoron, idest, album, reuocet, & limphatum conce-  
ditur. porro quæ de vlcum curatione scripserunt, iubent primò causas, quæ illa creant, aut fouent,  
abscindendas esse; deinde ad eam, quæ coniuncta est, deuenire. Tollantur igitur eorum causæ prima-  
riæ vniuersali euacuacione. nam sic docet Gal. dum inquit: Hoc tibi, tanquam commune præceptum  
est, omnino in omnibus morbis, nedum vlcibus, in quibus efficitrix causa adhuc manet, ac hac in-  
choandam curationem esse. igitur si corpus cacochimia fuerit repletum, vbi redundantia sanguinis in  
toto corpore, aut subiacente particula subest: tunc à totius corporis euacuacione curatio inchoanda  
est. miratur ergo sanguis in hoc affectu, idq. magis si corpus iuuenile, boni habitus, ac optimi roboris  
fuerit. quanto enim euacuatio communior est, tanto magis præcedere debet: secus verò si expedit ta-  
li, aut altero simili pharmaco, per secessum fiat purgatio, in diuitibus præsertim, aut tenellis corpori-  
bus. R. cass. pinguis no. extract. 3. x. ellec. de psilio. 3. ij. zuccari q. s. pro 6. aut R. reub. ellec. 3. i. i.  
spice 3. ij. decocti epithimi sine addicione q. s. fiat infusio per noctem. & facta forti expressione, adde  
syrupi ros. sol. 3. ij. misc. & fiant p. 6. aut R. reub. optimi 3. i. spice 3. ij. decoctionis florum, & fructuum  
cordialium cum tamarindis q. s. fiat infusio secundum artem. & facta diligenti emulsionem, adde ellec.  
diacar. 3. j. confect. amech. 3. ij. misc. & fiant p. 6. pro pauperibus verò, R. syr. de fumor. de succo  
endiuiæ, añ. vnc. j. aque acetosæ, boraginis añ. vnc. ij. ellec. diaprurni solutui 3. iij. misc. huius fimi-  
le pharmacum non reperitur. cumq. corpus exquisitè euacuatum non fuerit, denuò euacuare conue-  
nit, potissimum cum catapottis, ex fumaris, ex agarico, ex reubarbaro, aut aggregatis. scena etiam,  
aut præparata, aut cum passulis, in sero lactis infusa, commendantur: resistentes verò humores, qui ma-  
ligni, ac euacuacionibus rebelles sunt, longa syruporum exhibitione præparentur, donec eorum con-  
coctio in vrina dignoscatur: vt autem ab ingentibus defluxionibus, seu ab iniuria fluentium humorum  
vlcerata particula vindicetur, optimum præsidium erit, circumiacentes partes aliquo linimento apo-  
cristico, vt fluxio auertatur, repellaturq. illinire: & tunc R. succi plantaginis, solari, aque rosarum,  
aceti optimi, olei rosati, mirrhini añ. vnc. j. bulliant vsq. ad succi defectum. & adde boli armeni, sang-  
dra, añ. 3. ij. pulueris mirthillorum, gallarum añ. 3. j. ceram pro linimento. Porro, anequam ad medi-  
camentis localia deueniamus, excogitare oportet vlcis tam magnitudinem, quam malignitatem, vt  
apta medicamenta eligamus; cum difficultas, ac per maligna vlcera, nisi à validis fortissimiq. medica-  
mentis, superari nequeant: ex leuiori enim vsu eorum malignitas non tollitur, sed potius augetur: se-  
cus verò vlcera mitiora, quæ acrioribus, ac fortioribus medicamentis irritantur, & augentur. quare  
in his, medicocribus, & quantis fieri potest, mordacitatis expertibus medicamentis vi expedit: ex me-

Col. lib. 5. cap.  
de chorostrut:  
Ant. lib. 6. ca. 14.

Gal. lib. 2. p. m.  
cap. 3. & 4. Me-  
th. cap.

Auen. 1. ca. 3.

Præ. lib. 4. c. 4.

thodo verò, & propria ratione, exsiccantibus, & refrigerantibus: cum erosio absterri, & calido succo fiat, à calidiori, & licciori temperie genito. igitur ad illius visiofi succi consumptionem, necessaria est exsiccatio; & ad calidam temperiem delendam refrigerantibus opus est. & friccitas lima fer caloris: plus tamen præstat, tum reigieratio, tum etiam absumptio visiofi illius succi: qui longè magis sic cabat, & calcificabit, quam id genus medicamenta facere possint. quæ autem huic indicationi oportet runa sunt medicamenta; explicauit Gal. campè mineralia multa, sora, & trita; veluti est pompholix, pro qua tutia vitæ, plumbum vltum, bolus armena, terra Lemnia, litargirium, lapis ematit, & similia. ex plantis etiam, sicut est mirabolanorum puluis, aristrolochia, aloes, & ralia, ex quibus maligna vlcis natura superari poterit, & erosio tolli, præsertim si mediocrius fuerit; quippe interdum ad eod vlcus malignum apparet, vt huicicemodi medicamenta superet: quod duplici de causâ evenire solet; vel quia à prauis succis, quibus corpus totum refertum est, fouetur, & quia caro vlcera, & circum iacentes partes adeo corruptæ sunt, & prauum vitium contraxerunt: vt omne alimentum, & partes alioquin sanas corrumpant, aut in prauum succum peruertant. vnde illico vlcus malignum, & erodēs redditur. Inquit Pau. & Auic. Superfusiones viles sunt vlcibus depascentibus, putridisq; ex aceto, posca, aqua frigida, aqua mirrhi, aqua rosarum, aqua virgæ pastoris, & vino astringente. si non fuerit caliditas, aut paretur decoctum, ex lentiscula, malicorio, lentisco, mirtho, aut spina ægyptia, aut ex aliqua re simili astringente, & exsiccante: fortassis hæc non in vlcere ipso, sed circa ipsum adhibenda sunt, ne mali humores ad viciatam partem defluant, & vt mala loci temperies tollatur. hac ratione paratur cataplasma ex farina fabacea, erui, pane filigineo, aristrolochia, alumine liquido, oximellite, & lixiuio claro: vlcus verò si immundum apparet, aqua maris, aut cineris, aut aluminosa, aut viridi ablatur; & cum exsiccatum fuerit, absumatur eius malignitas, potissimum pulvere illo celeberrimo, qui ex hydrargirio, siue mercurio paratur, præcipitatum vocant. nam absque dolore omnem tollit putredinem, partes bonas præseruat, saniem crassiorē reddit, & vlcus ad benignitatem conducit: pulvis hic solus in vlcere adhibendus est; ac per diem naturale permaneat. desuper vero plagella splenia ex filis penicilli nitidis, & siccis applicetur, quod totum contegat vlcus, & super omnia latum platisma, cum cerato ex sandice, quod ius de minio vocant, aut ex ouo, quod cerussatū dicunt, aut diaphanice, quod palmeum vocatur. Porro si copiosa appareat forditio, medicamentum iside, aut macherione mundetur. isis sic paratur. ꝑ. aristro. galbani, opoponacis, æruginis, irios, ammoniaci, mirrhæ, añ. vncj. thebentine, olei rosati crudi, añ. vnc. vj. cere q. s. æ rugo tritetur cum oleo, reliqua verò cum cera, & fiat vnguentum. Trocisci adhuc quamplurimi, nempe Andronij, cum se, passionis, aut de asphodello, melle crudo, aut thebentina, leuigati summo perē probantur: attracti ad hoc uogeiū præstantius medicamentum non datur ægyptiaco, aut per se, aut alteri admixto: at si horum vlcis adeo fuerit malignitas, quod prædictis auxilijs tolli nequeat, ad ignem cautericum, tanquam ad sacram ancoram, deuenire oportet: cumque in dies magis atque magis erosio serpit; & vlcus augeatur, corpus denudò à visiofi succis repurgandum erit; postmodum continens causa, seu coniuncta, quæ partes vlcis absumit, & erodit, vltione, seu cauterio actuali desiccanda venit, sedò patiēti id genus auxilij non formidet, aut renuat, cum remedium sit aspectu horridum, & formidabile: igitur, si candens ferrum ob laborantem timiditatem, aut affectu sedis naturam non admittitur, ad ea medicamenta confugiendum est, quæ similem fere vim habeant, qualia sunt, quæ fiunt ex atramento furorio, aut ex viua calce, potissimum vero, arsenicum, quod sublimatum vocant, in modica tamen portione, cum butiro, aut cerato albo turo adhibetur: si hæc peo desse non videntur (id magis quando vlcera putrida sunt, & mali habitus, atq; exedentia, vt nullis medicamentis sanari possint, & cauteria facta non sint, & adhuc mala qualitas putrida, & corrosiua perleuerat, nec ignis ipse putredinem, & malignitatem vincere potest) quod corruptum est abscondere iustum est. nam dictum est ab Hipp. Quoscūque morbos medicamenta non sanant, ignis sanat. quos ignis non sanat, ferrum sanat: quos verò ferrum non sanat, hos sanari non posse putato: vel hos incurabiles existimare oportet. quo modo verò putrida membra amputanda sint, infra capite vlt. huius libri ad plenum explicabimus.

## De Vlcere sinuoso.

## Cap. IX.



Levs sinuosum illud est, cuius initium satis angustum apparet, profundum vero in latius se diffundit: nulla ramen durities, aut callositas percipitur, à quo longè maior, quam vlcis magnitudine, quæ in superficie adest, puris copia effunditur. Tale vlcus à Græcis colpon, à Latinis sinuosum, casuosum, concauum, coniculosum, lacerosum, & abscessum nuncupatur; siquidem, vt dictum est à Gal. Cum amplius agglutmandi cutem subicicis corporibus creuerit difficultas, huiuscemodi affectum sinum, aut cauernam Latini appellant. Eius causæ quam plurimæ esse possunt, nempe magnæ contusiones, quæ tandem in saniem conuertitur; abscessus pariter locorum frigidorum tardè sedus: qui (vt ait Gal.) cum ruptus, & apertus fuerit, ac euacuata materia, quæ in eo continebatur, non amplius abscessus, sed sinus dici debet, præter hæc vlcera mala, non opportune

4. de compo. m. in gene.

Lib. 4. cap. 44. 4. 12. 3. ca. 11.

Gal. 1. Kinge.

Albuc. lib. 4. ca. 54.

Aphor. 6.

- 10 opportune absterſa, & exſiccata. Porro cuius viceribus adiacens, diutius ſubſeſtis corporibus non coaleſcit, aut propter nimiam eius tenuitatem, aut diminutam mundificationem, aut debilem exſiccationem, aut ob externarum humiditatum abundantiam: abſceſſus vero tarde ſecantur, ob patientia timorem, aut chirurgorum penuriam, vel ob eorum negligentiam, aut impericia: vlcera opportune non abſterguntur, propter aſſectus ſedis nimium ſenſum, aut medicamenti imbecillitatem, aut morbi malignitatem. Cautorum vlcerum indicia ſumuntur interdum ab excreſcentibus in quantitate nimia, aut quia ei herogeneis, aut in ſubſtantia tenuibus, & acutis, ac lotura carnis perſimiſſimis, quæ aliquam argunt in inflammationem: aut talis materia craſſa, & ſubalba eſt, odore non grato, vel ſeroſa, quæ intemperienti aliquam frigidam demonſtrat: ſæpe à loci vlcerati tenuitate, profunditate, & litu: multoties à digitis, aut ſpecilli, aut cereæ candellæ leui, ac blanda impoſitione, aut alicuius tenuis liquoris iniectione:
- 20 nam color materie, quæ ab ipſis cauernulis egreditur, qualitates eorum manifeſtè inſinuat. Horum vlcerum natura & forma viſa eſſe ſolet, & diuerſimodè dignoſcitur, interdum à dimenſione, quippe hoc breue; illud altius penetrat, aut in ſatus ſe diſſundit; hoc diametraliter, & rectè procedit, illud toruoſè, ac pampini riuu; aliquid ſurſum, & aliquid deortum, à ſitu, veluti in parte carnoſa, aut multarum vcnarum, & arteriarum, in loco concauo, abſolſo, aut articulorum. à figura, ſive numero, & ſimplicitate nam varias formas ſeruare ſolent, & ſphericam, & triangularem, & ſiſtularem: interdum ſinus tantum vnus, multoties plures inſunt. ſola ſe ſimplicia contingunt; vel plurimam alio morbo, aut diuerſo ſymptomate complicantur. diſſident cauæ vlcera à ſiſtulis, hæc ratione: nam ſiſtula vlcus eſt Gal. Aet. lib. 14 cap. 33. Pan. lib. 6. cap. 49.
- 30 altum, anguſtum, & callolum, & eſt ſicut cæna, aut ſiſtula penetrans in membro. hæc in ſinofis vlcibus inelle non videntur: cum in eis nulla durities reperitur. præterea raro ſiſtula huiusmodi diuerſo repletur: ſinus vero magna tenuium humorum copia ſcatur. Inquit Auic. Vlcus, quod profunditate in habet, non abſoluitur: quin aut iam indurata ſit caro, circumdans ipſum, & nominatur ſiſtula, & eſt ſicut canna penetrans in membro: aut non induratur aliquid, & nominatur abſceſſus, & cauerna. Oc currit interdum, viſuſſet autem à pure circa abſceſſum aggregato ſufficienter extenuari, inſtat lacerti veſſimenti, vnde illi nomen laceroſi vlcus à medicis inditum eſt. eſt igitur huiusmodi cutis conglutinari contraxit, præcipuè ſiquis ſecundum ſubſtantiam ſiccam medicamentum imponat. ex his enim magis ſit lacere veſtis ſimilis, & ſicca cutis inſtat pellium detritarum. paſſio hæc à Græcis rachodes, & à Latinis laceroſa dicitur, & ideo dicebat Auic. dicunt quidam abſconſionem illud, quod elongatur ſub cute, & cutis ſeparatur ab ea: & cauernam illud, quod inſectitur ſub carne, & dilatatur in eis vbi verò qui ad magnum abſceſſum perueniunt, & chirurgiam non admittunt, ſed expectant, vt longiori
- 40 tempore cutis à pure rodatur, contingit eam extenuari: vnde fit vlcus laceroſum, aut more Auicennæ, cauernoſum. hoc vtrplurimum, ait Albucasis, contingit in poſterioribus membrorum frigidorum, aut cartilagineoſorum: in quibus pus longo nimis ſpatio retinetur, & non rite expurgatur; atque ita à græ vlcus cauum carne repletur, & ad cicatricem perducitur.

P R A X I S.

- P R o axiomate, ſive diſpoſitione hoc apud Medicos habetur, & ab omnibus inſtitutum eſt, vt omne cauum vlcus vna tantum ratione, ea nempe, qua cauum eſt, circa ve complexu alterius affectus, curari debeat. hæc quippe eſt, vt caro, quæ periit, regeretur; & quod cauum eſt, noua carne repleatur. vnicui tamen indicationi variæ præcedunt conſiderationes: quarum prima ea eſt, quæ vltimo
- 50 conſequitur, ſcilicet cauitatem replere, & continui diuortium vñire. Secunda magis particularis eſt, accepta ab ipſo affectu, & à corpore affecto, id eſt ab eſſentia, quantitate, forma, & litu ipſius ſinus, à temperamento totius ſedis affectæ, & ſymptomatum magnitudine, & qualitate. Cautas repleri ſolet vbertate boni cibi, alimento ſufficienti, & optimo ſanguine: porro optimus ſanguis ex bonis cibariis ſuccis gignitur; ſic enim totius, ac affectæ particulæ temperies conciliari ſolet. Diuortium vñitur diſſidentium partium vñione, & conſeruatione, extranearum humiditatum prohibitione, ac ſymptomatum proſtitigatione: vt verò hæc tunc adimpleri poſſint, corpus optimo vitæ regimine regi debet. & li qua plethora apparuerit, ſanguis mittatur. ſi cacochimia prauis humoris copia, conuenienti pharmaco euacuetur: pars verò affecta in eius naturali diſpoſitione aut conſeruetur, aut reducat: nam affectus non curatur, niſi affecta ſedes fuerit optimè diſpoſita. Igitur li qua intemperie vœntur, per
- 60 contrarias qualitates ad temperiem permuetur: hoc interim vlcus tiruſi ſi decet, vt intum ſitum oriſicium perpetuo ſpectet: aut ſaltem per cinnulazas turundas pus continuo effluat: vel per expulſicem inuoluſum ſuccoſiſſimæ humiditatis expurgentur: aut ſi expediat, facta in decliuiſi parte noua ſectiōe, ſinus totus appareat; ſic enim ſinus omnis, quatenus ſinus eſt, regi debet. Vt verò communis indicatio exequatur, ſcire oportet, quod in nouæ carnis regeneratione duo excrementa neceſſariò vlcus in ſeſtant, vnum videlicet tenue, & alterum craſſum, à quibus vlcus & humidum, & ſordidum ſemper red dicitur; ob id medicamen geminæ facultatis præditum eſſe debet, exſiccantis ſcilicet, & abſtergentis; ſiquidem quod humidum eſt, exſiccari poſtulat: quod ſordidum, abſtergi deſiderat. porro hæc ſunt duæ indicationes, ſumpe à cauſis prohibentibus carnis generationem: quæ omnino, aut corrigendæ, aut tollendæ ſunt. inſuper ſanguis, qui ad laſum locum deſiuit, optimus eſſe debet: ſecus verò caro in

Gal. 3. Meth. 3.

causis vlceribus gigni nequit. nam dictum est: In gignenda carne binas esse causas, alteram effectricem, alteram materialem. efficiens ipsa natura sola est, non autem medicus, nisi quatenus possit naturæ iuu-  
 uari, et vi expeditius, & citra vllum impedimentum hoc præstare possit, adiuta tamen loci temperie; qui morbo in diminuta quantitate assilgatur: quare eius naturalis habitus, à quo fit attractio, conco-  
 ctio, appositio, & assimilatio, conseruationem in sui esse desiderat: huius vero effectus potissima ratio est, optimum vitæ regimen, & conueniens diæta; cibaria enim, quæ calidiorum, & acriorum, aut aquo-  
 siorum sanguinem gignunt, omnes corporis partes (ipsam præcipue) alterare solent: quies præterea in his affectibus præsidium optimum est, alius, ac loci expurgatio quotidiana; somnus etiam naturalis, & nocturnus, ac animi quies in carnis generatione summopere auxiliatur: ambien- etiam æquæ tempera-  
 tus ad hoc maximè facit, igitur, ne nimis calefaciat, aut frigidior vel humidior sit, quam debeat, cauere oportet: ab omni itaque excelsius qualitate vlcera quoque iritantur. præterea sanguis, qui tanquam  
 causa materialis in generatione carnis existit, purus, simplex, & syncerus sit, ac ipsæ rationibus con-  
 seruetur: si minus, corrigendus, aut præparandus est per massæ sanguineæ alterationem. & si eius ni-  
 mia copia fuerit, illa nempe minuenda est sanguinis mutatione: ut si alijs admixtus fuerit humoribus,  
 per illorum, qui mixti fuerint, ianuam eorum corpus purgetur: si illius fuerit penuria, opportuno alimen-  
 to augeatur: si malis qualitatibus affectus, mala temperatura serapijs, aut decoctis, alteretur, do-  
 nec ad temperiem redierit. & quia in carnis regeneratione, & cauari vlcis repletionem duplex excre-  
 mentum producit, alterum humidius, alterum crassius; in eorum cura, non quatenus vlcera sunt,  
 sed quatenus his duabus humiditatibus replentur, due necessariò requiruntur indicationes, nempe ab-  
 stergeri, & exsiccatio: cumque igitur nec dolor, nec inflammatio, nec aliud symptoma, præter causam  
 rem, causa vlcera occupauerit, cuius hoc pacto molienda est, inueniunt ab ipsa abstergitione sumendo,  
 quæ est separatio sordium adhaerentium ipsi sinui, aut cavitati: quippe ex methodo, & ratione ipsa opor-  
 tet, vt administriur medicina, facientes nasci carnem, cum iam mundificatus fuerit locus: si sordidie-  
 bus, & similibus: nam in vlcere sordidie, aut aliena humiditate existente; caro gigni nequit: attamen,  
 apteque ad has indicationes deuenit medicus, formam, & situm ipsius sinus considerare tenetur:  
 nam si cavitatem altè reconditam vlcus habeat, & in superiore parte sit, ita vt sanies ex ea prona ef-  
 fluat, aut secus sit: eius, cuius cistivus pater, eadem quæ aliorum vlcum, curatio est: cui vero non  
 est, huius ipsi molatur effluxum, opus est. & eius duplex ratio est, aliis rota cavitatis diffecta, aliis in  
 fundo tantum aperta. quomodo vero horum altera sit inueniunda, docebit tum locorum ipsa natura,  
 tum cavitatis magnitudo: si verò loca ipsa dubiam sectionem faciant, & vlcus magnum fuerit, in fundo  
 aperire magis expedit: si contra hæc se habeant, totum pericindere præstat, & idè dicebat Aulic.  
 Oportet, vt sit situs eorum talis, in quo eis retræatur virus, imò currat. & si situm hunc tenuerint  
 inuenit medicus, & fuerit in eo radix, idest inum vlcus ad superiora, & orificium ad inferiora: tunc  
 ille est verus situs. quod si secus se habuerit, & alterati poterit, alteratione naturali, cum membri præ-  
 paratione, aut alteratione, id faciat: si verò hæc impossibilia fuerint, nõ datur exulsio, quin vlcus se-  
 cetur, aut in fundo tantum, aut vsq; ad radicem sectione exquisitissima. vt non relinquatur cauerna, &  
 orificium tale sit, vt medicamenta commodè adhibeantur, & seruetur in hoc membri complexionem, ne  
 superueniant illi accidentia mala. Cum ergo factum fuerit hoc, stringatur vlcus, ab eius fundo initia  
 capiendò, conuenienti ligatura, ad radicem, aut ad locum, qui secus est, perueniendò: ligatura verò  
 tum ad eorum abstergitionem, aut exsiccationem, quicquid volumus, statim applicamus, siue siccum id,  
 siue humidum medicamentum fuerit: licet tamen omni parti vlcis ea tum inspergere, tum illinire, vt  
 etiam ad imum perueniant, & optima hæc abstergio: nam si dimittatur abstergerantur, reciduat, aut li-  
 las facere conuenire: & non adhaeret cutis conglutinatione bonæ: interdum conglutinat conglutina-  
 tionis simili sanæ. Porro in vlcibus, quorum maior est profunditas, aut sinus infusus diversus, & non  
 est possibile, vt sectio aliqua admittatur, tam quippe facere non licet. & si ea medicamenta cineris ri-  
 tu circa vlcus insperges, nihil proficies. neq; ad fundum peruenit medicamentum vis, quod siccum fue-  
 rit, humidiorum igitur desiderat: & quod liquidum, & fluxibile sit, & currens, quod cum mediocri  
 inijs possit. nam aliter nec abluuntur, nec abstergantur sinuosa vlcera abstergitione vltima, & conuenien-  
 ti nec minus carne repleri possunt, præsertim dum nec ratione situs, nec sectione, nec fascijs, continè  
 vt decet, expurgantur. Hac ratione fluens probatur medicamenta, qualia sunt aqua hordei, hydro  
 mel, mullum, lixiuum clarum, aqua calibata, aqua Theriacalis, & aqua maris, quæ abstergit, exsic-  
 cat, & fluxiones prohibet. corroborat mirabiliter, & vlcera ab omni putredine, & corruptione præ-  
 seruat pariter & aqua aluminis, quæ ab omnibus commendatur. harum aquarum vltus commodus est,  
 indicatione sumpta à complexu vlcis. igitur si sinus sordidus abundat, ab Actio oximeli probatur, ab  
 Alibocali ægyptiacum cum vino, aut sapa, à Scribonio aqua cineris cum flore æris, & alumine. In oc-  
 cis sinibus asferit Aulic. pluries expertum fuisse emplastrum apostolicum, quod summe confert in  
 eis. tale medicum cum communi voce emplastrum ex duodecim rebus, aut Veneris, aut Apostolo-  
 rum, nuncupatur. ab eo deforbatur, & dicitur: rectibatur cum facilitate fistulas malas, & scrofulas, & ab-  
 stergit vlcera concaua, & replet ea: est fere eiusdem compositionis cum istide emplastro Heras, quod  
 à Scri-

70

20

30

40

50

60

Gal. 3. ad Glu-  
 uc. de lim. 3. 4.  
 8. 8. Meth. 3.  
 1. 1. 1. 1. 1. 1.  
 1. 1. 1. 1. 1. 1.  
 1. 1. 1. 1. 1. 1.  
 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Gal. 3. ad Glu-  
 uc. 8. 3. Meth.  
 3. 1. 1. 1. 1. 1.

Anic. 4. 1. 1. 1. 1.  
 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Gal. 3. Meth. 3.  
 1. 1. 1. 1. 1. 1.  
 1. 1. 1. 1. 1. 1.  
 1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

- ap à Scribonio describitur, & à Gal. mirum in modum probatur. Valent hæc medicamenta per se, aut ali  
quo tenui, & liquido sub cursibili corpore redacta; veluti est marina aqua, aut vinum nigum clarum.  
aut aqua cineris; oleum namque cauo vlceri infusum aduersissimum omnium medicamentorum est; cum  
li ita moderi velis, vsu ipso intelliges sordidum, ac male olens vlcus fieri. quod si temporis anni quoque  
calidum sit, ac vitio mali succi homo laboret, aut fluxionibus natura obnoxius sit, aut etiam in vlcus  
ratione delinquit, timor est, ne pars corrupta rescat, in qua vlcus est: cumq; ab huiusmodi prædijis  
abstergentibus purum vlcus se obiecterit, vt nulla mala humiditas exinde appareat, ad medicamenta  
sarcotica, idest, carnem producuntia, transire est opus. ea quippe sunt, quorum proprietas est, vt  
permutent sanguinem superuenientem vlceri in carnem; propterea quod equat completionem eius, &  
coagulat ipsum cum exsiccatione. igitur sicca esse debent, non tamen multa siccitatis: sed ea satis est,  
20 quæ modicè excedat naturalem siccitatem partis viceratæ; nam dictum est; Gignunt carnem quæ pri-  
mum ordinem exsiccationis non multum transgrediuntur; & ille quidem non per relationem ad me-  
dium inter fines vniuersalis temperaturæ; sed facta collatione cum naturali temperie partis viceratæ:  
quare non idem modus exsiccationis in omnibus corporibus, & membris vtiliter est aptus ad gignendâ  
carnem; quia quæ sicciora suapte natura sunt membra, siccioribus egent medicamentis: quæ verò mi-  
nus sicca, debiliora: nec minor in hoc ratio habenda est particularum, quam vniuersi corporis: sicuti  
enim humana corpora plurimum natura, & temperatura non parum differunt: ita & eorum particule,  
ex quibus componuntur, inter se natura, & temperatura multum variant, alie namque sicciores, alie  
humidiores sunt. & sicut temperamentum corporis vniuersi, quod natura siccus est; medicamenta  
exigit siccantia magis: & humidius siccantia minus, pro eorum conseruatione; ita partes corporis, quæ  
ad alias relate magis sicca sunt, præ alijs magis exsiccantia requirunt medicamenta: vnde si tem-  
peratura vniuersi corporis cum natura, & temperatura viceratæ partis in siccitate conspirent, magis siccâ  
tia possunt medicamenta: si vero mutuo dissentiant in temperatura; nempe quia alterum à mediocri-  
tate per siccitatem; alterum per humiditatem labatur, & à medio per vitiumque sit recessus, moderatè  
exsiccantis, quia mox requirit corpus temperatum, apta esse creduntur ad carnem generandam:  
sed si impar sit recessus; ita & medicamenti vis à medio citatè ad aliud extremum inclinet, in quod ma-  
gis inclinet recessus. hæc ratione in cauis, & sinuosis vlcibus locorum siccorum, paratur decoctum  
ex aristolochia, minori centauro, simphirio, hypurim, rosis, & similibus cum vino nigro: cui ad-  
dere possumus, mirram, thurem, & aloem. Instrumenta verò ad hoc opportuna ab Auic. iniectione-  
rium, à Celso, Actio, & Paule, Clistere oricularium; ab Albucasi Clapiedra, & à Gal. pialum, co-  
40 tenebras, & carecheras, ex argento, aut auriscalco formatur. si verò tale non aderit, aliud paratur  
ex suilla vesica, & sillula, directum solum habente; cum ea etiam medicamenta liquida injicere pos-  
sumus. Nunquid verò ex istis operationibus pars sinus profunda coalescit, & bene glutinata sit, totū  
cūm est humor emanans; si multus, aut paucus: si crudus, aut concoctus fuerit, adhuc si neque in ipso  
lo sinu dolor sentitur, neq; inflammatio appareat; sed tota regio plana, sicca, atque doloris exper-  
tior: tunc enim de sinu glutinando summo per se sperandum est. cumq; quarta, aut septima pertran-  
sierit dies, & humor crudus ex vlcere ore se ostenderit: tunc scito, sinum glutinatum non esse; ob id li-  
cet adhuc ipsum curare medicamento vehementius exsiccante sine moridicatione; veluti illud est, quod  
cirrum vocant, ex metallicis elixatis, oleo antiquo, aut de citonici, & aceto, absq; cera conficitur: aut il-  
lud, quod sit ex litargio, adipe suillo antiquo, calcitide, & melle: aut illud, quod ex carta combusta,  
50 aut anteo combusto paratur. hæc omnia cerato humido, aut oleo masticino, aut mirrhino colligari  
possunt, præsertim in corporibus siccioribus, ac robustioribus: nam in iunioribus, & mollioribus hæc est  
interdum visus, post absterionem emplastris, siue vnguenti resinatis, siue resini, aut aurei, aut basilico-  
nis. nam medicamenta sunt corporibus non admodum duris accommodata; moderatè enim calefiscit,  
temperatè attrahunt, & quantum quippe sit satis, modicè exsiccant, & aliquam detergendi facultatem  
habent, ac concoquendi, si concoctione vlcis sit opus, faciunt etiam ad sedandum dolorem; quod  
opus nunquam non vtile vlcibus est: si verò agglutinationis difficultas ex humiditatis copia, aut ex  
sarcomatè, & molli carne, ac adhestant medicamenta, quæ barbara, dichroma, aut rubra appellantur, in  
fine à Gal. & Albucasi, diaphanicon emplastrum, siue palmulatum (quod diaphana illi vocant) com-  
mendatur. post agglutinantis medicamenti applicationem, spongiam nouam ex vino aultero infusam  
adhibere non inueniunt: aut in quo decoctæ sint lentæ, malicorium, centasium, gallæ, rubi comæ,  
60 & similia. membrum commodè locare, ut pus sponte perpetuo effluat, modò lectum ipsum, modò  
atque membrum eleuandum, aut deprimendo (prout vlcis orificium consueat) optimum est: aut  
id puluilli faciant, fundo sinus adhiberi: deligatio superne initium capiat, ac interius desinat, vbi absq;  
dolore, & ciuilis prohibitione id admittitur; plastimata, & petizæ, siue lincola, emplastris munita,  
hincinde, & auctore Hippocrate, inciduntur, vt pus effluere possit, habita consideratione, quatenus  
protundiora, ac maiora vlcera valentioribus; minora imbecillioribus, erunt curanda medicamentis.

## De Vlcere calloso. Cap. X.



Gal. 4. Metho.  
cap. 1.  
4. 4. 113. 3. ca. 1.  
Cels. 8. 1. ca. 2.  
de vlc. choro.

**V**lcere inueteratum, & callo obductum, siue callosum, aut quod tumidas oras habet (quod isti ostracinum, aut ostracofum appellant) illud est, quod abiq; vltà profunditate planum, sed in superficie durum apparet, vnde vix cicatricem admittit, à Græcis Disceputolium, ab Auic. corion, & à Latinis chironicum, & telephium nuncupatur. Eius indicia sunt, planities continua, alba, dura, sicca, dolore expers, ac sine ingrato odore: Senum corpora vltimum occupat, præsertim eorum crura, & pedes, eius causæ internæ, sunt, mala patientis viuendi ratio, veluti dicta sicca, & mala totius corporis dispositio, vitiosis humoribus repleti: vel alicuius visceris praua habitudo, quæ tale vlcus aut gignit, aut fouet obstructions, prohibentes naturales humiditates ad affectam sedem defluere. externæ, exercitium laboriosum, longa mora stando, aut deambulando, æstus immo diu, nimia frigora, vlcus nimis constrictum in corpore senili, aut mali habitus; topica frigida admodum & styptica, siccitas propria partitis vlcera, mala indicatio curatiua: interdum vetustas vlcus occupat, inducitque ei callus, & circum oræ crassæ fiunt; postque quicquid medicamentorum ingeritur, parum proficit. Differt vlcus durum, & callosum à fistula, ratione formæ; fistula enim sinus angustus, profundus, & callosum est: tale autem vlcus planum, apertum, & durum est, habens oras tumentes, à quo sanies non multa, sed tenuis, effluit; odor malus, neque in vlcere, neque in eius vicinitate percipitur; nulla inflammatio, nullus dolor ipsi molestat, nihil ferpit: idcirco nullum periculum affert, sed non facili sanescit. fistula vt plurimum successione abscessuum parum dextrè curatorum, originem ducit, vlcus callosum ex se oritur: callus verò, qui in eius summo apparet, caro est superficialis, continua, alba, dura, sicca, sensus expers, in qua nec vena, nec nervi reperiuntur: si cicatricem inducit, illa nemp tenuis est, ac facillime frangitur, & vlcus denovo innouatur, & reuiuiscit. hac ratione dicitur Chironicum vlcus; quia opera magni Chironis centauro eget, qui primum chirurgiam excoluit, aut excellenter eam exercitauit.

## P R A X I S.

Philop. lib. de ho-  
cio in lymano.

**F**ieri solet, vt exulceratæ partis labra tantum callosa & dura: causa sine, quominus vlcus sanescat;quare partes omnes decoloratæ, & duræ ad sanam vsque carnem tollantur. pariter si liuida, aut nigra, aut alio quopiam notabili coloris vitio appareant, ea remouere non inconuenit: siquidem huius morbi ratio non est vna & simplex; constat enim ex complexu duorum affectuum, nemp vlcere, & callo. proinde à calli remotione indicatio curatiua sumenda est, tanquam à causâ, sine qua non. callus enim aut mediocris, aut durus est. mediocris tum mollentia, tum digerentia requirit: durus vero talem eius ablationem desiderat: quo remoto, vlcus inde derergetur, & deficcantia præsidia exposcit: at quia callus semper durus est, igitur sæpè ablatione, & sectione tollitur. est enim, ait Gal. excidere res promptissima. oppugnantur calli primum quidem malacis, idest, mollientibus medicinis, deinde de causticis (Echuloticæ, quæ callum detrahunt; Græcè vocantur) postremo aut igne, aut ferro: molliores verò calli vnguibus interdum eradantur; scalpris lacerantur, cultus ad viuent exciduntur; & si quid remanet, caustico absumatur, aut accenso ferro vitatur. vtrum autem id omne excidendum sit, quod præter naturam apparet, an spatio temporis curandum; proculdubio ægri animus hoc casu consulendus est: nam aliqui longiori tempore curari citra sectionem malunt: aliqui quidvis subire, dummodo citius sanentur, sunt parati. Excisio diuersimodè fit, interdum nouacula, & multis, ac profundis scarificationibus: sæpè ablatione totali partis liuidæ, aut callosæ, ferro ignito, aut frigido secante: interdum etiam medicamento viuenti vrendi habente, quale est cauterium potentiale: nos verò sectionem magis probamus; quoniam dolor & minor, & breuior pereipitur. nec vltieris sedes ipsa affecta excidatur, veluti à valido medicamento potentiali contingit, à quo etiam malignas aliqua imprimunt: attamen huius actionis propriis indicatio ab interna, & remissa ipsa callositate, necnon partis læsæ natura, sumenda est. Solet remissa durities mollientibus suffragiis tolli, donec callus molliatur; & si debilis fuerit, humectantibus. nam dicebat Gal. Carnis quidem intemperiem, si squallens, siccaque, videtur, aqua temperata fouens, humectansque corriges: quotiens verò eo remedio vitatis, esto tibi perfusionis, humectationisque mera, vt cum primum rubescit, attolliturque particula moles, tum desinas. & Auic. iubet, vt membrum sudare facias; & fortasse confert pannos, infusos in aqua tepida, adhibere. si denique fuerit durities, ad mollagines, pinguedines, & mineralia transire oportet, donec callus molliatur: postmodum acuto aliquo medicamento absumatur. inter simplicia mollentia laudatur mucilago althææ, fornugraci, & mali terræ; pinguedo asnerina, æterna, & vrsi; spuma argenti, cerussa, & lapidis piritæ, sturæ, ladanum, & ammoniacum. ex compositis, certum diachylon, de mucilagibus, dialadanum, & diapiercon: vetus autem callus scalpello coniciendus est, excidendoque eius oræ, & quicquid super eam hucet, atque incidendum. ait Gal. cum labra tantum vlcis decolorata, duræque plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam vsque carnem: deinde vbi sanguis emissus, nouatumque

vlcus

4. Meth. cap. 1.  
Ausc. 4. 4. 113. 3.  
cap. 1.

Gal. 9. de compo. m. 1. 1. 1.  
de 9. d. 1. 1. 1.  
fac. ca. 7.



10 vlcus est, eadem curatio adhibenda est, quæ recenti vlceri congrua fuerit; si verò timorem aliquem par-  
ticula ex sua natura, & compositione adduxerit, aut asilictus sectionem non admitteret, scarificandus  
est callus, profundus, aut leuibus, vt decet, vulneribus; inde medicamentis acuto, aut epirotico, vt  
septico tollendus, probatur ægyptiacum: quod si non inuat, & litrum torrefactum cum calce viuæ, &  
vina pueri, aut gruginem rasam cum thure, sale, & melle. aut & calce viuæ, mellis crudi añ. & diu mi-  
sc. in catiola ad lentum ignem, aut & pulueris radicum elleboris 3.ij. calce viuæ 3. ij. tartari vini, zi-  
nklar, añ. 3. j. omnia cum melle conficiantur, denudato vlcere ab omni callo, regatur vnguento de lino,  
descriptione Alexandri: quod à principe, & Melue commendatur. & opopanacis. 3. j. rasuræ panni de  
lino, antiqui, mundi 3. s. litarg. aloes, sarcocollæ, añ. 3. 2. s. vini, mellis, olei mirrhini. añ. 3. v. ceræ  
3. vj. fiat vnguentum sub bona forma. cumq; operationem facere volueris, stude, quòd si non iuues.  
10 saltem non nocces: id tamen scrutare oportet, quòd extremis morbis extrema exquirere remedia sunt  
opportuna. quare extremam, & antiquam callositatem, aut igne, aut ferro absumere debemus.

De Vlceri vermicoso. Cap. XI.

30 **N**EXA accidentia, quæ raro vlcera associare solent, vermes sunt, & ideò de ver-  
minoso vlcere satis parçè antiqui sermonem habuere. solet tamen cucurire, quòd  
ex nimia humiditatum putredinalium copia, valido calore in ea agente, aut ex lon-  
ga medella, aut medicorum ignauia; aut quia in absconso, & cauernoso vlcere diu  
vinctuosa, & pingua medicamenta adhibita fuerit; aut quia corpus totum malis sca-  
tè humiditatibus, vermes quamplurimi in vlceribus procreantur: quæ tunc Gra-  
ecè scolicoles vocantur. sunt vermes huiuscemodi, animalia parua, multa, alba,  
& rotunda: quæ maximam arguunt humorum putredinem. & sicut dulcibus alimentis delectantur, sic  
amaris rebus trucidantur.

P R A X I S.

**V**ERMIVM curatio est, vt primò necentur: secundò, vt omnis putredo ab vlcere abstergatur:  
tertiò, vt omnis putredinis causa tollatur. & quia sæpè aduenit, quòd aliquo instrumeto, si  
ue organo, auferri, aut occidi non possunt; aut quia ita cauernis hærent, vt nisi cum difficultate, &  
40 maximo cruciatu remoueri; aut quia locus incommodus est, ideò expedit primò eos interficere, me-  
dicamentis nempe, quæ simul etiam, & humiditatem, & putredinem omnem auferant. vermes necit,  
ex Archigene, ceruilla, & possum, pari modo cum piecliquida illatum. ex Aet. & Pau. omnia asstringen-  
tia, quæ amara sunt, conueniunt, qualia sunt succi diuersi, nempe cucumeris agrestis, foliorum persici,  
ablunthij, centaureæ, rutæ, & prassij: puluis pariter agarici, reubarbari, gentianæ, carthæ, & zeduarior;  
sic etiam aloes, & larina lupinorum, & orobi: sed ante omnia præsidium optimum est, vlcus abluere  
vrina veteri, aut lixiuio, aut hidromelle ex aqua maris, aut muria, aut oxalme, quòd ex aceto, & sale  
paratur: aut decocto lupinorum, & maioris centaureæ, addito oximelite: aut decoquatur absinthium,  
marubium, calamentum, & agaricum in aqua maris, donec medietas absumatur: formetur postea me-  
dicamentum tale. & agarici albi, tartari vini, añ. 3. ij. pulueris centaureæ, dictami, aloes. añ. 3. j. scor-  
30 aris 3. s. theriacis claræ 3. vj. ceræ q. s. pro vnguento. aut & succi foliorum persici: cucumeris  
agrestis, gramineæ, gentianæ añ. 3. j. olei absinthij, amigd. amararum, añ. 3. 1. s. bulliant in mol, donec suc-  
ci consumpti fuerint, & adde pulueris aloes, elleboris albi, agarici, aristolochiæ añ. 3. ij. & cum cera  
fiat vnguentum. Nos verò decocto lupinorum cum ægyptiaco, vi soliti sumus, felicitè quippe succibus: si  
verò corpus malis repletum fuerit humoribus, euacuetur, minuendus est sanguis, & diæta tenui, ac op-  
portuna vincta est.

Gal. 4. de com-  
po. m. in gene.  
Aet. lib. 14. cap.  
48. Pau. lib. 4. c.  
41. Aulic. 4. 4. 2.  
3. cap. 4.

De Vlceri varicoso. Cap. XII.

60 **V**ARICES, quos Arabes yites appellant, & Græci cirros, venæ sunt, plus equo intume-  
scentes, dilatæ, sanguine crasso, & melancholico replete, varia loca, coxas, & cru-  
ra præsertim, occupantes: ac interdum sedem vlceris affectam sic insistentes, quòd  
sanari nequit, nisi remoto varice, tamquam huius difficultatis potissima causa; liqui-  
dem tam magna humiditas cum copla estuere solet, quòd in causa sunt, quominus ta-  
le vlcus sanitari exponatur, oriuntur in temporibus, aliquando in ima venteris parte  
sub umbilico: nonnunquam etiam circa testiculos, sed maxime in cruribus, eorum præsertim, qui lon-  
go itinere defatigantur, aut graui opere premuntur, aut diu stant cum labore: vnde potissimum viris,  
raro verò mulieribus, nisi post difficilium partum, suboriuntur, & interdum etiam post crissim in affectu  
bus melancholicis: eorum indicia manifesta sunt, quippe venæ extrinsecò sunt dilatæ, crassæ, per li-  
neam extensæ, aut pampati ritu volutæ, obæurgæ, & diuersæ. causæ sunt eorum imbecillitas, ac crassi  
sanguinis

Hipp. lib. de vl-  
ceribus.  
Gal. lib. de mi-  
moribus. ca. 19.  
Lib. de varicis.  
cap. 4. 17. Meth.  
in fine, & 4. A-  
phor. com. 1.  
Aet. lib. 14. c.  
48. Pau. lib. 4. c.  
41. Aulic. 4. 4. 2.  
3. cap. 4.

Hipp. lib. 1. de morbis. & d. Aphor. 31.

sanguinis multitudo, qui naturali ordine ad inferiora descendit, & venas dilatat, adeo quòd pellente natura talem ad partes ignobiliores, nobiliores ab affectibus melancholicis liberantur.

## P R A X I S.

Hipp. lib. de vlcibus Cui. lib. 5. cap. de cura vlcium. Gal. 4. Meth. cap. 2. & 4. Pass. lib. 4. cap. 6. 1. Anst. 4. 1. tra. 3. cap. 2. Gal. 4. Vnge. for. 2. & lib. de veng. lib. aduer. fra. lib. lib. 4. cap. 4. & lib. de aia. lib. 4. cap. 4.

**R**A à à chirurga manu curantur varices: atamen qui supra exulceratum locum sunt, eò quia vlcisurationem prohibent, prius eos curari iubent Medici: vt deinde mox vlcus sanemus. & hoc fortasse, si à varico & dolore, & inflammatione, & conuulsum timores moueantur: aut, ne vena ipsa frangatur, verendū sit. Interdum enim contingit, vt, vena tali excisa, vlcus statim ad cicatricem veniet, & si iam annum durat: verum ipsius loco iuxta diuisionem, vbi erat excisa, vlcus malignum, ac contumax oriretur, cui cicatrix induci non poterit. Præterea varices humanis corporibus multa commoda præstare solent: siquidem fuorem, pleuritidem, renum dolores, tussim cum sanguine à thorace, fluxum sanguinis ex ano, attonitum morbum, & aquam inter cutem curare solent. non igitur, nisi urgente maxima necessitate, secandi sunt, neque si à malo humore oriuntur. In eorum curatione dū occurrit considerationes, vna circa affectū sedis naturam, & compositionem; altera circa operandi modum. nam si in scroto ramices varicosæ sunt, aut in temporibus angiolgiae, aut in lumbis fundo, vbi sunt bubonocæ, varices nascuntur, periculo non vacant, nec rudè manibus tractantur, igitur his chirurga manus adhibenda non est: qui verò in coxis, aut cruribus sunt, triplici modo tractari solent, nempe, vt adusti tabescant, vt simplici modo perforati inaniantur, vt ex rois separati rotantur. in vnaquaque harum operationum præstat in id genus viri, viribus a gri consulti, à veng. in cisione auspicari: deinde pharmaco melancholicum humorem purgare, & cum hoc etiam piuitolum educere: quoniam is quoque vnà nonnunquam effluit, dum varices generantur. sanguis igitur à vena manū mittatur, & corpus cum hiera picra, & lapide lazuli, aut cum ephirimo, & aqua lactis expurgatur. & opus est, ait Auic. euacuationes assiduare, ac tenuem victum instituire, ac omnem motum prohibere: postremò ipsam venam vlcis suprapositam in longum scarificare, commodum est. Vbi abunde vacuatis, ei ipsi venæ secte prius medendum: postquam exactè iam cicatricem ducere videtur, tunc maligni vlcis curationem, vt decet, aggredere. Adurendi ratio ex Celso hæc est. cutis superin cidiatur, tum parafacta vena, si recta est, simplex & parua, tenui & retuso ferramento candente modicè premittitur: vincturque, ne oris ipsius plagæ adurantur, quas reducere hamulis facile est; id interpositis ferè quaternis digitis per totum varicem fit: & tunc superimponitur medicamentum, quo adufla sanantur: nec de aduisione nihil plus videre potuimus, nisi quod Aetius dicit: Aliqui aduisionem approbant. & Auicenna inquit: Cauterium magis vile est, quàm incisio, & hoc fortassis, quia Hippo- 40 crates dicebat: Sunt aliquæ partes, & aliquæ veng. quæ maxime sanguinis fluorem patiuntur, nec facile sili potest, quemadmodum varices sunt. Diuiditur varix more phlebotomiz, ex Albucasi. prius cum aqua repida fomentare oportet, donec sæculentus sanguis, & melancholicus præparetur: deinde conuenienti laqueo sub poplite vena stringatur, & pluribus in locis phlebotomo mirrhino perforetur: aut vno ramum adacto vulnere, diebus diuersis, sanguinis misso reiceretur. sic enim fecit Pergami Gal. in quodam eius amico Doctore, Straconico dicto: nam quater sanguinem misit, postea corpus à crasso humore expurgauit, & victum euechimum instituit, & ab vlcere varicoso sanatus est. Extrahitur varix curruis, aut tortuosus, aut duplicatus hoc modo. cute eadem ratione super venam incisa, hamulo oræ excipiuntur, scalpelloque vndique à corpore vena diducitur, cauterique, ne inter hæc ipsa lædatur, ei: retusus hamulus subijcitur: interpositoque eodem ferè spatio quatuor digitorum, eadem vena (quæ quò tendat, faciliè dignoscitur) lineo funiculo per acus utrobique defigetur, ac sub ligaturis candente ferro soletur, & vena extrahatur: prius tamen à sanguine expurganda est, postmodum vulneris labra in vnum redigantur, & medicamenta ad recentia vulnera destinata adhibeantur, ac desuper splenion & oleo, id est, vino, & oleo rosato imbuto, applicetur, ac opportuna fascia auoluto membro quiescat. Porro, vt dictum est, antiquiorum varicum totalis sanatio reprobatur. nam inde id euenire solet, quod ab antiquis hæmorrhoidibus sanatis contingit. dictum est ab Hipp. A diuturnis sanato hæmorrhoidibus. si vna non feruatur, periculum est, a quam inter cutem, vel tabem, aduenire. hæc ratione in senibus, aut veteratis varicibus, & corporibus melancholicis, aut ab affectibus melancholicis affligi paratis, varices curandi non sunt, est multa còmoda præstent, quæ ab Hipp. còceduntur.

Cel. lib. 7. ca. 12. Art. lib. 1. cap. 14. Pass. lib. 6. 4. Anst. 3. 1. tra. 1. cap. vii. & 4. ut. 3. Ch. 2.

Lib. de medicis.

Lib. de colera. 4. cap. 4.

6. Aphor. 13.

lib. 3. de art. 4. Epidemiarum. lib. 1. de morbis. & d. Aphor. 31.

## De Vlcere cum offe corrupto. Cap. XIII.



**N**ON varas causas, quæ malignorum, contumacium, atque ægrè sanabilium vlcum, sanationem impediunt, ac remouent, terebines sumi, id est, ossium corruptiones. Sapè quidem fieri solet, quòd ossa terebina affecta tæxodon, Græci vocant in causa sint, quò minus vlcus sanescat. dictum quippe ab Hipp. est: Vlcera quæcunque immua sunt, aut etiam diuturniora, os abcedere est necessarium, & cicatrices causas fieri. & in huius sententiæ expositione dicebat Gal. Quæcunque vlcera longo tempore manent, vel cicatrice nullo modo adueniente; vel si facta sit, rursus resoluta, nihil videlicet

Lib. de vlcibus. & d. Aphor. 31. 4. 1.



possunt composita parari, vt. *sc. squammæ aris, ætuginis raris, añ. s. s. ræsing caricina. s. i. m. miscæ, vel* 10  
*sc. iridis, oppopanacis, aristolochiæ, ærug. ratoris, gallarij, añ. 3. ij.* har pulvis subtilis, vel *sc. pomice gal-*  
*liarum, aristro. iridis, añ. s. s. squammæ aris, farmæ orobi, corticum oreocorum, añ. 3. ij.* fiat pulvis  
 subtiliss. & adde calicis viuz. *s. j.* & cū aqua ardens, & rætina pituitua formetur troscus. Composita  
 adhuc quamplurima à Gal. comprobantur. Ex Lucio Cathagete hæc tollunt squammas, & edu-  
 cunt ossa corrupta. *sc. iridis Illiricæ, radicum oppopanacis añ. 3. iij. mali terræ: 3. ij. mæne thuris. 3. ij.*  
 contundantur, & vtere. Ex Triphone chirurgi, *sc. pini cortices, squammæ aris, pomice, combulli,*  
*añ. 3. vj. manna thuris, mali terræ, iridis Illiricæ, resing pini. añ. 3. iij. murbæ, aloes. añ. 3. ij. pisten-*  
 tur omnia subtilissimè. Ex Dioscoride, *sc. radicum plantæ oppopanacis. 3. vj. pini cortices, pomice*  
*adultæ, corticum oreocorum adulstorum, cornu cerui viti, squammæ aris, añ. 3. ij. mali terræ, alumi-*  
*nis rochè. añ. s. s. miscæ, & fiat pulvis subtilissimus.* Dicunt antiqui, quod fusa papaueris, ac fici silue, 20  
 stris cum polenta, idest. farina bordi leuigata, atque ex vino illita, vel aliteri semencum atramento,  
 furorio, idest, calcanto, pari pondere contrita; peucedani etiam radix cum melle citò squammas of-  
 fsum separat. Nos vero longo nouimus experimento, quod desquamatas ossa leuiter affecta nitrum  
 cum euphorbio, & aris squamma; pariter oleum de vitulphure, aut de vitriolo. Porro his non conse-  
 rentibus, scalpello radendum est os, donec sanum id sit, quod relinquitur. qui radit, addaceret imprimere  
 fermentum debet, vt & agat aliquid, & maturius descendat, finis est, vel cum ad album os, vel  
 ad solidum deuenierit. albo finiri ex nigritie vitium, soliditate ex carie, manifestum est. accedere etiã  
 aliquid cruoris integro osse clarum est. In carie quidem expedita cognitio est, quæ si alius descendit  
 ræ, specillum tenue in foraminibus demittitur, quod magis, minusve intrando, vel in summo cariem  
 esse, vel altius descendisse, testatur. igitur si caries alitè descendit, terebris tolli debet, quæ altitudine 30  
 vitium æquent: aut scalpulo recto, aut curuo, adacto maleolo, caries abscondenda venit, donec os al-  
 bum, & humidum se ostendat, quod manifestius adacto modiolò fit. In his operationibus caries  
 tota euascent, sat erit: sin minus, ad candentia fermenta deuenire oportet, donec siccum os ex toto  
 fiat: finis vero vitij est, vbi icobis nigra esse desit. simul enim post hæc, resoluitur aut inferiore ossis  
 quodcunq; vitiatum est, carne subnascente, & statim sinus carne replebitur; & humor postea aut nullus  
 aut mediocris feretur. Si autem nigrities, aut caries ad alteram quoque partem ossis transierit,  
 quod totum vitiatum est, totum eximere oportet; sic enim Celsi, & Auicennæ verba sonant: at si cor-  
 ruptio iam perfecta est medullam, non est excusatio, quin assumatur illud os cum medulla sua: ve-  
 rumtamen, antequam ad hoc opus accedat chirurgus, alij secunda obijciunt consideratio, nimirum quid ma-  
 ius incommodum, quàm vtile, consequi possit, vt sæpè in affectibus caluarie, aut stemonis, aut articu-  
 lorum euenire contingit, quibus in locis cauea reprobantur: artem si caries in his sedibus inutile  
 vitium est, tolli debet, primò quidem ratorijs, scalprij, aut cyclischis, aut phacotis, aut altero simili  
 instrumento, & os vsque ad os radere: inde, vagente ratione, ac morbi magnitudine, si ex-  
 ceperit, ignito cauterio, tunc, ac quàm minimo cum periculo, ceteredem totam adurere, nullū quidem  
 præstantius, aut tutius remedium excogitari potest ipsa vitione dependente tædaliuam quod nunc adhi-  
 beat cum qui iureo, saltem per tres dies, & per alios tres rherebentina cum, oleo, hypericonis, ac  
 oui iureo, aut assungia cum butiro, donec cadat escara, Ex caue, ait, Auic. ne os adustum moueatur,  
 aut medicinis, aut manu operatione violenter; periculum enim immoiet, quin faciat accidere spul-  
 mum, & febrem, aut saltem vlcera fistulosa; ergo non est festinanda curesu actio, & si aliqua datur  
 difficultas, totum dimittatur natura: aut fiat illud attractione longa, interdum quadragesima dierum, &  
 vltæ: quod facit mirabiliter serapinum, lac titimale, cum terra partæ euphorbij, & pauca cera; aut pul-  
 vis radicum peucedani, iridis, aristro. añ. s. s. euphorbij. 3. ij. misc. postquam pariter est vlcus  
 rine muniat, & stipaz, ne à medicamento ledantur, nam causticum est, & proticum, igitur hæc soli  
 parti affectæ iniicies, vt os tantum comprehendant. Cumque ignito cauterio, vi volueris, presertim  
 vbi ossis corruptio ex humiditate excrementosa, & superuacua, ipsius ossis substantiam labefactan-  
 te, ortum habeat: ne labra vlcera adurantur, fistulam, siue cānulam ferream vsque ad os inuicere  
 oportet, fistulam sine diuersæ, vt vna supercaliecta, altera frigida imponatur: aut stupis, vel perij, fi-  
 gidiorebus medicamentis imbutis, labra muniantur; & circumdantes particulas medicamentis, quod phleg-  
 monem propellat, circumdare oportet; & tertio curationis dies vlcus solucere, ac ipsum ablergere, &  
 rursus medicamentum imponere. Humiditas vero, quæ adusto ossis perpetuò emanat, spongia, aut  
 xilo excisecetur, ne partes vlcera exuratur: ac statim post cautrium vlcus, & paries, quæ in consorcio  
 situatæ sunt, coarpiantur, aut stupi, aut pannis, in oui albore, aqua rosarum, & aceto rosato insu-  
 sis, vt dolor tollatur, & affecta sedet ab inflammatione vindicetur. Remoto ossis, et curatione adhiben-  
 da est, quam vlcus erisientia requirit: at si adeo magna, & vehemens fuerit corruptio, & de illis, quas  
 non sanat nisi totius ossis, ac membri abscissio, & serratura: tunc determinet Medicus locum, vbi se-  
 ctio fienda est, interposito prius specillo, vsque quo consequatur locus, vbi inueniet adherentia  
 vitiatam ossis cum carne; quoniam illic est terminus corruptionis eius, & quia infra de cauterijs, eorū  
 formas, ac de cauterizandi ratione, necnon de mēbrī corrupti serratura, & amputatione ad plenum ser-  
 monem habebimus, hæc pro nunc in hac materia sufficere videntur.



cantur: quorum aliqua non tantum superfluum carnem minuunt, sed & vlcus ad cicatricem perducunt, sumpta indicatione à corporum diuersitate, in ætate, habitudine, viribus, sexu, & patientis timore, ait Hipp. Vlcera quæcunque probè, & prout oportet, purgata sunt, semper ad ficiorem modo dum germinationem faciunt; hæc autem plerumque carne non supercrefcunt: non purgata verò, nec committi solent, nec sua sponte coeunt. caussa ergo, à qua fit hyparsarcosis, in diminuta vlcærum ablatione, & exsiccatione consistit: aut in excrementosum, & superuacuum humorum dirigitur; & proinde caro, quæ hoc modo augetur, inutilis & vitiosa est; altera quidem mollis, madens, & flaccida; altera verò densa, aut dura, & quasi callo obducta superficiei verò harum diuersitatum à diuersitate naturæ excrementosum humoris, qui ad vlcus defluit, oriri solet; nam si tenuis, aqueus, & copiosus fuerit, caro mollis, à more Hippocratis, mucosa generatur: ex fluxu verò crassorum humorum, aut viscidæ pituitæ, præsertim in sordidis vlcæribus, caro densa, & callosa augetur, & supercrefcit: nec dicamenta verò, quæ excrefcences carnes tollunt, calida, sicca, astringentia, & crassæ substantiæ esse debent, ne sui tenuitate vlcærius, quàm in superficie carnis absumenda, procedat. & multa à medicis commendantur, sed quæ magis viua seruantur, sunt alumen liquidum adustum, alumen rotundum, puluis hermodactylorum, radicum asphodillorum, calcantum vitum, squama, & erugo aris, & quod cerelebre est, hydrargitum præparatum, quod præcipitatum isti vocant, trochisci calidicon, faustini, à asphodello, & illi mirabiles de manio: at his suffragiis non contentibus, sæpè nouacula vitum, vbi intensa durities se ostenderit: interdum etiam, nisi aliquid obstat, nempe partis affectus natura, patientis timor, & imperitia Medici, ignitis ferramentis vti expedit: aut saltem medicamentis, quæ veluti ignis adurunt, & sarcinata, id est excedentes carnes, absumunt, vt in carnis nimia molliæ (quæ præter diminutionem, ficiatorem etiam magnam requirit) multoties vitum, veluti est oleum ex atramento luxorio, quod isti viriolum vocant, aut oleum, siue aqua sulphuris, aut aliquod debile cauterium: sed aduertendum est, ne calefacta pars affecta, ac phlegmone occupetur, quare prudens medicus huius symptomati primò se opponat, nempe visu eorum medicamentorum, quæ refrigerent, & imminentes fluxiones repellant.

## De Vlcere difficilis consolidationis.

## Cap. XVI.

**A**LIA reperitur vlcera, quæ maximam eorum salutem promittunt, cum benigna, ac ab omni malo symptomare denudata esse videantur, nihilominus nunquam sanitati perfecte restituntur, à Græcis cacoethe, & discipeluta, à Latinis mali modii, malefica, dolosa, contumacia; male morigerata, desperata, & difficilis consolidationis vocantur: verumtamen propriè vlcus discipulorum illud est, quod tantum difficilis consolidationis est, & propriam, ac manifestam habet causam: cacoethes verò, secus quod ad causam, se habet, ait Gal. Vlcera, quæ omnibus ritè, decenterque factis, tamen non sanantur, ea Medici Græci cacoethe, nos maligna, contumacia, rebella ve dicimus, inueterata etiam, ac diuturna sic vocant; pariter & quæ articulos occupant, Chronica etiam, aut Telephia nuncupantur, seu Chirone chirurgiæ peritissimo indigentia, aut quòd in tali vlcere Telephus Imperator consenserit, nec vnquam sanatus est: Quamuis, ait Gal. superfluum sit ea his nominibus appellare: sed sat est dicere ea esse malè morigerata, cacoethe, desperata vlcera ea sunt, quorum curationem plerique aggressi non absoluerunt, sed tanquam ab insanabilibus destitit. Indicia vlcæris cacoethe sunt, eius magnitudo, quæ duas habet oras callosas, tumentes: ab eo exiit sanies non multa, sed renuis; odor malus neq; in vlcere, neque in eius tumore est: nulla insensatio, dolor modicus est, nihil serpsit, ideoq; nullum periculum affert, sed non facillè sanescit: interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, vlcusque renouatur, sit maxime in senum cruribus, & pedibus: occurrit frequenter in sede malè affecta, aut in corpore, vitioso succo scatente, quod ex vlcæris diuturnitate dignoscitur. pessima huius diuturnitatis causa est, quòd huiusmodi vlcera, cum quibus ipsa affecta pars in tam vitioso habitu consistit, vt sanguinem, qui eam partem nutriendi ratione terminatam, non concoquat, sed mutet, corrumpatq; aut id, quod insuit, adeo existit cacochimum, & malè naturæ, quòd & si pars nihil passa fuerit, quàm vlcus, procius ab ipso solo erodatur, & corrumpatur. multæ aliæ causæ vlcærum esse sanabilium à Medicis connumerantur, & manifestæ, & occultæ, veluti subiectæ carnis malitia, callositas, ossiteredo, forma circularis, antiquitas, consuetudo sanguinis vitium: aut eius mensura, totius corporis cacochimia, aut plethora, mala corporis habitus, varix superiacens, & lienis, vel icterici aliquid vitium. Harum verò omnium interdum duo, aut duæ, sæpè quamplurimæ, simul apparent: multoties verò nec vnatumque dignoscitur ratione cuius vlcus sanari nequeat, & vlcus cacoethe appeletur, id est, difficilis curationis. Inquit Auic. Scias, quòd vlcera difficilis curationis absolute sunt, præter corrosiua, purrida, ambulatiua, fistulosa, & similia: sicut commune, præter proprium. ista enim omnia sunt de summa vlcærum difficilis consolidationis absc; conuersione. id est omne vlcus sub aliqua causa specifica, aut symptoma te proprio declaratum (veluti corrosiuum, aut purridum, aut fistulæ) est difficilis consolidationis: sed



10 fed non omne vlcus difficilis confolidationis, eft à fua cauffa fpecifica, aut proprio fymptomate declaratum . ac fi diceret Auicenna; dantur aliqua vlcera maligna difficilis confolidationis, quæ alicuius fui mali accidentis naturam non oftendunt, fed longo permanent tempore, cum quadam eorum mala difpofitione occulta, quæ nullo modo fenfibus deprehendi poteft: quemadmodum in corrofiuis, putridis, & filulofis fieri folet, quæ ab eorum effectibus fingulariter dignofcuntur; idcò funt ficur commune præter proprium, idcò, communiter in fe omnes malas conditiones continet, quæ eorum cum confolidationem prohibere folent, abque particulari, & proprio aliquo accidente, quod faciat id vlcus effe tale, & propriè tale, ea quippe præcipite, quæ vni & foli, & non omni, conuenit, nec femper; & ea ratione, quia in cacoethis nec cauffe, nec indicia manifèftè percipiuntur, vocari folent Chirones, Thelephæia, & difceputola . ferè omnes male conditiones, à quibus deſperata vlcera, & cacoethis produciuntur, à Medicis connumerantur, & nullum proſus proprium fymptoma, quo ab alijs differant vlcibus, præter ficcatem quandam, & occultas difpofitiones aſſignant . Differere vlcus cacoethis ait Celfus, quod curationem recipit à carcinomate: quod curationem non recipit ( nemo eſt qui ne ſciat ) niſi tempore, & experimento; tempus ſiquidem eius arguit antiquitatem, experimentum propriæ cauffe ignorantiam . cum igitur medicus pro cura alicuius vlcis omni officio functus fuerit, neſ que vllum videret nouerit auxilium, ſciat eerrè morbum illum de genere cacoethis eſſe . talia enim ſæpe videtur ſoliti ſumus in his, qui morbo Indiano, ſue Gallico affliguntur .

Lib. r. cap. d.:  
CARCINOIDE.

# PRAXIS

**Q**UOD VICE QUAE ratione, ac methodo, de viccerum curatione scribere, causas, quae illa gignunt, aut fouent (ut ceterorum omnium morborum) primo abscindendas, & tollendas esse, institueret; postmodum morbum ipsum curandum fore iussit. Hac ratione in desperatorum viccerum curatione primo inspicere oportet, nunquid corpus totum aliquo visioso luco rederundet, & eius flexione vicceri transmittat. Secundo, an sedes affeeta mala temperie affligatur: aut os corruptum, vel varix, vel quid simile tam occupet, quod vlcis consolidationem impedire possit: & qualicumque fuerit causa, quamprimum notescit, omni meliori modo tollatur, quemadmodum superius, vbi de cura vlcis, in genere, & singulariter explicauimus. & quia, cum nulla particularis causa vlcis caecothae assignetur; ideo nulla particularis curatio describi potest, prout ea si vlcis tale sit tunc commune, praeter proprium: verumtamen, praemissa vniuersali indicatione, sumpta à morbi natura, & accidentum malignitate, ac, vt decet, instituto vitae regimine ad callosa & desperata, vlcis curari tentare oportet. Hae igitur est malignorum vlcis, ac difficulter curationem admettendum, fumus, ac vniuersalis scopus: particularis vero est, vt si subiecta caro squallens, ac sicca videatur, eam aqua temperate calida fouens, humectantius corriges: quandoque necesse est vlcus, & membrum fricare, & medicamina pitae attrituua supraddere. & si intensa adest durities, scarificatio, tunc adhibenda est: hoc quippe symptomata vlcera caecothae associare solet. post haec loco auxilia inducimus, quae sine morbo vlcis restituta valeant; nempe si egerat praeparatione, praeparetur; si absterfione, abstergetur; si excitatione, excutietur. praeparat tale vlcus triapharmacu Gal. ex pice colophonia ad duplum adipis tursae, & cerae. nec obstat, si medicamentum calidum, & sicce potius situm optimè posuius mouere solet. medicamentum vero his vlcibus, de quibus nunc agimus, in iutura sunt, quae calida, & sicca facilius

50 te constare videntur: calore enim temperato coctio auxiliatur, & siccitas vlcis medetur, calor quippe moderatus esse debet, qualis ille est, de quo dicebat Hipp. Cutim induratum mollit, crassam exrenuat, dolores sedat, & conuulsiones tollit. siccitas vero aequalis ab omni putredine vlcis vindicatur. & est eius propria indicatio. Abstergunt postmodum vlcera Chironae medicamenta, nihil, vel parum mordacitatis, indicatione tamen sumpta à natura, & quantitate fordici: quamuis raro fordes in eis reperitur, aut saltem paucae: quae luiti tamen remedio absumunt, nempe iside, damasceno, aut cerastio aut macherionis medicamento. Et quia omnia eiusdem generis non sunt; ideo interdum rubroaurum, interdum mitoria requirunt praesidia, varia medicamenta in genere ab antiquis describuntur, quorum ex Celso hoc vnum est, squamae aris, plumbi loci combusti añ. 3. xliij. cadmie, cerae, añ. 3. xviij. olei rosati, squamae fari est ad ceram, simul cum eis molliendum. Ex Galeno de mente Asclepiadis

60 aris squamae 3. j. cruginis rase 3. s. ceree 3. vj. rase laricis 3. s. quae liquari possunt, liquecant, deinde de arida admisceto. Aliud ex collectaneis Primiotionis ad desperata, sorios, aut calcitis 3. xxiij. aluminis scissi, malcori añ. 3. xvj. calcis vine tantundem, thuris 3. xxxij. gallae tantundem, cerae 3. lxx. f. ut vinulini 3. lxx. olei veteris 3. xvj. Aliud Crutoni attributum. picis aride 3. lxx. cruginis rase 3. xliij. aris combusti 3. xv. squamae rubrae 3. xxxij. laudani 3. viij. spumae argenteae 3. xxxvj. olei sextarium medium, vini optimi sextarium vnum, & medium. Aliud ex Asclepiade, argenti spumae 3. xvj. cerae 3. viij. x. cruginis rase 3. iij. chamaeleonis 3. ij. olei mirthei 3. xvj. oleum, & argenti spumam spatula agitant, donec crassitudinem acquirat, & haec mellinum, deinde xruinem inpergitio, postea ceram diligenter liquefactam adidit, & ab igne sublatam chaemleonem indiro. & cum in vitrum coierint in mortarium fundito, ibique subactum excipito. Ex Rasi, & Aui. liq. argent. oleo rosato, & ac-

Gal. 4. Mark. 2.  
6. Act. 10. 14. 2.  
10. Paul. 10. 4. 7.  
46. Act. 4. 4. 12.  
1. 1. 1. 1.

4. Krag. vbl.  
Gal. 4. Math. 1.  
2. Aut. cap. p.  
pro de vicar  
difficile confo-  
lari.

P. Aphor. 2. 2.

Gal. lib. 3. de fr  
et Hipp. 7. d  
simp. facul. et 4  
de curandi cau

4. de compen...

20 44 023-023

agens quiescat, & tunc Medicus operationem inchoare teneat: sed prius supra locum secundum per  
 10 quatuor digitos, adhibito aliquo apocruftico medicamento, quale hoc est. *℞. mumia. sang. dra. añ. s. s.*  
*bol. ar. terræ sig. añ. 3. ij. accatiz. pul. cor. gra. añ. 3. j. camphuræ 3. s. aceti. olei mirth. añ. q. s. præ-*  
*parata deniq; in parte superiori ligatur, vt fluxionibus inhibeatur, ac etiam præparatis ignitis caute-*  
*ris, ac pulueribus sanguinem silentibus, & plenij ex stupis, vino austero, & aceto imbutis, situm*  
*secundum considerare oportet. si digitus corruptus fuerit, in propinquiore articulo est diuellendus. si*  
*manus iunctura diuidatur. si brachij, cubiti iunctura secanda est. sic & de alijs partibus dicendum*  
*est, & non expectes vteriozem corruptionem, nam si supremæ partes corrumpuntur, moriuntur qui*  
*sic affecti sunt: Paulus siquidem manus, aut pedis tantum, sectionem admittere videtur. porro sic*  
 20 agendum est. *fac. vt duo ministri carnosas partes superius extendant manus suis, & illic cunctello*  
*simplici carnem circumquaq; vsq; ad os seca. sana verò, vt in sphæclis fieri solet, tangenda non est.*  
*qui perpetuò sanas partes aggrediuntur, nec indutias expectent. igitur, ne crudeles interantur dolores,*  
*isla pars putrida resecanda est. si qua postmodum alterata remanserit, grido cauterio tolli debet: vt*  
*verò, auctore Leonida vna vice tantum, absq; maximo sanguinis fluore hoc opus perficiatur, ferro se-*  
*cando igneo vti opus est. aliqui supremas venas, ac arterias laqueo confringebant, quod difficillimum*  
 30 est. inde terra subtili os sanum à teredinoso diuidatur, cautè quidem, ne pars sana ledatur: si sanguis  
 mokus effunditur, aut theribentina, aut oleo feruenti, aut igne locus vratur, multiplici cauterij ad-  
 hibitione, vt tota putredo absumatur, & membrum totum rectificetur. facta amputatione, splenia, ac  
 to, & cui albore imbuta, ac superposito puluere ex aloe, thure, gipso, & calcanto, applicentur. inde  
 fascia duplici modo auoluta, membrum artè auoluitur. & sic per triduum patiens, & membrum  
 40 quiescat in lecto molli, & acce temperato. at si aliqua virium indigentia appareat, vires reficiendæ  
 sunt alimentis, & odoribus: aliter victus tenuis sit, & frigidus, absq; vino, & carnibus, ne dolores,  
 aut inflammationes irriterentur. porro, vt escara cadat, & locus viceratus corroboretur, & vt dicit Pau-  
 digeratur, *℞. theribentina claræ s. ij. resina pini s. j. vitelli ouorum nu. j. boli armeni, malt. thuris*  
*añ. 3. ij. læpi taurini. s. j. s. olei rosati mirthin. añ. s. j. misc. regio superior oleo rosato, masticino, &*  
*chamomello unguatur. subula escara, si maiori absterfione opus fuerit, prædicto medicamento ad-*  
*de succum apij, & rodomelem, aut quid emplastri isidis, aut æspiriaci: vt noua regeneretur caro, & si*  
*strobiluz, iris, centaurez, litargij, spodijs añ. s. s. masticis, mirrhæ, aloes, sarcocollæ. añ. 3. ij. the*  
*rebinthæ claræ, mellis optimi añ. s. ij. ceræ q. s. quæ puluerizanda sunt, puluerizentur, & secundum ar-*  
 tem fiat vnguentum cum oleo mirthino, & cerâ in bona forma: demum cicatricem inducit ceratum  
 40 ex cadmia, aut ex minio, aut Grcum, triapharmacum vocant. postmodò, ne febris, aut dolor, aut  
 inflammatio, aut consensio, aut casus virtutis superueniat, curare oportet: aut si qua mala apparue-  
 runt symptomata, ea corrigere, aut prolongare opus est proprijs indicationibus, vt supra locis suis  
 explicauimus.

De reparandis. ac dealbandis cicatricibus. Cap. XVIII.



N extimis corporis humani partibus multis modis cicatrices occurrunt, nempe  
 post continui recentes solutiones, & hæ vulnerum vestigia vocantur. hac quippe  
 10 ratione in hoc Medicus diligens sit: ne, postquam vulneris labra coierint, turpis  
 refideat cicatrix, aut concaua, aut emimens, aut mali coloris. partes igitur vulne-  
 ris perpetuò æquè vnitas conseruet: quæ in secto magis, quàm in contuso, aut la-  
 cerato vulnere desideratum finem admiunt. multoties enim in vetusta vlcera, aut  
 plana, aut excavata, post eorum consolidationem cicatrices relinquunt, quæ na-  
 turalem coloris alterationem exoptant; cutis siquidem naturalis, quam dermæ Græci vocant,  
 naturaliter sicca est, & alba, & à patris genitura producta, quæ pariter alba erat. ob id, cum inciditur,  
 aduritur, laceratur, aut alia quapiam causa soluitur, & perit, amplius nec regignitur, nec augetur.  
 Causa verò, cur sicut caro, & adeps regignatur; in a cuius, quæ prorsus perierit, regi nequeat, est;  
 quia amplius patris genitura non reperitur. cuti ergo deficiente eo in loco, carnem naturali aliquo te-  
 20 gumento regere necesse est: quod nil aliud est, nisi vlcus ad cicatricem ducere. ergo aut cutis generan-  
 30 da est, aut summa caro cui similis efficiatur: verum, vt cutis regeneretur, fieri omnino nequit. restat,  
 vt quapiam carnis pars, nempe superficialis, ita alteretur, & dura fiat, vt carnis cooperimentum, &  
 cortex euadat, & cutis officium per accidens suppleat, non tamen plane cutis erit. & quia caro ex fan-  
 guine ortum habet, qui rubescit; ideo cicatrices, aut rubesc, aut subrubesc pro maiori parte produ-  
 cuntur. Porro summa vlcusum caro cui similis efficitur, induciturque ei cicatrix, si illam deficiemus,  
 astringamusq; adeò, vt non solum id, quod præter naturam redundat, discutiat: verum etiam quod  
 secundum naturam est, excutietur. vt autem quam pulchra, & concolor inducatur cicatrix, vltus medi-  
 camentorum calidiorum, aut mollientium, aut attrahentium reprobat: sed ille magis conuenit, qui  
 frigida, ac sicca habitudinis est, veluti emplastrum ex cadmia, ex pompholyge, ex ouo, cerussatum,  
 & simile. cicatrice induta, aliquo linimento liniatur, quos uis aliqui simplices sunt, vt oleum de  
 40

Cap. 3. Methus.  
 5. Antic. 4. 6. 3

Medus.

Gulielmus de tra  
rigora.  
Dietrichides lib.  
3. ca. 56. Act. li.  
31. ca. 131. P.  
lib. 4. c. 47. A. uic.  
4. 4. 78. 3. ca. vlc.  
de 7. 4. 174. 3. ca. 4  
Cel. Mafius Flo-  
rent.  
Guido de Cam-  
ghano.  
Nicolus Ale-  
xandrinus.  
Bernardus.  
Orbanus. A.  
nou lib. 13. cap.  
113. 114.

4. 4. 78. 3. cap.  
vlc. 7. 4. 78. 3. ca.  
1. 6.

vitellus oöorum, aut de tritico, aut de cera, aut silaminum, aut metopion, idest, amigdalorum amara-  
rum, balsaminum, aut balsamum, sudor oui recentis, aqua frañini, dum aduritur, lperma hominis,  
adeps asinina, quæ principatum tenet, fel caprinum, & semen cruce. inter composita, oleum, in quo  
bryoniae radix candida, & nigra incocta sit, radix cucumeris agresti cum melle, calamintha, vino de-  
cocta, argenti spuma, rosaceo albo lota, aqua Gallica, quæ sic paratur. R. tartari calcinati 3. xij. ma-  
sticis 3. j. albuminis ouorum, quod sufficit pro mixtura, & per vitreum lambicum extrahatur aqua. fa-  
cia ad hoc muliebres lac cum cerussa lota, & oleo de vitellis ouorum. in mortario marmoreo diu deduc-  
cantur, facit emplastrum alabastrinum, aut de pomo citri, aut de vitro, cuius hæc est compositio. R.  
collum fiale vitri albißimi, accendatur sepius, & extinguatur in succo bryoniae, aut limonum, inde sub-  
tilissimè trituretur super porfidum. R. huius pulueris 3. j. camphure, boracis, salis gemmae añ. 3. s. mel-  
lis albi 3. ij. misc. diu in mortario marmoreo, & fiat linimentum. Aut R. saponis, stercoreis albi cani-  
ni, oleo loci añ. misc. aut R. chimoleæ, stercoreis columbini, saponis, olivani, & cum albo aceto fiat li-  
nimentum. aut R. spumæ argenti, cerussæ lotæ añ. & cum oui albumine fiat linimentum. valet farina  
lupinorum cum melle, fel tauri cum aceto, & tartarum cum vrina pueri. mukocies, inquit Actius, in  
cauis vlceribus nigricantes cicatrices, & fœdi aspectus, remanent: quæ à vitiligine, & alphi differre  
videntur. nam hæ cicatrices leues, superficiales, & sine asperidine sunt: alphi verò, aspectu turpe, &  
tactui asperum est. Ait Auic. Eradicationes vestigiorum vlcerum egene medicinis fortiter abstergen-  
tibus. & quanto magis cicatrices fortiores sunt, fortioribus agent absterfionibus, & multa describit  
medicamenta optimæ operationis in dealbandis cicatricibus. Porrò interdum, aut ex mola medela,  
cum ante tempus cicatrizantibus medicinis (Epulotica Græci vocant) medicus vltus fuerit aut quia of-  
fusa excuata sunt, cicatrices caue remanent: quod symptoma tollitur, cicatricem renouando, & denuo  
vulnus planum reddendo. quod facit assidua fricatio cum nitro puro, aut geranii folijs, aut cantaridibus,  
donec vesicula eleuetur: quæ amota, vulnus repleatur, adhibito emplastro aureo, aut vasilicone; post-  
modum noua inducatur cicatrix: at si ea eleuata. & eminens plus iusto apparebit, aut inæqualis, & cri-  
spa fuerit; si adhuc recens & tenella extiterit, malacticis, idest molliuentibus, remedijs regatur, & su-  
peraddita lamina plumbea, arctò alligetur: si dura, inuererata, & callosa fuerit, scalpello exulcerari de-  
bet: aut medicamento, quod duram substantiam exeat, absumatur: aut saltem cute exulcerata, su-  
pereminente in carnem, aut alumine adusto, aut hydrargiro preparato, aut squama tris combusta,  
aut simili epirotoico destruat, donec sanæ cuti equetur, & tunc denbo cicatrix renouetur. si medio-  
cris fuerit eius siccitas, admoto diachilone, aut litargirio, acri aceto nutrito, molliatur. idem faciunt  
radices cucumeris agresti tritæ, admixta asnerina assungia, aut ciclaminum radices cum melle.  
nigricantes cicatrices, aut malo colore affectas, remouet oleum, in quo bryoniae radix in-  
cocta fuerit, aut calamintha in vino bullita. aut R. argenti sublimati 3. s. succi limo-  
num 3. ij. ducantur omnia in mortario lapideo cum pistillo ligneo sub sole, do-  
nec siccitentur: ponantur posica in linteo, & fiat fasciculus, quod leuiter  
immergi debet in duabus partibus succi limonum, & vna aqz ro-  
sarum, sic dimittendo, donec succus totus absumatur: & fa-  
cta leui expressione, ex eo, quod egredietur, cicatrix  
liniatur, hæc pro cicatricibus reparandis agen-  
da sunt: attamen, vt Celsus ait, stul-  
tum est, si vel excreuerit ci-  
catrix, vel concaua  
fuerit,  
decoris causa, rursus & dolores,  
& acrem medicinam  
sustinere.

L. h. 7. sup. 16. h.  
3. 4.



# LIBRI TERTII. TRACTATUS TERTIVS.

In quo de Vlceribus membrorum particula-  
rium, copiosè tractatur.



## PROEPIVM.

**I**N hoc huius sectionis tertio Tractatu affectus quosdam particulares describere intendimus, qui singularia aliqua membra à capite vsque ad pedes molestare solent, nulla quippe gallicæ dispositionis, aut cancri habita consideratione; siquidem vna, non nisi particularibus, & proprijs remedijs curari solet: alterâ verò melius est non curare, quàm curare: sed tantùm vlcera aliquorum singularium locorum curationem tractare nostri instituti est, interdum nec causam, nec indicia assignantes, subiectum determinatum non habentes. erit igitur hęc empirica hęc praxis, longo tamen nostro experimento, & Antiquorum auctoritatibus comparata.

### De Vlceribus curis capitis. Cap. I.

**I**N cure capitis, interdum vlcuscula suboriuntur, à minimo quodam tumore exorta, qui Græcè achor dicitur: vnde vlcera hæc achores vocantur, ab Arabibus alschedie, & à Latinijs vlcera curis capitis manicia nuncupantur. à parvis tuberculis originè ducunt, qui à magno pruritu mouentur, deinde tenuibus admodum foraminibus perforantur, quæ subtilem humiditatem, ac madorem continent. causa ex nitrosa salisq; pituita fit, aut ex humiditate mixta, quæ partim saniem tenuem, ac mordacè, partim crassum humorem occupat. itaque tenuis, vt quæ mordax, primò sane pruritu ipsi excitat: temporis autem spatio, ob pruritu, & tubercula oriuntur, & foramina in eis constituuntur. similis huic morbo est & alius affectus curis, qui à faui similitudine, melicera, & cerion, à Græcis dicitur, idque duas species habet, alterum subalbidum furunculo simile, sed maius, & cum dolore maiori: quod vbi maturascit, habet foramina multa, per quæ humor glutinosus & purulentus fertur: nec tamen ad iustam maturitatem petuenit: sed diuissum multò plus intus corrupti, quàm in furunculo, apparet, aliusq; descendit, & raro fit nisi in scapulis: alterum est minus super corpus eminens, durum, latum, subviride, suppalidum, & magis exulceratum; siquidem ad singulorum capillorum radices foramina sunt, per quæ fertur humor glutinosus, suppalidus, crassitudinem mellis, aut visci referens: dolor autem, et inflammatio ingens est, ad eò vt & acutum quoque febrem mouere consueuerit.

## P R A X I S.

**C**UM quæ achores, aut eruptiones, seu pustule quædam vlcerosæ cutem capitis infestant, abstinere sane patientes ab omni cibo, salso, acro, & acido. à vino etiam, & ambiente æstiuo: liquet hoc interim humores, qui affectum generant, euacuare. & si qui fluxerint, eorum defluxum prohibere, aut sanguinis missione, aut pharmaco, ad tale opus destinato, aut caput purgij opportuno, si vero affectus exiguus fuerit, hæc sufficere solent. sin inanis, post hæc, pilis capitis prius edemptis, ad medicamenta (à Græcis topica, & merica dicta) etiam quod corpus euacuatum non sit, deuenire oportet. si vero eū euacuare expediat, primò sanguis mittatur, aut sero lactis cum 3. iij. epichimi euacuetur. serum autem lactis, vt iubet Aet. parare oportet: aut pharmaca ea exhibeantur, quæ caput à pituitosis humoribus exinanire solent, aut per nares, seu per os, apoplegmatiflata Græci vocant. vbi verò

De Vlc. Lib. III. Tract. III.

S 4 potiss.

Col lib. g. ca. de  
mollis. Gal lib.  
de tunc. perur  
na. cap. 16. h. 1.  
de compo. m. li  
candi loc. 4. et.  
lib. 6. ca. 6. 8. Par.  
lib. 3. cap. 3. h. li.  
4 cap. 35.

potissimum obseruantur pillulæ cochiz, de hyera. de agaricò, & aggregatiuz. postmodum pilis, qui in vlceribus furiunt inferi, extrahis, caput ablatur decocto mirthillorum, lentisci, rubi, lentium, & radicum asparagi: ac si virulentia copia aderit, tum ea probantur, quæ cum aliqua incisione exsiccare virili et possunt. hac ratione propter crassitatem, ac lentorem humoris, acutum secundum omnem modum laudatur (extrahit quippe in eo digerendi, ac reprimendi facultas) sit igitur acre admodum, nihil omnino qualitatis vini repressans, in eo scilicet cetera medicamenta immergere oportet, ab imbecillioribus incipiens, præsertim si dolor aliquis ipsis insit, veluti est chimolia, cretica, ac lentinia terra. pompholix etiam, spodium, & argenti spuma, ac tenera cadmia. quod si hæc non prosint, medicamentum ex carta combusta aceto merisum illinjo. si hoc acre videtur, argenti spumam misceto, siquidem abunde morsum eius obtundere solet, si æqualem pondere misceris; si intendere vires cogites, pauciorum: quemadmodum, si plurimum vim eius solvere statueris, copiosiorum: cumq; affecta sedes instaturatione tenatur, corpus denovo decenter à superuacua ieiis humoribus liberetur. indebis, aut ter in die decocto mirthi, plantaginis, & lenticulæ caput ablatur, & medicamento ex crudo litargirio, & elimia terra illinire oportet. si aliqua putredo insita fuerit, eam tollit hydragrium preparatum, aut ʒ. argei spumæ 3. xij. foliorum rutæ 3. viij. herbe pedicularis, staphidem agriam illi vocant, 3. iij. calcanti 3. ij. acci, olei mirthei, añ. q. s. milc. donec in sordium spissitudinem redigantur. aut ʒ. cerasi combustæ, argenti spumæ añ. 3. viij. calcanti vñ 3. iij. thus, sulphuris viui añ. 3. ij. mirrhæ, opij añ. 3. j. hæc omnia in oleo lentisco, & aceto excipio.

## De Vlceribus oculorum.

## Cap. II.

Cel. lib. 4. cap. 6.  
Gal. 4. de comp.  
in lenticulæ loc.  
Pau. lib. 1. ca. 11.

Botryon.  
Botryo.

Epicauma.



**C**VL: post eorum vulnera, aut inflammationes, aut tubercula, aut longum desolatum, interdum vlcere aliquo molestantur: quod ratione sius, aut magnitudinis, aut puri edinis nomina diuersa fortiri solet; siquidem si in membranis, quam Græci ceratoidem, & Latini corneam vocant, vlcus cauum oritur, angustum, & purum, tale Botryon Græcè dicitur: quod verò botryo latius est. Calomai nuncupatur. at si in pupillæ circulo hæc euenierit, & ambientia comprehenderit: vt etiã in exteriore pupillæ parte rubicundum, in interiore candidum appareat, Epicauma vocatur. Tale enim vlcus sordidum est, & crusta obductum. quo repurgato, oculi humores sæpè effluunt.

## P R A X I S.

**C**Vm magnam partem, ad vitæ simul, & vsum, & dulcedinem, oculi conferant, summa cura & tuendi, & curandi sunt: igitur in omni eorum curatione primæ omnium indicatio quies est, & abstinentia: ergo primo die loco obscuro cubare patiens debet; sic, vt a sermone quoque abstineat, & paucum cibum assumat: sed generis eiusdem vitæque, vt nihil falsum, nihil acre, nihil ex his, quæ ad ca put vaporant, & nihil potui præter aquam. porro in similibus vlceribus vlcus ratio talis maxime conferre videtur: ceterum propter particulæ naturam medicamenta ab omni rosione, aut morsu aliena adhibeantur, veluti quæ ex pompholige loca conhiuntur. succi etiam, qui illi admiscerunt, non solum rosione carcant, sed qui vehemensissimos dolores lenire possunt, nempe polygonij, aut andacoche, vel oui albumen. Propria verò vlcum oculorum indicatio est, vt vlcus purum conseruetur, & oculus à dolore præseruetur. constat autem his omnibus, vt medicamenta, cum medendi tempus est, formentur: eo quod cito arefunt, probatur collyrium ex thure, mirrhâ, & croco, aut ʒ. thuris 3. vj. cadmiæ, pompholigis añ. 3. ij. cerussæ loræ, gummi amilli añ. 3. j. s. & cum aqua pluuiali paretur collyrium. at si sordidum vlcus apparuerit, aliquod absterseum misceri oportet. quale est rodomes & aloes, si cum dolore, aut inflammatione vlcus obortum fuerit, commodius, est primo, aut secundo die, si ramen res vrget sanguinem mittere, id magis si in fronte venæ tumidæ sunt: alium etiam, sed non nisi secundo aut tertio die, duci oportet: verum modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. satique est vt quiete, & abstinentia, vt verò dolor tollatur, tria cõmuniter probantur auxilia, nempe pulpa pomorum sub cineribus coctorum, cum medulla panis lora, vitello oui, & oleo violato: aut decoctum sguæ græci cum farina hordei, & butiro recenti, aut lac pingue, cum oui albumine, & parum quid croci, aut gummi tragacanti. porro talem curationem ex ijs, quæ inflammationem lenire solent, & concoquere, mollium ijs quippe non neglectis, quæ ad vlcus propriè pertinent, veluti collyrium libanum, cignus, aut asfer. pariter sief de thure, de plubo: aut tale. ʒ. sief de thure. vnc. s. rutæ preparatæ, aloes epatici, zuccari candidi añ. 3. j. aquæ rosarum, andacoche añ. vnc. ij. bulliant omnia parum absq; sief. deinde coletur, & cum sief secundum artem, cum paucò vino nigro odorifero, fiat collyrium.





Cel. lib. 6. cap.  
21. & 15.  
Gal. 6. de com-  
pos. facilius  
loc. de 3. Syde-  
comen 12.  
Aet. lib. 3. ca. 30.  
Pau. lib. 1. ca. 3.  
Aul. 3. cap. 13.



**N** intima, ac superficiali oris parte, vlcera quædam oriri solent, potissimum in pueris, qui prauo, aut corrupto lacte nutritur, aut acceptum nutrimentum concoque re nequeunt, igitur non absq; periculo sunt; pueros enim sæpe consumunt. in viris, & mulieribus idem periculum non est: ac milierius etiam est, si lactans adhuc infans est, quominus imperari remediū aliquod possit: talia vlcera iuxta fucci peccantis naturam nunc subalbida, nunc subrubra, aliis crustæ modo nigrescunt, quod omnium periculosissimum, & lethale est: cōmuniter à Græcis aphthæ, ab Arabibus alcula, aut calaba vocantur. à gingiuis incipiunt, deinde palatum, totumq; os occupant: interdum ad vnam, saepeque descendunt, in adultis etiam aphthæ videri solent. Ex deduxu alicuius acris, aut prauis humoris, ac viciosi ad os, aut ex comestione rei acris & mordacis, in humidis validisque corporis partibus, qualis os est, putredo statim oboritur, & ex quacunque acuta causa exulcerari contingit. confert huc etiam, quod nullum medicamentum possit longo tempore, vt in vlceribus aliarum sedum, adherere, eluuntur quippe facillimè à salua, dilatantur velociter, cum ibi fortis calor, & multa humiditas infit. multiplicantur in tempestate pluuiali, & in febribus malignis, vnde sæpe in gangranas degenerant: dignoscuntur & visu simul, & tactu. vili sane per colores, rubentes siquidem sanguineum præpollere humorem indicant: flauī magis biliosum, quemadmodum rursus quæ albescunt, pituitosiores. quæ luent, nigricantq; melancholicum. aphthæ pueris maximè contingunt, potissimum lactantibus: quæ vero à vicioso humore fiunt (quod sæpius prouectionibus accidit) sæpe in vlcera cacoeihes degenerant, & quæ ab atra bile oriuntur, perniciosè indicantur. quæ verò diuturnæ sunt, & aliquam putredinem acquirunt, malignæ euadunt, ac ægrè sanabiles fiunt.

## P R A X I S.

**S**UPERFICIALIA oris vlcera, quæ caloris igni nihil obtinent, magna ex parte facili curatio nem recipiunt: quæ verò vetustatem incidunt, ægrè soluantur, ac temporis spatio putrida fiunt, & depascendo nome dicuntur. Puerorum aphthæ, nutrimentum regimine potissimum, gubernantur. igitur primò cogenda est exerceri, ambulationibus, ac his operibus, quæ superiores partes mouere possunt, minimaque aqua calida perfundere bonum est, tum alenda cibis bonis, & his, qui facili non corrumpuntur, abstinendo ad acribus, salis, acidisque cibis, & potu; ille quidem, si febricitat puer, sit aqua, si sine febre est, vini diluti. si alius nutriti subsistit, ducenda est. si pituita in os eius coit, vomitu moueri debet: fere enim huius curæ vis est, lactis rectificatio. porro quia infantes ob eorum ætatem fortia medicamenta non ferunt, decet, vt tantum mîna, & lacte vlcera curentur: aut diamoron adhibeatur, cui sæpe adhibemus melleum, mirrhain, & crocum, aut parum quid aluminis: quæ enim temperatè consistunt cum pauca abstersione, initium horum vlcerum sanare solent: cumque nulla, aut debilis, adest inflammatio, & rodemel ab omnibus probatur. si calor quis aderit, mulsum, idest, vinum austerum, & mel. sudatur decoctum gallarum cum melle vsque ad spissitudinem, ac pinna illinitum; est enim præsidium opportunum succus pillosæ cum vino, & melle pro collutione. aqua pariter hordei cum corticibus, & melle rosaceo, mukum vsui seruatur. talis aqua omnem extinguit inflammationem: mel vero secundum omnem modum iuuat vlceribus oris, gutturis, & pulmonis, nulla apparente inflammatio ne: secus, violatum sit. Nos verò in pueris rodemelle cum vino granatorum sæpe vitmur. si dolor alioque patientem infestat. lacte aut vacino, aut caprino tollatur, aut hordeacea aqua, & acresta, aut vinum nigro austero, & rosis: si aliqua malignitas comprehenditur, fames in adultis, & abstinentia, quanta maxime imperari potest, instituatur: sanguis copiosè ex cephalica, aut cōmuni vena mitratur: alius exqui sitè expurgetur, & quies optima est. occurrit interdum, quod ex minima quadam pustula in labris, aut gingiuis, ex mala medela, aut praua victus ratione, sedes affecta sphacelo occupatur: tunc enim ea adhibenda sunt remedia, quæ crustas inducunt, quale est alumen scissile, & calicis: attamen nil præstantius ægipciaco, aut solo, aut alteri medicamento admixto, veluti, R. vini granatorum vnc. iij. succi plan tag. vnc. j. vnguenti ægipciaci vnc. s. misc. aut ægipciaco per se tantum vtaris. si ab his escara non prodigetur, & malignitas adhuc perseuerare videtur, & nihil medicamenta proficiunt, ad attuale cauterium, tanquam ad sacram anchoram, deuenire oportet, & vlcera adurenda, donec escara fiat, ne affectus vicinior, & sanum locum lædat, quod interdum in labris necessarium non est; nam excidere com modius est: quotiens verò aliquid medicamentum in ore iniicitur, & ante, & post, os diluendum est cremore lenicule, aut trui decocto, sic, vt cuilibet eorum paulum mellis misceatur. acetum quoque ex scylla ore retentum, satis aduersus hæc vlcera proficit: quod si puer est, cui id incidit, specillum lana, aut alio inuolutum, in medicamentum demittendum est, & super vlcus tenendum, ne per imprudens adurentia, aut acuta delectet.

De Vlceribus Gingiuarum.

Cap. V.



**S**IMPETIGIA leuiusq; gingiuarum vlcera afinino lacte curantur, rodometelle, & sale in tenuissimum polinem redactis, vel decocto lentium, vel etiam scilicet aceto, afinino lacte commixto. quia autem horum natura cum præcedentibus est si-  
millima, idcirco de his sufficiat. si autem aliqua illis coniuncta fuerit putredo, Aegip-  
giaco vnguento, & sapa sunt abstergenda: si autem os fuerit corruptum, vlcusq; in  
fistulam mutatum, id dilatandum est, ac opportunis scalpbris, terebrificis, os cor-  
ruptum, & alteratum, est amouendum. si autem hæc non sufficiant, actuali cau-  
therio est inurendum, vel sæpius sulphuris aqua madefaciendum, quousq; tota of-  
fis superficies remoueat. Si autem dens in radice corruptus appareat, radicitus est euellendus, alias  
incurabilis affectus resultabit: si autem callosum solummodo fuerit vlcus, remouendus callus est, trochi-  
scis ex minio, vel aphodello, vel hydrargirio præparato. Si autem dolor superuenerit, vel inflama-  
tio, ille superuenit affectus, qui à Græcis parulis nuncupatur: mulcetetur autem lentium decocto, vel  
portulacæ. sanat tandem huiusmodi morbos, gingiuasq; putridas rosarum decoctum, mirtilorum,  
cum mirra, & rodometelle. Idem operatur asinum lac, qui cum folijs oliuæ, & scilicet aceto  
ebullierit. Gingiuarum autem tumor, qui à Græcis epulis dicitur, succo portulacæ curatur, si in ore de-  
tineatur, vel omphacino oleo, vel lentiscino.

De Vlceribus Lingue.

Cap. VI.



**L**INGVA varijs modis affligi solet, varijsq; suis partibus exulceratur aliquo assuen-  
te humore, acri, & adusto, unde fissuræ illæ, vulgo setole dictæ, à Græcis ragadæ,  
exoriuntur: aliquando ex acrimie vis nonnulla in ipsa nascitur pustula, & sæpe  
sphacellæ, sæpe & cancro afficitur, qui affectus proprijs signis distinguitur. So-  
let etiam aliquando à latere vlcera quædam plana, vel saltem parum concaua, pati:  
unde est animaduertendum, an aliquis dens oppositus ita sit acutus, vt talem af-  
fectum inducere possit, vlcusq; cicatricem impediatur, quo ita reperto, lima eius  
acuties est amouenda. In vniuersum vlcera hæc propter membri inquietudinem,  
& excessiuam humiditatem curare sunt difficilia.

P R A X I S.

**P**YSTULAS à latere lingue exorientes, & pura sunt vlcera, ex solo alumine crudo applicito exsiccare  
solent; idem operatur saturcij decoctum cum vino, vel aluminis decoctum in aqua plantaginis. si  
autem aliqua appareat malignitas, vt aluminis crudi 3. ij. floris æris 3. j. sanguinis draconis 3. s. folioru  
saluæ, rosis marini ass. 3. j. bulliant in vino nigro ad tertie partis consumptionem. sæpius autem tali reme-  
dio intingantur vlcera: quæ si maiori indigeat exsiccatione, fac vt bulliat aliqua vnguenti ægyptiaci por-  
tio in sapa, vel rodometelle, & vere. Aduertendum autem est, ne ex nimia abstersione ille accidat mor-  
bus, qui a Græcis Anciloglosson dicitur, ab Arabibus Alchalel, qui nil aliud est, quam nimia lingue bre-  
uitas, ac conuulsio quædam. quando igitur lingue aliqua suboriatur inflammatio, secetur prius vena:  
inde corpus expurgetur, cassia, vel ellec. rosato Mel. vel ex succo rosarum: & in omni oris vlcere te-  
nuissimæ, & parcius commendatur, vt alica, prisanæ exaula, vitæ acris, arida, & difficilia cocta.  
vinum oligophorum sit, & in pauca quantitate. Solet etiã in lingua abscessus quidam exoriri, à Græcis  
Batrachion dictum, est autem tumor inflammationis similis, sub lingua exorienti, qui ranunculæ dicitur.  
Huius cura abunde, quam ex dictis, excipi non debet. si tamen in mole atollatur, tardeq; suppuretur,  
cephalica est incidenda deinde vena, quæ est sub lingua, si fuerit opus, parçè nutriatur, & à vino abstineatur.

De Vlceribus collumellæ, & tonsillarum.

Cap. VII.



**S**I quis os adaperiat quantum plus possit, linguamq; deprimat, in ipsius centro quid  
suspectum apparer, quod à Græcis gargareon, à modernis collumella, collumellæ, & vna  
nuncupatur, licet vna affectum quandam præter naturam huiusce partis, quam pro-  
prium nomen, potius significare videatur. inflammatur facillimè hoc membrum, mul-  
tibus: paritur ex notabili inflammatione. excoxiat namq; varijsq; modis exulceratur,  
vlceraq; mala, & fraudulenta euadunt. huius namq; partis substantia mollis admodum  
est, & omnem fluxionem desillationem ve apta recipere, semper namq; vda est, nec  
medicamenta detinet, unde sæpe gangrena oppressa, & potrefacta ex se ipsa cadit. Eiusdem nature  
sunt tonsillæ, ab istis glandes dictæ, in faucibus, vel à lateribus gula sitæ. Iste vlcera  
hæc partem occupantia, signis non egent, vt cognoscantur.

## P R A X I S.

Si collumella inflammatione tantum tentatur, his medicamentis vtendum est, quæ humorum fluxionem repellere possint, quemadmodum agendum esse docuimus in affectibus illis, qui ab humorum fluxione originem ducunt. Interim verò conueniens seruanda diæta, vnaq; pro opportunitate secunda; quæ si aliqua de causa impediatur, tunc alui solutio erit opportuna, claustrum caput detineatur, osq; gargarismatibus ex decoctione rubi lentum, sæpe sæpius abluatur; huiusmodi namq; remedia adstringendi virtute pollere debent: fluxione autem mediocri existente, sequens medicamentum iuuamento erit, ꝛ. succi granatorum dul. nulliq; añ. liquiritiæ minutissime incisæ .q. sat videbitur, bulliant omnia ad mellis spissitudinem, & addito modico croci vula cataplasmetur: quæ si fuerit exulcerata, siccissima expostulat remedia, prius tamen abstergenda sunt vlcera rodometelle, vel vino granatorum, vel onphacio cum melle; hæc enim ppiacide vlcera abstergunt, fluxionesq; prohibent: exsiccantur autem medicam. croco ex gallis, alumine plumæ, carða causta cum melle, vel trociscis Andronij subtilissime pul. in quem vsu deservunt etiam mirtha, alumen liquidum, tragacantem, terra lemnia cum melle, collumella aut pinna iniungenda. instrumentum namq; à Græcis Raphileparton dictum, propter eius duritiem, reprobatur, tentantur nonnulli corruptam, vel cancrena detentam vulam destruncare, vel ita tumefactam, vt patiens suffocari videatur, ita namq; iusserunt Aetius, & Auicenna. Hippocrates autem, Celsus, atq; Galenus huiusmodi operationem negligere videntur. Nos tamen sæpe collumellam ita affectam curauimus oleo ex vitreo lo melle ros. admixto, vel sapa, aliquando autem (caute tamen, summaq; cum diligentia operando) cauterio actuali, foelici cum successu vsi sumus.

## De Vlceribus Labiorum.

## Cap. VIII.



N Labijs diuersæ vlcetum species exoriri solent: quæ tamen sæpius occurrunt, sunt fissuræ, à Græcis ragades dictæ. nonnunquam etiam paruis vlcusculis afficiuntur, quæ vulgo taroli nuncupari solent: aliquando etiam vlceribus planis, mali moris, malignis, & cancerosis infestantur, quæ à multis, poli me tangere, nuncupari solent. huiusmodi signa sunt vlcuscula longa, superficialia, quæ ad morum labiorum maxime dolent, ita vt sæpius sermone impedire videantur. tempore hyberno quæ maxime frigido exoriri solent, maximq; Borea expirante; horumq; causa, intentia est siccitas, adstrictioq; potens, vel tandem adustus humor. Ea verò, quæ taroli nuncupantur, vlcuscula sunt parua, rotunda, albicansia, & superficialia, quæ ab acti, tenuiq; humore originem ducunt. Benigna, vlcera sunt plana, sub epidermide rubicunda, omnino malo symptomate carentia: quæ maligna sunt, serigna dicuntur, & cancri figuram representant, labia inæqualia reddunt, tetri coloris, ostracosa, dolorosa, odorisq; ingrati. hæc præcedere solet, vel exigua pustula, vel tumor aliquis exiguus atq; durus, fusci coloris, prauiq; sensus, in superficie labiorum, vel faciei, quem Græci sonthon, Latini varrum, cõmuniter verò, collo, nuncupatur. hic vero ab humore crasso, & adusto leprosimè originem ducit: Interdum verò verucula quædam, à Græcis Acrocordon, vel Mirmichia dicta, vel tandem puitula quædam melancholica, a malo viuendi regimine orirentur, decens, vel ex adhibito præter rationem medicamento, in labijs cancer, phagedenicaq; vlcera induci solent.

## P R A X I S.

Labiorum scissuris, quando à frigore originem ducunt, mirabili modo conducere solet arietina pinguedo, vel asinina, vel anathina, vel simplex, vel cum cera commixta, & oleo amigdalorum dulcium. Idem operatur vitulina pinguedo cum macilagine sem. psilij, & oleo citri. ad idem multũ pollet oleũ ex mirtha, ex cera, & ex luto oui: Quæ vlcera taroli nuncupantur, alumine liquido applicito facillimè sanantur: dummodo per temporis spatium ibi detineatur: quo non iuuante, huiusmodi decoctum paratur, quod non modò labijs, sed ori vniuerso conducere solet: ꝛ. Aquæ marinæ lib. ij. Mali granati in quatuor partes diuisi, Aluminis erudi s. xv. sublimati optimi gr. ij. salis sardi s. ij. bulliant omnia in olla noua cum sex folijs lauri, ad tertie partis consumptionem, & coletur: colatura in vase vitreo bene obturato seruetur; hæc enim malis presentaneum est remedium. vlcera plana labiorum curantur vnguento ex turis, vel albo camphorato, vel ex soliatro confectio. vel ꝛ. Litargij argentei, plumbi erusti añ. s. j. mirthæ, aloes, turis præparati añ. s. s. pinguedinis vituli s. ij. succi solatri, plantaginis, vini granatorum, ol. mirthini añ. s. s. bulliant omnia humida ad consipationem succosũ, deinde cera alba q. s. aridaq; addantur, & vnguentum in mortario plumbeo in lenimenti formam conducatur. Vlcerata verò maligna, phagedenica, cancriq; naturam redolentia, eadem ratione curantur, quæ in cap. vlcetum famosorum tradita est; si autem eorum malignitas prosequi videatur, basilicam pro opportunitate secabis, humoresq; peccantes imminues, vel cassia, vel syrup. ros. solut. vel electuario ros. Mel. vel ex succo rosarum: si autem adusti fuerint, cum sero, vel succo sumaria, vel electuario lenitimo, vel diallene, vel confectioe Hametich, & similibus, humores autem, qui relinquuntur, præparantur syrup. de epitimo, de sumaria, vel bilantino. cum verò aliqua in vniuerso apparuerit concoctio, iterum curanda

- 10 cuanda est materia, hyera Pachij, vel diacolocinthis, ut isti appellant, vel pillulis Indis, vel de lapide lazuli, vel decocto epithimi, vel Mcl, vel Auic. vel Rafis, vel pillulis de fumaris, ex eleboro nigro aliteratis. Topka, localiaue medicamenta omni mordicatione vacare debent; quare aqua ordei, & melle violato vlcera ipsa ablueri sufficiat, vel aqua ex virga aurea, vel bippinella, & vino granatorum; Si autem aliquis appareat putredo, hydrargirio preparato remouetur; in hisce enim antisectionibus multum proficere solet. Ab hoc quædam inducitur elcara, post cuius remotionem, tale debet applicari medicamentum. *℞* Terebentina claræ abluta, vel vino albo, vel aqua solatri, prout videbitur oportunitas, *℥*. ij. mellis rosati, *℥*. iij. ordei añ. *℥*. 3. s. mirræ, terræ lemij añ. *℥*. ij. melle, & S. A. huiusmodi medicamento insillitis lichenis, vlcus impleatur, desuper autem imponatur vnguentum ex pompholige, donec optima appareat sanies, & concoctio. Quod verò deficit, refarciendum est diacadmia emplastro, vel ex luteo oui camphorato, vel diapalma desuper inducatur: quæ si non profuerint, pars vniuersa infirma; & saniosa ignito ferro amouenda est, reteratoq; actuali cauterio est inurenda, Si autem aliqua de causa huiusmodi operatio impediatur, ut puta infirmi timiditate, vlcus autem cauterio commixtum, non inconueniens in casu tali, imò præcipiunt moderni Chirurgi, ut aliquid arsenici sub limati applicetur, vel simplex, vel alijs medicinis commixtum, optima tamen preparata defensione, ne eius vis terminos pertranseat, ut puta arsenici granum apponatur, vel simplex, vel cum vnguento ceru fati commixtum; hoc enim passio non muleum infert doloris, sed elchara inducit, quæ loco butiro, & ordei farina, vel decocta malua, & ærugiæ porcina remouetur; quæ remota, vlcus denuo est mundandum; vtuntur autem aliqui sublimato, terra sigillata commixto, vel vnguento populeonis: laudant alij trociscos ex minio, vel ex asphodelis, qui in tenuissimum polinem redacti, malam carnem omnem consumere solent; quo peracto, quemadmodum alia vlcera, proprijs indicationibus curanda sunt.

De Vlcerebus Aurium.

Cap. IX.



**R** A o auribus exoriri solent affectus, qui chirurgica manu indigeant; ideoque antiquorum Medicorum pauci de hisce verba faciunt: exulcerantur tamen aurium, vel interna, vel externa partes; quæ externa sunt vlcera, vel arida, & sicca, vel multa humiditate, & virulentia plena apparent, inter sicca aliqua chronica, antiqua videntur, aliqua recentia; & sanie plena existunt; Horum aliqua dolorosa, profunda, & maligna sunt; multa vero benigna, plana, & salutaria.

P R A X I S.

- 40 **Q** V I A Auditus organum natura siccissimum est, ideoque validissime siccantia expostulat medicamenta; quare externa, & apparentia vlcera medicamento curantur ex memie confecto, quod glauion à Græcis dicitur, & aceto, vel trociscis Andronij, & austero vino, vel ex spuma ferri, & melle. Aliqua autem apparente putredine, hydromelle remouenda est, vel mellito vino, vel decocto lenium, vel mirthillorij, vel ex hedera in uino decoctis, addito melle rosato; deinde tale applicet medicamentum, *℞* mirrha, olisani añ. *℥*. ij. aluminis vlli *℥*. j. mellis q. s. vel *℞* mirrha, aloes, calcithidis añ. *℥*. j. succi papaueris, acetij añ. q. s. vel *℞* Aloes, aristolochiæ, sanguinis draconis, squamæ eris preparatæ añ. *℥*. j. terantur omnia cum aceto, & modica cera f. vnguentum. si aliquis factor percipiatur, vlcera cum oxo melle mundetur, deinde cum lide curentur si vetò corrupti inceperit, curetur ex agripiaco Celis, ex grugine, aceto, & melle confecto: si autem vlcus notabili dolore teneatur, licio, & mulebri lacte mulcendus est, vel medulla panis, & sappa, vel medulla anatis, & ol. amigdalino, & croco: si autem nimium squiat, fiat colirium ex aloes, & croco, opio, & melle, vel meconium aqua abluitur, & infirmatus locus emplastratur: si autem multa affluerit materia, ad os & nares diuerrenda est, vlcus deinde alumine exusto, mirrha, calcantho, & melle, & ex hoc suris semper cooperiendū est, postque mullo, quando recens est, & aceto, quando antiquum fuerit abluitur. Antiquis vlcerebus, humo roq; carentibus, sequens valet remedium; *℞* hyssopi, medullæ cerui, buxij añ. *℥*. iij. rchinæ terebentini añ. *℥*. ij. ol. amigdalini, & ricini q. s. m. & vtere. Antiquis autem affectibus *℞* mirrha, spumæ nitri, nardi, aluminis scissilis añ. *℥*. j. croci. *℥*. iij. misceantur omnia cum aceto acerrimo: si autem multus affluerit sanguis, insillatur marubij succus cum aceto, vel succo granatorum in aceto decoctorum. Vermes autem, qui in auribus generantur, albo veratro interficiuntur, si cum melle, vel succo rubi infundatur: si autem vlcus profundum extiterit, remedia fistula, cannaue sunt insillanda.

## De Vlceribus faciei:

## Cap. X.



**L** A C I E S, Ea videlicet pars, quæ capillorum principio, mento, & auribus circumscribitur, quæ in modum & alij partes, et culerari solet, manifestis, saniosisq; vlceribus, quæ cum peculiarem non requirant curationem, idcirco de ipsis particularis non est facienda mentio: non sunt tamen silentio inuolendi affectus, qui ipsam præcipuè infestare solent, inter quos præcipuum obtinet locum gutta rosacea, & de formis potius affectus, quam morbosus:

## DE GUTTA ROSACEA.

**S** O L E N T circa eminentiores faciei partes, vt pura sub oculis, & circa nâres, quedam exoriri emittentia, succæ, crustosæ, inæquales, intensaq; rubedinis, quæ fore semper lepræ futuræ, elephan-  
tiasis ve indicia sunt. Horum affectuum materies est sanguis crassus, ac inflatus, qui aduultus redditus inflamatam, aspectuq; deformem faciem reddit. affectus hic contagiosus est, excessiuosq; hyemæ cre-  
scit, ac quoriscunq; curis porri conspiciuntur, nec vapores, et nescis: humores ad tapæ ascendentes ex-  
pelli possunt, quare facies inflatur. ex crassiori autem humoris parte, nonnulla generantur pustula, variaz, crustæ, sic, et, inæquales, & rubicundæ, quæ in tetrum affectum cum suprafcriptis conditioibus  
conuertuntur. Appellat Arabes albedinalem, & vulgares autem burilaga: quando verò excessive ru-  
bet, gutta rubet nuncupatur: quando verò maxima afflicta ægritantem molestia, gutta rabida, sive ru-  
ro gutta rosacea, vel rosacea, vel Arabica vulgò dici solet, reponendus est in genere Herpetum crusto-  
rum, ab adusta bile originem ducentium, quæ propter eius leuitatem innatam faciem peti, tamq; de  
formem reddit:

## P R A X I S.

**I** N Cura huius deformis affectionis cutis, omnia videntur conuenire medicinæ instrumenta, ea namq;  
seruanda est diæta, quæ leprosis proponi solet. vitentur crassa cibaria, frigida, salsa, dissoluta, digestio-  
nis, elumit, quæ optimum generent sanguinem, eumq; naturalem, & concoctu facilia. laudatur vinu  
album, atq; oligophorum, nec dulce, nec austerum. fugiendum est immoderatum exercitium, maximè  
autem materias in capite existentes monere, vel sursum ad faciem humores, vaporesq; pellere potens.  
frigidus aer, coitus, immoderatusq; calor est vitandus, quando in facie, mentoq; nonnulla pustulae par-  
uæ, & inflamatæ incipiunt apparere, earum cura est ventris solutio, venæ sectio, adhaerent etiam  
spatulis cucurbitulæ, hæ moroidibusque sanguisugæ cum autem nihil obster, basilica prius est incidenda,  
deinde cõmunis, postmodum verò cephalica: sic enim iubet Hippocrates in sanguinis rectificatione:  
quando infirmum est caput, inspicienda est materia efflata. leni, vel diaphana, residuumq; præparat,  
dum cum syrupo de fumaris, ex infuso, ex lupulis, & tandem corpus est exquirere purgandum com-  
otione hamech, hyera Hermetis, vel Pachij, vel cum medicamento ex epithimo Mesi. cum fero, vel pil-  
lulis ex lapide lazuli, quem Græci cianetum, Latini verò ceruleum appellant, vel pillulis Indis, remex  
disq; similibus. Localia medicamentâ fluxiones moderatè repellendi facultate pollere debent, quem  
admodum vnguentum ros. Mesi. vel simplex lenimentum, vel largirium in aceto enutritum. ad idem  
valet lactucæ succus, portulacæ, & aqua rosacea: Idem pollet decoctum rubi, mirthillorumq; in aqua  
plantaginis: quando verò expanditur rubedo, & nini granatorum, aceti ros. añ. ʒ. ij. succi limonium, ly-  
ci albi sine opio añ. ʒ. j. bulliant omnia tantisper, deinde adde cerussæ lotæ, rutæ præparatæ añ. ʒ. j. agitentur  
die in mortario plumbeo ad consistentiam lenimenti: vel ʒ. acet. ros. ʒ. ij. Aquæ ros. ʒ. ij. ol. om-  
phacini ʒ. j. bulliant omnia tantisper, deinde adde terræ sigillatæ, rutæ præparatæ, cerussæ lotæ añ. ʒ. v. sub  
liniati ʒ. ij. m. pro lenimento, quod est mirabile: Si autem aliqua superueniat inflammatio, denuo, sicut  
cucurbitulæ scapulis applicandæ, vel hemoroides prouocandæ: locus nerò inflatus ex ol. frumenti  
est inungendus, vel ex lacte oui, vel unguento ros. Mesi. In statu verò huiusce morbi à multis commen-  
datur ol. ex tartaro cum litargio aureo, vel auripigmento cum succo lapati, vel sulphur cum succo  
asfodelorum, vel acetum cum cerussa, & euphorbia. nos autem multum laudamus huiusmodi  
remedium, & ol. ex tartaro, succi lapati, limonium, aceti ros. añ. ʒ. ij. aquæ plantaginis  
ʒ. vj. lupinorum amarorum ʒ. ij. radicem dragonij. ʒ. j. bulliant omnia leuiter, quo-  
uisq; lupini molles fiant, deinde colentur, & adde cerussæ lotæ, plumbi usti,  
rutæ præparatæ añ. ʒ. ij. hydrargirij salua exinctæ, deinde cum  
medulla panis ex purgati ʒ. j. pinguedinis cerui, hæ  
di añ. ʒ. v. m. In mortario marmoreo ad  
consistentiam unguenti. Quando  
uerò morbus inueterauerit,  
omnium Medicorum in  
vicio incurabilis est.

## DE VLCERE NOLI ME TANGERE.

**I**N facie, in mento præcipue, vel circa os, tumor quidam parvus, forunculo similis, vel verruculae quidam, rectus, durus, tuscusq; coloris enasci solet, qui paulatim excrevit, tandem exulceratur, & in vlcus melancholicum degenerat, cancriq; naturam redolens, idcirco morbus ira malignus est, & contagiosus, ut nulli cedat remedio, imò potius ab ipsis irritatur, quàm eius malignitas mitigetur, sanas partes depascit, cõmuniterq; lupus, vel noli me tangere, noncupatur. huius tamen effectus tardus est in consumptione, quod in vero cancro accidere non solet, à bile adusta, vel mixta originem ducit, & sub vlcere phagedenico, vel cancro reducitur, in quibus occulta quædam malities reperitur. Ad hæc faciem propter eius raritatem occupare solet: quando verò uigoris gradum pertingit, omnia carcinomatosis signa demonstrat.

## P R A X I S.

**Q**UIA deformis hic, timendusq; affectus, est in genere cancrorum manifestorum exulceratorum videlicet, faciusq; est, dicit Hippocrates, quemlibet cancrum non curare, quàm eius curam incassum tentare, curati namq; citius interficiunt, non curati verò longius protrahuntur, idcirco eius curationem tentare non conuenit: si oerò aliquod proponatur medicamentum, illud præseruatium potius esse debet, ne vlcus euadat, vel exulceratum in deteriorem statum deueniat, molestiusq; quotidie euadat. huic opimum prodest vitæ regimen, opportuna totius corporis euacuatio, diligensq; chirurgia: vitæ igitur tenuis modus est iniungendus, bonum generans nutrimentum. & si humoris adusti in corpore accretatio vitari non possit, propter icoris intensam caliditatem, refrigerantibus, & humectantibus cibarijs vitandum est, ut priscanq; cremore, sero, alteratissq; iusculis ex cicorea, endiuia, & boragine; Inter horrentes herbas, conceduntur arriplices, blitis, cucurbita, & similia: necnon saxatiles pisces, aues montanæ, carnes pullorum, bardorum, suinmq; iuniorum, ouaq; recentia, vinumq; tenue, aquodum, album, omnique cuitur repletio, acrimusq; rerum vltus: & si consenserit ætas, brachij vena prius est secanda, tantumq; sanguinis extrahendû, quantum fuerit opus, deinde hæmorrhoidalida vasa sunt aperienda, si præcipue appareat morbus supra nates, & successiue corpus ab adultis humoribus purgito conuenientibus medicamentis, quæ in principio blanda, benignaq; sint, progressu verò temporis gradatim efficacia: & potentiora; cum enim curari non possit, quin in corpore adusti, melancholicq; humores non generentur, saltem opportunis intervalis eos euacuare debemus, pharmaci, necnon sanguinis euacuatione. localia autem remedia, quæ infirmæ parti adhibentur ante purgationem, temporeq; purgationis, anodina esse debent, quæ & fluxionem moderatè prohibere possint, vt si nullum adhuc apparcat vlcus, acetum cum aqua rosacea, & oui albumine, vel succum solatri cum cerussa albina, vel vnguentum ex litargio, & plumbo adusto: sed si forte aliquod saxum appareat vlcus, arsenicum subtilissimum tussissimum, præstantissimumq; est remedium, opportune applicatum, & moderatè; inhiæcet namq; & eradicat huiusce morbi voracitatem, integrumq; a corpore segregat, si præcipue id onco ligno inter sanam, corruptamq; carnem applicetur. Animaduertendum tamen est, ne circumuicinas partes inficiantur, vel aliquam admittant fluxionem, quod quidem assequimur, si partes illæ tueantur aliquo defensiuo, vt pote bolo armena, & aceto, vel oxilacra, & succo solatri cum bolo armena, vel vnguento populeonis: arsenici verò quantitas quando applicatur, paucula admodum esse debet, quemadmodum in duriore corporibus dimictum grani frumenti pro vice: quando verò correctum, alijsq; est commixtum medicamentis, ut cerussato vnguento, vel ex ruta, vel cum butiro ad integrum granum adhiberi potest: buluifodi tamen medicamento sæpius, in pauca tamen quantitate. vti, tutius est, quæ rarius, in maiori tamen quantitate: perdurat autem, absq; eo quod muretur, per tres dies continuos, et carnamq; inducit, qua butiro femora, vel succo porri, vlcus est rodemelle mundandum, succo apij, & or dacea farina, in reliquis, quemadmodum & alia vlcera, curandum est.

## De Vlcerebus Colli.

## Cap. XI.

**O**UT Vnde, ea videlicet pars, quæ mento, & furcula superiori terminatur, varijs modis vlcere opprimitur, quæ pro uenarum, nervorum, & arteriarum copia, & quia cibi, potusq; & aeris est uia, periculo non vacare, & frequentissime strumis molestat, de quibus alias fecimus mentionem. Nunc ab vlcere plano, & simplici incipientes, quod ipsi occurrere solet, id cerato ex pompholyge, vel ex minio, vel ex calcichide curandum est: si autem profunda, sinuosaq; fuerint, maiori indigent subsidio; quare instituto optimo ultæ regimine, conuenientiq; corporis euacuatione præmissa, proprijs indicationibus sunt curanda, detergentibus nempe medicamentis in sordido ulcere, exsecantibus autem, nouamq; carnem generantibus in cauo; ordoq; curæ: ab abstergentibus incipiendus est: nulla namq; pars vel agglutinari, vel carne impleri potest, nisi prius omnis sordidus abstergetur, loculusq; infirmus optime mundetur: quando uerò à quocunq; alio



affectu fuerit liberum, vel melicrato solo erit mundandum, vel vino mellite, prout magis videbitur oportuñ: id autem maxime accidit, quando vlcera os inferna despiciat, vt sanie facilis pateat aditus: si autem humor, qui à sinu distillat, cruentus, fetidusq; appareat, oximel præstantissimum est remedium, addita aliquando modica ægipiaci quantitate: si autem opus fuerit, vt super finem medicamentum diutius detineatur, vel damaicenum, vel isis, vel etiam ceralcos medicamentum est applicandum; Absterfione autem pericula, id medicamentu applicetur, quod ex cartha combusta, vel tutia componitur, quorum exigua portio aliquo cõmifcatur liquori, vt eorum vehementia aliquantulum remittatur; immittantur autem in immo sinu, vel fistula, vel recto syphone. Quia autem hoc in loco multe cauities accidere solent, scien. omnes vnguento regali, Basilicone minori dicto, eas impleri, & ad sanitatẽ perducı: vel citrino, & similibus, diaphenico autem ad cicatricem perducuntur.

## De Vlceribus Pectoris, &amp; Humerorum. Cap. XII.



**C**irca thoracem pectus, hominumq; præcipuè, vlcera accidere solent, quæ propter eorum formam, ac figuram, necnon effectum, formicosa dicuntur; suntq; in genere Herpetum depascentium, ab humore adulto originem ducunt, sæpè læpiusq; parue, ac inflammatæ oriri solent, à pustulis paruis exordientes: si autẽ inueneraerint, ossa cori odunt, pectus perforant, ac in fistulas degenerant; nec periculo vacant, cum pectorales partes multis venis, & arterijs abundent; hæncq; ob causam humoreli dolores, ac deliria inducere solent. Cumq; circa dorsum multi exoriantur nervi, spasmus facillime, ac periculum inducitur. sed quia interior de pectoris fistulis sermone sumus habituri, nunc illocis pedibus, hæc prætermitemus, ad vlcera formicosa redeunt, quæ his solummodo accidere solent, qui multis adultis humoribus scærent, necnon & alijs superfluitatibus; quapropter cum nihil obstat, talia corpora sunt exquisitè purganda, & fortasse vena secanda, quemadmodum in cap. Herpetum iam dictum est. Confert huic morbo febricitanti vicius, interq; principales indicationes ea primum obinet locum, quæ est inflammationem reprimere, deinde secunda succedit intentio, quæ est morbi causæ concoctio, in quem vsu mirabili modo confert sequens medicamentu. 30  
 1. Tercebinæ claræ lotæ in aqua plantaginis. 2. ij. succi apij, absinthij añ. 3. j. farinæ ordei, lupinorum añ. 3. s. lutei oui ou. 1. mellis ros. 3. ij. misce, & hoc medicamentum lichinia illiniantur, emplastrumq; saturninum superextendatur: aliqua verò apparente malignitate, hydrargirio præparato est remouenda, ea verò perseverante, tali corrigatur medicamento; 32. Mellis crudi 3. j. floris æris 3. ij. aluminis liquidi 3. s. succi apij, 1 ng. æ pastinacæ vini granatorum añ. 3. s. collentur succi, & bulliant omnia lento igne, semper agitando, quousq; mellis spissitudinem acquirat: si verò hoc medicamentum nõ proffit, ægipiacum expetor, vel ignem; hæc enim medicamenta salutem pollicentur.

## De Vlceribus Mamillarum. Cap. XIII.



**D**e Mamillarum cancro, morboque gallico hic verba facturi nõ sumus; alibi enim de his pertractauimus, sed de alijs vlceribus agemus, quæ eis occurrere solent, quæ maxima consideratione sunt pertractanda; in cancri namq; naturam faciliè deducuntur. primum igitur aliquo digestiuo sunt præparanda vlcera, deinde rodometel abstergantur, iuxta Dioscoridem, & Gal. cui adiungit Gal. mirram, & aloem: modernis autem praticantes succum apij, ordeaceumq; farinam adiungunt. bona autem apparente coctione, noua generetur caro, atq; vnguento, vel perclimemone, quod isti de matrisulis appellant, quod optimu est medicamentum: in hoc verò affectu, medicamentorum crebra mutatio, ac reitratio, prodesse maxime videtur: si autem aliqua appareat inflammatio, vnguento ros. curetur, vel ol. ros. in mortario plumbeo, ad spissitudinem plumbeo pistillo agitato: si verò aliquis superueniat dolor, oleo ros. est mulcendus, vel cutaplasmâ ex medulla panis, lacte, & croco est parandum, vel 32. Medullæ panis frumenti. vnc. ij. foliorum maluæ, violarum añ. m. s. bulliant omnia in brodio, & adde butiri recentis. 3. ij. lutei ouorum nu. 1. ol. ros. vnc. j. croci parum, farinæ ordei q. s. vel conducatur emplastrum. Cauendum autem, ne ex medicamenti acrimonia, vel caliditate, vel duritie, & atiditate, vel crassitie, & lichiniõr longitudine, dolor augeatur. mamillæ enim propter earum raritatem, cumq; spongiosæ sint, fluxionem omnem facillimè admittunt, ac inflamantur, quare si spensæ sunt tenendæ, ne nimia impleantur humiditate: si autem lactis copia (prout aliquando accidit) curationem nimia humiditate impedire videatur, lac exsiccetur (nisi fortasse lactet mulier) mamilla cooperta terciatina tepida, vel folijs nucis communis, quæ sunt mirabilia, vel 3. j. pillularum ex Rabbardo in aqua plantaginis dissolutarum exhibeatur. si autem papillæ mamillarum propter lactis acuitiem, vel infantis morsum, fistulis molestantur, quæ à Græcis ragades dicuntur, à vulgaribus autem ferole nuncupantur, ita vt mulier in lactis exhibitione dolorem percipiat (in hoc enim affectu accidit aliquando, vt ex toto papillæ corrodantur) multa diligencia, tenuis dicta est institienda, frigida, & humida,

10 mīda, uinū prohibeatur, corpusq; euacuet cassia, manna, uel syrupo ros. solur. si opportunū videat, uel sal  
et alternis diebus enematis, iuxta opportunitatē factis, in principio autem fistulatum prestansimū  
est remedium, locum illi nire mucilage .f. citoniorum, uel uino granatorum, & bolo armena, uel la-  
cte alūnino, albumine oui. & cartha combusta, uel f. lenimentū ex hircino sapo, olamigdal. dul. & ce-  
ra citrina. in statu autem, ꝑ. macilaginis. sem. lni, citoniorum añ. f. s. ol. masticini, ol. amigdal. dulcis,  
medullæ cruris uirili, pinguedinis hircinæ, añ. 3. ij. pul. sandalorum, corallorum, tragacanthi, ꝑumie,  
añ. 3. s. campboræ gr. ij. cœq; citrinæ. q. s. & f. vnguentum.

De Vlcerebus Articulorum.

Cap. XIIII.

30 **A**RVICULI, in quibus ossa committuntur, sæpē infirmantur: qui affectus, si absque  
methodo curetur, cautorum vlcera, maleq; naturę sunt in causa, quę cacotica di-  
cuntur. quemadmodum enim inquit Auic. non omnia loca per se abscessus pei-  
peri sunt apta, quemadmodum sunt articuli, vel ossium concatenatio, quę loca  
uisudo crassoq; humore nutriuntur, euaq; sunt; quapropter ulcera his contingē-  
tia, cauerosa, & fistularia euadunt, & idcirco curatu difficilia. Primus igitur  
medici scopus erit, horum orificium hians, ac patens reddere, ita vt intima eor-  
um pars oculis subijci queat. insuper sinus abstergendū est uino melle, uel li-  
xiuo claro, & melle, aliquando etiam hydragritium præparatum addentes. debet autem huiusmodi  
medicamentum siringa injici, quādiuq; potest, obturatum orificium detinere, vt diutius ibi perma-  
neat, particularemq; efficiat operationem. vel huiusmodi utere, exsiccati, abstergenti, potētiq; ꝑ. lixi  
uij clari, uini nigri añ. f. vj. rodemellis f. ij. aquæ ardens f. ij. vnguenti ægipiaci f. s. m. & tamisper bul-  
liant. si autem aliqua fuerit ostracositās, ea medicamento acuto est remouenda, vel supradicto præci-  
pirato, uel ægipiacio, uel troscifis ex minio, uel ol. calcanthi, cautione adhibita, ne uicinæ partes of-  
fendantur. si autem incisione fuerit opus propter orificij angustiam, ita fiat, vt nullus neruus, arteria,  
venaue lædatur, statimq; or deacea, & zucharo ros. abluatur, successeineq; carne Aureo, uel Citrio adim-  
pleatur quod uero reliquum est, argideo emp. uel diaphenicino, uel græco consequi poterimus.

De Vlcerebus Virgæ.

Cap. XV.

40 **M**EMBRUM virili, peniue quodcumq; ulceris genus accidere solet, maximeque hisce  
temporibus, quibus morbus gallicus grassatur, de quo proprio loco uerba sumus  
facturi, nunc de vlcerebus pertractantes: quæ alia de causa, quàm à morbo gallico  
sunt, uel sunt plana, benigna, uel mala, corrosiua, & putrida. benigna, ut asse-  
rit Rasis, absteruntur ex aloe inperfo, & turia exsiccat. si autem multa scateat  
humiditate, hæc assumitur corticibus pini, & lapide emathie exusto, uel cucur-  
bita adusta cum alumine crudo exulto, emplastro ex cartha combusta, uel ex can-  
cris fluuialibus exultis; laudat deinceps Gal. cadmiā locam, & argenti spo-  
mam. eaq; omnia, quę tanta exsiccati virtute pollent, quę hinc partibus conueniens est, caroe ficiori-  
bus. Notandum est etiam, glandis ulcera exsiccantibus ualidioribus curanda esse, quam ea, quę in præ-  
putio exoriuntur: hæc autem exsiccantia magis expositulā, quàm ea, quę in reliquo pene oboriuntur.  
50 huius ulceris causa est sordidities quædam, aliquando alba, aliquando nigra, quę intra præputium deten-  
ta, & exseruata, uel uulsa illa producit, quæ uulgo taroli nuncupantur. exoriuntur aliquando ex la-  
bore, uel equitando, uel remigando, uel quocunq; alio modo perperlo, & eadem sorditie eo loci de-  
tentæ accidunt aliquando et ex adstringentibus applicitis medicamentis, quorū uis apud scorta frequēs  
est ad uulū adstrictionem. si ergo phagedenicū, uel coct osiū fuerit vlcus, huius effectus causa est inda-  
ganda: quod si præ nimia humorū copia fiat, ea est imminenda, unde nullo obstante, basillia est  
incidenda; quod conueniens magis est medicamento, quàm pharmacia. morbus nanq; in extremis par-  
tibus est, cui magis reuulsio cōuenit, quàm attritio, quæ soluentiū medicamentorū principalis est esse  
ctus: si tamen cacochimia appareat, ea opportuno medicamento est euacuanda, id Hipp. asserente. qua  
re cum hæ morbi ad adultū, & acri humore fiant, hi ellect. de pillo sunt deturbandi, uel ellect. ex succo  
60 ros. cum rab. & syrupo ros. soltenis sit vlcus, frigidus, & humidus; quicquid eger, motus nanq; sordi-  
dū vlcus reddit; appensum membrū detineatur, & uentri alligetur, ne pendens fluxiones adinitæ. vt  
autē omnis prohibeat corruptio, defensiuū aliquod superiori loco applicet, vt acerū, & bolus armena.  
Hancq; decoctionem parato, ꝑ. mirtilorum, rubi rosarum, corticum granatorum, plantaginis, lin-  
gę pascinæ, aluminis liquidi añ. q. 3. & hæ decoctio in uino nigro, qua facta ablutione, huiusmodi  
pul. applicetur. ꝑ. sem. rosarum, baccarum mirthi, balauftiorum añ. vnc. ij. aristolochiæ longæ, alu-  
minis rubei añ. 3. ij. ra. & f. puluis subtilis. uel cum ol. masticino, & f. vnguentum. si autem hæc non  
iuerint remedia, ad hydragritium præparatū confugiendū est. Absteruntur autem ulcera unguento  
damasceno, uel iside, nouaq; inducitur caro, licet iuxta Hippocratis auctoritatem, dicimus, præputium

6. Aph. 19. lib.  
de coactis pra-  
notis. à lib. de  
morbis.  
Arist. 3. de Hy-  
pocris ammalis  
cap. 19.  
Gal. 1. de Sim.  
cap. 8.  
Aetius lib. 14.  
cap. 16.  
Paul. lib. 3. cap.  
19. à lib. 7. cap.  
17.

Call. lib. 6. cap.  
18. à lib. 7. cap.  
31.  
Paul. lib. 6. cap.  
151.

diuisum nec crescere, nec unari, pauca gigni possit, polibano, mallice, turia, aloë, anetho exsulto, & similib. medicamentis, tandem diacadmia, vel cerussatò vnguento ad cicatricem perducuntur. si autem aliqua interfuerit ulcus putredo, apostolorum unguento remoueat, vel iside, uel alio leuiori remedio, cum prae dictis commixto, ut & vnguenti citrini un. j. isidis 3. lib. aegyptiaci 3. ij. m. uel & unguenti basiliconis minoris un. j. aegyptiaci 3. ij. m. si autem huiusmodi vlcera consolidata difficilia, ac maligna euadant, eorum malignitas est remouenda, corachon, uel corace, uel etiam conco appellato medica-mento, cuius descriptio hæc est, & pul. gallarum un. ij. squarum aris un. j. 5. calcithidis, oliban ass un. j. triuruntur hæc cum aceto per multos dies; deinde adde mellis albi un. v. & iterum misceantur, & adde ol. mirrhini un. ij. pinguedini taurinae un. viij. terebenthinae un. j. m. & f. emplastrum S. A. & nos sepe tali usi sumus medicamentis, & plumbi exsult, cartæ exsult, aluminis vili, scis ferri, sangui- nis draconis ass. un. j. aloës, oliban ass un. 3. ol. mirrhini, & ceræ q. 5. hæc ac similibus remediis ul- 20 cæra virgæ sanantur, tam ea, quæ in preputio coxingunt, quam ea, quæ glandi accidunt. Accidit etiã aliquando, vt genitale ita tumescat, maximeq; præputium: ita vt glans videri, nec ulcus inspicere possit, qui affectus prima, uel phimosi à Latinis claustra nuncupatur. aliquando ita retrahitur præputium, vt maxima cū difficultate proprio loco reduci queat, unde glans omnino aperta appareat, qui affectus à Grecis periphimosi appellatur, cui sepe tumor magnitudine notabili accidit, rubicundus, tractabilis, absq; dolore, statq; plenus, uel tenui pituita. cum igitur ob aliquam exortam inflamationem, uel ulcus genitale intumescat, præputium proprio loco reduci nequeat, locus aqua tepida læpe la pius fomen- tandus est vii hyphonis. si glans fuerit cooperta præputio, inter verumq; tepida aqua est iniicienda, quo præsidij genere si pelvis mollis, tractabilisq; euadat, nil aliud est peragendum. si autem tumor pertinax adhuc fuerit, lens, marubium, & malua in uno sunt decoquenda, aliqua addita mellis portione. si au- 30 tem hæc non iuuent, cataplasma parato ex maluis, fem. lini, & altea cum luteo oui, & butiro, uel f. em- plastrum ex malua, altea, pinguedine gallinae, triticea farina, butiro, ol. ros. luteo oui, croco, & sapa. prodest etiam aliquando cerarum ex altea, mucilagibus, uel diaquilin dictum. si morbus hîc reme- dijs non cedat, glansq; etiam cooperta remaneat, interim ulcere progrediente, quod ex dolore, multa- que humiditate colligitur, multo ablatur, ex vino, & melle, addito modico alumine: uel multa effu- ente sanæ, eaq; satente, & adde huiusmodi decoctionem, lentium æruginis, & troscifos Andronis, vel & lixitiij clari un. x. rob. un. iij. vnguenti aegyptiaci un. j. m. & tantisper bulliant, hæc enim decoctio omnem putredinem mirabili modo absorbere solet, in ulceribus illis, quæ cætera remedia admittere non possunt. si autem phimosi, ipsa claustra, ita angusta, arida, & nimis plena fuerit, vt patiens non modo vehementissimis doloribus crucietur, sed nec sili acies penetrare possit, imò difficultas vrinæ ac- 40 ciderit, absq; ulla spe salutis, tunc locum clausum adaperire est necessarium. lichinis uario modo para- tis, uel etiam ferro, quod duobus modis perferri potest, quorum aliter est, ut per longum quicquid uice præputium incidatur, uel forscite, uel scolopomacherio, ut pateat vlcus. incisione autem facta, statim morbus pannis cooperiendus est, ne à frigido lædatur. Hoc autem ab omnibus non commendatur, di- uisq; partes reuiri non possunt, imò cadit præputium, retrahiturq; eminet in eam quædam gene- ralis deformem, & incōmodam. proponitur igitur secundus modus, in quo diuiditur pelvis intus so- lūmodo, & in inferiori parte recta linea à summo incipiens, usq; ad frenum. tergu. n. hoc modo, superius relaxatum, decidere, & retrocedere solet: quod si parum aliterat iuuamentum, uel propter angustiam, uel propter duritiem, interna pelvis est incidenda duabus, tribusq; scissuris, linea recta fac- 50 ta, & æquali spatio inuicem distantibus. si autem acerbis, intensiq; dolores inuadant, uel inflamatio, vlcus imminuendum est, vena secanda, corpusq; euacuandum, clisterijs interpolatis diebus factis: in- totem uero pars inflamata ol. uiolario, uel vnguento rosario, uel lenimento simplici est inungenda. si au- tem ita usu veniat, f. emplastrum ex maluis, violaria, fertula campana, farina ordei, luteo oui, ol. ros. & croco: quo calu urgente necesse sit, vnguenti populeonis addere poterimus, uel succum solariis medicamentis autem noctu, diuq; sunt permittenda, ne exsiccantur; interim vero animaduertendum est, ne præputiō glandi ex occulto adhæreat, & simul uniantur, quod sepe propter ulcera accidere so- let, unde peria lineæ renues aliquo lenimento illinæ sunt interponendæ. si autem id acciderit, scal- pello intem fuit diuidenda, diuisaq; conseruanda: huiusmodi autem morbi in phagedenica ulcera, & cancrenas sæpe incidunt, unde curandum non est, sed statim opportunis remedijs occurrendum, quæ si parū profint, ignito ferro eorū furiores est extinguenda. si autem affectus hic serpens absq; eoque- 60 percipitur sensu, ad vrinæ meorū perueniret, incurabilis est: si autem in summa glande extiterit, prius fistula, uel argentea, uel plūbea in urina meatū est imponenda, ne claudatur, deinde ferro exurent. si au- tem cancrena alius penetraverit, omne corruptum remouendum, & exurendum, elcra autem remo- ta, quemadmodum & alia ulcera, curanda sunt: si autem elcra immobilis remaneat, uel medicamentis, uel ferri causa, emoragie aliusq; periculum imminet. His autem, qui incisionem perpeti non possunt, si circulus latus, uel canaliculus plumbicus ita subleuit, vt præputium ingredi possit, sensimq; imponitur, in ipso canaliculo imponentes trutuli spongiæ optime compressæ, quæ dum præ humiditate tumescit, sensim dilatat, prædictamq; claustrum aperit. hæc modernorum Chirurgicorum est inuentio, & opti- ma, meo quidem iudicio. secunda autem claustræ species periphimosi à Grecis dicta, est illa, in qua

10 ira aperta, ac nuda glans apparet, propter præputij contractionē, vt nullo modo cooperiri possit, morbus deformis est, in pueris: facilius curatur, quam in adultis. cum autem inuenerauerit, omnino incurabilis est: quando autem mundum inuenerauerit, nec occuluerit, diutius ol. amigdalino tepido inungendus est, manibus tractando, & suo loco deducendus: si autem non profuerit, decoctum maluz, acanthi, & alteæ applicandum est, eo vases genere, quod angustū orificium, latiorē verō habeat fundum, deinde tentandum, an vi possit in pristinum deduci, quo, propter eius duritiem, non succedente, scalpello cutis leuiter est scarificanda, teneris namq; fiet propter sanguinis exitum, faciliusq; suo detrudetur loco, statimq; cataplasma apponendum ex cicurum farina, floribus camomillæ, meliloti, & vino nigro. Vrinæ necatus aliquando ex eius acredine exoriri solet, ita vt ægrotantes non succedente, scalpello in spasmus deduci videantur. vt igitur talis leuetur dolor, tale præsidij genus componatur, quod  
 20 quidem in tali casu mirabile est: & aquæ plantaginis, rosarum, solarij añ. vnc. iij. tutiæ præparatæ 3. ij. floris græj. bulliant tantisper, & siphone duo uocū eo sæpius vtire: lustra Aetium maximè cōmendat cignarium collirium, in lacte dissolutum, & ipse, eius virtutis, & præstantiæ largam fidem, testimoniumq; perhibet. lustra Gal. autem, & Licij. Mirrhæ añ. 3. ij. calchididis 3. j. f. pul. subtilis. & adde rob. parum. vini albi odorati 3. iij. decoquantur omnia ad mellis consistentiam, & feruentur in vase plumbeo, quando autem eo uti volueris, dissoluantur cum ol. rosato claro. Auc autem troscicos ex thure, in lacte, vel vino dissolutos, commendat. Non inconuenit autē aliquando, lotionē præmissa, plūbeam virgam, vel pinnam auis in canall deinere, ne partes vlcerate simul coalescant: In hoc vrinatis meatu aliquādo alique paruz caruncule exoriri solent, omni sensu priuatæ, quæ, vel ex malo applicito medicamento, vel ex longo seminis produlio inuoluntario, superueniunt, quarum aliz molles sunt, aliz verō duræ; moles, labina excicata, & pul. vel hermodactilorum pul. vel serpentariæ radice remoueri solent: duræ verō quantō antiquiores in hisce curandis, tantō maior insurgit difficultas, ad torriorq; medicamento deueniendum est, semper aduertentes, ne corrosiua medicamenta liquidiora sint: quare in hunc vsum, futorium atramentum, calcanthium distū, maximè commendatur, vel mercurium præparatum, præcipitatum vulgare videlicet, vel ægyptiacum solum, vel emplastro ex cerussa commixtum: Carne verō consumata, locus aqua plantaginis, vel vino nigro cum tutia est abluendus, & de hoc satis.

Accidit etiam aliquando, vt vlcus corrosens, ita meatum vrinarium excedat, vt ab ipso vlcere vrina egrediatur, tuncq; casus difficilis euadit curatur: idcirco interius, exteriusq; medicamenta conueniunt, & exciccati faciliare maximè sine prædiis, siphone igitur sequens iniiciatur medicamentum, & aquæ plantaginis vnc. iij. vini nigri. vnc. 3. s. tutiæ præparatæ, ærginis abraiz, & combustæ, aluminis liquidi añ. 3. ij. bulliant tantisper simul, & applicetur. Exterius verō tale conuenit medicamentum, & thuris, aloes, mirrhæ, farcocollæ. añ. 3. j. anethi exusti, corticum pini exustarum, tutiæ præparatæ, plumbi exusti, cerussæ añ. 3. s. f. pul. subtilis. quo impleantur vlcus, superponendo emplastrum ex tutia, vel ex cartha combusta. Accidit etiam sæpe, vt sudatur pellis, illudque hidurum genus exoritur, quæ à Græcis ragades appellantur. Hæ a principio curantur fotu ex decoctione maluz, & sem. lini, vel sedate patiens in aqua calida decoctionis maluz acanthi, & pimpinellæ, deinde fissuræ inungatur, oleo ex sem. lini, vel nucum, vel ex oui luteo, & desuper imponantur columborum oua elixata, & dura, vel huiusmodi medicamentum, & ol. ros. vnc. iij. ceræ vnc. iij. cerussæ, plumbi exusti, añ. vnc. s. ammali, traga canthi añ. 3. j. opij camphoræ, añ. 3. s. lutei ouorum du. 4. m. vel & vnguen. rosati, ol. omphacini, añ. vnc. j. succi plantaginis, n. c. s. pinguedinis vitulinæ, vnc. j. litargirij aurei, & argentei, añ. vnc. vj. plumbi exusti, cerussæ, tutiæ, añ. 3. iij. antimonij. 3. j. thuris, terræ sigillatæ, boli armeni, añ. 3. j. m. c. in mortario plumbeo, plumbeo pistillo per duas horas, & f. vnguentum; huius autem non conferentibus remedijs, & ol. lutei ouorum, 3. ij. sulphuris 3. j. m. & ex hoc ragades leuiter illiniantur, interim ab acrioribus, acutius cibarijs abstinentes, ventremq; violenter non mouentes, sed ex liquidis, leuioribsq; & lubripibus cibantibus, & vino tenui, nisi tamen aliquid obstat.

## De Vlceribus Vuluz, &amp; Matricis. Cap. XVI.

60 **N**ASCUNTUR in sinu mulierum, vel in ingressu vuluz, vel in colo vteri, vel in ipso vtero, varij affectus, vlceraq; diuersa ab humorum acriorum fluxione generata, vel ex ipsius loci immunditie, vel medicamentorum acredine, vel ex infelici partu, vel ex suppurato tumore, vel tandem ex alicuius rei infectæ contagio, hisceq; in locis ex crescentiæ quardam monstruosa generantur, quarum omnium passioem, partim in præsentī, partim aliās, sumus verba facturi. Hic breuiter occurrentiū vlcercum historiam contexamus, quæ vel superficialia, & sensibus etiam manifesta sunt, quæ ex situ, & exentibus cognoscuntur. Horum etiam alia sunt pura, & simplicia vlcera, alia dolorosa, infirmata, putrida, & fistulosa, quæ in orificio vuluz nascuntur, facillimè oculo cognoscuntur: quæ verò ceruicem, vel vterum ipsum infestant, eo indigent instructo, quod Græci Aliota, & drio pifmon, Latini matricis speculum appellant; licet sæpius ab excrementis, continuo exeuntibus, vlcus natum a ceruice testatur, paruum namq; vlcus, & parum, nisi paruo expurgatur humore, æquali, boni coloris,

ris, & sine malo odore, ex vlcere verò doloroso, vel inflammato, humor crudus, & fœculentus, & mordax 10  
egreditur; ex fœdido verò crassus, & viscosus; ex virulenti, & corrosiuo, maxima humorum copia, se-  
tens, maligni coloris; & tandè vlcera illa, quæ continua febre sunt concomitata, dolore atroci, inquit-  
tudine, animi deliquio, & morte, interdum in cancri naturam, etiã manifesti, conuerti solent.

## P R A X I S.

**H**I affectus curantur (semota morbi gallici suspicione) iuxta eorum peculiarem naturam, quæ ali-  
quando ex apparentium accidentium vehementia desumi solet: in vniuersum tamen commen-  
datur medicamenta, quæ multum exsiccare valeant, sine mordicatione tamen: loci namq; natura maxi-  
me humida est, quia etiã locus hic variarum superfluitatum via est, ac iter; idcirco & abstergentibus 20  
indigemus, & in tali casu eo vtendum est instrumento, quod Græci Metrenchitam, & piulcham, Ara-  
bes verò clapsidram appellant, nos verò Latinos imitantes, clistere oticulate, vel iniectionum appella-  
mus. Remedia verò in hunc vsum approbata, sunt aqua marina, aqua ordecacea cum melle, vel vinum  
melice, vel aliquod magistrale decoctum, vt ʒ. ordei cum cortice torrefacti m. 1. rosarum rub. balau-  
stiorum, mirabolanorum cirimorum, añ. vnc. s. aquæ calibetæ q. s. & f. decoctio, cui adde mellis albi  
vnc. iiii. vel decoquantur lente, & lupini in aqua marina, quousque molles fiant, deinde colescat, & ad-  
de syrapi rosati, vel mellis ros. q. s. quando verò q. s. fuerit abstersum vlcus, regatur diacadmia, vel ex  
pompholice emplastrum, vel diacartho famoso, ad sanitatem perducatur: si verò multa superabundet  
humiditas, vel profundum fuerit vlcus, ʒ. aloes, 3. ij. gallarum, sanguinis draconis, boli armenii, tutiæ,  
irios, aristolochiæ rotundæ, mirrhæ, gummi Arabici, añ. 3. j. aluminis adusti 3. ij. m. & f. pul. subtili-  
lis. & tale patetur emplastrum, ʒ. spumæ argenti, cerussæ lo. æ, sarcocolliæ, añ. vnc. s. aloes, mirrhæ, 30  
añ. 3. ij. ceræ, & ol. ros. q. s. vel ʒ. tutiæ lotæ, chiniæ ex argento, mirrhæ, fatocollæ, añ. 3. s. carthæ  
combustæ, añ. 3. iij. ol. mirthini, & ceræ q. s. si verò patiens doloribus fuerit vexata, vlcus est abluend-  
um, vel lacte, vel sero. si verò vrgentes fuerint dolores, mucedini sunt in fessu ex decocto plantaginis,  
maluæ, pimpinellæ, camomillæ, fertulæ campanæ, in vino albo tenui, vel sero: vlcus verò, emplastrum  
ex succo solari, & emplastro simplici diutius in mortario plumbeo ad mellis spissitudinem agitatur, cu-  
ratur. Vlceræ verò, quæ in vtero, vel circa vterum sunt, hisce signis cognoscuntur; exit namque ab ipso  
sanguis, sanicij: copia, percipitur grauis fætor, lumbi, inguina, & imus venter, doloribus acutis ab al-  
to versus costas, humorosq; exordientibus; Capite dolet, infelicius patiens delectat, & temporis progres-  
su verus tumescit, cuti debilitas, febriq; continua succedit. cum hæc signa apparuerint, victus opportunus  
instituendus est, iuxta vlceris dispositionem, humorumq; naturam, & corporis. procuretur in hi-  
sce morbis alijs beneficium: & aliqua apparente pletoria, basilica incidatur, deinde si fuerit opus, quæ  
genubus est vicina: & pro corporis lenitione, laudatur cassia, manna, & syrapi ros. sol. nec vinum  
uenda est, nec aliquid aliud excrementum violenter inouendum. vomitus pro reuulsione conuenire  
videtur; & si lotionibus vtendum erit, vino vt melius est, quàm aqua, sæpeque vlcus abluendum; aliter  
namque malignum euadit. Quia autem omnis Medici intentio est in hoc infelici morbo doloris prohi-  
bitio, idcirco pectus ex floribus meliloti in vino decoctis, luteis ouorum elixatorum nu. 4. olei violati,  
vnguenti rosati añ. q. s. croci parum, misce, & f. emplastrum. in reliquis, vlcus, quemadmodum & alia  
vlceræ, curandum est, maiori videlicet, minorique absterfione, prout opus fuerit.

## A D D I T I O.

**E**Xoriantur in obscenis partibus mulierum, fistula, innaturales tumores, mulep; excrecentiæ, qua-  
rum licet in subsequenti tractatu verba simus facturi; hoc loco tamen de his aliquod pertrahere op-  
portunum iudicamus, à thimo exordientes; id autem est excrecentia quedam carnosa, mollis, rubi-  
cunda, vel dealbicans, inæqualis, absque dolore, quæ frequenter naturales hominum partes, necnon &  
mulierum, infestare solet, à Græcis thymum dicitur; eoquod thimi flori, vel epithimi per simile sit; ab  
Arabibus asse, vel asse dicitur, quod est stecadis flos; licet Auc. interpretet morum appellent, eoquod  
cum moro Celsi similitudinem habeat; Albucasis barherem vocat, Cellus uerò fungum: Ait præterea  
Acetius, excrecentias istas, cum parue fuerint, thimos nuncupari; cum autem supercreuerint, sicus appel-  
lari, vulgo autem porrifici dicuntur. Parui thimi benigni sunt, & facillimè curantur, magni verò ali-  
quando maligni, & incurabiles existunt. Reperitur præterea alia excrecentiarum species hiæ in locis, 60  
à Græcis ninpha dicta, ab Arabibus tentigo, à Latinis cauda dicitur; in magnam attollitur molem in  
aliquibus mulieribus, exiguiq; pudoris sunt indicium, imò (vt aliqui asserunt) mulieres sunt, quæ hac par-  
te mediante, maris munere in coitu funguntur, & Venerè cum alijs exercent: ninpha tamen à cauda dis-  
fert, eo quia ninpha substantia quedam muculosa est, mouetur, & panni alciuius affricu turget, cauda  
autem per se immobilis est, & aliquando ita excrecit, vt totam vteri ceruicem adimpleat, sæpeque ita  
egrediat, vt vere cauda videatur. hoc accidens à Latinis cauda, à Græcis circofom, ab Arabibus fur-  
sus appellatur; Archigenes autem asserit, excrecentiam istam, æstiuo tempore longam fieri, hyberno  
autem breuem, licet aliter Hipp. & Gal. sentire videantur. Solet, præter prædictas, aliud excrecentia-  
rum genus hæc partes infestare, quod carnosum, durum, immobile, pendens, & callosum est, Græcis  
condi-

- 30 condiloma dicitur, Arabibus alzheli, Latinis verò veruca, in principio tuberculus dicitur; in statu verò condiloma. differt à nympha, substantia, motu, & operatione. Apparet præterea in vulgè orificio venæ nonnullæ, quæ tuberculi cuiusdam duri, sensus expertis (præterquam ubi inflantur) citigimem referunt, cõmuniter ab omnibus emoroides dicuntur; Turgent, quando dolent; dolent verò, quando inflantur; inflantur autem, quando non superueniunt debito tempore inenitit purgationes; tunc enim rubicundæ, duræ, & dolorosæ euadunt: si autem repleantur, & exsiccentur, diutiusque durent, abiq; vlla humiditatis expurgatione, condilomata sunt: tactu autem, ex apertione oris vteri, cognoscuntur; fissuræ verò, quæ in vulgè ingressu apparent, oculis patent; mulieres enim expurgationem huiusmodi symptoma arborantur, non morbum. Harum omnium excrementiarum materia est sanguis crassus, & in carnis melancholicæ, & murtis naturam conuertitur; quæ si absq; ordine curerur, in cancrum degenerare solet. Nos autem huiusmodi affectus curationem in cap. de excrementijs pertractare decreuimus.

De Vlceribus Sedis. Cap. XVII.



**S**ED Vlcera, anus videlicet, & recti intestini extremitatis, qui locus à Medicis pro dextro sphincter, vel perineon dicitur, varia sunt, varijq; modus exoriuntur, quedam namq; benigna, simplicia, sunt, alia verò longa, inequalia, corollaria, purida, vermicola, olstracosa, fistulosa, & cancerosa. horum autem aliqua extra, multa verò intus eueniunt, in occultis rectum intestinum à facilius. Extrinseca vlcera sensu deprehenduntur, non multaq; difficultate curantur; indigunt tamen validè extrinsecis medicinis, quemadmodum in virgæ, & vulgè curatione superius proposuimus: vlcera verò, quæ occultæ, nec benigna sunt, multis de causis cum difficultate curantur. cum-que particula hæc admodum sensibilis sit, facillimè exasperatur, acriorib; applicatis remedijs; tacet præterea in imo ventre, & ferè est in corionio moru; cibiq; excrementorum iter, ac via est, ipsaq; ex sui natura mor- dicatione pati apta, quotiescunq; vel bilis ipsa, vel sanies aliqua portio ibi detineatur. non datur etiam Medicis determinatū aliquod tempus, quo medicamenta applicari possint; ferè semper namque accidit, vt indeterminato tempore excrementa educantur. loci autem caliditas, & humiditas non paucam cura- tionis difficultatem affert. Harum partium vlcera magna, mortalia iudicantur, cum nec caro supercresce- re, nec ad cicatricem perducì queant.

Hipp. lib. de fi-  
stula.  
Celsus lib. 8. ca.  
12.  
Gal. 1. de medi-  
camentis lo. 11.  
de affect. mor-  
bis. in fine. 1. 4.  
Aph. 24. & 26.  
Aretus lib. 14.  
cap. 1. & 10.  
Paul. lib. 3. cap.  
39.  
Auis. 13. f. 8.  
cap. vltimo.

P R A X I S.

- 40 **I**N vlcerum sedis, & intestinorum curatione ea conueniunt medicamenta, quæ absq; vlla acrimonia exsiccare, ac adstringere possint; cuiusmodi metallica sunt, quæ non acra. id operantur, quod in hac curatione conuenire videtur. Prius autem vicus lauare proderit lacte, si dolor infestet; si autem non, aqua ordeï addito melle, si oportunitum videbitur, vel vino mellite, vel aqua marina, vel lixiuio dulci, vel aliquo magistrali decocto maioris, minorisue absterctionis. huius autem morbi essentia, lociq; natu- ra optimè inuestiganda est; si enim morbus abditus sit, sedes à daperienda est, eo instrumento, quod catoptræ à Græcis dicitur, à Latinis speculum anus appellatur; huiusce namq; partis affectus, si medica- mentis non cedant, manu, ac instrumentis pertractandi sunt; quando verò in propatulo fuerint, indica- tionibus necessarijs curandi sunt, nec manuum operationes pertimescendæ, cum dicat Hipp. non oisè-  
50 di rectum intestinum, vel ex fistula, vel incisione, vel etiam ex aditione, licet hæc graui videantur. si igitur in prædicto loco abiquis tumor suppuretur, & sanies appareat, statim incidendus est, ne vniuersa podicis pars suppuretur: non laudo tamen, vt omnino crudus incidatur; tunc enim inflantur, & maior sanies malè copia generatur, semperq; de fistulæ generatione pertimescendum est. Localia remedia huic parti opportuna sunt, quæ & naturalibus partibus sunt conuenientia. hoc autem summopere seruandum est, vt talia vlcera sepe sepius abluantur, & adstringentia sine morfu applicentur, quæq; sine inflamatione validè exsiccant, quemadmodum sunt, quæ ex cartha combusta sunt, vel ex cucurbita exsulta, vel èt ex anetho exsulto, maxime verò, quando multa superabundet humiditas; non minus etiam aliquando pollene, pompholy, vel picetæ cortex (ole, vel lapis emathites: maxime verò recentibus vlcibus prodest aloes exsiccatum, & in tenuissimum polinem redactum: si autem aliqua cauitas appareat, thus, & aristolochia addenda sunt: vlcera verò intestini eisdem indigunt remedijs, liquidiora tamen paran-  
60 da sunt, vt per syphonem injici queant, vel succo plantaginis, vel equiceti, vel cennodij, vel aqua mel- lis, vel marina, vel aluminosa, vel fibrorum, vel aurificum, vel etiam vino austero; emplastra autè hu- milinodi esse debent, vt p. vnguenti ex pompholyge, vnguenti albi camphorati, an. 3. iij. ol. mirrhini, ol. ros. omphacini, an. 3. j. manar, thuris, aloes, an. 3. iij. litargirij argentei, 3. j. fucci solatri, verbasci, plantaginis, an. q. s. misceantur in mortario plumbeo, & vnguentum S. A. vel p. cerullæ, spumæ argen- tæ, an. 3. iij. thuris, aluminis fissilis, an. 3. s. aloes 3. j. croci 3. j. ceræ 3. j. ol. mirrhini, an. q. s. vel p. plumbi exsulti, & loti 3. iij. spumæ argenti 3. s. lapidis emathitis, aloes, an. 3. j. s. tæxi præparatæ, corticis pini exsiccatum, an. 3. j. semen anethi exsulti, cucurbitæ exsultæ, an. 3. j. ol. ros. ompha- cini 3. iij. ceræ albæ, q. s. Hicce, & similibus remedijs sedis vlcera sanantur, quæ cancri non redolent natu-  
tura n



turam, nec morbi gallici, de his etenim proprio loco tractabimus.

# ADDITIO.

**S** Edes, præter prædictos affectus, alijs malis etiam infelatur, quibusdam videlicet fissuris, quæ ragades dicuntur: hæc autem fissuræ quædam sunt angustæ, longæ, in pelle exsistentes. præterea etiam lungo, qui à Græcis thimidi dicitur, apud Vulgares porrico nuncupatur; hæmorrhoidibus etiam, quæ ora sunt venarum, quæ turgescunt sæpè dolent, & ex his sanguis emanat, tandemque intestini procidentia, ex multa humiditate cum relaxante procreata. hic autem affectus pueri morbus familiaris est. de horum autem morborum curatione partim verba facimus, partim alio loco facturi sumus.

## De Vlceribus, & fissuris Manuum, & Pedum. Cap. XVIII.

Hippocr. de mor.  
pop.  
Celsus lib. 5. ca.  
p. 103.  
Aetius lib. 24.  
cap. 73.  
Paul. lib. 3. cap.  
79.  
Auc. 7. 4. trad.  
5. cap. 28.



**L** XORIUNTUR in digitis manuum, & pedum, & calce maximè puerorum, & hyberno tempore, vlcera quædam, à Græcis chimethla dicta, à Latinis perniores, communiter buganzæ nominantur, exoriturque prius inflammatio quædam sparsa cum acuto dolore. quæ ex se ipsa deinde exulceratur, absque sanie, aridæque fissuræ, vel vlcera plana, sicca tamen sine vlla digestionis sunt, stillant etiam aliquando humorem, qui in sui substantia pus, sanieque representat, illud tamen exiguum est. Affectus hic curatur in principio fottu aquæ gelidæ marinæ, vel decocto blitis, vel lentissimi, vel ex cataplasmate lentis in vino decoctis, & contritiæ, addita farina ordeacea, cum cera liquesfacta, & modico olei: vel decoquitur granata dulcia in vino nigro, & in tenuem massam redacta, cum vnguento rosato commiscetur, & madefacto prius infirmo loco ex decocto lupinorum, applicatur. si autem ingenti vexetur dolore, alterci succus, cum ordeacea farina, omnem remouet dolorem, ac inflammationem; maximo etiam iuuamento excipitur radix rapæ sativæ, & in medio cauitate facta, ol. lentisino impletur, ceræque citrina, & neque vase decoquitur aqua marina, vel muria, vel ex decocto lupinorum, vel aliquando etiam sub cineribus solum, liquefactumque: ceratum extrahitur, frigidoque vitæ dum. in perniores verò exulceratis, æ. thuris, aluminis scissilis, minij, resine terebinthinæ, añ. 3. iij. pinguedinis porcine s. vj. f. emplastrum: In hunc vsum commendatur ab Actio, Orisatio, & Paulo medicamentum exapharmacum, quod in hunc modum paratur, æ. ol. rosati. spumæ argenti, mellis, añ. s. vj. pinguedinis taurinæ s. xij. silicis, colophonie, añ. 3. iij. misc. laudant nonnulli etiam porcorum vngulas crustas, & puluerizatas. tandem emplastrum ex succo solatræ, vel ex palma applicitum, idoneum est medicamentum.

In digitorum etiam extremitatibus, propè vngues, caruncula quædam supercrefcere solet, maximo dolore, quam Græci perigion, Arabes dahalla appellant. Pterigion autem est excrecentia quædam carnea, vnguem concipiens, symptomataque inducens (auissima, sæpèque in pedibus fit, ex aliqua coram offensione, in manibus verò ex neglecta reditua, vel ex aliqua simili causa, requirit medicamenta siccissima, veluti adustum alumen, vel mercurium præparatum: vel liquefact alumen rotundum in aqua ad os sistentiam mellis, & in pari dosi mel addatur, bulliantque igne lento, quousque croci colorem præseferant, & vtere, vel æ. calthididis, corticis granatorum, squammæ aris añ. 3. ij. caricarum pinguium exustarum mu. 2. mellis parum, misc. vel æ. carthæ exustæ, auri pigmenti, sulphuris viui, ol. martialis, q. s. & f. vnguentum. si autem hæc non profuerint medicamenta, scalpello sæpè sæpius vtendum est, vel cantherio actuali. cauendum autem est, ne vnguis angulum perigion molleat, sed quamprimum scalpello remoueat.

In eisdem præterea partibus, exiurales quædam inflammationes exoriuntur, quæ maximè dolent, nec multum sunt eminentes, sed ita profunde, vt sæpè sæpius tendones, & ossa corrumpant. febre necessestario corripiuntur patientes, & inquieti viuunt, & quandoque spalmantur, & intereunt. Affectus hic parenichia à Græcis dicitur, ab Arabibus doggam, à Latinis rediua, communiter panarizzo, nuncupatur; huius cura est in principio, quæ in omni inflammatione conueniens est, idem in augmento, (statu, ac declinatione, omni tamen ingenio doloris mitigationi incumbendum est. præmissa igitur tenui dietæ, & vniuerso corpore euacuato, sectione etiam vcnæ, in principio affectus digitus in aceto calenti submergendus est, non tamen multum temporis spatium est detinendus, ex multa namque mora, periculum imminet, ne obstruantur cutis pori, materiesque discissioni difficilior reddatur; quare damnant nonnulli vsum aquæ frigidæ, & niuis. doloribus autem apparentibus, infundatur aqua calida in oleo communi, & vt prius digitus submergatur: si autem fississimi fuerint, mulceantur mucilagine sem. pilij cum aceto extractæ, opij addita portione: sed quia aliquando ex se suppurantur, & aperiuntur, imendum est, ne in vlcera maligna cendant, & ossa corrumpant. quare notanda ea erunt, quæ in tractatu sequenti de paronichio dicitur. Solent præterea digitos, volas manuum, & pedum, fissuræ multæ infestare, ab humore acri, & adusto procreatæ, quæ potius ragadum, quàm vlcus, naturam sapiunt, ædem etiam à vaporibus malignis exoriuntur. Animaduertendum autem, quodd quando nutrimenti fit cõmixtio cum atra crassaque bile, humor hic, cui grauis sit, deorsum tendit, in volisq; pedum fissuras tales

his procreat: quando vero flacca, smaraq; bilis cum alimento commiscetur, sanguine videlicet, eundē in manibus effectum producit, non autem in pedibus: quoniam enim levis sit hic humor, superiora petit. sim-  
ptoma hoc etiam ex ambientis aeris intensā frigiditate accidere solet. ex longo continuoq; labore, alii-  
cuiusque rei durā apprehensione; hifceq; temporibus ā gallica lue fīfīare: quedam sunt alibantes, squamofe,  
10 & abſque dolore, de quibus vno loco pertraſtabimus. Fiſſurę igitur, quę ab alijs exordiū  
cauſis, proprijs curandę ſunt indicationibus, contra humorum euacuatione, quę eas producere poſ-  
ſunt, victus humidi, & frigidi ratione inſtituta; & ſi nihil obſtet, ſecta vena, ſecoraria primū, deinde hæ-  
morrhoides aperiente. præparetur aduſtus humor longa præparatione, præmiſſo tamen aliquo minora-  
tio, vt ellectuario lenitio, vel diaſenne, vel conſeſſione Hamech; cui additur aliquando Hyera lo-  
godionis. pro præparatione autem, optimus eſt ſyrupus de fumaris, ex biſantij, ex epithimo, ex po-  
nis, ex cicorea, & ſimilibus, diſſoluſis cum aqua fumaris, lupulorum, vel lactis: quando autem in vris  
30 aliqua apparuerit concoctio, purgandis eſt præparatus humor, ex ſloribus violarum, bugloſis, bo-  
raginis, añ. ꝯ. s. prunorum ſolutorum, vel damaſcenorum, iuiubarum, ſebelſen, añ. ſu. vj. tamarindor-  
um vnc. s. ſennę vnc. ꝯ. epithimi ꝯ. iij. polipodij vnc. s. liquiritiz ꝯ. ij. paſſulorum vnc. ꝯ. mirabolano-  
rum Indorum, citrinorum, añ. ꝯ. ij. ſem. ſenliculi, macis, cinamomi añ. ꝯ. s. f. decoctio S. A. cuius  
exhibeantur patienti vnc. l. iij. cum ſuccharo in aurora. In hunc eundē vſum iuuat decoctio epithimi Mel-  
vel Rafis, vel Autic. quę mirabiliter operatur in euacuatione humorum aduſtorum, & melancholicorū;  
Valent etiam pilulę de fumaris, Indis, aggregarijs, & de lapide lazulis ſuo autem ꝯ. j. ſennę præparę  
exhibere ſolemus in iure, vel ſero; præparatur autem in hunc modum, ꝯ. ſoliorum ſennę vnc. ꝯ. zin-  
30 ziberis vnc. ꝯ. tartari vnc. ꝯ. ſalis gemei ꝯ. ij. macis ꝯ. j. ſcamonei præparati ꝯ. xv. miſce, & f. pul-  
uſis. Idem operatur diatribis, hoc modo præparatum, ꝯ. turbiſ albi, & gumofi, hermodactilorum  
añ. ꝯ. j. zinziberis, maſtici, gariophylorum, galangę, cinamomorum añ. ꝯ. s. diagridij, aniforum añ. ꝯ.  
miſce, & f. pul. Euacuato corpore, decoquantur ſolla caulium rubeorum, & maluarum, & ex hoc ſu-  
ſumigio inſcaleſcant rimę, & vngantur cum ſorace liquida, ſpuma argemę, & vnguento ſoſato, vel de-  
coquantur medulla ſeille in ol. mirrhino, ca autem optimę expreſſa, addet tandem terbenſcinę, &  
30 & pinguedinis caprę in dimidia quantitate, & f. emplaftrum; ſed ſi rimę, maxime in calce, inueteratę ſue-  
rint, ꝯ. calcis viarę ꝯ. x. ceruſſę, cerę añ. ꝯ. x. x. pinguedinis lullę recentis vnd. vj. colophoniz vnc. l. ij.  
ol. ſem. lini vnc. ꝯ. s. olei communis vnc. x. miſce, & f. lenimentum S. A. Exoriuntur & in calce vi-  
cera quedam conſula, maxime ex longa morā in lecto, quę medicamento ex ſpuma argenti, oleo ſoſa-  
to, & cerā in pari portione curantur; vel vnguento ex ceruſſa, vel ex palma ꝯ. Accidunt præterea, pue-  
40 ritates maxime, vicia quedam in manuum, pedumq; digitis, cum carie offis commixta, quę ſpincę ven-  
toſitates appellatur, de quibus vno loco pertraſtabimus.

In Anzilor, cap.  
de melicobolia.  
1. ad Almazin.  
cap. 13.8 f. 4.  
trac. 3. cap. 10.

## De Cutis excoriatione. Cap. XIX.



50

Vitis à Gracis derma appellata, in superficie leuiter exulcerari solet, vlcerque purissimo, absq; cauitate, duritie, vel aliquo accidenti, hic affectus à Gracis apothoma dicitur, à Latinis excoriatio, vel erodio, oritur à laboriosa causa, quæ ex incommodo attritu pellem erodit, vel ex contactu rei duræ, vt equitando, propterea ambulando, & similibus extrinsecis causis: Intrinseca vero causa, sunt humores acres, acuti; sepe sæpius ex aliqua crisi concurrentes, corpore cacochimo existente, valida virtute humores ad cutem detrudente. hæc passio quando inter coxas dicitur, & ex longo itinere prouenit, vel ex asperiori vestitu. modus autem curatione plectorio existente, euacuat, venas aperiat, si opus fuerit, non existente con diebus canicularibus, victus præterea tenuis iniungatur. si namq; noua luboratur morus cancrene, maxime vero, quando multa fuerit excoriatio, vel cum aliquo accaliquando enim ex causâ excoriatio accidat, & talis periculo non vacat. quare dicent Medici in excoriationibus humorum fluxum, & inflammationem, quare non cum sed curare debet, sed & viscera principalia ab omni nocumento præseruanda, præmittantur, locoq; affecto defensionum aliquod applicetur, cuiusmodi hoc est, terre sigillata, sanguinis draconis, añ. ʒ. j. cere rubæ, spodij añ. ʒ. ʒ. acetii rofati añ. vnc. j. cere rubæ parum: si autem fuerit leuis excoriatio, sufficit applicatio quod isti ex ceruilla, vel ex litargirij crudo appellatur, vel ex plumbagine, vel ʒ. v. vnc. j. sandalini vnc. s. litargirij argentei, plumbi vili, ceruillæ añ. ʒ. iij. succi plantarum, oil: mirrhini, añ. vnc. s. agitentur omnia in mortario plumbeo ad consisten- tiæ ablatione fuerit opus, præparatur decoctio ex ordeo, rosis, lenibus, plantagine viri, vel falcis ea vero remedia applicentur, quæ epulotica dicuntur, idest cicatri- quod inflammationis vestigium apparcat, iterum vena lecectur, & fiat cataplasma ex iulijris, plantagine, farina ordei, ac fabarum, cum oil: mirrhino, & roscaco: si autem sit cutis, aliquaq; pars pendeat, non statim detruncanda est, sed agglutinatio ten-

Gal. 3. & 4. Ma-  
tho.  
Act. lib. 14. cap.  
13. & 17.  
Paul. lib. 4. cap.  
14.  
Axi. 3. f. 1. doc.  
1. cap. 4. & 4. f.  
4. tract. 3. ca. 9.  
Gal. lib. de agra  
do.

tanda opportunis medicamentis, vel etiam sutura, si autem nigra appareat, omnino incidatur: si verò 10  
articuli attriti, vel flagellis excoriati fuerint, vniuersa curandi ratio consistit in doloris remotione, idcirco anodina medicamenta applicita conueniunt, inter quæ alia emplastrum ex ouo à Paulo commendatur, quod in hunc modum paratur, &c. ceræ vnc. j. litargij argentei, cerussæ, amili, añ. vnc. ij. ouorum 10  
nũ. q. ol. ros. vnc. xij. omnia simul bulliant, ouis exceptis, quæ in fine adijciuntur. Excoriationes verò, quæ in calce fiunt ex vestimenti orum duritie, curantur applicito pulmone caprino, vel fusillo, vel etiam agnino, vel &c. cineris calciamentorum veterum adustorum, cucurbitæ adustæ, ol. rosati, ceræ citri-  
næ, q. s. vel &c. excrementi plumbi, cerussæ, litargij argentei añ. vnc. j. ordei torrefacti, amili añ. vnc. s.  
succo psilij, ol. mirrhini añ. vnc. j. ceræ q. s. & misceantur. laudatur etiam emplastrum cerularum, ex 10  
camphora, ex succo solatri, & palma: vesicæ autem, quæ ex adstrictis medicamentis eueniunt, aperien-  
dæ sunt, deinde aqua rosacea foudendæ, & vino nigro, & tandem medicamento curandæ ex licio confec- 10  
tio, bolo armena, gallis, cerussæ, & oleo rosato; morbus hic in senibus inueteratur, habent enim par-  
tes illas à calore remotas, nec descendunt præterquam crassæ humiditates, & melancholicæ, quapropter  
sepe cachoetica vlcera eciadunt, & cum difficultate sanantur.

## De exustis ab oleo, vel aqua feruenti. Cap. XX.



CCURRUNT diuersæ exustiones ab oleo, vel aqua feruenti, supra membrum ex-  
pansæ, quæ vesicæ multas produciunt, & membri gignunt inflammationem, inten-  
sum causando dolorem; In hoc affectu accidunt vesicæ, non crustæ, quemadmo-  
dum in exustis ab igne: non enim ab agente calido & humido, cuiusmodi est olei, 30  
& aqua feruens, consumitur innata humiditas, quemadmodum in agente calido  
& siccato, vt est ignis, imò ab oleo, & aqua attrahitur tenues humiditates, & vapo-  
res, maxime verò quando exurit membrum molle, alteratur, & inflammatur, &  
quæ humiditates ad pellem penetrantes, pro eius densitate retentæ vesicæ, & huiusmodi ampullas ge-  
nerant, quæ acri, tenuiq; humore replentur; siq; fit, vt ab oleo, & aqua feruenti huiusmodi ampullæ  
inducantur, non autem ab igne actuali, qui intempera sui caliditate, & siccitate humidum membri substanti-  
ficum consumit, & crustam inducit, à Græcis escaram dicta. Oleum, & aqua, omnesq; consumitis sub-  
stantia ebulliens, inflammationem in membro inducit, intemperatumq; reddit, ignis verò corrigit, om-  
nesq; intemperantes effectus remouet. harum aduersionum aliquæ sunt simplices, & superficiales, aliquæ  
verò amplæ, & profundæ, sæpeq; sæpius venas, nervos, cordaq; patientium afficiunt. Accidunt hæc di- 40  
uersis corporibus mollioribus, nempe & delicatis, necnon duris, ac laboriosis.

## P R A X I S.

P Rima indicatio, quæ in aduersionum curatione occurrit, est vesicæ prohibitio, quo minus fiat; secunda  
est loci vesicati regimen; tertia est loci vlcerati, post vesicæ curationem, curatio. Prima indicatio  
perficitur his medicamentis, quæ ampullarum generationem impedire possint, cuiusmodi est emplastrum  
ex sandalis, camphora, & aqua rosata. aduertendum autem est, ne exsiccet medicamentum, sed sæpe  
sæpius immutetur, vel locus pannio, aqua frigida, vel rosata madefacto cooperiatur. prodest itidem  
oui albumen, cum aceto, & oleo rosato commixtum, quod operatur etiam portulacæ succus, lactuca,  
solatri vermicularis, & alterci, addita aliquando chimolea, cerussæ, & spodio: nos autem sæpe experti 50  
sumus, & felici cū successu, caulium rupeorum succu, vel lutum illum tenellum, quo sub dolis in cella vi-  
naria reperitur, vbi vini guttæ cadere solent: idem etiam operatur & atramentum scriptoriũ: mel itidẽ  
& per se, & cū succo lenium commixtum, maxime iuuat, itidem & milij farina, affecto loco insper-  
sa: factis autem pusulis, in principio nõn sunt dirumpendæ, sed his diutius perseverantibus, dirumpun-  
tur, exiens autem humor, citrinus, & virulentus erit, statimq; cataplasma tale est imponendum. &c. so-  
liorum maluarum, sichæ, violarum añ. m. j. decoquantur in aqua, & contendantur, & adde litargij  
argentei, climæ, cerussæ, plumbi, añ. vnc. j. ol. ros. mirrhini, pul. coriandrorum, farine ordei añ. vnc. ij.  
misc. it. autem vlcusculum aliquod remanserit, vel excoriatio, huius medicamen, inquit Rasis, est vngue-  
tum ex cerussæ, quod in hunc modum paratur, &c. ceræ optimæ colatæ partem vnam, olei rosati partes  
quatuor, cerussæ quantu capiant, miscetur igne leno: quando verò refrigerari incæperit, adde albu- 60  
men oui, agitando, donec spissescat, & in fine adde camphoræ parum, hoc autem est emplastrum albũ  
camphoratum, quod melius est remediũ, quam fuerimus experti: In corporibus verò mulierum, vel  
puerorum ab antiquis huiusmodi remediũ commendatur; bulliant internæ sambuci cortices in oleo ro-  
sato, vel etiam communij, & facta diligenti expressione, adde ceræ albæ, & pinguedinis hircinæ añ. q. s.  
iterum bulliant, & adde cerasæ masticis añ. q. s. ad mellis consistentiam: Secundum autem Dioscoridẽ  
paratur medicamentum ex succo caulium, cinere tamaricis, cerussæ, & oui albumine: vlcere autem iam  
perfecto, celebratur emplastrum ex calce, quod varijs modis perficitur: Iuxta Rasm recipitur calx  
viva, & munda, & super eam imponitur aqua, vt cooperiatur ab ea, & ita per duas horas maceretur;  
deinde coletur, denuo aqua imponatur, vt prius; quo per quatuor vices prædicto, refrigerare permit-  
tarur,

10 tatur, & adde ol. ros. & agitur in vase, quousque vniantur. Secundum Aetium verò hoc modo paratur, ꝑ. calcis viue decies extinctæ, & aqua frigida ablutæ, deinde exsiccatæ vnc. iij. cerussæ lacte ablutæ, ꝑ. calcis viue, & septies lotæ, quousque omnem mordacitatem amittat, deinde in ol. rosato cura modica cera mactetur, & adde chimolæ, albuminis oui, & vini modicū. Alio quāmodo paratur ex cōde Aulic. ablutur septies calx, deinde cum folijs sicchæ, & caulium, & ol. rosato f. vnguentum, & oleum autem, & omnia mineralia ablucenda sunt, vt ab omni mordacitate expellantur. Inquit Hipp. si morbus magnus fuerit, vel cum inflammatione, si opus fuerit, sanguis erit mirtendus, & corpus medicamento lotuendum, & dicta attendenda; præterea vicinæ partes inungendæ vnguento rosato, vel oleo violato, vel omphacino: vt autē pulchra suberiat cicatrix, locus vino albo tenui ablutur, in quo decoctæ fuerint rosæ, plantago, & equisetum cum modico alumine; deinde torrefiat hircina pinguedo, & dentefq; guttæ in vino demittantur, supernatans autem pinguedo refrigerata colligitur, & adde litargirij argenti, & cerussæ q. s. pro inunctione.

Lib. de comp. medicam. en.

q. f. a. trad. 2. cap. 14.

De partibus combustis igne actuali. Cap. XXVI

30 **S**i sanum membrum ab igne contingatur, vel à corpore denso exuratur, continuo escara apparet, quæ iuxta maiorem, minoremue adustionem magis, minusue in corpore imprimitur. ex vehementi namq; calore cutis porri aperitur, substatiscisq; humor ex excessu ignis siccitate consumitur, vnde exaruit, & exsiccat; locus in escaram conuertitur. escara namq; est pars pellis, & substantiæ carnosæ, propria humiditate, ex violento calore, destituta, quare exusta & sicca remanet pars, in eam porra verò progressu, subrescente carne, vel naturæ impetu, vel humidorum medicamentorum virtute recedit, & a carne separatur.

P R A X I S.

30 **C**orporum, necnon adustionum, varietas multa reperitur; corpora namq; robusta minus offendunt, medicamentaq; ferunt fortiora, imbecilliora verò corpora contrario modo se habent; facies præterea pulcherrimam cicatricem requirit, in manibus; puerorum maxime aduertendum, ne digitus simul coalescat, quemadmodum in infimissimè accidit: in articulis verò summa diligentia vitandum, ne articuli voluntarium motum amittant, in omnibusq; partibus attendendum, ne turpes reddantur cicatrices; hæ autem primæ sint. Medici consideraciones in adustis, quibus aliquando, doloris mitigatio, & fluxionisq; prohibitio: si igitur morbus sit morbus, corpus est euacuatum. omnium integrum contulim in principio parti affectæ est applicandum, vel obbanum in aqua dissolurum, vel linter in aceto decoctæ, vel bolus armena cō aceto, & oleo mi rhino: In doloribus autē excessibus opportunū est remedium vnguentū ex calce abluta cerussa, albumin & oui, & lacte, addita opij portione, vel fiat emplastrū ex endiuia, farina hordei, luto oui, & oleo rosato, vel ꝑ. ol. rosati crudi vnc. vj. ceræ vnc. iij. liquefiant lento igne, & adde calcis viue, septies lotæ vnc. ij. cerussæ lotæ, litargirij argenti añ. vnc. j. lactis muliebris vnc. j. albuminis ouorum nu. s. opij ʒ. ij. rolic. Qui autem, pro doloris sedatione, leuissidissimè vniunt medicamentis in adustis; longè aberrant, tali namque qualitate obcluduntur cutis porri; nec calidi vapores exhalare possunt, quare augeatur dolor, & magis asstingitur æger. quapropter, dicebat Paulus, in adustis ab igne, hisce vtendum est remedijs, quæ non in ense refrigerent, nec manifestè calefaciant. Scribimus autem hoc emplastrum mirabili modo prodite testatur, cum autem ego sum expertus, nullum præstans, tutiusue reperi; applicarum namq; ledet dolorem, summaq; celeritate leuatur, affectumq; sanat: cōficitur autem hunc in modum, ꝑ. sp. argenti, pinguedinis suillæ, ceræ añ. vnc. vj. luteorum ouorū assatorum nu. 6. quæ sunt contundenda, cera, & pinguedo liquefenda, deinde litargirium puluerizati, & oua confusa sunt addenda, emplastrumq; fiat. Quia autē affectus aliquando altè penetrat, crustæq; admodum sunt profundæ, tardeq; remouentur, remedia sunt adhibenda, qualia sunt butirum, vel porrum elixum, vel malua decocta cum axungia porcina. crustis autem semotis, vlceris sunt abstergenda medicamento, quod omni mordacitate careat, quemadmodum si reciperemus succi plantaginis, apij añ. vnc. j. syrapi rosati simplicis, farinæ hordeacæ añ. vnc. ij. pulueris corticis thuris ʒ. ij. lutei ouorū nu. 1. ceræ q. s. quando verò mundum apparuerit vlcus, regatur medicamentum à nobis expertum, ꝑ. ol. rosati crudi vnc. vj. ol. ex luteis ouorum vnc. ij. vitri albi subtilissimè pul. vnc. j. corticum interiorū sambuci m. j. bulliant omnia, deinde coentur, & adde ceræ q. s. & f. vnguentum optimæ consistentiæ. in reliquis vlceribus, vlcerum planorum more, curandum est. pro cicatrice verò remouenda laudatur ol. ex virellis ouorum, ex cera, ex melle, & ex frumento; iidem vnguentum ex pomo citri, vel alabastrinum, vel asinina pinguedo: si autem frigus sit color, ꝑ. pinguedinis suillæ depuratæ vnc. ij. ol. ex luteis ouorum vnc. j. ceræ ablutæ vnc. v. lacæ optimæ ʒ. ij. succi limonium parum, & cū modica cera f. lenimentum.

Lib. de comp. medic. decept. 225.

# LIBRI TERTII. TRACTATUS QUARTUS. IN QVO DE FISTVLIS ABSOLVTE TRACTATUR.

## De yniuersali Fistularum natura. Cap. I.

Cl. lib. de mem-  
bris. c. 4. &  
s. ad Glor. c. 1.  
& s. propo. &  
lib. de diff. med.  
Aetio lib. 14.  
c. 33.  
Cl. lib. 9. de  
officiis.  
Pauli. 4. c. 49.  
Aluisc. & Theo-  
roscorum. c. 9.  
Aluisc. lib. 1. c. 11.  
Ant. c. 14. de ac.  
3. cap. 11.



**N**TIQVI Scriptores de fistulis pertractantes, earumq; natura, aliquando à forma ita describere, dicentes, fistulam esse sinum profundum, callo obducum in parte carnosa; aliquando verò à forma, & accidentibus simul desump-  
tere, ut puta à profunditate, angustia, & callositate, dicentes, fistulam esse si-  
num profundum, angustum, & callosum, sensu expertem, à quo pauca, vel nulla  
apparet humiditas; saepe etiam à temporis antiquitate describere, præcipueq;  
quando sinus male fuit curatus, & quadragenarium pertransiuit diem, aiuntq;  
fistulam esse sinum, inueteratum, angustum, & callo obducum: Nos verò ve-  
ram fistulae essentiam, non in callo solum, non in antiquitate, consistere arbi-  
tramur, sed in forma sinuosi viceris, angusti, & callo obducti, ab vno pluribusq; sinub, male curatis exor-  
diens. Diuiditur fistula in nouam, & antiquam. Noua, quæ videlicet nuper est facta, ab Arabibus tro-  
chemen appellatur, est sinus altus, angustus, non de facili ad sanitatem deueniens: Antiqua verò fistu-  
la, quam Arabes Risati appellant, est sinus altus, callosus, sensuq; priuatus: ex quibus patet, sinum hoc  
loco generis vicem gerere, angustiam verò, & profunditatem eius differentias esse, cuius gratia à sinu  
simplici, alijsq; viceribus abditis, & cauernosis, fistulae formam referentibus, sinus, quem Græci  
colpon, Latini sinum appellant, originem ducit, quotiescumq; sæpe sepius in suppuratis humoribus  
pus renouatur, parsq; ita excoriatur, & dilatatur, ut multoties pure euacuato, pristinam unionem acqui-  
rere non possit, & distantia, & cauitas remaneat, quæ si citò carne non impletur, callosa fit, & tempo-  
ris successu in fistulam degenerat, quam Græci syringam vocant, Arabes verò Zuchemen: Callus ve-  
rò ab omnibus cognoscitur; est enim caro quædam continua, alba, humore priuata, & per consequens  
absq; dolore, vnde quaq; sinum cingens, nec venam habet, nec neruum ad eam attinentem, euenit autē  
propter antiquitatem callosa. Quatuor reperiuntur profundorum vicerum differentia, sinus videlicet,  
abditus sinus, cauerna, & fistula. Cauerna est vicus flexuosus, & sub carne dilatatus: fistula verò est vi-  
cus sinuosus, & profundum, angustum, callosum, exigui sensus, non multæ humiditatis, & tardæ cō-  
solidationis. In quacumq; corporis parte fistula exoritur, quæ per metaphoram à canis sic nominatur,  
Fistula dicebat Galab eius figura sic dicta est, eò quia fistulam, musicale instrumentum, imitatur,  
illud verò est instrumentum longum, angustum, & concauum; id eò dicebat Auic. Omne  
vicus profundum, in quo indurecat caro, em cingens, fistula nominatur, & est veluti  
arundo, membrum penetrans: si verò prædictam formam non seruauerit, & oc-  
ciderit caro, sinus abditus, vel absconditus, vel secreta dicitur. Duobus  
modis vlcera callosa deueniunt, quando scilicet humores ad partes  
decumbentes, diutius ibi retinentur, cum inde nec fecioci, nec  
superati fuerint, vel euacuati, & si euacuentur, sæpe reno-  
uantur, maxime verò quando fuerint crassi, præte-  
rea quando interiora vicerum labia callosa eu-  
dunt, & dura, propter natium calorem,  
vel extraneum etiam, à quo sæpe vi-  
cera afficiuntur, vel ob appli-  
cata medicamenta, quæ exsiccandi vim habeant,  
& tenues partes resoluendi, & humiditas,  
crassis, & duris rema-  
nentibus.

Cl. lib. 9.  
Pauli lib. 5. c. 77.

Cl. lib. 9. apoc.  
p. 10.  
Aluisc. lib. 1. c. 11.  
p. 10. p. 10.

De causis Fistularum, & quomodo generentur. Cap. II.



**L**ISTULARUM causæ in vniuersum, iuxta peritiores Medicos duæ sunt, altera interna, antecessens dicta, vt humorum expulso ad ignobiliores partes, à virtute, corpus nostrum regente, per crism tacta, vel etià ex accidentalì motu, à quo abscessus exoritur, qui postea in sinuosum vlcus conuertitur, vel causa, vel malè affecti corporis gratia, malis humoribus scatentis, vel ob Medici imperitiam, vel ob ægrotantis intemperantiam, malumq; vicijs regimen. quod vlcus, si per longum temporis spatium producat, quàm sanetur, profundū euadit, angustum, & callosum, & fistula nuncupatur, hic idem morbus ab vlcere etiam sicco cauetico, quaq; in membro intemperato, tendonibus, venisq; scatente, vel circa articulos, vbi corrupta ossa reperiuntur. Secunda verò causa, vel primitiua, vel euadens dicitur. facileq; cognoscitur: extrinsecus enim accidit, vt puta si gitta aliqua, vel globulus corpori infusus; hocq; in pectoris, articularumq; vulneribus apparet. Idem etiam ex mala cura accidere potest, vel ex imminuti abscessus incisione, vel ex pauca cauatorum vicerum absterfione, vel ex aliqua re præter naturam in abscessu relicta, vel Medici imperitia, vel ægrotantis timore sinus accidit profundus, qui contracto callo, conuertitur in fistulam. quare dicunt Medici, si aliquam aperueris exturam, idq; omne euacaueris, quod in ipsa reperitur, sinum diligenter absterge, eiusq; citam agglutinationem procurato, ne denuo renouetur materia, intrusq; occalleat, nec vnio nem consequi possit, antecedentiq; exituræ similis euadat, & tandem in fistulam conuertatur. Accidit etiam aliquando, vt vlcera ad sanitatem deuenisse videantur, deinde ob paucam absterfionem reuertantur, quod si accidit sæpius, in fistulam desinit. multæ sunt aliæ causæ, quæ vlcera sanata difficilia reddunt, vt per consequens in fistulam conuertantur, vt boni sanguinis penurias, vnde malitias, & mala affecti mē bri complexio, malus interiorum viscerum habitus, maximeq; nutritioni. simulantium, ossa alterata vel erosa, vel ab aliqua occulta dispositione affecta, vt quotidie in cacocidis gallicis viceribus apparet, malum ægrotantis regimen, Medici imperitia, tarda q; manus applicatio. Hæc omnia mali habitus vlcera reddunt, quæ facile (cum sinuola sunt) in fistulam conuertuntur.

De varietate, & signis Fistularum. Cap. III.



**I**n singulis humani corporis partibus, diuersisq; ex causis, fistule oriri solent, vlcera nē pē alta, angusta, & callosa, & singulis in partibus quid habent peculiare. earum verò differentia, multæ sunt, aliæ namq; simplices, aliæ verò. vel cum alio morbo, vel cum propria causa, vel etiam cum aliquo diuerso symptome sit commixta; simplicium nonnullæ parue sunt, aliæ verò profundiores, nonnullæ rectā carnem penetrant, aliæ verò per transversum, pleræque autem tales sunt. præterea nonnullæ ab vno orificio originem ducentes, duplices, triplices euadunt, & in plures sinus diuisantur: aliæ verò flexuosæ, & in pampani vicem retoræ: nonnullæ etiam faciles sapē sanari, nonnullæ difficiles, & multæ incurabiles. harum omnium aliæ sunt nouæ, aliæ verò inueteratæ; hæc autem iam callum perfecerunt, aliæ verò duriciem solum quandam: quandoque etiam ab antiquis fistulis quædam sunt sanies, ea q; diuersa, ratione affecti loci, quando scilicet in ossē est corruptio, vel pars est nervosa: sæpe etiam omni humiditate sunt expertes. Cognoscuntur fistule, earumq; progressus ex disposito stilovante omnia igitur stilus est imponendus, vt innolescat, & quò pē figat, & qualis, quæ sit humiditas, quæ effluit, vel proorsus sit omni humiditate inenunis; cognoscitur autem fistula argenteo, vel plumbeo stilo. vel etiam ex cera (vt magis flexibile sit, & magis cuiusq; sinui accommodetur) cognoscitur præterea, an vnus pluresue sint sinus. Cum igitur stilum immiseris, si quod extrinsecus tetigeris, in molle videatur, affectum intus penetrare erit indicium: si autē, durum, & tenens, si se videatur, illud os esse, poteris coniectari; si stilus delabitur, ipsum nondum erosum esse iudicatio; si autem modo adhaereat, ipsum leuiter erosum esse erit indicium; si inæqualis appareat, magnam esse viq; corruptionem credendum, cariēq; alius penetrasse: cognoscitur autem, an fistula in vnam, vel plures diuidatur partes, ex purē ipso: cuius si maior appareat copia, quàm simplici sinui conueniat, plures sinus esse credendum est: præterea fistula in sola carne exiens pus album, lenē, & copiosum reddit: ab ea autem, quæ nervosam partem occupat, pus quidem albu, tenuius tamen, emanat; in minori etiam copia. præterea etiam quando neruum afficit, pus crassum, oleoq; persimile excidit; quando verò os penetrarit, coloratum pus, & nigricans, retriq; odoris reddit, à quibus etiam fistularum loca, spatia, & documenta cognoscuntur. Idem cognoscitur etiam ex iniecto vino, vel simili aliquo decocto, eo instrumento, quod solent Chirurghi luringam, clistere oriculare, cotenchitam, clapedram, canalicros, & pilulam appellare; à lotionis namq; exitu natura, fistularumq; conditionis cognoscitur, an simplices, an verò diuersos habeant sinus. hoc idem ex corporis situ cognoscitur, sit enim aliquando, ut situate corpore aliter, quàm prius erat, multa saniei copia exit, quæ prius cessauerat; un-



de facili colligitur alterum esse finem, à quo derivat, ipsum tamen aliam corporis partem occupare. In uniuersum igitur signa fistularum ex ingredientibus earum substantiam, ab accidentibus eas concomitantibus, maximè verò ex situ, figura, numero, magnitudine, & excrementis desumenda sunt.

## De signis prognosticis Fistularum. Cap. IIII.

Hipp. l. de fistu.  
R. de cras. pri.  
not.  
Cel. l. 7. c. pro.  
Paul. l. 4. cap.  
77. de l. 7. c. 4.  
Aulic. 4. l. 4. m.  
3. c. 1. R. 10.  
Aul. l. 1. c. 100.



ISTARUM simplicium, recentium, & carnosas solummodo partes occupantium, curatio facilis est, maximeq; ad hanc conducit iuuenilis ætas, robustum corpus, & optimi habitus: contrario modo se habent fistulæ lacerata, antiquæ, & in corporibus mali habitus, antiquis, & melancholicis. ea iidem mala sunt, quæ laceratorum capita offendunt, vel venas, vel arterias, vel articulos, vel ossa. pessimæ præterea sunt, quæ spatia, concava; loca occupant, pectus videlicet, ventriq; inferiorem, quæ iidem viscera offendunt, pulmonem, uterum, venas, vel grandes arterias, & intestina: mala enim fistula est, quæ ex calli duritie, non sentit, nec in ea aliqua reperitur humiditas: quanto verò magis sensibilis est, & antiquior, tenuisq; exit humiditas, colorata, & odoris ingrata, tanto magis est maligna, curatioq; difficilior. præterea quæ est prope aliquod principale viscus, timorosa est, crudelia namq; inducit accidentia. Antiquæ etiam, & multæ profunditatis, lethales sunt; latera namq; earum, vel medicamento, vel igne, vel ferro sunt eradicanda, ut possint curari; id autem timorofum valde est, si ibi, præsertim prope, venæ, vel nervi reperiuntur. Ea fistula incurabilis est, quæ vesicæ ceruicem perforauerit, vel huj articulum, vel ad rectum intestinum pertingit; cum difficultate etiam curatur, quæ occultum habet orificium, sæpe autem reuertitur, vel etiam, quæ ad os pertingit, vel in varios sinus, & multa spatia diuiscatur. Sæpius etiam ex symptomatum vehementia, & excrementorum natura prognostica desumuntur; dolor namq; intensus, nervosas partes affici de monstrat; sanguis stillans veniam aliquam corruptam esse demonstrat; si tenuis exeat humor, obliquus; & fatens, os corruptum esse manifestum est: qui affectus male carnis intemperiei, cum tumore conatus est. Aliquando desumuntur prognostica ab ægrotantis habitudine, melancholicæ namq; complexionis, maliq; sanguinis vlcera contumacia patiuntur, quodd hydropicis, maliq; habitus corporibus accidit. Fistulæ, quæ senioribus accidunt, propter eorū siccitatem, sanatu sunt difficiles: quæ verò pueris ob immoderatā humiditatem, sicut & quæ mulieribus, & iunioribus accidunt, ob eorū exquisitū sensum, difficili reperiuntur. Tortuose fistulæ, & obliquæ, multarumq; canituum, difficiles sunt, cum non facile possint medicamento applicari, ut vnamq;que partem attingant. In ventre nullum os reperitur, fistulæ tamen huiusce partis ita sunt perniciose, ut Solitarius insaniabiles indicauerit, oriuntur fistulæ loquocunque, omnesq; vlcus, quod sanatur, deinde reuertitur, facile in fistulam degenerat. dicit tamen Hipp. fistulas sæpe peioris morbi remedium esse.

Cel. l. 7. c. 4.  
Aulic. 4. l. 7. c. 4.  
p. 1. de l. 7. c. 4.  
morbis.

## De modo curationis Fistularum. Cap. V.



In omnibus præternaturalibus affectibus curandis, communis est Medicorum observatio, uniuersalia prius applicare remedia, deinde ad particularia deuenire. pro altero igitur generalium remedium, conueniens diæta iniungenda est, de qua ex abundantius superius loquuti sumus. pro nunc aduulsi sufficiat, an multis scateat corpus humoribus, an pletoricum sit, & vno tantum abundet humore, an verò cacochimū sit, ut conueniens possit adhiberi remedium, pro euacuatione abundantia humoris. cum verò languinis ad sit copia, vena secetur, vnaq; diæta instituitur, fistulaq; pro eius natura gubernetur. Victus igitur ordo esse debet, ut opusimum corpori apponatur alimentum, morbisq; qualitatibus contrarium. In euacuationibus autem à fortitudine virium suspendenda est indicatio, & fistulæ situ: si enim fistula à visceribus erit remediis, vomitus opusimum est præsidium: si verò anus orificio, purgatio est infesta: sed de hisce obseruationibus proprijs locis sumus verba facturū, pro nunc sufficiat hoc in generali tetigisse. hisce peractis, plumbeo ululo, cereæque candela, qualis, quantæque sit fistula, est indagandum, quæ sit profunditas, & quis sit eius progressus, quisque sit finis, si humore scateat, siue sicca sit, si aliquo sit concomitanti accidenti, cui prius sit attendendum, deinde fistula curanda: cui operationi quatuor sunt necessarie indicationes. prima est causarum remouio. secunda opportunorum remedium ad hanc operationem inuentio. tertia est accidentium tam præsentium, quam futurorum propulsio. quarta est, ut ita fistula consolidetur, ut non amplius reuertatur. Prima indicatio consistit in tocius calli remotione, vsque ad fundum: quod periculi non potest, nisi orificium, vel ferro, vel igne dilatetur, vel lichenijs, à Græcis themata, à Latinis pericidia dicta, quæ ex varijs materijs formantur, nunc ex tela lini, nunc ex spongia bene compressa, nunc ex medulla cinarum, forgi, vel ebulli, vel sambuci, nunc ex radicibus gentianæ, vel aristolochiæ, vel bionizæ, vel dictami, vel dragonis: hæc autem penicilla, vel lichenia in fistulam immissa, nisi calli inueniant, præ humiditate incrassantur, & ita pedetentim angustum orificium dilatare valent, absq; dolore; quare deinceps melius possunt applicari.

- 10 plicari remedijs, ut fundum attingant, omnemq; duritiem, & callum consumant, ossa corrupta patefaciant, vel varios sinus, causas occultas, & putredines, ut ea Medicus facilius removere possit. Si autē callos impediāt dilatationem, remouetur ferro, vel igne, vel caustico medicamento, & quia se cito in angusto loco, ut fistula existit, parum est tuta; idcirco de hac paucam fecerunt antiqui mentionem. Igitur autem operatio licet præclarior, tutum, & nobile sit remedium, adeo iū homines perterrefaciāt, ut pauci huiusmodi faciliē subeant remediū, de hac igitur pertractabimus, cū de cauterijs verba faciemus. Inter fistulas igitur nonnullæ duriori callo obducuntur, nonnullæ verò tenuiori. antiquæ duriores habent callum, & medicamenta requirunt valentiora: qui verò tenuior est, benignioribus etiam remouetur remedijs. Faciunt pro tenuioris calli remotione spondilij radix circumcirca abstrahit, radix veratri nigri, asphodeli, serpentarij, & brionij; pulvis atramenti sutorij adfusi, hydrargirium præparatū, auripigmentum; cortices etiam pini, nucum, cartæ combustæ, radicem filicis rubæ, & bocinorum; succus præterea cucumeris agrestis, veratri, timali, virga aurea, & theriaca; mullum præterea, vinum videlicet mellite, aqua aluminis, sublimati, decoctum lupinorum, oleum ex calcite, ex sulphure; troscisci ex alumine, asphodillo, minio, & arsenico. præterea damascenum vnguentum, isis, cerascos, ex centaureo, ægyptiacum, & cauteria: hæc igitur, & similibus remedijs, tum simplicibus, tum compositis fistularum calli absumuntur. quæ si ita altè penetrent, ut remedia fundum attingere non possint, & si tunc ruosæ sint, multorumq; sinuum, maius in manuum operatione inuenies iuuamentum, quam in medicamentis. si igitur cutim permeent, stilus est intromittendus, & super ipsum aperiendū, si in multa spatia, ramulosq; distribuuntur, eosq; in pampani modum retortos, eodem modo etiam incidendū sunt: cum autem ad finem fistulæ ventum fuerit, callus omnino est detruendus: si autem virum in os desinat, ad secus hic non aliter, quam manu, curandus est, longoq; temporis intervallo, si tamen ex le os non decidat, vel eius squama. cum igitur hoc pacto terminauerit, hæc medicamentis est procedendum, q̄ callum, osq; remoueant, vlcusq; agglutinent. Pro sunt aliquando simplicibus vlcibus portiones nonnullæ, ut puta, & agrimonij partes tres, plantaginis partes duas, foliorum oliuæ partem vnam, incidantur minutim, & contendantur, & in vino albo decoquantur. vel & ossis mundi, quem isti filicem appellant, partes tres, gentianæ partes duas, centaurei partē vnam, decoquantur, ut prius, & colentur, & in aurora poculum exhibeatur.

De Fistulis lachrymalibus. Cap. VI.

- 40 **R**ORUS naris, in angulo interiori, vel domestico oculi, locus, quem Græci encanthis appellant. Arabes almacheni, vel almaseni, sæpe tuberculis quidam inflammati, & valde dolens exoritur, hunc Græci anchilopa, Arabes asilio, vel bacilo nominant, qui faciliē in abscessum degenerat, vesicamq; inducit, quæ disrumpitur, vlcusq; ostracofium generat cacoete, paucæ profunditatis, & fistulæ, à Græcis ægiropa dicitur, ab Arabibus garab, & algarab, Latine fistula lachrymalis. hæc, vel ob carnis tenuitatem, quæ ibi reperitur, vel ob continuum pituitæ fluxum, vel ob oculi vicinitatem, quod malè adaptentur medicamenta, ut permanent, vel quia os eo loci corruptum, varicisq; perforatæ cum difficultate sanentur. Aliquando (dicebat Celsus) fistula cancri redolet naturâ, quando videlicet turgentes venę sunt factę, fuscus color, pellis dura, & ex leu tactu indignatur, in partibusq; continuis inflammationem inducit. horum vlcum ea, quæ ad cancerum iam deuenerunt, cum periculo curantur, mortem namq; accelerant. Fistulæ ad nares declinantes incurabiles sunt, ita etiam, qui in interiore angulo oculi expurgantur: earum verò, quæ extrinsecus sunt, quantò magis orificium oculi angulo est prope, tantò curatū sunt difficiliore, angustus enim locus est, quem Medici manus pertrahere debet, facilius tamen est cura, quando vlcus est recens. Solent aliquando tuberculi quidam exoriri in oculi angulis, qui vnde quaq; moventur, nec vnuquam suppurantur, sed in numero sunt glandularum, & diutius perdurant. Abscessus balne partes occupantes, aliquando extra oculum, aliquando intus, aliquando ambobus in locis disrumpuntur; sæpe etiam humorum accredo, & acuties ossa corrumpit, & ad os rurius cauitates pertingit; corroditur etiam palpebræ interioris cartilago, continuoq; multa puris copia molestat, & in oculi inflammationem inducit. Hæc fistulæ, quæ iam sunt inueteratæ, vel maiora loci intemperie committit, vel humidiora capita nanciscuntur, vel mulieres, puerosue infestant, vel criticè oriuntur, sæpeq; inuoluantur, cum difficultate sanantur.

P R A X I S.

**Q**ui in oculi angulo vel inflammationem, vel abscessum patiuntur, caput inclinare non debent, nec varijs cibis repleri, nec vino, carationisq; principium à corporis euacuatione exordiri debet. quare, cum nihil obstat, vena secanda est communis, ab opposito brachio, deinde corpus expurgandum, vel hyera, vel pillulis cochij, vel assaiareth, vel sine quibus. quia autem morbus in longum aliquando protrahi solet, necessariò consequitur, ut materie multæ, crassę, & indigestæ abundant. quare, præmissa minoratione, residuum præparetur, coctionisq; signis apparentibus, præparata materia euacuetur.

De Vlcib. Lib. III. Tract. III. V 3 hoc

Elib. 7. ca. 88.  
et 4. ca. 229.

Cel. l. 7. c. pro  
prio.  
Gal. 3. loc. 7.  
Aet. l. 3. c. 85.  
Pauli. l. 1. c. 37.  
Ruf. l. 1. libello.  
cap. 34.  
Aet. l. 4. c. 22.  
S. C. 14.  
Albu. l. 2. c. 19.

Auen. 1. chalt.  
trac. 2. c. 16.

Auen. 1. c. 3.  
trac. 2. ca. 19.

p. 87.

Gal. de comp.  
m. secund. loc.  
l. 7. de comp.  
m. per genera.  
Scribitur de  
fist. 1. 109. Gal.  
5. libr. in lene.  
Pamab. 7. cap.

Archigenus in  
medic. Alclepa  
des in 3. enter.  
lra. de tactu  
quintiliani, l. 1.  
l. 2. de Regimen.

p. ad Alcap. 30  
lib. de fistula  
cap. 14. in aut.  
In, dist. 1. 19  
Auct. 3. 1. 10.  
p. cap. 1. 10.  
p. 1. 1. 1. 1. 1.  
vlt. de colono  
al. 1. 1. 1.

Lib. 1. cap. 19.

Gal. lib. 7. cap.  
p. 87. 100.

hoc interim sedes inflammata. & dolens apocrofticis regatur medicinis, nempe quæ fluxiones inhi-  
bere possint; nam sapè humores talis hoc methodo discuti solet. quare ex Aet. commodum erit infi-  
dium, cum pustulis, aut tuberculis apparere ineperit, adhibere fuscum siluestris portulacæ, aut temper-  
uini, aut saltem oculi albumen conuulsum cum vino nigro austero: si verò inflammatio periculerare videa-  
tur, ea, quæ diffundunt temperatè, competere videntur, expoliata nempe omni mordicatione; nam  
acria medicamenta dolores irritant, & inflammationem commouent, ob id ab antiquis probatur em-  
plastrum barbarum simplicioris temperaturæ, aut ex salice. aut diaphanis, Asclepiadis emplastrum.  
p. obibani, miltibz, ceræ p. 3. iij. aluminis plume, coaguli leporis, spume niri añ. 3. ij. laudani 3. j.  
omnia subtilissimè triturantur, & cum oleo irino paretur emplastrum sub bona forma: si inflammatio  
medicamentum superauit, & ad suppurationem deuenit, opus est omni celeritate vomica fieri,  
& aperire, ne periosiosus à coluicæ laniola corrumpatur: at si tarda fuerit humoris concoctio, aut qua-  
crassius, aut quia etheregenius, cum maturis caricis pingues cum assungia gallinacea, fermento, & cro-  
co, aut medulla panis cum semine marubij, olibano, & mulieris lacte. aperto abscessu, materia ro-  
ta euacuetur, & linus, si expediat, ablatur decocto rosarum, mirtilorum, rodometæ, & vino nigro, &  
si qua adeit cruditatis, aut durities, præparetur vlcus medicamento ex terebentina, ouiluxco, corticibus  
thuris, & rodometæ; albsitgerat postica emplastro damasceno, aut iside, aut cerasæos; repleatur post-  
modum vnguento aureo, aut citrino: postremò cutis inducatur cerato Græco, aut iuxinio, aut dia-  
phincine: cumq; pluries materia diuersa ex noua fluxione in eo sinu innouetur, aut praua adhibetur  
chirurgia, fistula ibi oritur vnâ cum suis essentialibus conditionibus: quod dum occurrit, considerare  
oportet, quanta sit eius penetratio, & profunditas; an tantum carnosam partem occupet, vel os tere-  
dine afficiat: nam recenti re in carne tantum, mederi facilius est: attamen, vt ait Auic. canon in cura-  
rab est perfecta mundificatio. ergo primò specillo mensuretur. secundò aliquo ingenio dilateur vici-  
ad inum. tertio callus ex toto tollitur, & omnis mala temperatura absumatur: callus verò tollitur,  
si debilis fuerit, alumine liquido, aut cinere vitæ cum recenti stercore columbino, & aceto, aut aloë, ni-  
tro, & vrina pueri, ex Gal. scilicet exsiccat, & caluaria humana in puluerem redacta: nos verò hy-  
dragirium præparatum perpetuo felici successu administramus: si durus, vnguento ægyptiaco, aut tro-  
cisco illo celebri de minio, aut ex Auic. pra fidio tali. sumatur arsenici rubri, atramenti, cantaridæ,  
calcis, salis ammoniaci, aluminis cum æquali portione; terantur omnia cum vrina pueri, & siccentur: ve-  
rum hæc, quia cauteria sunt, modeste, & cautè administranda sunt. consumpto callo, inde citò tali pul-  
uere sanantur, p. mirrhæ, sarcocollæ, aloës, corticum thuris, memite añ. misce, & fiat pulvis subtiliss.  
qui vsq; ad vlcus finem peruenire possit. & stude, ne medicamentorum subtilitas ad oculum tran-  
seat. Quare, vt docet Auic. si fistula profunditate habet, inuoluatur radius cori in medicamento  
submerso, & ponatur in fistula, siue sit medicina currens, aut pulvis: & est tale administratur medicamē,  
stringatur cum panno, & adhibetur quies. sed quia multi patientes sunt, qui nullo modo cauteria ad-  
ministrare videntur, aut timore doloris, aut quia oculum amittere credunt. Ideò, dicat Auic. in his  
exprimat, si fistula humiditas omnis diaerit, & vino nigro stiprico abluatur, postea secetur, & instil-  
letur inus collyrium algarab, quod Maumeth, Zacharia filius, suæ inuentionis attestatur, hoc à Rasi  
plurimis in locis probatur. Ait ipse, medicamen, si adhibitum fuerit, lacrimalem fistulam per multos  
menses adeo tardare facit, vt arger sanus videatur. sic paratur, p. aloës, thuris, sarcocollæ, sang. dra-  
conis, balauit. anisuiouij, aluminis añ. vinar quantum est quinta pars vni, fiat ex his fief. cumque  
necesse fuerit, fistula adeo exprimat, vt quicquid parulenti saniei in ea continetur, egrediatur: deinde  
li tres, aut quatuor guttes inijciantur, magno excellentie interstitio inter projectionem vni guttis, & al-  
terius, quo factò, per tres horas æger quiescat; in sequenti die pariter summo mane fistula bene pre-  
mat, & eadem fiat cura per vnâ hebdomadam sic agendo: aut tandiu, donec fistula ex toto exsicca-  
ta fuerit. huiusmodi præfidia in pura, recenti, & carnosâ affectione contere possent; in antiquata,  
aut alio morbo adfecta ad acriora deuenire oportet. igitur si os iam carne vexatum est, fistulam ad inu-  
vsq; dilatare oportet, & carnem omnem malam absumere, inde os totum dubitatum cooperire, quod  
si eius cortex, aut superficies tantum alterata fuerit, quæ viriliter exsiccant, adhibeantur, nempe atra-  
mentum sutoriorum, vel calcitis, vel ærugo rasa: aut, sed cautè, oleum de sulphure, aut ex calcitide,  
oculo, & cæteris iunctis partibus bene obiectis: si verò hæc aliquid fuerint suspitionis, os abraderè  
oportet, donec tota nigredo absumatur, & hic est primus Auic. operandi modus: porro quia af-  
fectus in angulo est, in loco concauo, & angulari, res difficillima est, & magno labore celebranda, nec  
communis icalpra, siue raspaoria adhiberi possunt, sed ea magis probantur, quæ ab Albucasi, lunata,  
aut asperi capitis vocantur. pariter & quæ duabus albis secantibus munita sunt. Dum instrumentū  
ad os peruenit, & vnâ tantum manu hincinde auoluitur, nigredinem, & omnem alterationem destrue-  
re porcit, quod fit, & citò, & tutò si verò teredo manifesta esset substantiam occupauerit, & morbus  
nigredinem transierit, opus est os totum cauterio ignito adurere, & hic est secundus modus operandi,  
quem clarè antiqui probantur, afferentes ante hanc operationem necessariò tres præcedere operationes,  
quarū prima est, ne oculus laedatur, ideò aliqui, vt Hifac, iubent, vt oculus argenteo coaleari coope-  
riatur,

- 10 riat. Actius, & Avic. cum spongia frigida aqua madefacta, aut liuteolo lineo nudo infuso, Iesu hali cum fermento frigido, Albucasis cum bombace in oui albumine confuso madido, aut in piluli macilagine nos verò vna cum recentioribus, stupis oui albore infusis contenti. lumen, aut acci o rosato: aut vino nigro stipitico. His praedit ad secundam considerationem transire opus est, nempe ne oculi angulus destruarur; si quidem consolidandus non recipit, aut turpis remanet cicatrix, & ne hoc sequatur incommodum, oritur tertia consideratio, & est instrumenti forma, & substantia, ac operandi ratio, & in hoc omnes Albucasis sequuti sunt. Ait ipse, quando foras fistulam cum eo, quod diximus in divisionibus aegritudinum, & non confert duratio tua: tunc oportet, vt cauteri: res ipsam secundum locum. Praecipue infirmo, vt ponat caput suum in sinu tuo, & teneat caput eius minister inter manus: suas taliter, vt non moueatur, neq; agitur cum capite suo. deinde fac, vt oculus, & eius vicina loca sint bene obiecta, & tunc fac igne cauterio, aut ex auro, aut ex ferro Iudo, quod radioli formam praefert; & ne oculi offendat, cinnulo eger, quod longitudinis medietatis vnus digitus esse debet, aut encu, aut ferreum, grossitudinis vt decet: cumq; operando cauterio vt volueris, exprime fistula ab omni humiditate, & caesice ipsam, inde canululum intromitte sic, vt ad os perveniat, quod cauterio optime ignito vehementius adurendum est, & inclina manum tuam cum cauterio ad partem oculi, sic vt eius ignitae extremitas inclinet ad partem nasi, & distet ab oculo, & nō erret manus operantis in hoc, ne oculi angulus laesetur, & inquietetur infirmus, si vno cauterij adactu os aduritur, fac erit; sin minus, cum bis, & ter reiterare oportet, donec novitas os ex toto siccum esse, statimq; lana, aut stipula oui candido imbuta applicetur, totaq; regio circumvicina vnguento rosato Mesues liguatur; in sequentibus postmodum burrum cum lenticula, donec eschara eeciderit, adhibeatur, cumq; os aditum cicerit, quod interdum tardius evnere solet, curatio sequitur eadem, quae in ceteris vlsis. Alter cauterizandi modus apud seniores reperitur, qui, eo quia non sine timore est, a modernis non probatur, per canululum dragmam vnam plumbi liquetati super os indudebant, diligentia multa adhibita, ne plumbum liquefactum ad oculum penetret; plumbum enim, ait Albucasis, comburitur locum fistulae, & sanat ipsam sanatione mirabili si fistulae duae bus his praedictis suffragij, nempe medicinis, aut cauterio cedat, bonū est, & terminus quadraginta diesi est illi non tunc necesse est os narium terebris perforare, & fistulam ad nasi cursum reducere, & haec est tertia via, quae garab-curari solet. cum ergo scopoptrum fuerit os, eum tebrato, vsq; quo ab ore, & naribus, aut sanguis, aut pus emanaverit. operando caue, ne ascendas cunaterebro ad superius, & cadat perforatio in capsula oculi; siam inde nullum sequetur beneficium. sit igitur perforationis progressus ad nares: cumq; penetrauerit perforatio, obcuratis naribus, & ore manu infirmo, ab orificio & aer, & humiditas diuersa exire, & videtur, & feritur, ibiq; postmodum perpetuus & internus sinus residet, ab Arabibus arisan vocatur: postremo exterius vlcus consolidetur, siquidē omnis humiditas, quae continuo ibi gignatur, per nares expurgatur, & minus patientem molestat, & vlcus curationem recipit. facta igitur optima loci mundificatione, aut ut iubet Avic. leui adulatione, tale ex Galeno ad Hierc mentem, adhibeatur remedium; 3e. mirrhē, calcitis, añ 3. vj. aloes, thuris, aluminis plume añ 3. vij. aristolochiae, galae imature añ 3. vij. malicorij contriti 3. x. mis. & conundantur subleisidone, & arida uirore, aut cum cera fiat vnguentum, saepe idem facie emplastrum palmarum, aut diacadmias, aut Græcum.

De Fistula Maxillatum. Cap. VII.

- 30 **I**n inferiori maxilla, tuberculus, siue parvus quidam tumor exoritur, qui ut plurimum ad suppurationem devenire solet, & ex eo fit vlcus curatu difficile, ob id quia passissime cum ossis terebine complicatur, cui perpetuo dentis dolor praecedit aliquis, ac tractu temporis in fistulam permutatur, quae cum corruptione radiis deitis annexa est; quare, nisi dente extracto, curationem tentare non oportet. & si interdum vlcus ad sanitatem devenisse videtur (quod perinde recidivum facere solet) saepe vidimus, quod nonnulla vlcum cicatrice obducta frequenter, haud magno temporis intervallo iterum inflammatione tentant, rumpunturq;: si qui dem ossē quodam affecto interdum caro circumdata ex facili cicatricem recipit, ac facit ex toto esse videtur: verum cursu humoris valido paulatim ex ossē in alto contabescente, tum inflammatio, tum pus oboritur, quod cicatricem deradit, & vlcus innovatur. hac ratione harum fistularum curatio est, vt os affectum decidat, & vt patiens dente priuetur: memini, dum publico stipendio Feltriae essem stipendiarius, quendam iuvenem curasse Vallis Iuganę, Georgium comitē, nominatum, ac ex nobili familia natū, qui absq; vilo dentis dolore annis iam tribus menti vlcere vexatus fuit, & quamvis complurium medicorum ope vsus fuisset, non deprehendentibus illis morbi causam, sanitatē consequi minime potuerit: at cum aliqui alium, & callosum vlcus viderint, citra vlsionem nequaquam tolli posse affirmabant, alij quia callosa vlcus habebat orta, chrynone eum esse credebant, & ob id omnes curatu difficillimum arbitrabantur: verum cum ad manus nostras se contulit, & fistulę naturam, & locum consideravimus, nullis id malum medicamentis vinci posse praediximus, nisi dente cum eius cariola radice prius evulsio, sic

Cel. lib. 6. cap. 11. & lib. 7. ca. 11. p. 10. Ars. lib. 8. cap. 11. p. 10. Pan. lib. 4. ca. 11. p. 10.

enim dentes extrahere iussimus, & eius terebinthina radicem inspicimus, & non multis post diebus, 10  
remoto vlcis callo, restitutus sanitati est. indicium huius affectus erat pus multum ab vlcere profusum.  
si patiens forte fortuna dentis euulsionem non admiserit, caries tota candenti ferro aduratur; inde ea  
peragenda sunt, quæ in cura aliorum vlcum similium probantur.

## De Fistulis Thoracis. Cap. VIII.

Col. 1. y. ca. 4.  
Gal. 3. de opp.  
anar. 6. inter.  
cap. 4. r. inter.  
cap. 1.  
Gal. 3. metho.  
cap. 2.  
Ausc. 4. q. 17.  
3. cap. 2.



Vt post tumorem pituitosum, aut calidum, absque methodo curatum, aut post tho-  
racis vulnere penetrante, in pectore, aut dorso, aut lateribus vlcus fistulare rema-  
nere solet, quod cacoetes est, idest difficilis consolidationis, id ve magis si ossa  
sternonis, aut spina, aut costarum male affecta fuerint, vt illi adolecentulo marul 20  
lo occurrit, qui cum scetus esset, cordis motus manifestè patuit, & tandem sanatus  
est; facillimè dignoscuntur, sed difficillimè sanantur; partes hæ perpetuò mouentur;  
sed cauitas plurimis superuacaneis superfluitatibus repletur; vapores, & spiritus mul-  
ti non sine crepitu, ac humiditates variae cum tussi per vlcus exire solent, id ve magis retento aere. sim-  
plices fistulae remoto callo tuto curantur, nempe præsidij omni mordicatione expoliatis: quæ verò aut  
tredine, aut prauo alio symptomate complicantur, nisi ad puritatem, & temperiem deuenierit, sa-  
nari nequeunt, egent studio, ac solerti operatore; ob id, quia affectus prope primum membrum oc-  
currit; si in interiori parte, vbi lacerti quamplurimi, ac venæ locantur, timere oportet; si in dorso, vena-  
rum, articularum, ac nervorum copiosa, res absque discrimine non est: si costas pertranstrit, sæpe septum trā-  
suerit, confidendum sunt, vt si non iuuent, saltem uou noccant: porro si aliqua opportuna fuerit di-  
latatio, turundarum operatio magis, quam ferrum, probatur, si ossis corrupti remotio, abraas magis, 30  
quàm cauterium, laudatur. pro curatione harum fistularum, lotiones exteriùs adhibita, & potiones  
interiùs assumptæ competere videntur: præcedant quippe hæ operationes exquisitæ corporis secundū  
indigentiam euacuationes, ac viuat modus, qui qualitatibus aduersetur, curatione prohibentibus. potiones, q̃  
in his affectibus probantur, sic parari solent, ꝑ. arimonij m. iij. foliorum plantaginis m. ij. foliorū oli-  
uæ m. j. centaui. m. i. erinodani m. s. contundantur grosso modo, & bulliant in vino albo, donec tertia  
vini pars euanuerit, coletur, & adde mellis albi s. vj. iterum parum bulliat, & da summo mane patien-  
ti s. viij. huius decocti tꝑidi, aut ꝑ. centaui. m. m. j. minois pimpinellæ, betonicæ, equiseti, garioli-  
latæ, eritrodani, agrimonie, hedera terrestris añ. m. s. fiat decoctum in vino albo: cui adde mellis cla- 40  
ri s. xij. da huius syrupi patienti quotidie in mane s. vj. lotiones verò, quæ in pectore per syringas,  
aut iniectionum impouuntur, vt tota eius cauitas abstergetur, & exsicceetur, & vt omnis tollatur immundi-  
ties, sic fieri solent. paretur primò hydromel, postea mulsu, vltimò tale decoctū, ꝑ. valerianæ, garioli-  
latæ, caudæ equine, pilosellæ, salbiæ, rosarum ru. centaureæ m. i. confolida, millefolij, eritrodani añ. m. s.  
fiat decoctum in vino montano claro, & adde mellis albi odorati s. x. mifcæ, & coletur, & iterum adde  
de mirrhæ, aristolochiæ, lirii os. 3. ij. parum bulliant, & vtet, toties vultus, & cauitas abluendo, do-  
nec lotio clara exierit, tunc. n. indicij est, pectoris cilibanum inanitum esse; sic enim procedendum est, vt  
quequo materia ex toto fuerit exsiccata.

## De Fistulis Ani. Cap. IX.



Pud extremitatem intestini longæonis, siue recti, locus, qui sphincter, & podex  
nuncupatur, sæpe inflammationes, & tubercula oriuntur, aut post chronicos affec-  
tus ob aliquam crism, aut post longas equitationes, aut remigaciones fatigat-  
as, aut quocumq; partes, quæ ano proximè sunt, aliqua exercitatione atterun-  
tur, aut fortiter contunduntur, aut vulnerantur, aut dolores hemorrhoidales, aut va-  
riarum superfluitatum retentionem, quæ per eam scdem expurgari solitæ erant, pa-  
tiuntur, aut ob nimiam corporis repletionem, aut causam occultam, quæ, aut  
ex mala medendi ratione, aut patientis timore, qui opportunitatem sectionem non admittit, sed vomit-  
cam, & vltimam maturationem, seu potius seminalam corruptionem expectat, in fistulas permutatur; 60  
quarum altera simplex est, idest tantum in carne consistit; altera verò non simplex, idest penetrans in  
intestino, aut componitur cum alio morbo, aut diuersa causa, aut non solito symptomate: porro quæ  
penetrat, aut ambiens, siue anularem musculum super equitat, qui totam intestini extremitatē cir-  
cumposuit, cuius officium est exitum sacrum retinere, ac anam perficere ab eis expurgare aliq; verò sub eo  
terminantur. In simplici fistula sæpe expedita curatio est, vt supra explicauimus: quæ autem in ex-  
tremo intestini, & sub lacerto ipso sunt constitutæ, non multo labore, & sine periculo, sanantur: Timo-  
rosæ verò sunt, quæ aliè progrediuntur, & supra lacertum transieunt intestinum perforant: quæ  
altius terminantur, tantò magis timendæ sunt, nec sanitatem recipiunt, si diuersimodæ, aut plurimis si-  
nibus, & officijs sunt munitæ. earum, quæ non penetrant, aliq; sunt multæ profunditatis, aliæ tortuo-  
sæ, ac

Hipp. 1. de fistu-  
lu. Col. 1. y. ca.  
4. Gal. 3.  
Act. 1. 14. c. 7.  
Paul. 1. 6. c. 7.  
Ausc. 17. 3. ca.  
9. 1. 18.  
Ausc. 1. 3. ca.  
8. 1. 18.  
Gal. 3. de med.  
mancipantur.

- 10 *sc.* ac pampiani modo procedunt, alię ad dorsum, alię ad matricem, alię ad vesicam, alię peritonęum ver-  
sus inclinantur, quę omnes longo egent orationis tempore, ac Medico magnam negotium facessunt :  
dantur & ani fistule latentes, eorū ore non apparere dolor ipsis oboriatur, & purulenta humiditas per  
anum expurgetur : verum plurima abscessus indicia præcellerunt, & digiti impositione facillimę diagno-  
scentur. Communiter sedis affectus magis in manu, quàm in medicamentis, præsidia expectant, & ma-  
xima cum difficultate sanantur. primò ob eius nimium sensum, quare ab omni medicamento acri, & au-  
stero irritatur, & inflammationem excitat. secundò, quia calis est immundarum superfluitatum totius  
corporis, quę interdum biliosę, & mordaces sunt. tertio, quia Chirurgi tempus determinatum non  
habent, in quo tuto opportuna medicamenta adhibere possint, locus inuicis est, & quotidie patientes  
diuersimodę, ac horis varijs aluum expurgare tenentur. quartò, est affectę sedis habitudo, calida nem-  
pę, & humida, in qua etiam perpetuò excrementicę humiditates congeruntur. quintò est motus por-  
dici, qui crebro constringendo, & dilatando dimouetur. sexto est situs decliuis, ad quę continuò varię  
desunt humiditates, & id magis dum malę afficitur, & dolore tentatur. duo possimã indicia mani-  
festę penetrationis habentur, vnum ab exuentibus sumitur; nã materię tenues, coloratę, & fetentes  
exire solent, interdum feces, aut earum odor, aut lumbrici, aut ventositas rugiens, aut res comestę, vt  
vuarum acini, aut granatorum semina, aut res similes. dignantur interdum ex specilli plumbei, & aut  
candelę cereę, aut recentis alij caulium ex Hipp. aut fetę porcine. ex Paulo, impositione exterior, & di-  
giti indicis interior, præsertim sinistrę manus, nam specilli extremitas digitum reperire solet. & hæc ve-  
ra est methodus in fistulis, quę per rectam lineam intestinum offendunt: sed quę tortuosę, & oblique  
procedunt, alio perquiruntur ingenio ex Albucasi, & Auic. nempe alicuius decocti, aut liquidi, & eur-  
reotis corporis impositione per iniectionem exterior, aut rectum siphonem interior, nam vtrobiq; cai-  
re potest. & hoc verum indicium est penetrationis.

P R A X I S.

- I N cura fistularum sedis, prima Medici indicatio est, scire, an ex tali morbo patiens aliquod commo-  
dum agnoscat: nam sepe affectus hic nullo modo curari debet, idq; magis si penetrans non fuerit, aut  
copioso fluxu humorum non affligatur, aut nimium fætoris non inducat; natura siquidem interdum  
per hanc partem multas expurgat superfluitates, & corpus a varijs symptomatibus liberat, vt in corpo-  
ribus mali habitus, senũ, & quę doloribus vexantur articularibus, aut hæmorrhoidalibus occurrere con-  
tingit. Aliquę etiam reperiuntur, quę rariũ præferuationem, aut palecium curationem exposcunt,  
nempe antiquę, ostracose, aut quę in carcinomatosis naturam transferunt: quę verò regularem curatio-  
nem desiderant, sunt fistule simplices, recentes, & quę partem rariũ occupant carnolam, hæc quip-  
pe multis medijs, ac indicationibus curari solent. Porro cum tuberculus, aut paruus tumor ani orifi-  
cium occupat, eius vitium maturacionem expedire non licet; sed crudus aperitur, non tamen tanta  
cruditate, quòd nulla reperitur sanies; sed aperitur, antequam ad intestinum suppuret: vlcus in-  
desiccat & ceteri suppurati phlegmones, regatur: si verò fistula, aut vlcus fistulare simplex apparuerit,  
in quo callus exquisitus non reperitur, sat est interdum vino maluarico cauitatem ablucere, & iside  
medicamento, aut hydrargiro præparato callositatem tollere, vt sinus vel glutinarius, vel impleri possit.  
si validiori opus fuerit medicamento. hat lotio cum aqua marina decocta cum bordeo, & alumine,  
& parum quid viridis aris; postmodum lichenium cum ægyptiaco imponatur: consumpto callo vl-  
cus, vt cetera, regatur: si autem fistula alicuius fuerit profundioris, aut angustę, expedit orificium dila-  
tare. commodè quidem, ac sine molestia, & timore, aut turundis diuersimodę paratis, aut terro, sic  
vt medicamento ad inum vsq; peruenire possint. igitur in hac demisso specillo, ad vltimum eius caput  
incidit cutis debet, si alitè peruenire intra sedem, & fistulę terminus demissũ specillum percipiat; par-  
tes enim, quę molles sunt, facillè sinuantur, atq; eroduntur, & hoc interdũ facius est, vbi fieri tuto possit,  
cum magis medicamentum admittant, & inde facilius glutincentur fistulę, quę hac ratione & cultro in-  
ciduntur, quàm quę topica tantum a callo vindicantur: sed quia in profundis fistulis, aut diuersorum  
sinuum, operationes aut admodum dolorosę esse solent, aut longum requirunt tempus; igitur, vt iubet  
Gal. in huiusmodi casibus ab ægotum requirendum est, an tardius, ac sine magna molestia: an cele-  
ritius, & cum maiori tormento sanari malit: qui verò ex timore dilationem non admittunt, lotionibus,  
& vnguentis curari debent. & Arabes omnes collisio algarab. de quo supra, vbi, cū de lachrymali fistula  
ageremus, multa explicauimus, mirum modũ cõmendant, præsertim vbi fistula proximè ad intestini tu-  
nicam accedit, quę nondum tamen percola est, sed integra manet, aut ad vterum tendit, vel ad eius cer-  
uicem, aut ad vesicam: tunc enim dolores atroces percipiuntur, & interdum locij expurgatio prohibe-  
tur, aut ad os sacrum, aut ad coxę acetabulum, vbi multę, ac diuersę humiditates perpetuò desunt.  
& tunc ait Albucasi, non datur curatio omnino, & talis est vanitas rei, & labor stulcorum Medicorum  
curare cum vnguentis: quare ad fortiores operationes transire oportet. & quod in rectis fistulis magis  
probat, cauterium actuale est: cognoscere igitur primò eorum profunditatem oportet, deinde accẽ-  
das cauterium radiolarum, iuberoq; preparari serraamenta septem, aut octo magnitudine palmi, crassius  
dine specilli crassi, quorum aliqua in summa parte reflexa sunt; deinde incromite ipsũ ignium in  
fistula

Gal. 9. de corp.  
m. & comit. l. c.  
vbi de vitiis se-  
dis. & 6. de s. o.  
loc. aff.  
Ausc. 17. j. d. m.

Ausc. 17. j. d. m.  
p. 12. 30.

Hipp. l. de fistu-  
la.  
C. 17. c. 30.

Albu. l. i. c. 18  
l. a. c. 12.



Lib. 7. cap. 19.  
14. Meth. c. 17  
6. Meth. c. 6.  
Lib. 6. c. 73.  
Lib. 17. c. 86.  
Lib. 1. cap. 86.

Hipp. lib. de fist.  
Cel. l. 7. c. 4.  
Aet. l. 14. c. 10  
Fon. l. 6. c. 78.  
Aur. 19. j. ca.  
p. 139.

fistulam, & itera super eam cauterium donec omnia eius latera comburantur, nempe semel, aut bis, aut ter, prout opus requirit. & caue, ne nerui, aut venæ magnæ adurantur, nec aulus sit super cauteriũ, nisi quando fistula est in parte carnosa, absq; penetratione: sed quia hæc curandi ratio nec semper tutâ, nec absq; periculo adimpletur, communiter non approbatur. & ideo dicebat Albucasis, quod fortasse sanatur cum cauterio: de quo nec Celsus, nec Paulus, nec Auicenna vllum verbum prodiderunt, nec nos ipsum probamus, quia difficile, & timorofum est. Quare ad aliud ingenium transire expedire, & est eius totalis diuisio vsq; ad intestinũ, ferro scilicet secare, quam summè probat Galen. lib. qui medicus, siue introductio vocatur, & huic operationi duæ præcedunt consideraciones. prima, vt musculi ipsi anularis non lædatur, & id. quod primò concipitur, adimpleatur. secunda, instrumenti opportuni forma, & magnitudo: porro varietate sunt formæ, & vario modo ab antiquis hincupantur, & Celsus manubriolum, à Galeno, & Paulo, quia formam tenet cucuram, aut feminarum, scolopomachetion; aut quia facit ad secandas fistulas, quas Græci stringas vocant, syringohomon; & Aetio accicula vocat, & ab Albucasi sparuen curuum. resupinato igitur homine, li infule extremum in summitate sublabitur, specillum per orificium demittatur, superioque cutis simplici linea excidatur. simplices igitur fistulæ, administratione hunc in modum adhibita, facile curantur, præsertim si callus non multo prominat, nam medicamenta commodè adhiberi possunt: secus verò tortuosæ, aut quæ labyrinthi modo flexuosæ sunt, aut antiquo callo induuntur: cumq; fistula ad intestini corpus deuenerit, ac ipsum sancti inuenerit, nisi secetur, curationis modus minimè datur; quare totum intestinum vsq; ad eius cauterium, secare oportet; nam sicca, & densa est eius substantia, quæ augeſcine conglutinari potest, ideo vna cum supraciente carne secare oportet. nam, dicebat Hipp. lib. 6. de hemorrhoidibus, rectum intestinum, & secans, & refecans, & consuens, & vrens, etiam si grauissima hæc esse videantur, nihil læseris: ob id accommodatum instrumentum est illud, quod semiparam Paulus appellat. Cum verò fistulæ tam intestini substantiam perforauerit, eam totam secare oportet, quod duobus modis perficitur, nempe laqueatione, aut sectione. laqueatio à Medicis communiter describitur, & in hunc modum ab Hipp. perficitur, linum erudum quàm tenuissimum, & palmi longitudinem tortum, in specilli stanei perforatam caudam coniungendum, ipsumq; specillũ in fistulam demittendum, eodem autem momento sinistræ manus index dignus in anum indatur, & specillum, quom occurrat, educat, extrema parte inclinans, cum quo lini caput extrahitur, quod in id coniectum erat, & cum altero capite bis, aut ter vinciat striâ. hæcenus quotidie coarctari, atq; inorqueri linum debet. in hoc verò præcepto homini, vt se ipsum fecerit: si verò linum putrefcat, antequam fistulæ excedat, alter similis laqueus ex seta alligetur, triquetusq; vinciat, seta enim non putrefcit. probant hanc Hipp. deligaturam & Celsus, & Paulus in his, qui timentisulli chirurgiam fugiunt. interim autem licet negotia agere, nempe ambulare, ac cibum capere, perinde atq; sanissimo: sed committendum non est, vt linum putrefcat, sed seruo quoq; die nodus resolvendus est, & ad caput alterum recens linum alligandum, ac in fistula cum simili modo retinendum. sic enim id paulatin cutem, quæ supra fistulam est, incidit. Hæc curationis ratio longa est, & ideo fieri poterit, vt ad scalpelli curationem tutò veniendum sit: nam, vt ait Hipp. bono sanus non fit, si non secetur, cuiusli liquidem fistularis, aut falscular, siue fauculis ab hoc parantur: vt vno adactu totam fistulam secare possint. eorum vñus talis est ex Hippocrate, expurgato toto corpore, vt decet, aut sanguinis missione; aut pharmaco bilem ducente; nam ex sectione nihil accidet, quàm dolor, & inflammatio: quæ si corpus, ut conuenit, purum fuerit, æquæquam ad scalpellum veniat, vel nulla, vel leuis admodum inflammatio superueniet. propterea inanio intestino à stercibus, & lumbricis, ubi priore die purgatorio medicamento purgasti, sectionem aggredere: ac homine supino reclinato, & puluinar sub lumbos subiecto, & podice subleuato, vt in conspectu bene veniat, sedem quàm maxime per digitum indicem sinistram foras extrahito, inde per fistulam cuticuli radiolum impositum, donec ad digitum, qui in ano est, peruenerit: qui cum radioli extremitas inuenierit, cum lætendo versus anum ducar, ac dextra manu viriliter falsculam impellendo, in causa est, vt cuticuli actus tardus, & citò totam diuidat fistulam, musculum, qui anum constringit, sphincter dictum, ubiq; vitando; nonnulli si quidem rudius, dum in ano sectionem molirentur, ipsum consuluerant, atq; inde inuolutura stercoris excreto homini accidit, & hæc horum affectum vera curatio est. Aliqui instrumentum, quod ad sedem diducendam sit aptum, dioptrion Græci vocant, prius in sedem imponebatur, vt fistula os interius clarè appareret. hic administrationis modus à multis reprobatur, cum ex eius impositione operatio magis adumbretur: nec laqueatio multum laudatur ob id, quia & incientes dolores, & ardentis inflammationis commouet, aut longo operatur tempore, ideo iubet Auic. vt, si praua apparuerint accidentia, illiç laqueus, siue lineus, siue sericus fuerit, secetur, & ea adhibeantur medicamenta, quæ dolores lenire possint. secta fistula quomodocunq; seruari aperta debet, donec ex toto callus fuerit consumptus, & medicamenta commodè adhiberi possint, & ne oris, ac labris glutinatis fistula reuertatur; ideo iubet Hippocrates, quod statim secta fistula, & nonnullis spogia tenuis sine incisa imponatur; deinde, ut callus tollatur, stercem aris vñi per specillum copiose in fistulam conijce: nam medicamentum tale facultatem maximam excendendi callum habet, nos vero, quia satis ære, & mordax medicamentum est, eius loco hydratgipr præparato (præcipitatum isti vo-

cant,



ex se rumpatur, expectant. euacuata materia, locus aliquo digerente regatur medicamento, donec optima apparuerit concoctio; ob id probatur terebentina clara, cum vitello oui, croco, & olibano; inde illi addatur rodomei, farina hordeacea, & parū quid isidis, epigoni, & erit abstergium mirabile: quare postmodum sinus faciliē replebitur; qui, si profundus fuerit, aliquo currente, & abluente medicamento abstergetur, & exsiccecur, quale est mulsū, hoc est vinum mellite, aut decoctum centaury, & quicquid foliorum oliuæ, & mirthillorum, addito rodomei, lichinia etiam cum emplastro aureo, aut vasilicone minori imponantur, ac desuper lintea cum cerato de minio, aut diacalcitreo, & erit cura. si autem vlcus conuulso callo, in coriadam transierit, aut nunquā, aut cū magno labore sanitari resistit potest. & hac ratione fortasse antiqui de hac re parē loquuti sunt, nec nos adhuc aliquam methodum curariū legere potuimus: & admirati sumus, cum hac pars colli vesicæ carnosā sit, curationem non recipiat. nam collum vesicæ, ait Galenus, videmus quotidie sanari, cum lapis extrahitur, quoniam carnosum est. addere etiam possumus & vulnus recens: sed cum anticiquatur, aliam acquirit naturam, & fit cacothetis, id est, difficilis consolidationis.

6. per. Aph. 6.  
mem. 18.

### De Fistulis Vuluæ, & colli Matricis. Cap. XI.



N sinu pudendi muliebris, interdum abscessus subulant, qui postquam ad vomica deuenierint, & suppurati sunt, sinus ob illius sedis nimiam humiditatem, sero replentur: sed contracto callo, in fistularem sinum permittuntur, qui à Græcis rhyada nūcupantur. affectus hi magno cū labore, & fœcissimis remedijs curantur, nunquā verō, si ad intestinū tendūt, aut ipsum perhorant: maximo sensū prædixit sunt hęc partes, ideo fortia medicamenta ferre non possunt. Ait Hipp: si vlcus in vtero, aut eius collo factum fuerit, & non statim sanatum, sed impurum euaserit, permanet ad multum tempus, & male olet, & quandoq; fanies male olens ipsi ex podendo fluit: ac interdum dolor acutus corripit lēbos, & inguina, & inum ventrem, & coras, & ad scapulas tendit: non curantur, ait Auic. fistule, quæ in fundo matricis sunt, aut quæ ad vesicam perueniunt, & illæ deteriores sunt, quæ pectinis pillos abradunt.

Arc. l. 16. cap.  
103.  
l. 1. c. 6. c. 70

L. 1. de fistulis  
& l. de matricis  
mulieb.

av. p. trad. p.  
cap. 17.

#### P R A X I S.

C V R A, inquit Auic. est sectio, quæ multoties propter ingrossitatem membri perducit patientem ad spasmodum, abiectionem vocis, & permutationem rationis, quæ tamen interdum non est possibilis, nisi in ea parte, quæ sensui manifestatur, cuius carnem malam tollere est possibile: quare melius est post corporis mundificationem, administrare medicinas exsiccatas, & confortare matricem: porro, ut corpus euacuatione mundificetur, & seruetur, quæ in eua fistularum anni seruanda fore iudicamus: efficaciter postea huius sedes fistulas, & callosam leperficiem ablutunt, aloes, radix paucedani, alphonisillorum, veratri, & spendilij, alumen liquidum adustum, alumen rotundum, pulvis agarici, reubarbari, calcis adusti, æris squama adusta, hydrargyrum præparatum, troscili de alumine, de minio, & de arsenico, oleum ex calcidie, ex antimonio, ex sulphure, in modica tamen quantitate, humido cera to admixtum, vnguentum damascenum, ceraleo, isidulis, egipciacum, & cauterij.

### De Fistulis Articulorum. Cap. XII.



P O S T recentes articulorum solutas conuinitates, aut abscessus malè curatos, ob id quia sedes sunt ob earum compositionem frigide, & humide, in eis sinus remanent mali moti, qui postmodum fistulas euadunt, difficilis curationis. cum sæpe aliqua ossium tere dine complicantur, ac tumore duro, equali, & colorato, & sine dolore molestantur, faciliē sensu vitius, & tactus dignoscuntur: nam membra hæc pauca carne prædita sunt, prohibent interdū articuli motū arbitariū, & membrū ancilosum faciunt, aut curuatum, & durum reddunt.

#### P R A X I S.

C V R A N T V R hi affectus methodo non multum dissimili ab ea ratione curatiua, quæ cæteræ fistula tere dine ossis complicate curari solent, nempe ossi corrupti ablatione, calli orbiculatione remotione, aut medicamento, aut vnguibus, aut scalpe: li acie, vlcis absterfione, tumoris discussione, cavitatis repletionē, & cutis inductione.

### De Fistulis cum ossis corruptione. Cap. XIII.



C V R I T I N T E R d u m, quod aliqua vlcera fistulosa, iam debili obducta cicatrice, & noua accedente inflammatione, propter nimiam humorum repletionem, sponte, & ex se rumpuntur: nam caro, quæ iam purgata est, & ab omni foridie denudata, ex facili quidem cicatricem inducit: sed iucco aliquo vitiolo subnascens, ab os male morigeratū, quod sanitatem adipisci nequit, nisi post viciatū, aut corrupti ossis ablationē eius mala dispositio agnoscitur, si quidem primo pinguefci, secundō nigrum, tertio cariosum fit, carq; cū circundans alteratur, & per eam de facili specillum ad os veni: ip sum

o Cel. l. 1. c. 1.  
Act. l. 14. c. 56  
Fon.  
Auric. q. 4. l. 17.  
q. 18. l. 1. c. 1.  
de xiii.  
Alou. l. 1. c. 22

10. ulsumque non lubricum, sed inæquale, & corruptum inuenit: humiditas verò, quæ ab vlcere emanat, tenuis est, nigra, ac fetens; & multas quod euenire etiam solet, si fistula ad neruum, aut tendinem, aut sindefimum attingit, quod in simplici secus apparet. Triplici modo ossa terebinosa sunt, vel eorum cortex, siue superflues tantum alteratur, & nigrescit, vel altius caries descendit, & ossis substantia in parte corrupta, vel ex toto os cariosum est: quod dignoscitur ex specilli demissione, quod magis, minusve intrando, vel in summo cariem esse, vel altius descendisse testatur: sed quia multa superius de hac re à nobis explicata sunt, hæc pro nunc sufficiant.

P R A X I S.

30. **O**PORTET ante omnia os nudare; & si latius eius vitium est, quàm vlcus fuerit, carnem subsecare, donec integrum os vndique pateat: tum id, quod tantum nigrum, aut pingue fuerit, icalpris ad hoc acco-  
modatis eradere oportet, donec iam aliquid cruoris ostendatur, & os album se offerat: nam finis vitij est, ubi nigrities esse desinit: si quando altius descendit caries (nam tunc eius esse expedita cognitio est) primo os radatur, donec solidum appareat, postmodum semel, interdue ad motu ferramentis, ut igni-  
to, ipsum adurere oportet, ut ex eo statu secedat, donec integrum id sit, quod relinquatur: neq; alia faci-  
enda sunt, ubi nigredo, aut caries in summo osse esse dignoscitur: si verò caries alte descendit, per te-  
rebrum multis foraminibus, quæ altitudine vitium æquent, primo tollenda est: tum per ea foramina candentia ferramenta demittenda sunt, donec inde siccum os ex toto fiat, simul enim post hæc & re-  
soluetur ab inferiori osse quodcumq; vitiatum est, carne subnascens, & sinus carne replebitur: si ca-  
ries ad alteram quoq; partem ossis transierit, quod totum vitiatum est, totum eximere oportet, siue cap-  
tis, siue pectoris, siue colli, siue alterius partis os corruptum percipiat: ante inflammationem enim  
30. omnia tutius tractanda sunt. itaq; quantum fieri potest eodem momento curis incidenda est, os dete-  
gendum, & ab omni vino liberandū: postremo callus tollendus est indicationibus, ac suisragijs superius  
pluries enarratis, quantum ab ignito cauterio omnia, quæ in hac curatione requiruntur, perfecte adimplentur.

Cicilia una  
est ossis.

De Fistulis diuersorum sinuum. Cap. XIII.

49. **S**ab vno tantum ore plures sinus oriuntur, facile ab excrementis humoris copia cognoscuntur, quæ semper magis, quàm à sola, & simplici fistula, expurgatur. ex pa-  
tientis etiam decubituprehenduntur; si quidem sub vno sinu viæ sive ob-  
struæ sunt, nec humor emanare potest: sub alio vero dilatantur, & materia  
commodè emanare potest: interdum extransu clysteris, an vna, an plures  
sint fistulae, percipimus, si tunc iniectionis, aut recto syphone aliquid deco-  
rum inijcimus. nam ubi vna tantum est via, pauca decocti quantitas recipitur: se-  
cus vero ubi quamplurimæ insident, at si per varios sinus effluit liquor, diuersarum  
fistularum indicij est: multoties etià hunc in modum manum admolesmur, circa candela, aut specillo  
inflexo (huiusmodi autem sunt quæ ex stagno, aut plumbo, aut ære tenuissimo sūt) an duæ, pluresue ho-  
ræ habeantur, & via, vel rectè intus tendentes, vel obliquè, percipimus: contingit etiam, ut prima via  
adaperta, statim reliquæ se ostendant, & eorum dignoscitur progressus, si in os desinit, aut in articu-  
50. lum, aut in quampiam principalem particulam.

Vide Celi lib. 1.  
cap. de fistula.

P R A X I S.

60. **A**DVERSUS fistulas, si altius penetrant, si tortuosæ sunt, si multiplices, maius in manu, quàm in  
medicamentis, præsidium spectare oportet: porro quæ plures sunt, aut ossa, aut grandes arterias,  
aut neruos, aut tendines non aut dignos, aut membranam collas subingrediem, aut aliquam principalem  
particulam læsant, vel nequaquam, vel certè cum multa, artificiosaq; diligencia attingere debemus:  
quæ verò carnosas tantum substantias occupant, tribus modis curari solent, nempe primarium oriens  
dilatando; inde callositatem omnem demendo, aut medicamento, aut vngubus, aut ferro, aut igne;  
postremo sinus omnes optinè abstergendo, cauitates replendo, ac curam inducendū: sic, ne amplius  
morbis immoetur. Ergo primò callus considerandus est, an recens, an inueteratus sit. recens si qui-  
dem faciliè foratione, & pulueribus tolli potest: diuersi verò vasa, & contrahitur, & fortioribus eget  
remedijs, quæ in recenti fistula praua, & inquieta sunt, nempe cautera, & ignis. in duplici igitur, aut  
multiplici sinu, sic tamen ut breuis, intraq; carnem sit, medicamento uti non debemus, quæ vnâ par-  
tem curent, alteram dimittant: decet ergo omnes sinus per oricularium clysterem eluere. si plus por-  
ris fertur, vinò mellite: si callus durior est, ærupine rasa, aceto liquata. Aut & succi agrimonie, & iij.  
radicum paucedani vnc. j. baurac, aluminis liquidi añ. vnc. s. aquæ ardentis vnc. i. s. aloes, myrrhæ añ.  
3. ij. mellis: erudi vnc. iij. mīc. & bulliant, donec succi, & aqua absumentur, & quod residet, liquefi-  
cat in vinò maluarico, & vtcre. Aut & succi agrimonie vnc. iij. asphodilorum vnc. ij. celidoniae vnc. i.  
salis communis, salis armoniaci añ. 3. iij. sublimati 3. ij. Zinari, aluminis liquidi añ. 3. i. s. aquæ arden-  
tis

tis 3. x. bulliant omnia simul, donec medietae euauerit, & seruetur in vase terreo vitreato, & vtere cū vino nigro stipico: porro si aridum fuerit medicamentum, in calamus scriptorium concipiendum est: idq; ori fistula aptandum, inspiciendumq; vt intra compellatur, atq; intra infundatur: quicquid inditum est. & quia ferè, quæ circa has fistulas sunt, aliquid inflammationis habent, superponenda sunt, quæ refrigerent, & reprimant, quale est medicamentum diaphanum, mirrhino oleo liquidatū neq; alienum est, vbi quis fistulam denudauerit, anteq; alia rursus medicamenta conijciat, ipsam abstergere, aut vino maluitico eluere, ac sinus orificium ita constituere, vt deorsum spectet, talis enim situs certè ad sanitatem facit: quandoquidem per os eius facile sanies effluit: quæ si ad latus declinet. aut intrò fertur, aut deorsum vergit, si sedes afflicta ita locari possit, incisione ex aduerso facta opus erit, vt liberè sanies è sinu emanare queat, & collirium vtrinq; dimitti possit, quòd diuersimodè, ex mē brorum diuersitate paratur: cumq; ergo fistula longior, & transuersa est, nec vti libet perforare videtur, demisso specillo alterū caput incidere commodissimum est, vt locio vtramq; partem ablueri possit, & medicamenta aqualiter caliscare: vnde postmodum celerius sinus ipsi glutinatur, quam replicatur: post hæc igitur glutinaria imponenda sunt, nempe consumpto callo; neq; verendum est, ne purū corpus, puro corpori iunctum, non coeat, adiectis quoq; medicamentis ad id efficacibus: si sub cute transuerfa, sed diuersæ fistulae sunt, immisso specillo, ferro secandæ sunt, idemq; faciendum, si plures, se quasi ramuli ostendunt, & postmodum ex toto callus extrahendus est. & si partes admodum separatae videntur, sibi se superdandæ sunt, & medicamentum, quo glutinentur: mortificatæ autem fistulae, euident argumentum est, cum pus, quod ante multum, & crudum apparuerat, nunc paucum, & coctū demonstratur: ita vt sinus ipse purus, & ab omni sordē mundus dignoscatur, & viuæ, ac probe carnis præsentia deprehendatur: interdum si fistula multiplices habuerit meatus, adeo vt linimenta intronit, ti nequeant, medicamenta aceto liquanda sunt, & clystere oriculario, aut recto syphone infundenda, veluti linimentum hoc, quod acre est. & vnguenti ægyptiaci vnc. s. arsenici 3 j. lixiui vnc. iij. aquæ rosatæ vnc. ij. subtilitati 3. s. bulliant ad consumptionem tertij partis, & iniecto medicamento, fistula os occludatur, ne quod iniectum est, refloatur.

## De aliquibus experimentis in fistularum curatione. Cap. XV.



RIA præsidia in fistularum curatione à Medicis potissimum describuntur; siquidem quæ recentes, ac tenellæ sunt, nec dum callum densum contraxerint, topicis remedijs, nempe pulueribus, emplastris, ac similibus, sanari solent, de quibus variis formas, ac satis debiles denotabimus: quæ autem callum durum continerint, ac fortioribus egent suffragijs, nempe cauterijs potentialibus: antiquatæ verò fistulae, & callosæ, aut diuersorum sinuum, aut ossē terebinde affecto coniunctæ, non nisi sectionibus opportunis, & actuali cauterio curari solent: quousque dicat princeps hoc ingenium prauum esse, & iniquum, à topicis propterea initium capiemus; postmodum parum intra loco proprio de cauterijs ad plenum sermonem habiturifumus, quod primo occurrit est.

|                                     |  |  |                              |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|
| Aqua maris.                         | Theriaca antiqua.                                  | succo paucedani, sale.                                 | Aurum pigmentum.             |
| Aqua aluminis.                      | Decoctum centaurij.                                | & aloe.  | Hydrargirum preparatū.       |
| Acida muria.                        | Decoctum celidoniae.                               | Cinis cartarum adustarū, aceto acri infusus,           | Trocisci de alumine.         |
| Mellicrarum.                        | Decoctum draguntij.                                | & exsiccatas, postea mixtus cum lacte timali, & melle. | Trocisci andaracharon.       |
| Multum.                             | Decoctum lupinorum.                                |  | Trocisci de asphodello.      |
| Lixiuus ex cinere ficul.            | Decoctum calcei viuae.                             |  | Trocisci de minio.           |
| Aqua agrimonij, cum sale armoniaco. | Oleum de tartaro.                                  |  | Trocisci de arsenico.        |
| Aqua plantaginis, cum arsenico.     | Oleum ex calcite.                                  | Fel capræ cū succo, porri.                             | Radix asphodillorum.         |
| Aqua alchymistarum.                 | Oleum ex antimonio.                                | Fel vrsi cū agarico.                                   | Radix spondilij circumrassa. |
|                                     | Oleum ex sulphure.                                 |  | Radix nigri veratri.         |
| Sucus cucumeris agrestis.           | Cinis corticum pini.                               | Puluis calcitis adustus.                               |                              |
| Sucus agrimonij, cū sale.           | Cinis ossiū crematorū.                             | Puluis radicis centaurij.                              |                              |
| Socus veratri, cū lacte.            | Cinis ostracordemati.                              | Puluis agarici.  | Vnguentum damascenum.        |
| Sucus timali, cū melle.             | bucinatorum, &c.                                   | Puluis reubarbari.                                     | Vnguentum cerascos.          |
| Sucus celidoniae, cum tartaro.      | Cinis corticum nucū, cum sale, & pinguedine hirci. | Puluis radicam asphodillorum.                          | Vnguentum apostolorum.       |
| Sucus virgæ aureæ cum aloe.         | Cinis radicam filicis, cū Sulphur.                 | Alumen rotundum.                                       | Vnguentum ægyptiacum.        |
|                                     |  | Alumen liquidū exsiccū.                                | Vnguentum cauterij.          |

# LIBRI TERTII.

## TRACTATUS

### QUINTVS.



#### De Cutaneis, & suis affectibus. Cap. I.



**N**ec ad earum affectionum cognitionem, quæ in extrema corporis humani superficie contingunt, & eam aut infestant, aut corrumpunt, aut dedecorant, transeamus. dicimus itaq; quod inter affectus cutaneos, pruritus, pſora, lepra, & quæ à Latinis, tanquam scabiei differentiæ, proponuntur; & lichen, quam impetiginem vocant, enumerantur: horum enim serè omnium sumptoma, est desiderii quoddam scalpendi, quod manifestum est argumentum, eos esse quæ si vitiosorum humorum sobolem, nempe acrimoniæ & mordacium, qui ad cutem transmissi ibi retinentur, & remanent, propterea quia aliqua constant crassitie, si enim omnino tenues essent, cutim perinde, vt sudor, transirent, cuticulamq;

abraderè possent; neque tamen adeo crassi sunt, vt illi existunt, ex quibus phagedenæ; idest vlcera corrosiua, aut cancri gignuntur; nam non modo extremam cutim abraderent, verum & subiectam carnem exulcerarent, exederentq;. Hi cutanei affectus inter se differre videntur, crassitie, & tenuitate materie, vnde concitantur: siquidem à crassiori materia lepra ortum habet, vt poxe in qua separantur veluti squamæ quædam, & quasi serpentis appellatum scorium diuiditur; à pſora verò veluti furfures, quæ quidem ad abrasionem sumunt, & extimæ solæ cuticulæ referuntur. Profundior verò abratio in lepra apparere solet, sicuti crassiores sunt squamæ ab ea resactæ, quàm futiles; his vtrique adhuc tenuiorè materiam impetiginis, vel lichenis, commune autem his omnibus est cutim reddere asperiore: sed pruritus materia alijs tenuior.

Quæ actè, aut qualis sit materia, quæ horum omnium affectuum fontem est, non videntur omnes in idem confectire, præterquam quod eam acron esse affirmant. Arabes enim (vt Auic. Alii, Alb. & Rasis) videntur voluisse pſoræ, & lepræ materiam esse sanguinem vitiosum, aut quæ illi admixtus sit melancholicus humor exultus, aut quia pars aliqua ipsius, quæ per putredinem, vel asilationem in melancholicum humorem sit conuersa, aut etiam quia interdum sanguini pituita falsa sit admixta. vnde sequitur, quod si ex humore melancholico scabies orta sit, sicca illa est: sin autem ex mixtione pituitæ falsa, pinguior illa esset. Gal. verò, & ceteri Græci hos affectus non in sanguinem, sed duntaxat in melancholicum humorem, & pituitosum salsum referunt. nam in lib. de atra bile, & lib. de tumoribus præter naturam. hos affectus melancholicos esse, censere videtur, cum eos sæpè mutua trans-

mutationem cum elephante habere visum est, si aliquando elephantiasis curationem habet, prius in lepram, postea in pſoram mutatur; sicuti sæpè si commutetur lichen in pſoram, mox pſora in lepram, tandem in elephantiasin fit transitus. At Gal. lib. 2. de simp. cau. air pruritum à tenui, & salso humore ortum habere; pſoram verò, & lepram à multo, crasso, & salso, & non moto, quia humores, qui in motu sunt, & per partes sensu præditas teruntur, horrorem, aut rigorem concitant: attamen ibidem exponens quid pruritus sit. cum prius dixisset esse sensum excrementorum, pruritum mouentium, id magis particulatim explanare volens dicit, nisi quis ea nitrosa, falsa, vel amara nominare velle, quibus insinuate videtur, & bilem pruritum concitare posse, amaritudo siquidem bili propria esse videtur: sed si res rectè examinare velimus, cū frequentissimè hi affectus, præsertim verò pſora, & lepra, reddant cutim & asperam, & serè aridam, sepius à siccio, & exulso, ac melancholico humore originem ducere videtur, interdū verò quia in his cutaneis affectibus papulæ quædam paruæ exoriuntur, à quibus videntur quidam quasi ichor exprimitur, aer quidem, & mordax. ob id putare eas à tenui, & falsa pituita ex creatas esse: quandoq; verò papulæ maiores, quæ tandem suppurantur, & inde pus satis crassum effluit, quas vulgus pinguem scabiem vocant: sed harum duplex est differentia, aliquæ enim dolorosæ sunt, & rubæ, antequam suppurationem assequantur, vt quasi inflammationes intemper: aliæ verò tandem de ipsâ suppuratõe veniant; neq; tamen ita inflammatæ sunt, neq; etiam adeo dolorosæ, putarem equidem priores sanguinis mixtionem habere, alias verò potius in salsam, & crassiorem pituitam esse referendas: impetiginè verò ex tenui ichore cū crassione, & acri humore generationem habere, vt 3. de compo. m. secundū genera cap. 6. concedit Gal. porro cōmuni omnium sententia est eos, qui vitio sis vtuntur cibis, in primis cutaneis huius affectibus obnoxios esse, ac senectutē frequenter ab illis exacerari, &



aded cruciari, vt aliquando pruritus in fene fi inueterauerit, aut nunquam curari poffe, aut ita agere, vt illis fati eſſe poffis, ſi leuietur, & mitigetur.

## De Pruritu. Cap. II.

3. de simp. cl.  
Gal 3. de comp.  
m. secun. loc.  
Ant 7. 4. m. 3.  
cap. 6.  
Pau lib. 4. c. 4.  
Aes. lib. 13. cap.  
116.

**P**erfectly

**R** *PRURITUS* summæ cutis asperdo, ac desiderium scalpendi magnum est, cum eius causa fit humor quidam subtilis, pruriginosus, non admodum acris, ac leuiter mordicans, partem cutis tantum infestans, ac per eam expansus hac ratione pullulans. sicut scabies, non excitat, & in hoc ab ea differre videtur (atramen ab vna ferè me causa originem suam hinc affectus trahunt) diuersiteriam quandam suscipiens à maiori, & minori tenuitate; aut aduersione, aut admixtione, ex genere symptomatum est, qui ad affectionem animæ lentius in lesam reuocatur: porro pruritus exhorretione, nec velle nec velle ob id quod eius causa materia sicca est.

PRAXIS.

**N** omni pruritu victus frigides, & humidus infilitur, sanguis interpolatè mittitur, & corpus oportuno pharmaco euacuetur, ergo imperanda ægris talis victus ratio est, quæ tenuis sit, bonumque, & minime melancholicum succum genere. quod si obiecoris caliditatem, & siccitatem excedentem prohiberi non possit, quin aut acutus, aut melancholicus in corpore sanguis procreetur, cibus, ut dictum est, refrigerantibus, & humedantibus vendendum est, quibus hepatis intemperies paulatim corrigatur, veluti est prunæ cremor, lactis; serum, pilæ laxatiles, aut omnes, præterquam palustres, caro hædina, veruensis iuuenis, pullorum, &c. ex oleribus, malua attritplex, bitum, cucurbita, atque id genus alia, acrilum visus, & repletio omnis vitanda: vinum verò paucissimum, & aquosum sit: sanguis, nihil quid obstitit, interpolatè mittitur, siquidem dictum est: In refectionibus sanguinis, melius est multiplicatio numeri, quam quantitas. sic enim succus ille prauus, qui in venis colligitur, ex intervallo, vena ad aperta, euacuandus est: & si decet per hæmorrhoidas detrahendus. Refocillatis viribus, ait Aet. corpus pharmaco leniendum est: & humor, qui peccat, educendus. consideretur ergo primò, quis humor ille sit, quæ eius natura, & unde oriatur. bile igitur peccante, calid, aut manna, aut ly. rosato solutio minoretur: quod rorè resider, præparetur sy. de endiuia, ex incubo, violato, acetoso, & simili, longa quippe præparatione, donec in vinis concocto apparuerit: & tunc euacuandus est humor manna, reubarbaro, ramarinditis, & ly. rosato, aut violato solutio. & si aliqua apparuerit adustus, præparetur sy. de fumaris, bifantio, & de epithimo, postea euacuetur elect. lenitico, de succo ro. rosato M. aut cum pillulis aureis, aut de fumot. aut alliaeret: si verò humor superuacuetus pituitosus fuerit, præparetur, præmissa minoratione, cum elect. lenit. sy. bifantio, oximelle, rodonelle, sy. de bifantis. euacuetur postmodum elect. diaphanico, diascene, agarico, & hyera, aut pillulis de aloë, aut de hyera, aut de fumot. cum verò materia crassa fuerit, præparetur sy. de eupatorio, acetoso comp. de calamico, de pratio, de fumo ma. probatur summopere decoctum epithimi Medusæ, aut Auiæ, aut Rafis, presertim in humoribus adustus. facit ad hoc aqua lactis cum 3. iiii. epithimi. confectio amech, & hyera duolocotindos. hoc præparato, ad externam curationem deuenire oportet, homo igitur, aut icuius stomacho, aut modico sumptu cibo lauandus est, nempe fœnugreci decocto, aut betarum, aut turfurum, aut maluz agrestis, aut lartuz, aut bordei, facit ad hoc aqua maris, & aqua Termarum. sudare copiose multum confert.

## De Scabie. Cap. III.

Cel. lib. f. c. d. e.  
f. cabre.  
Panis lib. q. c.  
d.



C A U S A affectus pruriginosus intimè cutis est, & contagiosus, in quo pustulae multae oriuntur, modo humidiores, modo aridiores, ex humidioribus interdum exiit pustulae multae saniores, ex siccioribus pruritus intolerabilis, & squamæ exoriuntur, siquæ multiores ex his exulceratio pruritus, scitipit, in quibusdam citò, in alijs verò serò, atque in alijs quidem ex toto desinit, in alijs verò certo tempore reuertitur: quæ sicciore est, pruritus magis, ac difficilior tollitur: quæ verò talis est, agriam, idest, sciam Græci appellant. causam quædam sunt primitiue, nempe vius ciborum calidiorum, salforum, & acutorum, ac meri potentis, olei multa, & mellis, tartarorum, aut contactus alicuius scabiosi corporis: antecedentes, veluti mala temum nutritionis, à qua mali, & corrupti humores eleuantur, coniunctæ sunt humores

10 ipsi acuti baurachini, ad cutis superficiem vi nature transmissi, sicut sanguis est, cui miscetur cholera, aut pruritus, retinens virtutem baurach. aut humor adustus in naturam humoris melancholici conuersus, uti de p[ro]fura producit, & hac ratione altera scabies humida est, dum sanguis crassius purrit, & pusilli de quamp[ro]fura ichore plene producit. alia verò est sicca, si humor baurachinus fuerit, idè utriusque apparet pruritus, & squamæ surfuræ ab ipsa cuti separantur: alia verò vlcerosa est, si humor fuerit adustus, & hec mala est, & in impetiginem, aut lepram permuat. porro cum affectus hic cutanei cutis superficiem ostendat, de surfuraceis p[ro]fura producam, a Grecis p[ro]fura, & à Latinis scabies vocantur: cum verò aspeedo, & pruritus cutim occupant, à Grecis lichenas, & à Latinis impetigo nuncupatur, cumque in his affectionibus squamæ manifeste producantur diuersorum colorum, & affectus serpendo progreditur alicuius profunditatis, communiter lepra vocatur. in scabie ergo hæc duo symptomata apparere solent, aut pustulæ quamp[ro]fura, quæ interdum exulcerantur, aut pruritus cum squamis surfuraceis, quæ minores, ac tenuiores sunt, ac varia figura coalescent: si profundam cutim depascitur huiusmodi affectus, & squamæ crassæ, & quales p[ro]fura rotundæ, maximoque cum pruritu excitantur, p[ro]fura vocatur: cumque curaneus hic morbus asperimus est, maximoque cum pruritu, & corporis colligatione, ac man telis squamis profundis in orbem depascantibus, ac à corpore decidit: tibus, non absque aliquo malo odore, lepra propriè dici debet: & omnes isti affectus, sicuti formam, ita & nomen mutare solent: & communiter papulæ pruriginosæ, aut pruritus falsus, siue phlegma baurachini, aut albaras, aut serrasati, interdum & derbia nuncupatur, & morbi esse non videntur, sed affectiones curaneæ, quæ ad decorationem spectare videntur: siquidem circa cutis colorem, & substantiam huiusmodi generis affectuum spectare videtur.

30 **P R A X I S.**  
**E**X omnium Medicorum communi sententia, in horum affectionum curatione, si nulla causa sanguinis missionem prohibet, vena aperiatur, idue magis, si corpus iuuenile fuerit, & tempus Veris, nam causa materialis est sanguis crassus, qui putrescit: conseruetur etiam, ut ægroto tenui utatur victu, & cibis frigidis, ac humidis. alius ducenda, nempe medicamentis adustus humores euacuantes, quæ est electuarius lenitium, dialcenc, amech, aqua lactis cum senna, aut epithimo. verum si expedit, prius, ut materia fuerit tenuis, præparetur, & fiat ad hoc syrupus de fumot, de endiuia, & violatus, cum decocto endiuia, boraginis, & lupulorum. si crassa, lyrapus acetosus, oximel, mel rosarum. adhuc si plenitudinis apparuerint indicia, humores cum biliofi, tum aduili, nempe præparati, purgandi sunt, & sic p[ro]fura aspeedi s. s. diacat. 3. vj. electus. de pilulo 3. ij. scabiei q. s. fiat b. aut p[ro]fura rabar. 40 borag. electi in decocto senna infusi 3. xv. elect. dialcenc hæmec. añ. 3. ij. fini rolati solut. 3. i. s. aque borag. q. s. fiat p. s. euacuato corpore inungatur, siquidem à Gal. dictum est, quod corporis plenitudinem affectus curationem non admittit. curare etiam non inconuenit per balnea, aut sudorificia copiosum, corpus inanire, interdum adhibitis cucurbitulis, & scarificationibus, abluatur corpus totum à foribus decocto tali, & foliorum malur, acanti, parietarie, fumot. hordei añ. m. j. elabori nigri m. ij. fiat decoctum in aqua maris. paratur hoc interim pro inunctione ynguentum, & tale pro pueris probatur. p[ro]fura tercentine nouies lotæ 3. iij. butiri 3. ij. salis 3. j. succi citranguli q. s. uicellos duorum ouorum, ol. ros. 3. j. fiat ynguentum. Aut p[ro]fura axungie lule 3. iij. sulphuris viui 3. j. salis albi 3. s. terebeat. in aqua rosarum lotæ 3. j. albugina ouorum nu. 2. butiri recentis 3. j. mulci odorati g. 2. misce, & fiat ynguentum. Pro consultantibus, p[ro]fura pinguedinis porcinæ salit lib. j. tere optime, terq[ue] abluat rosacea aqua, sulphuris triui 3. s. succi linonum 3. ij. misce optime. Aliud fortius, p[ro]fura pingued. por. virulina añ. 3. ij. olei malicini, laurini, rolati añ. 3. s. terebeat. 3. ij. linarg. auri, cerulæ, ellebori nigri añ. 3. ij. citracis liqui, de 3. s. sublimati 3. ij. misce cui in mortario, & vterè.

De Impetigine. Cap. III.



60

**I**MPEYIGO, ut Latini dicunt, ac lichenas, ut Greci, siue volatica, ut vulgares, affectus cutis est, superficialis, asper, & pruriginosus, omnes corporis partes decorans, potissimum verò & faciem, & manus: nam interdum per vniuersam faciem serpit, & oculos attingit, & ferè supremæ deformationis causa efficitur. ab acris, & tenui succo producit, interdum à mixto, & crasso, differt à p[ro]fura, & lepra: siquidem impetiginis aspredo, superficialis, rotunda, & plana est, sed non squamosa, aut surfuracea, sicut in p[ro]fura, & lepra apparere solet: permuat tamen facillimè ex prauo victus regimine, & nimio coitu, in p[ro]fura, communiter, dum relidet, nec permuat, impetigo vocatur, fecus verò serpigio. ambe hæc dispositiones sunt, & maximum excitant pruritus: sub duplici modo videri solent: aliquæ n. humidae, & sanguineæ sunt, quæ dum agitantur, inflammantur, & velocius appa[re]nt, tales facillimè sanantur: aliæ verò siccæ à phlegmate falso productæ, quod ex vltiori additione in blem atram conuersa est, nec curationem admittunt: nonnullæ etiam exoriuntur, à causa sicca, & multum adfusa genitæ, in quibus squamæ, quemadmodum in leuce Grecorum, aut albaras Arabum videri possunt, & promptè in lepram permuantur. Horum affectuum nonnulli ambulatiui,

Gal. 7. de corp. med. fecit loc. Aet. lib. 8. c. 18. P[ro]fura h. c. ca. 18. Colub. 9. ca. 18. P[ro]fura h. c. ca. 18. P[ro]fura h. c. ca. 18. P[ro]fura h. c. ca. 18.

& maligni sunt. multi verò immobiles, & saluberrimi, alij recentes, & multi inveterati, & antiqui. Apud  
 Cellum impetiginis species quatuor sunt, & ea minime mala, quæ similitudine scabiem representat, nec  
 ob hoc est male naturæ, quamvis sit rubicunda, & durior, & exulcerata. distat autem ab ea, quia ma-  
 gis exulcerata est, & pustulas similes varias habet; videnturque esse in ea, quasi bullulae quædam, ex quibus  
 interposito tempore squamulae resoluuntur, si evanescent, certioribus temporibus reuertuntur. Cre-  
 dunt aliqui hanc impetiginis speciem, eum affectum esse, quem Avic. safahati vocat, siquidem notat,  
 & accidentia admodum similia sunt. Secunda species peior est, papulis fere similis, sed asperior, ac rubi-  
 cundior, figuræ varias habens, squamulae ex summa cure discedunt, celerius, & latius procedit, cer-  
 tioribusque etiam nonnunquam prior temporibus & fit, & desinit, rubricaque cognominatur. Dicunt ali-  
 qui hanc Celsi secundam impetiginis speciem secundum safahati Avic. esse, humidum quippe, ab eo re-  
 frensi vocitatum; nam vtriusque affectus signa valde similia sunt, nec de hoc dubitare oportet, & si post  
 Historiam de safahati, de impetigine pertractauerit Avic. ibi enim asserit, nullam, aut paucam diversim-  
 tem inter hos duos affectus reperiri; & si qua est, illa occultata dignoscitur, nec aliud est safahati; quam  
 impetigo maligna, & corrosiva, & vtriusque morbi vna met est causa. Tertia species apud Celsum deteri-  
 or est; nam & crassior est, & durior, & magis tumet, in summa cure finditur, & vehementius rodit ipsa  
 quoque squamola; sed nigra procedit, & late, & tarde, & nimis serpit in aliquibus temporibus aut ori-  
 tur, aut desinit, neque ex toto tollitur, nigraque cognominatur, hæc est illa dispositio cutaneæ, quam Avic.  
 Albaras nigra appellabat, cum aliud non sit hic affectus, quam impetigo excoerata, pruriens, & squa-  
 mas emittens, ac leprato præcedens, quæ dum antiquata sit, curationem non recipit. Quarta species im-  
 petiginis apud Celsum, illa est, quæ nullo modo curationem admittit, & differt à tertia solum in colore;  
 nam hæc alba quasi est, & nouæ cicatricis assimilatur, & squamulae pallidæ, aut subalbidæ, spem etiam alij  
 quas similes lenticulas producit, quæ dum tolluntur, sanguinem effluunt, alioquin eorum humor albi-  
 dus est, cutis dura, atque siliæ est, proceditque latius. Hæc verò maxime omnia genera oriuntur in pedi-  
 bus, & manibus, & vngues quoque infestant. hanc vltimam speciem impetiginis vocat Avic. bakhiari,  
 & est de genere safahati male.

## De Serpigne. Cap. V.

Id. 1. p. c. vlt.  
 Ant. 1.3. c. 13.  
 Pra. 1. c. 12. d.  
 Ant. 7. c. 12.  
 1. c. 12.



Nam has met cutaneas, ac superficiales pruriginosas exulcerationes, à Celso  
 quardam describitur dispositio, quæ vitiligio nuncupatur. hæc quamvis ex se-  
 nullum indicet periculum, tamen sæda passio est, seu foedus cutis color, & ex malo  
 corporis habitu proveniens. Eius tres species sunt, nempe Alphos, Melas, & Leu-  
 ce; at quia hi omnes affectus serpendo progrediuntur, à Latinis serpignes nuncu-  
 pantur. Alphos vocatur, ubi color albus est, ferè subasper, & non continuus, ut  
 quardam quasi gutta dispersæ esse videatur; interdum etiam latus, & cum quibus-  
 dam intermissionibus serpit, de simili affectu inquiens Aetius ait, quod Græci Al-  
 phus eum appellant ob id, quia cutis colorem permutat, & antiqui hanc cutis permutationem alphe-  
 nein vocabant. ab vna met ratione cum Leuce, & lepra producitur: Alphos tamen non nisi cutim solâ  
 permutat, in qua squamulae quardam gignuntur. duæ eius species reperiuntur, vna quidem alba, altera  
 verò nigra; in alba squamulae à pituita fiunt, in nigra ab humore melancholico; Alius Leuce cutem mut-  
 tat, inquit Paulus, ut pilos quoque sibi similes procreet, Alphi summam cutem infestant, quamquam cili  
 vetustate sentiant, penitus recedunt, in eisq; albi pilii nascuntur, idque humoris, qui subest, ratione; et eo-  
 nem ex pituita albi ducit originem, nigri ex atra bile. Credunt multi, quod Alphos, seu vitiligio, Græco-  
 rum sit; Morphea alba, & guada, Arabum; siquidem viraque morphea cutis passio est, non multum pro-  
 funda: alba tamen à pituita, nigra verò ab humore melancholico originem ducit, ac eorum pilii, aut fla-  
 ui, aut nigri sunt: serpigo, quæ Melas vocatur, non nisi in colore ab Alpho differre videtur. nam Melas  
 nigricat, & vmbra similitudinem præfert, Alphus albefcit; & in reliquis multum adincoem consti-  
 runt, porro Melas Celsi, Alphos nigra Actij, & Pauli, ac Morphea nigra Auicennæ eundem effectum  
 esse manifestò constat. Leuce Celsi in aliquibus symptomatibus Alpho assimilatur, magis tamen albefcit,  
 & profundius progreditur, in eaq; albi pilii sunt, & lanugini similes. omnia hæc serpunt, sed in alijs cele-  
 rius, in alijs tardius. Melas, & Alphos in quibuscumque varijs temporibus & oriuntur, & desinunt; Leuce  
 locum, quem occupavit, non facile dimittit. Melas, & Alphos curationem non difficillimam recipi-  
 unt; Leuce verò vix vnquam sanescit: at si quid ei virio demptum est, tamen non ex toto sanus color  
 redditur. à permutatione sedis affecte in albedinem affectus Leuce nuncupatur: at si in parte pilis orna-  
 ta oritur, eam non denudat, neque scabrosam reddit, sed eos in canitiem permutat, secus verò, af-  
 fectum insanabilem prædicat. Leuce igitur Græcorum, Albaras alba Arabum est, aut Celsus. veram autem  
 aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facile colligitur; incidi enim cutis debet, ut acu  
 pungi, si sanguis exeat (quod fere fit in Alpho, & Melas) remedio locus est; si humor albidus, aut lactea  
 humilitas; sanari non potest; itaq; ab hoc quidem alblindum est. docet Paulus panniculo laneo as-  
 p. priore cutim iricare. nam si rubicundior euaserit, medicina locus est; si idem color remanet, non con-  
 sanescit

10 sanescit. Leuce, quæ plura corporis loca occupat, difficilior tollitur, quàm quæ pauca deturbantur; item verulior, quàm recens, minus in medicina spei habere cõfendit. epulogando itaq; afferere possumus, albam Albaras Arabum, Leucem Celsi, & omnium Græcorum esse, & Morpheæ Arabum, Græcorumq; Alphas: differunt quippe colore, prout colorata est eorum causa materialis: qui verò horum affectus, il lenes sunt, & non asperi, poiiores iudicantur, ob id, quia magis sepulchra refidet marceria, & magis trõdæ est, præsertim in albis, quod lectus in nigris apparere solet; nam cause ita adusta non est, & si longo trans-  
hunc tempore, in leprâ degenerare solent.

P R A X I S.

H I duo affectus, quia materialem causam continere videntur, eorum curatio à totius corporis eua-  
30 cuatione inchoanda est. corpore igitur toto, si opus fuerit, euacuato, aut sanguinis missione, aut phar-  
maco, succum malum exuberantem educente, ad remedia valde siccantia contugendum est. & à leuioribus inchoando, probatur à Paulo, præsertim in pueris, salua hominis stomacho ieiuno, aut olivæ de nixio, quod à Gal. 5. Meymir. sic paratur: tritici grana multa accipiens, inculci alicui imponit, deinde laminam igitam ætæam tritico superimponit, & quod ex eo desuit liquidum, adhuc calidum exceptum impetiginibus illinito, hoc solo remedio, ait Gal. multo curatos vidimus. facit ad hoc flos cineris cum aceto, succus fumaris si luesit cum sulphure viuo, succus portulacæ cum aphronino, succus corticis lapacij si luesit cum veratro, succus radicum asphodelli cum alumine, & melle, succus hepaticæ cum nitro, & sulphure: medicamenta verò ea in vniuersum competere videntur, quæ ad scabiẽ pertinere dictum est.

De Psora. Cap. VI.

**P** S O R A summe cutis aspreudo pruriens est, imbecilliter excedens, varias figuras habens, furfuracea magis, quàm squamosa ex superficie emittens. igitur eà multi scabiẽ agram, & feram vocant. ab humore adulto, aut melancholia admixto produci-  
40 tur; & hac ratione corpora sic affecta, paulatim absumi videntur. differt à communi scabiẽ, & pruritu, in quibus tantum scalpendi desiderium apparet, & eorum causa est humor tenuis, non admodum falsus, in cutis porositatibus insertus, qui nec pu-  
stulas, nec furfuraceas squamas, nec vlcera producit. differt à lichene; siquidẽ psora interdum totius cutis affectus est, impetigo verò sedem particulare occupat. cõmuniter apud Medi-  
cos, affectus, qui cutis superficiem tantum alterant, & aspredinem gignunt, pruritus, aut scabies, aut impetigo vocantur; si eam corrumpunt, & furfures gignunt, psora dicuntur; si verò squamas emittunt, aut le-  
pra, aut elephantiasis nuncupantur.

P R A X I S.

I N cura huius affectus in primis instituto vietus regimine, nempe frigido, & humido, sed temperatè, ac præmissa purgatione, præsertim sanguinis missione; qui semper crassus est, primò à vena basilari, secundò à venis podicis, quas Græci hemorrhoidas vocant, ac attenuato humore superuacuo adulto, phar-  
maco purgandus est, idq; duabus aut tribus vicibus, medicamentis nẽpe ad scabiẽ tollendũ pbans. postmodũ p multos dies exhibetur patienti sumo manẽ 5. viij. feri caprini, aut ouini, aut asini, quod omni tẽpore dari põt, aut solũ, aut cũ saccharo, aut serapio violato, aut de fumaris, aut de inubo: vel vtrũ  
50 sequenti, 3c. fumor. borag. bugulossẽ añ. m. iij. cicorij, florum violarũ añ. m. iij. mercurij añ. m. ij. foliorũ fen-  
nig. Orietalis 5. j. fiat decoctio ad lib. 3. in qua dissolue sacchari albißimi 5. iij. triafantalorũ 3. j. & fiat spo-  
zema clarificatur, aut 3c. succi mercurialis lib. 5. succi borag. tantundem, fenæ 3. s. sacchari q. sufficit, fiat syrupus. cumq; aliqua sanguinis rectificatio apparuerit, ad localem affectionẽ devenire opus est; & primò balneum paratur, à quo cutis ipsa humectari possit, ac laxari, ad hoc vt viii. ossi succi euporeu-  
tur, & insensibiliter discutiantur, ac eorũ tollatur acrimonia, & ad hoc valet aqua fontis pura, aut 3c. horum malurẽ, fumor. lapathi añ. m. iij. hordei furfurum añ. m. ij. misce, & bulliant in sufficienti aque  
quantitate pro balneo. hoc factò ad ea medicamenta transiendũ est, quæ possint detergere, attenuare, atq; ex alto reuocare materiam, & illam siccare; quare alterum paratur balneum, in quo patiens in-  
greditur horis matutinis, & 3c. radicem m. ij. radicem elenij, enulam cam-  
panarum vocant, lib. 5. radicem accori, brionis añ. lib. 5. foliorum qualis, violarum, scabiosæ, fumaris, chelidonis, saponariæ, calamenti, hederis añ. m. ij. hordei integri, lupinorum, fabarum, lentili añ. lib. 5. s. furfuris lib. 5. ellebori m. ij. enquantur in aqua pro balneo conficiendo, & per triduum hoc vtrũ bal-  
60 neq; inde adde salis communis lib. ij. aluminis lib. j. & iterum per triduum balneũ ingreditur per ho-  
ram; postmodum in lecto modicum sudet, & tali inungatur linimento, 3c. radicem enulæ campanæ, lapathi acuti añ. 5. j. coquantur in aceto acerrimo, terantur, cribroq; trajiciantur, & adde sulphuris viui 3. j. salis communis torrefacti 3. j. s. succi limonis 5. ij. vnguenti cerussati, mercurialis añ. 5. ij. butiri, olei de tartaro, ceræ albæ añ. q. s. fiat linimentum, quo liniatur post vsum balnei: his non conferentibus. ad aquas medicatas, quas termerum, aut balnei isti vocant, aluminosæ esse debent, quales Appo-  
ni, aut Consens, aut ex agro Pisanò, aut ex agro Veronensi Calderianq; appellantur, se conferant.

## DIGRESSIO.

**H**oc vult affectuum omnium, qui cutim, & cutaneas partes infestant, causæ quamplurimæ esse solent, nempe interius, externæ, & coniunctæ. inter internas imbecillitas virtutis alteratiõis, & assimilatiõis enumeratur, quæ nutrimentum cutaneis partibus pro earum alimentis à virtute regniæ transmissum alterat. ac ipsum nutriendi membro, sicut illi deceat, assimilare non potest, siquidem à Medico dictum est, quod bona nutritio tribus adimpletur potestis. Prima est permixtura, quæ sanguinem, aut alacrum similem humorem in propinqua potentia constituitur, vt in nutriendi sedis substantia permixtetur, alterat, & permixtur: quæ, cum in hoc deficit, illa oritur dispositio, quæ à Latinis consumptio, & rabiditas, & à Grecis atrophia dicitur, in qua patiens ex nutrimenti penuria macrescit. Secunda est appositio, hæc nutrimentum iam sic præparatum membro adhibet, & appodiat, vt eius eundem substantia, & partes. hæc si aberrat, eius dignoscitur error in hydrope, & hernia carnosæ. Tertia est assimilatiua, cuius officium est assimilare nutrimentum acceptum, & iam pro parte permixtum in partibus membri membro nutriendi in substantia, & colore: quæ errat interdum, aut ob eius imbecillitatem, aut nutrimenti malitiam, vt in morpheæ, & psoa aperte dignoscimus. nec potentia nutritiua ab assimilatiua multum differt, nisi in nomine: idcirco ambe simul pro quarta potentia in nutritione numerantur: & hæc deficit, aut quando suo non fungitur officio, aut quando non recte operatur: deficit in operatione, deficient nutrimento conuenienti, & determinata materia: imperfecte agit, dum nutrimentum, & materiam corruptam, aut à naturali extraneam, administrat: dum verò non agit ob alimentis defectum, fit corporis consumptio. si ob eius malitiam, scabies, aut psoa producit: si enim sanguis, qui carnis materia est, ex prauo generatur nutrimento, tunc & caro, quæ ab eo producit, talis erit: quippe si sanguis pituitosus fuerit, caro pituitosa erit: si melancholicus, melancholica nec obstat dicere, est caro pituitosa, ergo est caro: si quidem caro est, sed deprauata, & sic de alijs dicendum est: permixtantur enim eius propriæ qualitates, & color, & alimentum, quod illi ab ea potentia, quæ nostrum regit corpus, de mandatur. in tumeam carni non permixtur, sed liuida, aut cinericea fit, idcirco magis si nutrimentum continuum pituitosum est, vt in conchiliis, ostracordematibus, & polytis, aut similibus pituitosis animalibus videtur. huiuscemodi actio, & permixtura dignoscitur in his, qui leuce, aut viriligne affliguntur: ubique enim dum caro mali est, & sanguis optimus ad eam demandatur, illi permixtur, & corrumpitur, nec negari potest, ait Gal. de mente Arist. quod id, quod nutritur à proprio nutrimento permixtum possit, vt de animalibus, & plantis experimentum commostrar, dum & locum, & alimentum permixturant: ergo in affectibus cutaneis, nutrimentum, ambiens qualitates, & debiles virtutis assimilatiuæ, sunt causæ potentes permixturæ & membri substantiam, & eius proprium colorem: modò varij morbi apparent, nempe pruritus, vt in scabie sicca; pustula, & excoriationes, vt in scabie humida: interdum alfredines pruriginosæ, planæ, sine squamis, vt in impetiginibus: modò pruriges asperæ, & squamosæ, vt in leuce, albaras, & lepra. interdum cutis superficiem inæqualem, asperam, squamosam, & nigram, vt in elephantico morbo apparet: facit etiam ad cutis detractionem melancholicæ aluius visceris mala habitudo, aut obstructio, dum sanguinem ab humore melancholico expurgare non possunt: praua victus ratio, veluti cibaria falsa, eruda, acida, acuta, valde calida, vina potentia, nimis coctus, præsertim supra repletionem, & eorum cõmentu, qui aut affecti sunt morbo aliquo cutaneo, aut parati sunt ad affectus ipsos pruriginosos, & melancholicos.

## De Lepra. Cap. VII.



**Q**uia lepra cancer vniuersalis est, ac inter famosas cutis desquationes numeratur, facilis cognitionis, sed difficillimæ curationis, longam de ea scriptores Græci, & Arabes historiam protulerunt: Nos verò in hoc loco breuissimam de ea viderimus summam, sic Græci lepram describunt. Lepra cutis affectus est, asper, pruritus, & perpinguifolus, pili cum modo squamulas ex se emittens, circularibus etiolonibus, eutem alius depalcens, originem ex atra bile trahens, & corpus paulatim absumens, differt à psoa ob id, quia psoa summam illam corporis cutem exedit, variis figuris habet, quæ si furacea magis, quàm squamosa ex superficie descendit, de facili verò in lepram couertitur. Aucscnam lepram sic descripsisse, legimus. lepra est infirmitas mala, proueniens ex sparsione cholera nigre in corpore toto, quare corrumpitur, complexio, & figura membrorum, & fortasse eorum continuitas, ita vt corrodantur membra, & cadant casu, qui fit ab viceratione, & est sicut cancer communis toti corpori: cuius due reperitur differentia, alia quæ viceratur, & alia, qua non viceratur; alia citò terminatur, & alia cum pariente manet tempore longo valde; & hæc leonina, quia leonibus accidit, vocatur, eius indicia sunt, quoniam terribilem facit patientis faciẽ, & cum poit in forma leonem, & rapaciter tenet, quod caput, rapacitate leonis, & de ea curationis spes nulla relinquitur: nam confirmata est, & inobediens, & non cessat corrumpere complexionem

Gal. lib. 4. vire.  
nasit. 5. de con.  
sympt.  
Arist. 2. 4. 11.  
Ant. 1. 1. Dole.  
6. cap. 4.

Gal. lib. de col.  
rig. 1. 1. vire.  
mor. 4. de leuca.  
morb. 1. 4. cap. 4.

Gal. 4. de symp.  
ca. 12. Act.  
Pa. 1. 4. cap. 4.

1. 4. 11. 1. 1.



- 80 membrorum qualitate contraria qualitati conuenienti virg, donec perueniat ad membra principalia, & interficiat: incipit in primis in extremitatibus, & membris leuibus, & ibi cadent pili, & alteratur color eius, & interdum exulceratur, deinde paulatim ad totum corpus extenditur: & si eius prima origo est in visceribus, primum velligium in extremitatibus, & superficie apparet: A Medicis dictum est: quid de melicholia expellitur ad vnum membrum, secundum eius dispositiones, facit accidere in eo scirrhum, idest duritiem, aut cancerum: quae si fuerit subleili denotans, proenit estioniemus, idest cancer viciellatus, & manifestus: si verò expellatur ad superficiem cutis, euenit baras, seu albaras Arabum, quae leuce Graecorum est, aut morpha nigra, quae alphas est, aut impetigo, quae lichenas est, & his similia: si spargitur in corpore toto, & putrefcit, facit febrem melancholicam, si autem vniuer, & non putrefcit, ex ea euenit lepra, cuius apud Auiic, tres sunt species. vna quae mitis est, paucorum accidentium, quae non exedit, sed tantum cutis dispositionem alterat, & diu perdurat. & haec verè est lepra Graecorum; à sanguinis fece producta, & est mala psora species, profunda, & furfuracea. Secunda mala est, à qua ea omnia resultant accidentia, in eius definitione descripta, & haec cancer vniuersalis est, à melancholia ex bilis adustione genita, quae omnium pessima est. Tertia pessima iudicatur, & leonina vocatur, habere credo, elephantiam Graecorum esse; siquidem & nomina, & cause, & effectus, idem ferè esse videntur; & quid de elephantia ipsi dicant, audiat Fracastorium fol. 177.

aut. p. de sympt.  
cas. lib. de leu.  
baras. g. & lib.  
de vniuer. c. 17.  
Auz. de lepra.

Gal. 3. Prog. c. 50.  
cas. lib. de leu.  
baras. c. 4.  
Auz. 1. l. c. de  
humor. c. 17.  
c. de lepra.

De Elephantia. Cap. VIII.

- 30 **R** A. o. sed in aliquibus regionibus, affectus quidam cutaneus vniuersalis apparere solet, qui elephantiasis, elephanticus, leontiasis, & satyriacus, & vulgò morbus sancti Lazari vocatur. eius indicia haec sunt, patietes in alpe du horribiles sunt, prauè emittunt odorem, atri eundem coloris, eorum caro obscura, inaequalis, aspera, & dura efficitur, extrema tumescunt, magnè deformitatis, elephantiasis ob eius magnitudinem nuncupatur: sicut enim elephas animal magnum, caetera magnitudine excedit; sic elephantia inter morbos maximus est, satyriacus vocatur ob id, quia patientis facies permutatur, & faciei satyri formam praefert. ait Aetius de mente Archigenis, morbus elephanticus, ab aliquibus leontiasis, & satyriasis dictus. leontiasis, quia frons, & facies patientis tumida, aspera, & inaequalis redditur, leonibus admodum similis: satyriasis, quia facies eleuatur, & ruit, ac in latum extenditur, ac si ridere videatur, & more satyrorum ad Venerem parantur, qui ob coctum ad appetitum, leti, & ridentes semper videntur. Ait Celsus, Ignorui pene in Italia, frequenter in quibusdam regionibus esse morbus est, quem elephantiam Graeci vocant, isque longis annumeratur. Tota corpus afficitur ita, ut ossa quoque vitari dicantur. summa pars corporis crebris maculis, crebrosque tumores habet. rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur; summa cutis inaequaliter, crassa, dura, & quasi squamis quibusdam exasperatur; corpus emacrescit, furas, manus, & pedes intumescunt. vbi verus morbus est, digiti in manibus, & pedibusque sub tumore conduntur; fibracula oriunt, quae faciliè tot malis obrutum hominè consumit. ex India elephantem originem duasse affirmat Gal. de compo. med. secum. loc. & auctore Lucretio, ob Nili flumina, & praua dieta. Credit Plinius; hanc horrendam affectionem nouam esse, nec prius in Italia notam, quam tempore magni Pompeii, quae eius faciem primò mollescere tentauit, postissimum in naribus ad lentacule modum: inde totum corpus occupauit maculis diuersorum colorum, inaequaliter procedentibus, ac si aspera, & nigra scabie affligeretur; postremo digiti, manus, & pedes, cumidi facti sunt, quod est symptoma proprium huic morbo. Aegyptijs peculiaris affectus est; ac regionibus Septentrionalibus, ac rigorosis hiugoribus subiectis: & facillime viros, quam mulieres; pueros, & adolescentes, quam consistentes; & senes offendit. timorosis morbus est non solum patientibus, sed amicis, amicis, & innicis, ita ut familiares ab eorum conuersatione se alienent, eius abhorrentes eccegiunt. nam Aer. dicebat, malum esse secum comerulum tenere, siquidè aer à furore alteratus, ex visioforum spirituum exhalatione attractus, & inspiratus, alios facillime infestat. Inter contagiosas dispositiones, nempe quae transunt de subiecto in subiectum, & inter hereditarias, ac eas, quae à primo genio in vtero materno, aut à patris gentura, aut ex sanguine menstruo producuntur, enumerantur: Huic morbo multi affectus praecedere solent: nempe pruritus, impetigo, psora, & lepra.

Gal. 3. de cau.  
sae. lib. de  
causis c. 17  
lib. de color. m.  
g. c. 4.  
Celsus. c. 5.  
Plinius lib. c.  
1.  
Aer. lib. 3. cap.  
110.  
Paul. lib. c. 4.  
Auz. 1. l. c. 17.  
c. 17. de leu.  
baras. c. 17.

- 60 De causis Lepre, & Elephantiasis. Cap. IX.



Vamplurimè possunt horum affectuum esse causae, nempe internae, & externae. internae, & efficientes sunt mala temperamta membrorum nutritionis (hepatis videlicet) ac lenis, à temperie lapsa per nimiam caliditatem, & fortem siccitatem, vnde humores, & sanguis aduruntur, proprium non ferunt naturam, & sunt melancholici, aut complexio totius corrupta: vnde sequitur error in virtute, & potètia alteratrice, & assimilatiua; & nutrimentu, nec appodiat, nec permutatur, nec assimilatur, aut ambe istae causae simul ad eundem effectum concurrunt, nempe ut sanguis, aut ceteri humores adurantur, nec interdum cessat huiusmodi praua operatio, virae qualitatibus contra-

contra-



contraria, donec alectret, aut corrumpat aliquod principalium membrorum extrinsecus tamen eius actio  
 apparere incipit; nam piluli cadunt, & cutis color permittitur, aut exulceratur: inde paulatim per totum  
 corpus serpendo expanditur. possunt & aliquæ causæ iuvare ad hoc conferre, quales sunt fortis quæ-  
 dam obstruendo membrorum interiorum, aut cutis, & carnis; quare perforatur innatus calor, & san-  
 guis infunditur, & crassus fit; aut lien suo fungi nequit officio, sanguinem videlicet ab humore terro-  
 stri, & melancholico deindare; aut viscerum expulsiua facultas imbecilla est, & sanguinem melanco-  
 licum in venis podicis (quas hæmorrhoidas Græci vocant, aut matricis) expellere non potest. facit pa-  
 riter ad hoc habitu do patientis frigida, & sicca; plurimo sanguine crasso, & viscido scærens, aut ea co-  
 plexio, cuius multum de pituita acidâ, & salâ procedit. Causæ externæ sunt defectus in regimine om-  
 nium sex rerum non naturalium, pariter & contactus rei tali morbo affectæ; prava dicta, ac vicia cibari-  
 orum difficili concocionis, & prævi nutrimenti, prout est panis non fermentatus, & malè coctus, pi-  
 scis magni paludosus, osti acodemata, & cœchilia, carnes asæte, & sale conditæ, aut magnorum anima-  
 lium, bovm antiquorum, asinorum, camellorum, caprarum, leporum, & similibus; fabæ, lentes, caules,  
 vina nigra, crassa, & similia cibaria, quæ melancholicum succum gignere possunt. Vitanda est nimia ges-  
 & exercitium immoderatum, & laboriosum; coitus supra repletionem, potissimum nimis; repletio  
 mali cibi usque ad nausearum facietatem; prave cogitationes, & negotia multa, ac vanaque actio;  
 quæ cum in ventriculo corrumpere potest; aut ambientes aeris æstuosa caliditas vna cum corruptibili  
 efca. Hæc enim omnia, tenuiores partes nutrimenti discutiendo, crassiores in melancholici humo-  
 ris naturam permutare solent. Atra bilis, de qua elephantiasis origo est, duplici modo generatur; vel  
 enim ex melancholico sanguine, & exulcerioreq; & veluti eius limo, vel bile flava, utriusque mixtis, na-  
 scitur: hinc est, quod accidentia squiora sunt, quæ in lepra, & affectus magis turpis, & magis pericu-  
 losus. rarissime huiusmodi morbus oritur, & iuvenes ob malam vivendi rationem, vt Alexandriæ oc-  
 currit, aut in sanguine menstruo procreati, aut à paterno semine male affecto geniti, aut à contagione  
 corrupti, mori solent; & seniores ob nimiam atræ bilis copiâ in eis repetitam lædi.

## De signis Lepre, &amp; Elephantiasis. Cap. X.



ARII sensus concurrunt in cognoscendis symptomatibus, tum lepræ, tum elephā-  
 tiasis, ob id quia in propatulo sunt, & extrinsecas sedes occupant; visus quippe:  
 nam in lepra incipit color cutis fieri rubens, inde tendit ad nigredinem, & in oca-  
 lis offuscatio apparet, ad nigredinem declivis; postea cutis complexio corrumpit-  
 & pilis attenuantur; & postquam eorum radices corrumpuntur, cadunt; postea  
 vero permittitur cutis habitu do ad dispositionem diversam, & forma patiē-  
 tis turpis fit, & facies terribilis, squamosa, & nigra; tactus, ob id quia aspera cu-  
 tis est, & squamas emittit, ac glandibus plena: auditus, quia vox patientis rauca fit, & apparet in anhelitu  
 stridura, & multum stertnat; odoratus, quia odor corporis, & propriè in sudore, & anhelitu, ad foetorem  
 declinat. cognoscitur etiam leprosi à multis eorum operationibus levis, animalibus, vitæ alibus, &  
 naturæ alibus; siquidem eorum mores melancholici sunt, mali, & dolosi. multiplicantur in somno somnia  
 melancholica, & sentiunt in somno, quasi super eos sit grauedo maxima, & suffocari timent; pulsus  
 debilis est, & tardus, vires imbecilles, ac tardi, & pigri sunt; in eorum operationibus pusillanimes sunt, &  
 timidi; non appetunt, nec perfectè cœcoquunt: hinc est, quod pravo nutriuntur sicco, & pessimum ge-  
 nerans sanguinem: excrementa stinguuntur, & cruda, ac scolorata sunt; vrinæ albæ sunt, & claræ, ac in  
 eorum fundo trouentur squamosi, sursuracci, & arenosi apparent: at cum corporis totius forma, & habitu  
 do corrupta est, eam interiora leprosa sunt: vnde postea symptomata largiora euadunt, & patientes  
 sunt elephantiasis, & satyrnici, & adeo deformes apparent, quod fugientes ab eorum aspectu, amicos,  
 & affines relinquendo se abscondunt, & mori cupiunt; varijs eminentijs cooperiuntur in tota corpore:  
 potissimum, & primò in fronte; deinde in labijs, & mento, obstructis, nigris, & duris; venæ sub lingua  
 nigre tument, & varicosæ fiunt; postremo pedes tumidi fiunt, ac varicibus replentur, & nates ob respi-  
 ratum aerem corruptum exulcerantur vlcere insanabili: cum verò ad vltimam maliciam huiusmodi  
 deuenierit dispositio, si patientes punguntur, non sentiunt; & si secetur eorum caro, non exit sanguis,  
 sed humiditas pituitosa, latea, crassa, & nigra, corrodendo cartilago nasi, deinde cadit nasus, & eius extre-  
 mitates, & currit virus lætens: si verò phlebotomantur, & reditur sanguis ita adustus, vt arcæ formam  
 præferat, & hoc est indicium vltimæ malignitatis.

## De cura Lepre, &amp; Elephantiasis. Cap. XI.



RO confesso habetur, Actio, & Paulo affirmante, quod auxiliorum vni morbis fortiorē  
 esse oportet. hac ratione elephantiam nunquam curari, vt quia nulla superior medicina  
 reperitur, credendum est. hoc sic probatur. si cancer, veluti elephantiasis quædam, vna  
 oborta particulæ inter morbos insanabiles ab ipso Hipp. relatus est: quantò magis elephā-  
 tia, cœu totius corporis cancer aliquis, ab omni abhorrebit remedio? id vt magis ex Auc. cum can-

- 10 cer, qui est lepra membri vnius, sit de illis, quibus non est sanatio: tunc quid dicemus de lepra, quæ est cancer corporis totius? ergo quantum minus, si lepra non sanatur, sanabitur elephantiasis, qui morbus deterior est, & fortius non cognoscit præsidium? pauca idcirco de eius curatiua methode explicaturi sumus: sed lepræ curationem describentes, dicimus, quod si materia iam ex toto extra venas fuerit, & in musculorum substantia expansa, & imbibita (quod ex corruptione formæ dignoscitur) phlebotomiam nullo modo competere, nec minus pharmaciæ; siquidem materia talis reuocari non potest. iuuabit tamen, ne augeatur, antecedentem causam minorando; pharmaca enim fortiora in materia inobediēti, & non præparata, magis nocere, quam iuuare, videtur: attamen nec balnea, nec vnguentæ ante corporis perfectam euacuationem administrare oportet. talia enim præsidia porros obstruunt, & morbum augent: multa igitur in hac curatione consideranda veniunt, nempe optimus vitæ modus, 20 qui diæta nuncupatur, materia longa, & conueniens concoctio, siue præparatio, opportuna totius corporis euacuatio, præsertim sanguinem mittendo, aut esseborum exhibendo, ac topicorum (veluti laurærum, aut balnearum visus) administratio: vltimò accidentium correctio.
- Quod ad victum ergo attinet, vitanda quæcumque crassius, malique succi sunt, & concoctio difficilia: bonis ergo, quantum fieri potest, vescendū carnibus: quales sunt inter volatilia, gallinacci pulli, perdices, phasiani, atque auiculæ omnes, in montanis, & non in aquis locis vitantes. inter quadrupes, vituli, hædi, veruices, oues gallinarum recentia, mollia ac tremula, saccharo condita: pisces verò parui sunt, & petrosi, aut littorales. omnia autem, tam carnes, quàm pisces, sint potius elixa, quam assa, & cum petroselinis radicibus, odorata; menta condita; datur betæ, attritæ, & spinacia, omnibus in bono iure decoctis. possunt ferula communi modo parata ministrari, ad quem modum hordeo optimè cocto. solo anetro adiecto, vesci poterit: nec non & farfæ similiter potest vtiliter isofculum ex cui vnicuique vitello parari: ex fructibus, passilule, pistacia, & fici: potus sit vinum clarum, tenue, odoratum, sulsatum; potius, quam rubrum, vel nigrum, nec dulce, nec acidum: quod etiam si esset abstinthio, scena, & boragine in demiarum tempore conditum, non potus solum, sed magni medicamenti vim haberet. Aer eligendus, quantum possibile est, temperatus: si ad alterum tamen extremum vergat, ad tenuè potius, quam ad crassum, inclinet: turbulentus, nebulosus, atque obscurus fugiendus: solitudo, tenebræ, assidua cogitatio dimittantur: aspectus rerum viridum, & iocundarum, odores vè, & res gratæ probaturæ. Euacuatio totius corporis per hunc modum procuranda. 30. ellect. lenit. catolic. añ. 3. vj. de pomis. 1. decocti passilularum, soliorum scenæ, polipodij, & f. præparetur quod residet ex humoribus, longa quippe præparatione, sc. de fumaris, de epihimo, bilantino, cum aqua lactis. & vltimò purganda est. Hierapachi, aut Hieræ Gal. confert amech, decocto epihimi, pilulæ indi, de lapide lazuli, de fumaris.

De Combustione, quæ sit ab Aqua, vel ab Oleo feruentibus.

- Q**UANDOQUE, teste Auicenna, evenit, quod super aliquod membrum hominis effunditur, aut oleum, aut aqua feruens, & statim in illo caustur operatio ignis; nam inflammatur, & in eo bullæ, seu ampullæ diuersæ oriuntur. Erratio aut ampullæ, & vesicæ ab huiusmodi vitione, & non ab igne, generantur, hæc est. Natura, & operatio caloris est attrahere: & tanto maior hæc attractio, quanto potentior est agens in opere: quando igitur membrum carnosum læditur ab aliqua re feruente, tunc illa pars accenditur, ita ut in loco illo attrahantur multe materię, humide, tenues, & vaporosæ, quæ facillimè partes carnosas penetrant, ac permeant usque ad cutem, quæ densa, & dura est: quam cum non possint penetrare, sub illa vniuntur, & eleuantur pulsule; seu vesicæ diuersæ, quæ aeris, & aqua repletæ sunt. Et huiusmodi effectus facilius ab aqua, & oleo feruentibus, produciuntur, quam ab ipso igne. nam ignis naturali sua qualitate calidus, & sicca, humidum substantiis, cum membri consumendo, facilius in illo escharam, quam vesicam, generat. Et hinc fit etiam, ut oleum, & aqua, aut quævis alia similis res humida, in membro intemperiem introducit, quod non fit ab igne: nam ipse omnes discretas, & malas intemperies rectificat. Huiusmodi autem vitionum alie sunt: momentaneæ, magnæ, & profundæ cum latione nedum ipsius cutis, verum etiam carnis, nervorum, venarum, & aliorum membrorum: alie verò superficiales; & cutaneæ tantum sunt: alie similiter lædunt huiusmodi mines iam ætate prosectos, laboriosos, fortes naturæ, & duræ carnis: alie verò lædunt pueros; multo res, corpora mollia, & tenellæ carnis. Hoc autem à nobis dicitur; nam iuxta varietatem ætatum, exercitiorum, ac complexionum, debent etiam variari medicamenta in fortis, & debilis operatione.

DE CVRATIONE.

**I**N curatione huiusmodi vitionum tres necessariò requiruntur intentiones. Prima, iuxta Auicennæ sententiam, est opem ferre, ac succurrere membro austo, antequam vesicæ generentur. Secunda est regere locum iam vesicatū. Tertia est moderi viceribus, quæ post vesicæ quandoque remanere solent. Quò ad primam operationem, opus est, teste Auicenna, statim succurrere, & auxiliari, antequam vesicæ oriantur, cum fantalis, aqua rosacea, & camphora: neque oportet permittere, ut medicamentum huiusmodi exsicceetur, sed sepe, ac sæpius iterum apponere pannum lineum in aqua valde gelida, benè ma-

Vide Hippocratem de Viceribus, & Galienum in 5. lib. an. cap. de Aulio nibus.

de factum

In y. ad Alimē.  
cap. 18.Cellis comēdi  
de farinam liri  
ui cum Melle.

Lib. 3. cap. 4.

Lib. Dēbis.

Lib. de comp.  
med.4. v. 1. cap.  
10.

defectum nam hoc remedium impedit, quò minus locus ille lēsus veficetur. Huiusmodi curatio eadem  
est, quam ponit Rasis, qui asserit, quòd si adustio fuerit magna, fiat phibotomia in opposito latere  
subtiliter ratio videtur, & applicentur medicamenta infirigidantia. Inter recentiores, inale pro eadem  
intentione probant albumina ouorum qualitata cum aqua rosacea, & oleo rosacco; & alij addunt ace-  
tum. Dioscorides, & Plinius pro huiusmodi operatione tunc ut succis potulace, lactuca, plantagi-  
nis, solatri, vermicularis, & temperuuiis quibus succis addi possunt bolus Armenus, terra sigillata, chi-  
mola, cerussa, spodium, hyargarium, plumbum vitum, aut aliud simile medicamentum. Et ego te le-  
ctorem monco, me in leuibas adustionibus plures vsum fuisse succo brassicę, seu (vt vulgo dicitur)  
caulium, à principio vld; ad finem, cum maximo honore, aut luto illo, qui reperitur in cellis vinarijs,  
vbi continuo vinum in terrā distillat, & cadit. Inquit Auicenna, quòd multi de Paulo Aegineta in lib. 4.  
cap. 1. loquentes, solliciti sunt in hac operatione irrorare adustiones ab aqua teruenti factas, cū aqua  
obuiarum, vel cum aqua cineribus admixta. & probat quodē Paulus hęc remedia, & alia quamplurima;  
& Auicenna testatur bonū effeij; admiscere farinam hordei, & vnguentū ex calce. Sed cum veficę re ve-  
ra apparere cęperint, dicebat Aetius; Noli eas statim aperire, seu tūmpere; sed postquā aliquantulum  
perdurauerint, aperi, seu rumpe illas, vel desuper impone huiusmodi medicamentum. 3. foliorum mali-  
tę, plantaginis, violarum, añ. M. i. decoquantur in aqua dulci, & contundantur, addendo litargiri; a gē-  
tę, chiliaz, cerussę plumbi añ. 3. pulueris coriandri, farinę hordei añ. 3. ij. olei mirtini, violati, ompha-  
cini añ. 3. i. s. vitelli oui numero. 3. & fiat emplastrum. Et vesicę ruptę, seu aperta, statim humidas;  
quędam subtilis, & citrina emanabit, & in loco illo exoritur quodam, seu vlcus cutaneum ro-  
manebit, cuius remedium, & curatio (inquit Rasis) erit vnguentum de cerussa, quod, iuxta eius  
doctrinam, hoc pacto preparatur. 3. cerę colatz 3. ij. olei rosati 3. viij. & bulliant, & adde ce-  
russę quantū sufficit, & misce optimē, & cum frigetheri incęperit, adde albuminis oui q. sad inspissandū,  
continuo agitando. Et subiungit Rasis, quòd hauc medicamento multi modicū camphorę addere con-  
fueverint, quare fortā euenit, vt à multis vnguentum album camphoratum appelletur. Nihilominus  
idē Rasis inquit; Volo te monere, quòd medicamentū pro adustionibus à nobis postremo loco expo-  
nitur, est ipsum vnguentum album, quod ex cerussa, oleo rosato, & cera tantum, & non ex alio confici-  
tur, & hoc est vnguentum album Pauli, Oribasij, Actuarij, & Auicennę. Apud quamplurimas mulieres  
incuriatur Venetiarum medicamentū quoddā in vfu est, quo in leuibas adustionibus, & in tenellis, &  
mollioribus corporibus vti solent, & est mirabilis operationis. Accipiunt autem interiore lambuci cor-  
ticem, quam in oleo ebullire sinunt; posthęc, facta forti expressione, addunt cerā albam cū modico pin-  
guedinis hirci; & cum omnia liquefacta fuerint, addunt cerussę, masticę, & olivani añ. q. s. pro reforman-  
do vnguento tenui. Dioscorides nobis etiam hoc medicamentū reliquit, quod ex succo caulium, cinere  
tamarisij, cerussę (quę vulgo biacca dicitur) & albumine oui paratur, & si locus exulcerabitur (ait Ra-  
sis) ipsumq; vlcus magnum sit, cura eius erit vnguentū ex calce, quod hoc modo cōponitur. 3. Calcis  
albe, & mundi, aque clarę, & dulcis, quantum sufficit, vt tota calx mergatur, & insinuat per duas ho-  
ras maneat. Aqua coletur, & alia recens superimponatur, & sic quatuor vicibus fiat, & colata vltima  
aqua, fac calcem frigesieri, & cum oleo rosacco in mortario plumbeo omnia misce diligenter, & conti-  
nuē, donec fiat linimentum. Actuarius hoc idem vnguentum de calce hoc modo pręparat. 3. calcis  
viuę decies in aqua extingit, & lavat in aqua frigida, & exciscat 3. iij. cerussę in lacte lotę 3. iij. cam-  
phorę 3. ij. olei rosati 3. xij. cerę nouę 3. iij. & s. artem fiat vnguentum. Auicenna autem idem vnguen-  
tum ex calce hoc modo parari iubet. 3. calcis viuę, quam septies in aqua frigida lauat, donec omnis acui-  
tas ab ea remoueat, & cum modico cerę, & olei rosati, aut simplicis, longa misione, & agitatione  
fiat vnguentum, cui nonnulli addunt chamolę, albuminis oui, & parum vini. Alij quodq; alio modo pa-  
rant, nempe, 3. calcis, vt supradictum est, pręparatę, & cum succo betę, vel succo caulium, oleo rosa-  
to, & cerā fiat vnguentum. Animaaduertendum est autem, Medicorum sententiam esse, quòd quodlibet  
oleum in hac operatione debeat semper esse lotum: idem etiam verificatur in mineralibus, & in cera. Nā  
testibus Paulo, & Auicenna, huiusmodi medicamenta ab omni acrimonia, ac mordicatione omnino im-  
munia esse debent. Ego quodq; in vlcibus ab adustione genitis olei de calce parare consueui: cui quan-  
doq; addidi vnguentum de succo solatri, de litargirio crudo, de cerussa, de minio, aut illud tam ē Gale-  
no celebratum diapalma. Cum autem in membro affecto inflammationes apparuerint: tunc inmodico  
ex vnguento rosato Mesue, multum conueniens erit, aut ex diapalma cū oleo omphacino, vel mirtino  
ad formam linimenti redacto. Cum verò cicatrizandi opus fuerit, locum cum vino rubeo tenui lauat,  
in quo ebullierint rose, myrrylli, balustia, plantago, cauda equina, & alumen roscę, postea vnguen-  
tum, vel diacadmium, applicato.



**V**nde aliquod membrum ab igne actualiter laesum fuerit, illico, & quamprimum in illo quædam crustæ causantur, quæ Græci escharas vocant; quæ tantò maiores, & profundiores sunt, quantò fortior, & longior fuerit ipsius ignis operatio, membrum immediatè applicata. Hoc autem dicitur, quonià si læsio fiat ab aliqua re den siori, & duriori vehementer calefacta, sed non ignita, & rubea: tunc nò escharæ, sed ampullæ generabuntur; quia agens illud non est potens in consumendo humiditate membri, sed tantum in attractione propter suam caliditatem. Caudantur autem vesicæ, sicut dictum est de aqua, & oleo: & ob id dicebat Auicenna, quòd pruna, & ignis perficus, hoc est herpes, generant escharas, sicut & ignis, & cauterium. Sunt autem escharæ partes carnosæ, aut cutaneæ mēbris, quæ à propria humiditate derelictæ, & priuatæ remanent, propter caliditatem vehementis, & violenti applicationem: unde euenit, ut pars læsa arida, & sicca remaneat: quæ postmodum à membro separatur, vel ex naturæ operatione, vel quia subitus oritur sanies, aut propter applicationem medicamentorum humidorum putrefactibilem. Sed quia alibi iuxta mentem Aristotelis, copiosè de modo generationis eschararum, quæ à Medicis Epheleides vocantur, dictum est, ideo nunc dicendi finem faciam.

## DE CVRATIONE.

**P**ossunt combustiones lædere corpora diuersimode, & etiam membra diuersa: quare debent Medici diligenter combustionum diuersitates curare, iuxta patientem varietatem, id quod non solè ætatis respectu, verum etiam sexus, exercitij, & habitudinis corporis, nec non diuersitatis membrorum: nam facies in cicatrizando, quam diligentiissimè poterit fieri, ad maximam equalitatem, & naturalem paritatem reduci debet: & manus ita disponi, ne motus arbitrij impediti relinquatur: & sicut in quibusdam pueris obseruauimus, ne digiti simul adhærentes, aut distorti remaneant. Sit ergo hæc primaria intentio. Secunda sit in seditione doloris, sunt, n. accidit hæc nimis molesta: & ob id Galenus dicebat, quòd quoriscumq; passionis diuersæ complicatæ sunt, cura principalis ad illam convertenda est, quæ maiorem ruinam, & damnum minatur. Tertia verò sit in escharis auterendis. Et quarta in curandis vlcēibus, prout eorum necessitas postulabit. Ut autem prima exequatur intentio, probat Paulus applicari totum ouis bene quassatum, aut aramentum, quod scriptores videntur, aut olibanum in aqua limpidâ liquefactum, aut lentes coctæ, & contusæ suntq; medicamenta hæc commendata ab Aetio, & ab Auicenna, qui cum curam aduersionis ab igne genitarum pertractat, pro prima intentione vnguentum quoddam probat, quod ex oleo rosato, & vitellis ouorū conficitur, vel bolum Armenū cum aceto. Inquit Rasis, quòd si fortissimus dolor adfuerit, tunc vitelli ouorū cum oleo rosato quassati, & agitati applicandi erunt: si verò dolor vehemens non fuerit, emplastrum cum lentibus decoctis, contusis, & exorticiatis, cerussa, & aceto paretur. Est etiā aliud medicamentum Auicennæ ex oleo rosato, & cera q. s. addendo calcem optime lotam, cerussam, albumen oui, lac, & modicum opij. Est pariter emplastrum Auicennæ mirabile extendiui, farina hordei, albumine oui, & oleo rosato. ego autè pluries hoc medicamentum expertus sum. Et olei rosati crudi s. vj. ceræ s. liij. totum liquefiat in vase aheno ad ignem, cui adde calcis viuæ septies lotæ s. ij. cerussæ, litargirij argenci a s. s. i. i. albuminū oui n. ij. lactis muliebris s. ij. opij. s. s. & fiat vnguentum. Cum verò remissi fuerint dolores, si escharæ fuerint adhærentes, itaut non separentur, opus tunc est adhibere medicamenta, quæ habent vim emolliendi, & putrefaciendi: sunt, n. aliquando nimis profundæ, & ob id probant Medici ea medicamenta, quæ sanè generant, quæ propter à multis laudatur vitellum oui cum oleo rosato; & ab alijs buticum cum melle, aut malua decocta, & contusa cum axungæ porcina, & melle, Auicenna autem solo butiro vtitur. Cum verò crustulæ ceciderint, non erit extra rem aliquo leui mundificante vlceræ abstergere, quod hoc modo parari poterit. Et succi plantæ ginis, apij, an s. s. ly rosati simpl. s. ij. farinæ hordei, olibani a s. s. i. vitelli oui n. i. ceræ q. s. ad reformandum vnguentum tenue, & sicut ait Celsus, vlceræ mundificato, & purificato, pro illius repletio ne prædictum medicamentum, quo sæpius uti consueui, erit mirabile, vel aliud simile. inquit Scribonius in libro de compositione medicamentorum, descriptione 221. Emplastrum in aduersionibus mirabilis est operationis, quo, post multorum experientiam, nullum melius adinueni; nam quàmprimò læsæ parti applicatum fuerit, statim dolorem demulcet, & successuè in totū auert, & quàm citissimè vlceræ sanatur. Et ipsum ægenti, adipis porcini purgati, ceræ albæ a s. s. vj. vitellorum ouorū assaturum n. vj. liquefactæ cera cum adipe, & finatur refrigerari, postea adde litargirium puluerizatum, & oua contusa, & confice medicamentum. Multa alia remedia ab antiquis probata adducere possem, præsertim à Celfo, pro huiusmodi vlcerum curatione: sed quia multa ex illis mihi non satisfaciunt; quia vel sunt nimis fortia, vel nimis longæ compositionis, & quia etiam satis abundè de his dictum est à nobis superius, silentio hæc præteribo. Hoc vnum monebo, quòd cum levis aliqua combustio in facie occurrerit, ut optima, & equalis inducatur cicatrix, erit hoc admirabile remedium, nempe accipiendo porcina axungam, & ad assiduum ponatur in veru, & fac, ut guttur in vase, in quo sit vinum album, recipiantur: cū verò refrigeratum fuerit, colligito pinguedinem, cui cerussam, litargirium argentum, & modico camphoræ addito, & fac vnguentum tenue, vel vnguento ex pomò citri confecto vtete,

## ADDITIO.

**E**ST etiā aliud remediū mirabile, quo uti solitus sum. ꝑ. olei rosati ꝑ. vj. vitellorum ouorū nu.ij. vi tri albi subtiliter. pul. ꝑ. i. c. cerę albę. ꝑ. ij. corticis mediani sambuci m. x. bulliant simul, & postea colentur: Huic autem medicamento in combustionibus nullum simile reperiri posse, certō scias. Omnī Medicorum sententia est, quod in combustionibus, ut omnino prohibeatur, ne vesicę oriatur, oportet remedia valde frigida adhibere, à quibus duæ profectō operationes emanāt. Prima est, repercussio fluxionum, & prohibitio, ne fluant materię ad locū iam inflammatū, & dolorosum. Secunda est, inflammacionem auerre, & dolores sedare: tamen videmus multos per huiusmodi medicamentorum applicationem dolores augeri. Hoc autem euenit, quia à frigiditate exteriori porofarię clauduntur, & calor intus concluditur, & cum in suis actionibus magis vigoretur, maiores etiam dolores causantur:

## De morsu canis rabidi.



**M**ISERABILEM, & periculosa est ea passio, quę à canum insanorū, & rabidorum morsu oritur. Miserabilem appello, quia, teste Celso, lib. 5. cap. 27. ꝑ. si sit percussus, & aquas odio prosequuntur: Periculosa verō dico, quia, auctore Dioscoride in lib. 7. cap. 2. quamuis vulnus paruum, & cutaneum sit, tamen si remedia presentanea non sint, incidit patiens in timorem aque, quam passioem Gręci hydrophobiam, & hidrophobogiam nuncupant, & in prædicta miseria pereunt. Inquit Dioscorides, cuius historiam omnes alij Medici recentent, Galenus in suo

Col. lib. 4. c. 27.  
Dioscorid. 7. c. 2.

Gal. in suo An.  
n. lib. 5. ad Cpt.  
cap. 10.  
Art. de comp.  
med.  
Ausc. 6. 4. tra. 4.  
cap. 1.  
Rasis 5. ad Al.  
mans. cap. 10.  
Aet. lib. 6. c. 24.  
Pau. lib. 5. c. 2.

Antidotario lib. 2. ad Cęsarem. & in libro de Theriacha. cap. 6. Aerius lib. 6. cap. 24. Paulus lib. 5. cap. 3. Rasis in 8. ad Almanforem cap. 10. Actuarius de compositione medicamentorū. Auicenna in 6. 4. tract. 4. cap. 5. quod in hac forti, atq; terribili passione, quia canis est animal domesticum, atq; homini familiarissimum; & quia sæpe rabidus sit, ob id difficulter ab ipso cauere possumus, & læsiones, quę ab eo fiunt, valde periculose, & quandoq; inevitabiles fiunt. Et eius rabies alia non est, quàm suę cōspicacionis permutatio in malignam, & venenosam malitiam. Hęc autem conuersio, vel ab aere, vel à cibis corruptis, vel à potus intopia originem ducit. Ab aere rabies hęc oritur, teste Auicenna, quando in temporibus maximē calidis humores in cane aduruntur. & ob id, iuxta Aetij sententiam, in Autumno sit in sanus, & rabidus: aut cum in maximis frigoribus, & algoribus in eo humiditates congelantur, & insertim sanguis ipse, ducendo ipsum ad nigredinem, & ad atre bilis naturam: quapropter Vere aduenientie rabidus efficitur. Hanc etiam rabiem generant cibaria, sicuti quando canis occisorum sanguinem lambit, aut corporum mortuorū, ac putridorum carnes deuorat, aut aquas putridas forbet, & sic melancholia putrida totus repletur. Dignoscuntur autem canes, quando sunt rabidi, ex hoc, quod cibum & potum aspernunt: & licet sitim patiantur, aquas tamen odio habent: ita ut cum illam viderint, vel ei obuiam iuerint, timent, tremunt, & horrent: hoc autem, teste Paulo, sit, quia in eis partes omnes à veneno obfesse sunt. Alij verō asserunt, eos aquas timere ob maximam eorum siccitatem, cū eorum acquiritur complexionis sit aqua penitus contraria, & aduersa: anhelant fortiter, aures demissas tenent, & decliues: sunt serē in totum taciti, & muti: & extra os tenent assidue linguam, maximam spumose saluę copiam emittentes: nunquam quiescunt, sed veluti dementes huc & illuc seruntur: ita ut neq; proprios dominos, neq; familiares, aut domesticos agnoscant: sine latratu, aut alio rumore homines intradunt, & bestias: raro latrant, & eorum vox rauca efficitur: & si aliquando latrare audiuntur, ceteri canes ab eis aufugiunt. Sunt quoq; læsiones huiusmodi à proprijs patientum operationibus permutatis, vel corruptis manifestę. Nam, sicuti dicebat Dioscorides, ipsi quoq; rabidi efficiuntur, & quandoq; in primis diebus vulnus tantum cum nullo, aut paruo dolore apparet: post hęc corruptę cogitationes manifestantur, promptitudines ad iram, murmuraciones, & clamores: irrequisiti respondēt, aut extra propositum loquuntur: lucem odio habent, eorum facies inflammatur, & oculi eorum rubicundi fiunt: singultus, & sitim inextinguibilem patiuntur: nihilominus aquam timent, & continuo eam cupiunt: quietem non inueniunt, iano conuelluntur. & quandoq; more canum latrant: postremō maxima ira commoti ceteros homines mordent, qui etiam postmodum rabidi efficiuntur. Paulus, doctrinā Oribasij inhrens, quędam experientia docet, ut verō dignosci possit, an passio rabida sit, nec ne. Hoc autem vnum est, quod etiam Actuus, Rasis, Auicenna, & alij probant, ut accipiat nux, quę per horam continuam, super ipsum vulnus applicetur, & contineatur, ita ut stricte super vulnus alligetur, & postea gallinis exhibeatur: quam si manducauerint, scies nocumentum non esse venenosum: si verō illam recusauerint, tunc tutus eris, quod nocumentum à rabido cane proueniet. Idem quoq; continget, si vulneri frustum panis alligaueris: aut cum eodem pane virulentiā, aut aliam quamuis humiditatem, à vulnere emanantem, absterges, illumq; gallinis in cibum dederis, aut alteri cuiuslibet animalis: ex cuius morte certo scies nocumentum illud venenosum esse. Censurę Medici omnes, quod hęc, vel alia huiusmodi experientia in principio morbi fiant. Nam, teste Dioscoride, & alijs, nocumenta hęc quandoq; manifesta non fiunt, nisi post septimam diē, aut decimā quartā, aut vigesimā primā, aut vigesimā quartā, aut post annum, & ut multi asserunt, etiam post septimū annum: quapropter tempora hęc expe-

10

30

40

50

60

10 expectanda non sunt: sed statim cum opportunis remedijs succurrendum est. Communis est omnium Medicorum sententia, quod raro patientes illi curentur, qui ad hydrophobogiam, hoc est ad aquæ iri morem, & aliarum rerum humidarum odium pervenerint: cum eorum complexio omnino in naturam venenosam, & in ficcam habitudinem conversa sit, & humoribus melancholicis corruptis repleta sit. Quod omnino verum est, multis exemplis, & experimentis Dioscorides, & Aetius testantur, asserentes, quod multi hac passione affecti ante huiusmodi timorem feruati sunt.

DE CVRATIONE.

20 **Q**UONIAM passio hæc à causis extrinsecis provenit, & oritur, & à venenoso dente imprimitur, qui locum vulneratum immediatè lædit, & postea venenum serpendo totum corpus occupat, patientisq; complexionem suæ venenosæ, & mortificæ æqualem reddit; ita ut, teste Auienna, alteretur, sicuti in leprosis evenit. Ideo prima operatio in hac curatione erit, locum affectum corrigere, & venenosam causam absumere, quæ in loco illo reperitur. Quapropter Dioscorides lib. 7. in proximo, & Galenus in libro de Theriaca ad Cæsarem. cap. 6. dicebant, quod venena bibita assiduis vomitibus consumuntur: ea verò, quæ à dente imprimuntur, scarificatione, & cucurbitularum applicatione tolluntur. necnon medicamentis acris, cauterizatione carnis, & quandoq; toxicis membri amputatione. Et huius nocumenti particularem curam pertractans Dioscorides, in lib. 7. cap. 2. asserit, non magis timenda esse magna vulnera, quàm parua; sic quoque magis magnas scarificationes, quàm paruas: nam à magnis vulneribus maior sanguinis alterati, ac venenosi copia effluit. quapropter affectu locum profundis scarificationibus scarificare opus est, ut totum venenum exire possit, neq; in aliqua parte cõtineatur: posthæc super scarificatione cucurbitulæ applicandæ sunt, cum multa flamma, ut sint in attractione potentiores. Idem quod; Celsus in libro 5. cap. 27. asserbat, iniquens, quod si nocumentum à Cane rabido productum fuerit, statim venenum virulentum cucurbitulis extrahere oportet: postea verò, si locus affectus nervus, venis, & musculorum capribus priuatus fuerit, igne cauterizandus erit. Dioscorides in lib. 7. cap. 3. vitionem quàm maximè commendabat, hæc autem est, aduale cauterium, quod quidem præstantissimum est remedium contra virulenta, & venenosa nocumenta. Nam ignis in virtute, & potentia cæteras omnes operationes excellit; nam venenum absumit, malam loci effectum intemperiem corrigit, & nocumentum vltierus produci non permittit. Probat Aetius, Paulus, Auienna, & omnes alij Medici hæc duas operationes in principio morbus. & inquit Auienna, quod cauterij attractio in veneno corruptionem non producit, sicuti alia attractiua medicamenta efficiunt. Et licet sint præstantissima remedia, nihilominus dicebat Dioscorides (quod patet à Galeno in libro de febris, textu & commento. 8. & 15. & ab alijs comprobati est) quod, postquam excharæ à cauterio ceci derint, non oportet permittere, ut cicatrices in vlceribus imprimantur, nisi ad præfixum, & determinatum tempus, quod ex Dioscoridis, & Galeni sententia vsq; ad quadragesimum diem produci intelligitur. Nec timendum tibi est, dicebat Dioscorides, si vlcera vsq; ad tempus illud virulenta, & inflammata fuerint. & ob id dixit Auienna in 6. 4. tract. 4. cap. 9. Non opus est, ut vlcera in principio consolidentur, sed dilatanda sunt, & super illa cucurbitulæ applicandæ sunt, & vlcus apertum manere minus 40. diebus non potest, & secundum Paulum, 42. apud Aetium verò 60. Et si euenerit, iuxta omnium Medicorum placita, quod vulnus conclusum fuerit, opus erit ipsum aperire, & apertum seruare, eiq; iuxta doctrinam Dioscoridis, falsamentum quoddam superimponere, quod ex alio flicstri consulo sit, & ab eodem in lib. 2. cap. 169. scorodon vocatur: quod aduersus venena, & animalium venenosorum morsus mirabile, & efficacissimum est: aut ex capris, quæ, ipso in lib. 7. cap. 168. teste, multum profunt canum moribus, si cum aceto, ruta, & melle terantur. Idem Dioscorides triticum mansum, & erucam satis superq; commendat. & Aetius panem cum sale laudat, maximè vero radicem acutæ rumenicæ, quæ oxylapatum, vel vulgo lapatium acutum nuncupatur, probat. Est verò verecunda, & periculosa vulnerum venenosorum curatio, teste Commentatore Alexandrino in libro de seclis, commento 15. ante decimum tempus: scribitque multos ob istam curationem perisse, & ob id omnes Medici, & Galenus in 2. de Antidotis, multa acria medicamenta recensent, & quæ atrahendi vim habent: conscrunt autem, quia vulnus apertum manere faciunt. Medicamentum Galeni. xi. de simplici medicina. cap. 27. & in 2. de Antidotis, & in lib. de secretis ad morsu canis rabidi, quod vsus est Eschiron, & quod probatur à Paulo, hoc est. 3. vi. aceti acris 3. vi. picis liquidæ 3. iij. opoponacis 3. i. s. maceretur opoponax in aceto, & fiat medicamentum. Auienna remedium hoc mirifice probat, subdens: Forfan tibi sufficet alliu, cæpsa, eruca, & alia huiusmodi medicameta, quæ à rusticis pro turissimò experimento in vsu habentur. Hæc sunt operationes, quæ in primis diebus celebrandæ sunt. Quo tempore, dicebat Auienna, necessarium esse, ipsum ægrotantē, aut per vim morus, aut per balneū sudare, quæ fuit etiā antiquorū opinio. Dioscorides ipsos ante, & post cibū sudare iubet. Celsus verò dicebat aliquos post morsu canis rabidi consueuisse ipsos egros balneo immittere, permittentes eos vsq; ad lassitudinē sudare, vulneribus apertis, & detectis manentibus, ut veneni virus facilius efflueret: Cui verò à balneo exibant, eos optimo, & puro vino nutriebant, quod, teste Celso, omnibus canonicis omnino contrariū est. Auienna dicebat, Medicū non oportere in primis diebus circa euacuationem sollicitū esse, sed tantum materias ad partes externas atrahere debere: nō euacuationes ipsę multoties in

Diosco. lib. 7. in proximo Galien. de th- riac ad Cæsar.

Diosco. lib. 7. cap. 2.

Cel. lib. 5. cap. 27.

Diosco. lib. 7. cap. 3.

Aui. 6. 4. tract. 4. cap. 9.

Gal. 1. de simp. mod. cap. 27. de 2. de Antid. de lib. de secret. ad mor. can. rab.



causa esse solent, quòd venenū à circumferētia ad centrū penetret, & feratur ad partes internas vñā cū humoribus alijs, qui educendi essent. Cum verò post duos, aut tres dies cū medicamentis, vel alio auxilio optime, iuxta vires, attraxerint cū si aliquā materię portione penetrasse dubitaueris, poteris cū euaquare. Quòd si euenerit, inquit Auicenna, q̄ ob aliquā causā fortis attractio facta nō fuerit, tūc statim euacuatio fortis necessaria erit, tēpe vt humores ipsi melicholici, & venenosi educantur. Et ob id, cū fuerit necessaria euacuatio per pharmacū, laudantur à Medicis catartica, ex elleboro cōposita. Et inquit Dioscorides, nobis tutò licere, non semel, atq; iterum, sed sæpius vsq; ad 40. diē elleborifinis vti, quę sunt medicamenta ex elleboro cōposita, subdēs in hoc remedio tantū reperiri hōiūam, q̄ multi lassi, qui iā ad aq̄e timorē perueniant, sumpto elleboro, seruati sunt. Et Paulus dicebat, q̄ omnī euacuatiōi efficaciō illa est, quę ex elleboro componitur. Et ob id censēbat Auicenna, q̄ catartici est illud, quòd melancholiā purgat, sicut est elleborū, vel pillulę, quę ex elleboro cōponuntur. Aliqui vero pillulas tribus Russi, ex myrrha, croco, & aloē confectas, & cū cortice radicis ellebori nigri vigoratas, exhibent: quę aduersus venena mirificē probantur. Dioscorides quoq; testatur euacuatiōes esse maximā iuuamenti, & quòd vñā cū euacuatiōe, vim veneni corrigere oportet. quapropter in hiscē cōbinatis operationibus hierā diacolocinthidos probant quia verò valde amara est, lac scissile addit. Celsus dicebat, q̄ si medicamentū sua amaritudine aegrotū lēdit, ipsum mel addere poteris. Paulus verò monebat, q̄ ante aq̄e timorē fieret purgatio cū hyera, addito lacte scissili. Auicenna autē hyerā Russi mirabile esse dixit, cuius 3. j. cū vino optimo exhibētur. Quantum verò attinet ad euacuatiōē, quę fit per sanguinis missiōē, nullū de ea verbū fecit Dioscorides: Celsus verò censuit, q̄ cū vulnera in principio cauterizari nō poterunt, sanguinē ex vena detrudere nō erit inconueniēs. Ob id Auicenna dicebat; Si in principio magna plenitudo apparuerit, fac phlebotomiā, aliter, hoc est, si non fueris in principio, vel corpus valde repletū non inuenieris, noli phlebotomiā facere. Cum verò phlebotomaueris, dicit Auicenna, noli permittere aegrotanti, vt suū sanguinē inspiciat, & cū phlebotomiā facis, caue, ne materia à partibus externis ad cordis regionē ducatur, & propterea venā vulncri quā maxime propinquā fecabis. Quò verò ad mortū, & quietē, inquit Rasis, q̄ transactis tibus diebus egrotans nullo pacto laborare debet; tunc. n. venenū per vniuersū corpus diffusū est. Quiescat ergo, sitq; lēto animo, & horis suis consuetis dormiat, & vt inquit Auicenna, caueat à frigore; est enim huiusmodi passionibus valde inimici, & noxiū. Quod verò ad cibū, & potū attinet, omnes Medici cū Dioscoride concordant, qui ait l. b. 7. cap. 4. q̄ corū victus ratio huiusmodi esse debet, vt vino, eodemq; tēpore, contraria sit veneno, & eius malitiā obundet, eiusq; penetrationi obstat, ob idq; allii, porri, capas, & alia cibaria acuta, acetosa, & valde aromatica cōmendat, pro potu probat vinū mersū, & purū, laudat quoq; lac, & passum, nēpe vinū cōsū, aut dulce. Paulus vinū vetus, purū, & dulce exhibet. Celsus vinū dari merū iubet; est. n. omnibus venenis valde cōtrariū, & inimiciū. Eundē ordinē seruat Auicēna, asserens, quòd allii, capas, & familia cibaria sunt medicinę, & cibi, qui venenis optimē resistunt, illaq; ex corpore expellunt, quando aegrotus ab eorū vsu non impeditur. Quòd si euenerit, q̄ patiens hęc cibaria renuat, cum multi allii, & cepas abhorreat; iuxta Auicennę sententiā, theriacā magnā exhibeto, & medicamenta ex cancri flusialibus, cancroisq; in cibū exhibeto. Probant quoq; Medici theriacam, diatessaron, mitridatū, & inter simplicia medicamenta gentianā, chamedriū, nigellā, abinthiū, poliū, bolum Armeniū, & terram Lemniā. & hoc est regimen victus, quod in primis diebus obseruari debet, vt pręseruetur aeger à veneno, & à timore aq̄e: Quibus primis diebus elapsis, forsā ratio victus tantę caliditatis non erit conueniens; nā facillimē in ipso egrotō calor febris accenderetur, qui potens esset ipsū cor inflāmare, & ad eā partē venenū attrahere, & sicut ex lōga Medicorū doctrina constat, in venenosis passionibus multū ea conferunt, quę frigiditate, & siccitate veneno obstant, & cor ipsum defendunt, & ob id forsā Rasis 8. ad Almans. cap. 10. iubeat, q̄ aliquot diebus transactis, aeger in loco frigido quietus teneatur, eiq; in potu daretur vinū cū multa aqua, & lacte, pręcipiens, q̄ carne, & melle nutriatur, ne exsicceetur, vultq; q̄ totus oleo rosato infusatur, & q̄ exenata ex aqua bordeacea, succo pillii, portulacę, & oleo rosato ei imponantur, & iubet, q̄ rationale regimen simile sit illi, quod melancholicis exhiberi solet. Iubeat quoq; Auicenna, q̄ facta euacuatiōe cū catartici, aegroti aubus, & pollis pinguibus alcerentur, exhibito vino, dulci, veteri, & lacte, nec non auiū montanarū iusculis, & alijs cibis humidis, & Actius l. b. 6. cap. 24. qui mirabiliter hanc curationē pertraxit, inquit, q̄ in ratione cibandi indigentia, & repletio vitandę sunt, sed multo magis indigentia, hęc autē est valde tenuis diēta; nā hęc in humoribus malignitatē multiplicat, quod in viceribus malignis minimē conuenit; quare opus est alimentū moderari, qđ fit facile ad concoquendū, & ad corpus alendū, cū magna succi nutritiui quantitate, qui quotidie alui excrementa moueat, & pariter lotiū educat, & propterea Auicenna cibaria diuērica, subtiliatia, ac vinā potentē prouocantia, dari pręcipiat, sic quoq; consentientibus Dioscoride, & Celso. Pro hęc etiam operationē probat Actius radicē lapathi, feniculi, asparagi, & brassicę laudat pariter pisces mollis carnis, cuiusmodi sunt gammari, cancri, echini recentes, cū vino, & melle. Inter carnes verò, partes extremas animalū, omnes aues montanas boni succi, & facili cōctionis, cū vino tenui, albo, & non admodū veteri. Insuper vult Actius, necessariū esse per multos annos pręseruationē, viuendo in timore: quolibet autē anno, appropinquante tēpore nocuementi, faciendā est euacuatio cum hyera, & quandoq; theriaca ipsā vtendum est. Hoc au

Diosc. l. 7. c. 4.

Rasis 8. ad Almans. cap. 10.

Auicenna l. b. 6. c. 24.

44.

10 tē totum est, quod Medici de hac tediosa, & molesta curatione, ante aque timorem locuti sunt. Cū  
verō eueniret, q̄ egrotus in hydrophobia incurrat, & omnia humida timeat, & vt ait Celsus, aquas  
fugiat, & sibi crucietur, tunc spes salutis dubia est. de his autē sermonē faciens Dioscorides, inquit, q̄  
Eudemus, de quo sepius mentionē fecit Galenus, vinum tantū liberauit ab hoc morbo, dicit q̄ The  
mison aliquos curatos vidisse affirmat, neq̄ curationis possibilitatē negat Dioscorides lib. 7. cap. 1. sed  
tamen morbum hunc molestū, & periculosū esse, proteſtatur, quod etiā ab alijs Medicis omnibus cō  
probatū est. Et Celsus dicit huic affectui vinum tantū remedium reperiri: hoc autē est, vt patiens  
ex improposito in aquam proiciatur, & taliter alligetur, vt si natatē ignorauerit, possit modō submergi,  
vt multū bibat, & modō ex aqua extrahi: si verō æger narandi artem calluerit, tandiu in aqua detinen  
dus erit, donec inuitus multum bibat, & saturetur. nā hoc auxilio, inquit Celsus, vno & eodē tēpore  
30 perdet sitim, & aque timorē. Hoc autē verū est, quod in hac operatione suboritur timor, ne corpus pa  
tients ex timore, & aque frigiditate, conuulsione incurrat. vt autē ab hoc periculo tutus seruetur, inquit  
Celsus, q̄ quā primū ex aqua exierit, oportet, vt in oleū calidū immittatur, hoc autē experimentum  
apud alios Medicos non inuenio: sed vtrūq̄ reperio antidotū à Dioscoride positum, quod ab omnibus  
alijs scriptoribus, & veteribus Medicis, à Galin. 2. de Antidotis. & in x1. de simpli. cap. 27. Actius in 6.  
cap. 24. Paulus in 5. cap. 3. Actuarius in lib. de cōpos. medicam. Rasis in 8. ad Alm. ca. x. cōprobatū est,  
ponitq̄ illud in lib. 7. cap. 2. & in lib. 2. cap. 12. vbi de canceris sermonē habet, inquit huic esse particu  
lare, & peculiare remediū ad morsū canis rabidi, quando egrotans iñ hydrophlogus, hoc est aquæ timi  
dus, factus esse vocatq̄ illud antidotū esse canceris fluuiatilibus, & hoc modo paratur. sic canceris fluuiatiles,  
eosq̄: cū lignis vitis albæ cōbure, & serua cinerē, eamq̄: in subtilissimū puluerē redage, sumito quodq̄ pul  
uerē subtilissimū radicis gentianæ benè cribatū, & cū medicamentū cōponere volueris, accipito pul  
ueris cācorū duo cochlearia, & vnū pulueris Gērianæ, & vini optimi cyathos quatuor, & misce, & hunc  
potū in mane in quatuor vicibus patienti exhibe. q̄ iñ antidotū citō sumere incæperis, quantitas hæc iusti  
ciens erit: si verō duo, aut tres dies elapsi fuerint, opus erit quantitatē triplicare. & asserit Dioscorides,  
hoc medicamentū adeo prætans esse, vt vnica potio multis satisfecerit: quapropter cū maxima fiducia  
eo vti opus est, neq̄ prohibet hoc medicamentū, q̄ pro tanti periculi cautione nō possit etiā alia in vñ  
haberi, & seruari: nā multo melius est medicamentū multitudine terre, quā ob negligentiam ad necē  
tendere. Galenus in 2. de antidotis. medicamentū hoc Democriti fuisse, testatū reliquit, asserens insuper,  
q̄ Niceratus medicus, eo, tanq̄ medicamentū probato, in amicorū curatione sepe vtebatur. laudatq̄  
Galenus hoc ipsū medicamentū iuxta Dioscoridis doctrinā sic cōpositū, absq̄: vlla differētia: sub  
40 dē multis Medicos laudare, q̄ patienti per viginti duos dies continuo drachma semis pulueris gen  
tianæ cū vino exhibetur, quod etiā ab Actuario scribitur, nec non à Paulo, qui multos huic antidoto  
peritū sanguinē addere testatur. Actius hoc idē antidotum describit, sed alio modo, cōpositioniq̄: mo  
dū à Galeno in x1. de simplici medicina cap. 27. desumptū: qui de huiusmodi antidoto verba faciens fe  
cundū vñm Eschironē Empirici, eius concius, & præceptoris, senioris, & in medicamentis valde ex  
perti, inquit, q̄ Eschiron pro hoc faciendo medicamentū fruxiorum rubicundū cris tenebat, in quo can  
cros viuos ad ignē ponebat, eosq̄: affabat, quousq̄: in subtilissimū puluerē reducere posset, quem vñi  
continuo referuabat: asseritq̄: ipsū Eschironē hunc puluerē in diebus canicularibus, Sole existente in  
signo Leonis, præparare consueuisse, ipsūq̄: solū in aqua ad cochlearis mensurā per quadraginta dies  
continuo ad rabidi canis morsum exhibuisse. q̄ si in primis diebus egroti ad eius manus non peruenis  
50 sent, tunc quotidie eisdem duo cochlearia eiusdem pulueris in potu exhibebat: super vulnus autē cerotum  
hoc imponebat, nēpe ꝑ. picis lib. j. opopanacis j. iij. aceti fortissimi lib. j. a. dicitq̄: Galenus se hanc histo  
riam recitalle: quia multum in hoc medicamentū confidebat. nullus n. eorum, qui eo vñ vñt, vnq̄ pe  
rixi, eximiatq̄: idem Galenus, quod canceri fluuiatiles hoc eorum occulta proprietate operentur, à qua  
effectus hic mirabilis provenit. & licet hoc ex se medicamentum huiusmodi operetur, quando solum ap  
plicatur: tamē multo efficacius esse solet, quādo gentianæ, & olibano miscetur, sumendo scilicet oliba  
ni partem vnam, gentianæ partes quinque, & cinis cancerum partes decem. Et ego quidē (asserit Ga  
lenus) nunquā medicamentū hoc vñsum, nisi secundū formā, & rationē ab Eschirone traditā. Qua  
propter Actius lib. 6. cap. 24. & lib. 2. cap. 173. dicitbat, fieri medicamentum quoddā, antidotum ex can  
cris appellatum hoc modo. Vrantur cancri fluuiatiles magni, & viui in vase æreo rubicundo in mēse Au  
gusti, 18. die mēsis, ad ignem ex lignis vitis confecti, & eius pulueris sume ꝑ. 10. pulueris gentianæ ꝑ. 5.  
pul. olibani ꝑ. j. omnia misce, & patienti per 40. dies cochlear vñum eius cum aqua exhibebas, dummo  
do curatio in primis diebus incipiat, aliās verō mensuram duplicato. Asseritq̄: idem Actius, quod  
sola pulvis cancerum vitiorum ad morsum canis rabidi valde efficacē est. Componebat autem Rasis in  
8. ad Almanforē cap. x. hoc antidotū ex mente Galeni, ex partibus decē pulueris cancerum fluuiati  
lium in olibano vitiorum, & vnica parte olibani, gentiana nullo pacto adiuncta. Auicenna verō diuersi  
modō hoc medicamentum secundū duas descripciones ordinat, inquit: non esse exhibendum in pri  
mis diebus antidotum ex canceris, nisi cum aqua timor aduenient, laudat insuper Auicenna pro vñ  
vijs aperendis troiscos ex cantharidibus ad pondus drachmæ vnus, cum aqua tepida, multaq̄: alia  
antidota probat iuxta varias compositiones: sed ante omnia theriacā magnā ad sabē Aegyptiacā quan  
De Cur. affect. Lib. 111. Tract. V. Y 3 titatem

Gal. in 2. de An  
tid. 11. de Simp.  
cap. 27.  
Actius in 6. ca.  
24.  
Paulus in 2. de 3o  
Actuaria lib.  
de comp. med.  
Rasis 5. ad Alm  
anforē cap. 10.  
Et lib. 7. cap. 2.  
Et lib. 2. cap. 12.

Gal. 2. de med.

Gal. 11. de Simp.  
med. cap. 27.

Actius lib. 6. ca.  
24. Et lib. 2. cap.  
177.

Ra. 8. ad Alm.  
cap. 10.

titatem cōmēdat, quam etiam Galenus, Aetius, Paulus, & omnes alij Medici celeberrimi extollunt : 10  
Aetius vero quoniam omnes rabie affecti, ( vt etiam afferbat Gal. ) sui, & somno cruciantur : vt in eis  
focum induceret, mane antidotū ex cancris exhibebat, vespere autē antidotum ex nucibus : quod hoc  
modo preparatur. R. Sagapeni, opij Thebaici an. 3. ij. croci. 3. s. licij 3. i. s. pulv. nucum iuglandum,  
hoc est cōmuniū, non multum vetustarum 3. 40. & fiat mixtura. ex qua 3. j. cum aqua pluuiā calida  
in nocte parienti propinato. Et quia nimis tediosa esset hæc digestio, si vellēt tot generosa remedia lo-  
calia, & tot gloriosa antidota, à Galeno, Aetio, & alijs descripta, recensere; negotium Medicis illis,  
qui eis indigebunt, relinquam, vt ea in locis prælegaris requirant.

## A D D I T I O.

Q V I A præsi Medici in cura diuersorum morborū sub diuersis formis quibusdam animalibus aqua- 30  
tilibus vt consueverunt, quæ non minus in aquis dulcibus, & fluuiatilibus, quàm in marinis, & sal-  
tis vitam degunt, quæ cancri appellantur, animalia quidē de forma, & ridicula, de illis hoc loco men-  
tionem facere opportunū erit : nec tamen diuvs forsan erit sermo iste, licet sit de animalia turpi, & valde vi-  
li; cum apud Medicos valde celebris sit, & in eius operatione vita, & salus multorum hominum confi-  
stat. Quoniam verò illi decipiuntur, existimantes gammarum, seu gambarum in fluuijs nascuntur,  
& degentem, animal illud esse, toties à Medicis citatum, & vitatum huius cancri fluuiatilis nomine, sicu-  
ti à Galeno in 4. Carageni ad Cancorism. ab Aetio lib. 1. 6. cap. 47. à Paulo lib. 6. cap. 26. ab Auicenna  
in 3. 4. tract. 2. cap. 18. in carcinomatibus, seu cancri exulcerati curatione, & in cura morbus rabidi canis  
à Dioscoride, Galeno, Aetio, & alijs omnibus, & in viceribus pulsionis, quæ passio phthisis appellatur,  
à Gal. & Aetio lib. 8. cap. 67. & ab Auicenna in 10. 3. tract. 5. cap. 6. & in alijs morbis. sunt quæ moti ad cre-  
dendum, quod gambari sint cancri fluuiatiles ex hoc, quod non vident alios cancores in fluminibus, præ- 30  
terquam gambarum, & hoc quia ignorauerunt, & non viderunt, quod in Syria, & in Hetruria, & in mul-  
tis alijs locis inueniuntur cancri marini in maxima copia, qui etiā in fluuijs, & in aquis dulcibus nascun-  
tur, viuunt, & nutriuntur, & de his cancris, quos Græci carinos vocant, intelligebat Dioscorides in  
lib. 2. cap. 12. & in lib. 7. cap. 2. quod autem hoc verum sit, dicebat Dioscor. in lib. 7. in principio cap. 12.  
cinerem cancrorum fluuiatiliū eis, quos canis rabidus memorat, plurimum conferre. In fine vero ca-  
pituli afferbat eandem operationem fieri quoq; à cancri marinis, sed multo debiliorem. Ex quo pa-  
ter, Dioscoridem de specie illa cancrorum intellexisse, qui & in Mari, & in fluuijs viuunt, cum gamba-  
ri fluuiatiles, non in mari, sed tantum in dulcissimis aquis vitam degant, & à Græcis affati appellerent.  
Sunt autem cancri, & gambari animalia specie, & forma valde diuersa; nam ( teste Aristotele in 4.  
de historia animalium cap. 21. ) inter animalia crustacea solus cancer est sine cauda, & est figuræ rotun- 40  
dæ: sicuti autem omnes norunt, gambari sunt caudati, figuramq; oblongam retinent. Corret quoq;  
seu operculum cancrorum continuum est, & inæquale, gambarorum vero interruptum est, & leue.  
Gal. similiter cancrum, & non gammarum intelligebat x. 1. de simpl. medicina, quando dicebat, quod  
Peloys doctore in morbu rabidi canis cancores fluuiatiles, & non marinos commendabat, asserens, quod  
marini in aquis salis degentes plurimū salis admixti habebant: qui vero in dulcibus aquis viuunt, sunt  
multo minoris siccitatis; & ob id inter cancrum, & gammarum maximam diuersitatem esse asseruabat.  
Aetius in lib. 6. cap. 34. & in lib. 2. cap. 145. quia in cibis hydrophobicis cæcos, & gammaros proba-  
bat, & recens quæ sint animalia crustacea teneri corticis, cancores, & gammaros enumerat, nihil facili- 50  
mè suadet, quod cancri, qui in fluminibus, & in mari vitā degunt, sint veri cancri, posita à veteribus si-  
militudine inter carcinoma, & cancrum animal. dicebat. n. Gal. in 2. ad Glauconem in cap. de cancro.  
Vidimus plures in mām mulierum tumores quosdam figuræ, & effigiem cancrorum animalium in oen-  
nibus feruare; quapropter nulli dubium est, quod cancri, qui in mām oriuntur, & in alijs partibus, sunt  
figuræ rotundæ, & sic cum cancris rotundis hanc cōparationem faciebat Gal. quod Paulus in 4. cap. 26.  
confirmat. asserit. n. quod venæ carcinomatibus ita apprehendunt membrum, eiū affixæ inhaerent, sicuti fa-  
ciunt pedes cancri aquatici, & marini. Scium quod omnes illi, qui piscationem operam præbent, quod gāma-  
ri non eo modo inueniunt, sicuti cancri. Medici ergo in hac historia cancrum, & non gammarum intelli-  
gere volebant. Hæc verò similitudo inter carcinoma, & cancrum animal vera est non solum quod ad rotun-  
ditatē, sed etiā quod ad superficiem inæqualitatem. Et Paulus in lib. 6. cap. 45. inter carcinomatibus notas  
ponit ipsum esse tumorem inæqualem, quæ forma in cancrorum corticibus apparet, & non in gammaris.  
Intelligebat ergo Paulus de cancris, & non de gammaris, qui in cortice lenes, & æquales sunt. Huius opi-  
nionis sunt etiam moderni, existimantes hos esse veros cancores. Nam Virgilius Marcellus, Florenti- 60  
nus, vir quidem doctissimus, in suis traductionibus, & Cōmentarijs in Dioscoridē, in lib. 2. in cap. de can-  
crist inquit cancrum etiā animal ridiculosum, & deforme, & quod pueri cum illo ludunt, & iocantur, ip-  
sum irriteres: quia verò hoc cum gammaro non faciunt, sed ipsum manducant, idē credendum est,  
fluuiatiles cancores non esse gammaros. Ita quoq; studiosus, & diligens Matthiolus Senensis in suis Cō-  
mentarijs super cap. 2. 2. libri Dioscoridis, & in commento super curatione morbus canis rabidi in lib.  
7. hanc historiam differens, firmiter tenet cancores fluuiatiles hos enumeratos veros esse, & non gammaros.  
Ioseph Serapion Polenus iuuenis acutissimi ingenij, in suis Cōmentarijs super secundū librum Galeni  
de antidotis, exponens medicamentum Cratippi, inquit, quod etiam aliqui recentiores visu cancrorum  
fluuiā-

- 10 fluuialitium, & non marinorum probat, cum marini sint siccioris temperaturæ. in hoc autē hallucinantur, quia hæc cancerorum operatio ab occulta eorum dispositione, & proprietate proficiscitur, quæ eorum substantia emanat. Gal. 1. de simplici medicina. cap. 27. Actius lib. 2. cap. 175. & Paulus in lib. 7. in cap. de cancro, idem testantur. Quare optimi sunt etiam cancri marini, & Cratippus in sua compositione tantummodo dixit, & cancerorum 3. 20. mirrhæ 3. ij. croci 3. j. s. gentianæ. 3. j. piperis albi gr. 20. neq; idem Cratippus magis elegit cancores fluuialitiles, quam marinos. Nā Galenus descriptionem tractans medicamentū Claudij Apollonii, inquit, accipendas esse cancerorum marinorum vltorum libras tres, nullam de fluuialitibus mentionem faciens. Auicenna in 6. 4. tract. 4. cap. 9. asserit, quod aliquando fit etiam antidotum cum dimidio gentianæ, & duplo cancerorum marinorum.

Gal. 1. de sim.  
med. cap. 17.  
Act. lib. 2. cap.  
175.  
Paul. lib. 7. ca.  
1.  
de cancro.  
Auc. 6. 4. tract.  
4. cap. 9.

De Vlcerebus, & moribus venenosis.



VENERA venenata dupliciter considerantur, vel quatenus ab armis infectis veneno causantur, vel à quopiam alio instrumento: cuiusmodi sunt cultrum, ensis, lancea, sagitta, aut aliud simile: vel quatenus læsio hæc à morfu oritur alicuius venenosi animalis, nepe viperæ, phalangij, canis, aut alicuius piscis venenosi: aut à quauis alia causa similis naturæ: quæ passiones omnes, nisi opportunit, & presentaneis remedijs tollantur, patientibus mortem, & Medicis infamiam asserre solent. Dignoscitur autem horum vulnorum venenum ex hoc, quod mortalia accēdētia apparere solent, nempe, quod nocumento illato, statim patiens locus inflammatur, dolet, tumidum efficitur, primoq; fit liuidi, & postmodò nigri coloris, corrumpitur, & facillimè phacelos generat: Necnon circa locum vulneratum oriuntur ampullæ, & tubercula diuersa: patientis mens sana perturbatur, sapientq; illi superueniunt vomitus, nausea, inquietudo, febris, sudores copiosi, orfiones in interiori ventre, tremores, & conuulsiones: nec propterea Medicus aliam manifestam causam horū symptomatum agnoscit. Hinc fit, ut dum ipse in remedijs applicandis moratur, ægrotus ad necem perducatur.

CVRATIO VVLNERVM VENENATORVM.

- PRIMA operatio, & intentio, quam Medicus in curatione vulnerum venenatorum habere debet, est inquirere, an telum lædens, aut sagitta, aut spina, aut alia res exigui corporis in vulnere remansisset, & statim illam extrahere. Secunda verò operatio, est speculati. an corpus læsū sit valde repletum, & an in illo sint omnes conditiones, quæ liberè euacuationem per sanguinis missionem admittant. Nam
- 40 his duobus stantibus, Medicus sanguinem per venam vulnere propinquiore, quæ haberi, & secari possit, euacuare tenetur. Quod si euenerit, corpus non esse valde repletum, aut esse adhuc diem læsionis, aut aliam causam hanc operationem non admittere: multo melius est à venæ sectione abstinere. Asseruntq; Medici, quod extracto à vulnere telo, si ipsum angustum sit, nullum securus remedium inueneri, quam ignis o ferro pluries ipsum vulnus cauterizare. Quod si locus ob compositionem, aut ob frum, vlsioni opportuus, & aptum non fuerit, censent Medici, quod non apparente magno sanguinis fluxu, loco ipsi aliquam cucurbitulam applicare optimū sit prælidum: aut præcipere, quod aliquis homo vi lis ore proprio venenum hauriat, & exugat, illudq; labijs vulnere appositis extrahat: sed prius præparetur, sicuti inferius dicitur. Facta autem huiusmodi operatione, oleū sambucinum, aut lasminum
- 50 feruens vulnere imponendum esse, probant, superq; imponi aliquod attrahens medicamentum validū, & inter omnia asserunt in medicina nullum tutius reperiri, quam medicamentum meū sanctum, in curatione vulnere neruorū descriptum. Aut administraretur hoc medicamentū ab omnibus recentioribus approbatum. & Ceræ, picis nigre, axungie porcine veteris, olei versuti añ. 3. ij. galbani 3. j. & secundum artem hat vnguentum, aut & Galbani, sagapani, opopanax, assæ tectida, mirrhæ, piperis, sulphuris añ. 3. s. ster coris columbini, & anarini, añ. 3. ij. pulueris calaminthæ, mentastri añ. 3. j. dissoluantur gumme in vino, & postea cum modico mellis, terebenthinæ, & olei antiqui fiat emplastrū. Et si euenerit, quod venulæ serpat, & loca circumuicina inflamari inceperint, docent Medici, quod illico fiant profundæ scarificationes, & cucurbitulæ cum magna stāma applicentur: quibus ablatis locus patiens cum aceto, & sale, aut cum aqua marina, aut cum decoctione lapathi acuti, aut minoris dracontæ lauetur.
- 60 Subentq; quod postea parti affectæ applicetur Theriaca Andromachi, vel Mitridati. censent quoq; patienti ipsi exhibendam esse Theriacam magnam ad quantitatē subæ Aegyptiacæ, quæ est 3. 2. s. cum lacte, aut vino odorifero. Cōmendantq; aliqui, quod membrum in parte superiori aligeretur, si aptum fuerit, cum arcto ligamento, ita tamē ne membrum torpeat. i. stupidum efficiatur, sentiumq; amittat, ne venenum permeare, & ad mēbra principalia, & nobilia penetrare valeat. quod si causa aliqua ligaturam impedit, huiusmodi defensionem applicetur. & succi tormentillæ, diatami, serpentariæ, lanceo lē, plantaginis añ. 3. 1. acceti 3. ij. olei masticini, mirtini, omphacini añ. 3. s. coral. alb. spodijs añ. 3. ij. ossis de corde cerui 3. s. croci 3. s. boli Armeni, terræ sigillatæ sang. draconis añ. 3. s. ceræ q. s. & fiat vnguentum tenue. Dicitur Celsus in lib. 7. cap. 5. circa finem, omne venenatum vulnus indigere velocissimo auxilio, & cuiusmodi solet veneno infectus adhiberi, & moribus animalium venenosorum. Quia verò

Gal. 1. de sim.

Gal. lib. 7. ca. 1.

post cauteriū, aut post huiusmodi emplastra, solent hæc vulnera putrida fieri, & immunda, & escharis, 70  
vel alia immundicie repleti, aut ob attractionem medicamentorum inflāmari; ob id debet Medicus, elap-  
so tempore suspitionis, vlcera, si putrida sint, mundificare, & ad temperiem deducere, si alterata sint,  
aut secundū aliā necessitatem prouidere, & curare, sicuti in correctione accidentium suis in locis abunde  
à nobis dictum fuit.

## CVRATIO VENENOSI MORSVS.

**N**ONnulli opinantur, quod vulnera illata ab animalis venenosi videntis morfu sint multo gra-  
uiora, ac periculosiora illis, quæ à venenato telo, causantur. Nam venenum, quod ab animali pro-  
uenit, valde acutum, & penetrabile est, cum, autore Celsi in lib. 5. cap. 27. quilibet morfus venulenti  
quodam lædere soleat, quæ propria malignitate membri complexionem turbat, ac corrūpit, & ex in-  
trinseca qualitate cordi nocumentum asserre querit. Quapropter in horum morsum curatione Medi- 20  
cus apprime diligens esse debet, & licet Medici omnes assueverint multum differre curationem morfus  
singulorum animalium (etenim Dioscorides, Celsus, Aetius, & alij sigillatim diuersis animalium diuer-  
sorum moribus particularia medicamenta tradunt) nihilominus omnes istæ operationes ad duas prin-  
cipales intentiones reducuntur, nempe ad veneni euacuationem, & ad cordis defensionem. Prima (sic  
ti Gal. in 5. de simplici medicina in distinctione 4. cap. 4. docet) non fit nisi medicinis extrinsecus adhi-  
bitis, quæ aut per sortem attractionem respectu vehementis caliditatis, aut per similitudinem totius eo-  
rum substantię operantur. Et inter vehementiora, & potentiora remedia ad euacuandum venenum in  
moribus, dicunt omnes Medici, præsertim Dioscorides in lib. 8. cap. 16. Celsus in lib. 5. cap. 27. Paulus  
in lib. 5. cap. 2. Auicenna in 6. 4. tract. cap. 1. esse extractionem factam ab aliquo homine ore proprio, la-  
bia vulncri applicando, & exugando, qui non debet esse ieiunio stomacho, sed prius bene cibandus est, 30  
& os eius optimo vino lauandum est; intusq; modicum olei assumat, & opus ipsum faciat, & vulnere  
optime exugato, omnia foras expuat, & iterum os vino, aut aceto abluit, priusq; vulnus ipsum spon-  
gia in aqua, aut aceto madefacta, abstergat, iterumq; vulnere labijs apprehenso, exugando, sanguinem,  
& virulentiam venenosam extrahat. Hæc autem euacuatione facta, iubet statim secundam intentionem  
succedere, quæ profunda loci alterati scarificatione fit. Animaduertendum verò est, inquit Celsus, ne ho-  
mo ille vlcera in ore, aut in gingiuis, aut in palato patiatur: nam huiusmodi venena vlcibus, & non  
gustui, nocent; & illi, qui absq; vilo timore hanc operationem faciunt, Psylli appellantur. Tertia verò  
operatio fit cum cucurbitularum magnæ flammæ applicatione, aut alio quouis simili instrumento: Nā  
ab huiusmodi operationibus duæ vtilitates proficiuntur: quarum prima est, quod venenum virulen-  
tum, vel saltem magna eius pars euacuatur. Secunda verò quod venenum vltius non procedit, nec  
locum magnū, nec sanguinis magnam quantitatem occupare, aut lædere potest. Fit quoq; quarta eua-  
cuatio per carnis circa vulnus circulem incisionem, quam operationem cæteris potentiorē esse as-  
firmat Dioscorides: ad hanc autem necessariò sequitur vitio, & cauterium, quod est remedium inesse  
parabile, & tutissimum. Quandoq; etiam totius membri incisio necessaria est, quando illud incisioni  
commodum est. ita. n. docet Dioscorides, & in 3. de locis affectis cap. 7. asserit Galenus, quod rusticus  
quidam viniat, dum vindemiam faceret, & à Tyro in digito morderetur, ipsemet, vt à morte tuus  
esset, falce digitum abscedit. Probant quoq; Gal. Celsus, & Auicenna stricam ligaturam in parte, quæ  
est supra vulnus, dummodo ne huiusmodi sit, vt per eam membrum stupidum reddatur, aut vitam amit-  
tat. Optimum quoq; est, iuxta Dioscoridis, Galeni, Celsi, Pauli, & omnium aliorum antiquorum do-  
ctrinam, pullum gallinaceum per medium scindere, ipsumq; sic calidum cum parte interiori vulncri su-  
perimponere. Idem quoq; præstant hædus, agnus, carulus, aut parvula felis, aut anas, aut alius si-  
mile animal; nam doiores sedat, & virulentiam venenosam extrahit. Multi quoq; podicem, seu anum,  
aut extremitatem interstini vnius galli, seu gallinæ videntis vulncri applicant; nam sua potenti calidi-  
tate, & actuali attractione, hæc intentionem exequi solet. Quod etiam Celsus in lib. 5. cap. contra mor-  
sum Phalangij, fieri iubet. Multi quoq; affirmant, quod si mēbrum tale erit, quod commodè in puram  
terram immitti possit, vt manus, pes, aut brachium, si in illa triem diurnum spacio permanferit, pro certo  
à terra ipsa, à qua venenum oritur, erit extractum, & consumptum. Alij verò existimant optimum  
esse remediū, si medicamentis valde acerbis, & calidis in loco vulnerato phlegmone irriteretur. Ex qui-  
bus asserere possumus, quod omnes Medicorū operationes in huiusmodi affectionibus ad hunc finem  
tendant, vt venenum ad partes exteriores educatur, & euacuetur, & Gal. in 13. Methodi medendi. in-  
quit, 9. quod ex animalis venenosi morfu, & vulnere sequitur dolor, tunc duæ occurrunt intentiones cura-  
tuz, venenum euacuare, & doloris causam alterare. & ob id dicebat Auicenna (suntq; postrema ver-  
ba illius capituli) quod inter præcepta à Medico obseruanda, & in moribus venenosis considerata, est  
vulncri consolidacionem prohibere, vtiq; ad vltimam veneni, & eius malitiæ securitatem, quam ob cau-  
sam tot medicamenta cōmendabat Dioscorides, quæ à Galeno opispastica nuncupata sunt. Inter quæ  
multum, iuxta Aegyptiorum sententiam, liquidam picem cum sale, aut caprinum hæc in vino deco-  
ctū extollebat. Quæ medicamenta, quando Aegyptij fruges fecant, & merunt, ob serpentū timorem  
semper cum quibusdam fascijs parata tenent. & quando cucur, quod à serpentibus seduntur, aut in se  
candis frugibus, aut dum in vinosis antris, maximi æstus tempore, requiem captant (producent. n.

Arabia.

Celsi 5. cap.  
27.Gal. 7. de simp.  
med. dist. 4.  
cap. 4.  
Diosc. lib. 8. ca.  
16.  
Celsi lib. 5. cap. 27.  
Pauli lib. 5. ca. 2.  
Ausc. 6. 4. tract.  
cap. 1.Gal. 1. de lo. aff.  
cap. 7.Celsi lib. 1. cap.  
contra mor.  
Phal.Gal. 13. Meth.  
med.



- 10 Arabiæ, & Aegyptus multa animalia venenosa, & pessimæ qualitatibus fascias illas in pice infundit, & mebrum stricte, præsertim supra vulnus, ligant vno, vel pluribus involucribus, quæ etiâ vulnus ipsum operiunt, & super illud fascias incidunt, vulnus detegendo, & aliam picem calidam superponendo, & hoc est eorum tutissimum, & vnicum remedium. laudat præterea Dioscorides visum alij, & eparum minutim incisum, si supra locum morbus applicetur, libetq; sapius locum etndè aceto calido, aut aqua marina, aut aceto, & sale, aut decoctione calaminis sæpius lavari. Probat Actius valde applicationem theriacæ Andromachi, alij verò emplastrum ex fermento, iuxta Democriti traditionem: nonnulli autem emplastrum sacrum Diuini, secundum descriptionem Galeni in lib. 5. secundum generum inventum in templo Vulcani, quod est in Insula Memphis. Innumerabilia quoque medicamenta pro hac operatione à veteribus descripta sunt, à Dioscoride, à Galeno, & à Celso in citatis locis, quæ prolixitate, & tedious cuitandi gratia omittimus, afferentes in medium ea tantummodo præsidia, quibus cor ipsum defendi, & veneni malitia corrigi possit. Fit ergo hæc operatio iuxta Medicorum sententiam, cum opportuna vietus ratione, cum euacuationibus, & cum pharmacis, quæ antidota contra venenum appellantur. Dicamus igitur primò ea, quæ ad regimen sex rerum non naturalium spectant. & primò quòd ad aerem, inquit Celsus, quòd peractis huiusmodi operationibus, patiens in loco calido ponatur, & loceatur, taliterq; situeretur, ut vulnus in decliuiori loco inclinatum maneat. quòd si euacuationes veneni ab ulcere, aut cucurbitulis, aut alio præsidio calido non præcesserint, vult Celsus, quòd vomitus omnino prouocetur: pro quo laudat pinguissimum ius aut anatis, aut agni, aut viruli. Paulus verò asserit, quòd si contigerit, venenum ipsum per totum corpus dispersum esse, statim necessariam esse sanguinis missionem, & eo magis, si corpus ipsum plethoricum, hoc est omnibus humoribus abundanter repletum, fuc
- 30 rit. Existimât Celsus in huiusmodi affectibus maxima ab ipsis antidotis suffragia expectanda esse. quòd si forte non successerint, plurimi faciunt potionem ex generoso vino, & pipere confectam. Paulus autem dicebat maximè opportuni esse, in cibariis pipere, & alijs vt, in potu verò vino potentissimo, & hoc, quia omnes isti affirmant necessariam esse, quòd calor ipse naturalis moueatur, & augeatur vna cum totius corporis temperamento, ut veneno obstat, ipsumq; ab internis, & nobilibus partibus ad ignobiles, & externas pellere possit. commendatq; Celsus ipse nutrimentum valde calidum, cum maior pars venenorum maxima frigiditye noxia sint. Censebat pariter Dioscorides in lib. 8. cap. vltimo, quòd iis, qui à serpentibus vulnerati sunt, plurimum prodesse purgatio alui, id est corporis per medicamentum mundificatio, copia lotij, hoc est vinarum prouocatio, & copiosus sudor. Celsus quoque laudat omnia vinarum mouentia, cum materiam ipsam tenuiorem, & subtiliorem reddant. Dioscorides verò pro medicamentis communibus huiusmodi intentionibus, & cibis, probat cicorium, erucam, astragalum, & pauzinam in aceto decoctas, fructus platani, radices aristolochiæ, & eringij decoctas, baccas lauri comestas, piper, xnam, anethum, capita porrorum cum pane, allium, capas, origanum, feniculum, pulegium, & calamentum, & quæ plurima alia simplicia medicamenta ab ipsis plantis desumpta. Nonnulla quoque commendat, quæ ab ipsis animalibus excipiuntur, nempe cerebrum gallinarum, capta testudinum terrestrium, coagulum leporis, & castoreum. Inter composita verò plurimi faciunt opij, mirrhæ añ. 3. s. piperis 3. s. & cum melle fiat mixtura, de qua sumatur ad quantitatem fibæ Aegyptiacæ. Aut 3. s. seminum rutæ syluestris, nigellæ, camini, aristolochiæ, galbani, añ. 3. s. & cum succo erucæ fiant pastilli, ex quibus pro qualibet vice drachma vna cum vino sumatur. & Galenus in lib. 2. de antidotis laudat, & ponit multa antidota aduersus morbus venenosos iuxta multorum sententiam, inter
- 40 quæ est theriacæ de hera hoc modo parata. 3. Aristolochiæ longæ 3. j. ciniai 3. j. s. feminis rutæ syluestris 3. vj. laferpitij 3. iij. s. terræ sigillatæ 3. 10. mirrhæ 3. vij. opobalsami 3. viij. piperis albi 3. j. sem. rosæ marini 3. iij. fiar subtilissimum puluis, & cum melle fiat electæ, de quo ad quantitatem fibæ Aegyptiacæ sumatur, cum aqua calida. Aut 3. aristolochiæ rotundæ, dictami, gentianæ, staphysagriæ añ. 3. l. iij. piperis, seminum rutæ syluestris, erucæ, apij, cactris, hoc est feminis rosmarini, añ. 3. j. s. castorei, opij, mirrhæ, terræ sigillatæ añ. 3. j. dissoluantur gumme in aceto, & postea cum melle fiat electuarii. Describunt insuper Medici alia multa huiusmodi medicamenta: sed quoniam aliquando nocuentia, cum sit peracutum, & mortale, tempus non expectat, in visu pro actu prædicto theriacam magnam Andromachi, & mitridati tenent, & similia antidota, quæ sint præparata, fermentata, & longissima experientia comprobata. Dicebatq; Dioscorides, quòd Erasistratus non ineptè arguebat eos, qui medicinas incognitas laudabant, quæ pro his vibus expertæ non essent, & quæ non possint, nisi à Regibus, aut à magnatibus inueniri, cuiusmodi sunt Elephantis, ota Crocodillorum, sanguis testudinum, & similia. Hinc fit, ut multo melius sit, medicamenta scribere, & parare, quæ nota, & probata sint, & promeritis necessitatibus parabilia sint. Et ob id prædicti dant, ut tutissimum, antidotum, iis, qui à venenosissimis animalibus morbi fuerint, drachmam vnam, & ea plus cum optimo vino, & super ipsum vulnus tandem theriacam applicant. Nec timendum est, sicut quidam inexpecti dicunt, quòd per huiusmodi theriacæ super locum vulneratum applicationem venenum ab illa fugiens ad cordis regionem periret, nam ex tali applicatione vis veneni statim extinguitur, & calor membri vigoratur, & omnis eius mala incipies corrigitur. Quia verò apud veteres non inuenio, quòd pro cordis corroboratione, & defensione aliquod epithema, vel aliud medicamentum foris appliceretur, existimo remedia

Diosc. lib. 8. cap. vlt.

Gal lib. 2. de antid.

hæc



hæc effe modici iuamenti, & ob id ſuper ea ſermonem longiorem non habeo, ſed tantummodo cu-  
ram aliquorum particularium morſuum pertractans. quæ apud veteres, nempe apud Dioſcoridem in  
lib. 9. apud Cellum in lib. 5. Galenum, Accium, Paulum in lib. 5. & Auicennam in 6. 4. recenſebo.

## De morſu Scorpionis.



**N**AVIUM Dioſcorides, Celfus, & omnes alij, quòd ſcorpionis ipſe tritus, & vulnere ſu-  
perimpoſitus, ob quandam eorum antiſpazmiam eſt optimum remedium. laudant quoq;  
lac ficus innaturus ipſi vulnere inſtillatum, aut ſulphur viuum cum refina mixtum, aut  
ruram cum alio, aut galbanum in forma ceroti. Inquit quoq; Celfus ſe aliquos Me-  
dicos cognouiſſe, qui vulneratis à ſcorpionibus tantummodo à vena brachij ſangui-  
nem mittebant. Rafus verò aſſerit, alij ſuccum in potu ſumptum huiusmodi veneni frigiditatem  
exinguerent.

## De ijs, qui veneno infecti ſunt.



**V**M in præcedentibus digreſſionibus, nonnulla de nocuentis, quæ à cauſis exteriori-  
bus, nempe à venenoſorum animalium morſibus, proficiſcuntur, à nobis enumerata  
fuerint, nunc opportunum erit, vt de venenis in potu, aut in cibo ſumptis ſermo fiat.  
Eſt ergo Medicorum opinio, multa eſſe venena, quæ in cibo, aut in potu ſumi poſſunt,  
& formas, ſubſtantiasq; diuerſas tenent: quandoq; ſunt ſub forma tenui, quan-  
doq; verò ſunt duræ ſubſtantie: aſſeruntq; quòd aliqua venena in plantis, aliqua in  
animalibus, multa in mineris, & multa quoq; artiſcioſe ſunt. Inquiuntq; quòd in-  
ter venena, quæ in plantis naſcuntur, alia ſunt in ſemine, ſicuti hyoſciamus, catapucia, peonia, papa-  
uer nigrum, cicuta, coriandrum humidum, dracontium, & alia huiusmodi ſemina, quæ cum humanum  
ventriculum ingrediuntur, aut mortem, aut morbum grauem aſſerunt. Alia ſunt in fructibus, cuiusmo-  
di ſunt rhododendron, anacardus, nux metella, ſeu vomica, nux putrida, pomum mandragoræ,  
ficus Pharaonis, fungus, collocinthis, & alij huiusmodi fructus. Alia verò in ſuccis ſunt, ſicuti meconium  
quod opium dicitur, & ex ſucco papaueris nigri paratur; ſcamonium, quod fit ex ſucco conuoluuli la-  
cheteri, ſuccus apij riſus, napelli, rhododendri, mezerci, brionie, hellebori nigri, & ſimilium. Alia ve-  
rò in radice conſiſtunt, ſicuti aconitum, luparia, rhiſmalis, helleborus, cicuta, & ſimilia. Alia verò in  
totâ planta permanent, quemadmodum in multis enenarratis videtur. Ab animalibus autem venena  
cauſantur in diuerſis eorum partibus, ſicuti eſt in cerebro felis, & veſpertilionis. In cauda cerui, ſcor-  
pionis, aſpidi, theri, & ſimilium, veſpæ, apis, & aliorum animalium exangium. In ſanguine butionis,  
hominis rubri irati, & colerici, leproſi, aut menſtrui. In ſalia, & dente viperæ, buſonis, ſiniæ, ho-  
minis ieiuni, & ſimilium; & in ſelle leopardi, et in toto animali, ſicuti ſunt cantharides, ſalamandra,  
& baſiliſcus. Inter mineralia verò valde venenoſum eſt argentum viuum, gypſum, æs viride, ſcoria fer-  
ri, ærugo, magnes, & ſimilia. Inter artificialia verò ſunt arſenicum, riſagalium, & alia quàm plurima,  
quæ ſunt apud Principes, & magnates, de quibus cum aliquam profeſſio noticiam non habeam, de illis  
ſilebo: ſed tantummodo incèptam hystoriam proſequens dico, quòd venena ſunt ſubſtantie quædam  
omnino cibo, & nutritioni hominis oppoſitæ; cùm cibus ſumptus pars, & ſubſtantia corporis viu-  
entis efficiatur, & per operationem natui caloris, partibus, quæ continuo ab eodem calore conſumun-  
tur, approximetur, & aſſimiletur: venenum verò totum oppoſitum operetur. nam intus ſumptum me-  
bra alterat, & in ſuam propriam venenoſam naturam permutando tandem corrumpit; eſt. in hoc agens  
paſſo multò potentior. & hoc paſto ventriculus, & cor vnâ cum alijs nobilibus partibus, quòd veneno  
miſcentur, aut ab illo tanguntur, facillimè corrumpuntur; ex quo peſſima accidentia, & mors ipſa ſe-  
quuntur. Quapropter aſſerunt Medici, quòd venenum eſt vna ex cauſis complexionis, & poſitionis,  
& multoties vnitatem corrumpentibus. Hinc eſt, quòd à venenis ægritudines communes, & non pro-  
pria, eo tempore, quo in partibus intrinſecis humanorum corporum operantur, cauſatæ ſunt; licet  
multoties deſtructis, diminutis, aut alteratis eorum operationibus, aliquas particulares ægritudinarias  
diſpoſitiones in ſubiectis relinquere ſoleant; cuiusmodi ſunt paralyſis, cordis tremor, ventriculi im-  
becillitas, & alia huiusmodi. Dicunt inſuper Medici, quòd ex venenis alia qualitate eorum occulta ope-  
rantur, quæ prouenit, & oritur à primis formis elementorum, quæ eorum conſtitutionem, & com-  
plexionem ingrediuntur vñ, & inſuauitatem ſtellarum fixarum, quæ compoſitionem corporis mixto-  
rum inferiorum ordinant, medianibus ſineis pyramidalibus, & reſiſ, quæ ab eorum lumine oriuntur,  
& in illo fixæ permanent: compoſitis autem quaſdam ſpecificas virtutes impertiuntur, iuxta merita  
compoſitionis eorum. huiusmodi verò virtus forma ſpecifica, & proprietas occulta à Medicis nuncupa-  
tur. Et ob id dicebat Auicenna, quòd forma hæc ſpecifica per primam complexionem elementorū in  
coſpoſito in rebus ortum trahit. Quia verò, iuxta Philoſophi doctrinam, ignoramus, & in æternum igno-  
rabimus quantitatē, & meſurā horum elementorum, & eorum formarum in compoſitis, à quibus  
huiusmodi

10 huiusmodi forma specifice proficiunt, ob id de earum operationibus nihil amplius nobis notū erit, quā illud, quod ab experimentis cognoscitur. Alia quoque sunt venena, quę qualitatibus, & complexionibus eorum manifestis operantur; quādam.n.ob maximā eorum frigiditatem operantur, quā nēbra alterata, & stupida permanent, sicuti est opium: quādam claudendo vias spirituum, & anhelitus, aut obstruendo meatus, & vasa, per quę nutrimentum pertransit, sicuti facit plumbum vitium: quā dā verō ob ingentem caliditatem operantur, quia interius coarodunt, donec ad cordis substantiam perueniant, & continuum solvunt, quemadmodum faciunt lepores marini: quādam autem ita fortiter inflammant, ut nativum calorem, & humidum radicale destruant, sicuti helleborus, & euphorbium: quādam verō extrema eorum siccitate operantur, humidum sanguinis cordis consumendo, aut condensando, illudque in substantiam densam, aut duram convertendo, sicut calx viua, & colcotaria, aut separant sanguinem, aut substantiam humiditatis cordis in partes diversas, illudque postmodum destrunt, sicuti risagallū, & arsenicū. Alia verō venena ob humiditatem in quarto gradu operantur, sicuti Argemur vitium. Aliqua verō operantur ā tota eorum substantia simpliciter venenosa, sicuti fel leopardi, napellus, & aliqua ex artificialibus. Asseruntque Medici, quōd quādam reperiuntur venena, quę cū sumpta fuerint, primariō aliova membra particularia, & postremō cor ipsum lædunt, & deniq; totum corpus, sicuti cantharides vesicam, lepus marinum pulmonem, & opium ipsum cerebrum. dicunt insuper, quōd ex venenis quādam quasi immediatē operantur, quādam verō aliquo temporis spacio. Docent quoque modum cognoscendi per accidentia quēdam, quod nam sit veneni genus, quod aut in cibo, aut in potu ingestum sit. Nam cū patiens mordicationes, puncturas, corrosiones, & huiusmodi accidentia perceperit, manifestum est signum, quōd venenum sit ex calidis, acutis, & mordicantibus, cuiusmodi est arsenicum. Cū verō magna inflammationes, sudores copiosi, rubedo in oculis, angustia, & sitis apparuerint, venenum esse ex siccis, sicuti est euphorbium, existimandum est. Cū verō patienti profundus, & superflus somnus, aut intolerabile frigus, aut stupor supercenerint, venenum esse ex narcoticis, & valde frigidis, sicuti est opium, clarum est. Quōd si euenierit, alia accidentia non apparere præter angustias, sudores frigidos, & virtutis deiectionem, ac syncopem, tunc venenum esse ex illis, quę ā tota eorum substantia operantur (hęc.n. ceteris peiora sunt) manifestum erit. Inter venena quēdā sunt adeo vehementis operationis, ut omnibus antidotis, & remedijs resistant, aliqua verō sunt adeo debilis operationis, ut ā convenientibus medicamentis, quantis debilibus, corrigantur, & resoluantur, aut euacuentur. In his autem, qui veneno correpti sunt, cū syncopis supercenerint, & pupillis in eorum oculis permixtatur, & pars eorum nigra oculatur, nulla in eis amplius erit spes salutis, cum verō pulsus ceciderit, sudores frigidi apparebunt, & lingua extra os exhibet, quā celeritatem intendant.

De Vniuersali curatione eorum, qui ā venenis correpti sunt.

10 **P**RIMA operatio in venenatorum curatione conueniens est non morari, sed statim prohibere, ne venenum ad partes nobiliores penetret, aut per vniuersum corpus diffundatur. Er ob id laudant Medici, nempe Dioscorides in proemio 6. libri, Celsus in 5. libro. cap. 27. vbi remedia generalia aduersus venena declarat. Gal. in 2. de Antidotis, ex Asclepiadis sententia, Actius in 5. libro. Paulus in lib. 5. cap. 29. Auicenna in 6. tract. 1. cap. 4. & Rasis in libro diuisionū, cap. 141. quōd quamprimum venenum in ventriculo fuerit, vomitus prouocetur. ob id dicebat Dioscorides, inter omnia aptius medicamentum non reperiri, quā citissimē venenum extrahere, antequam noxam in mala qualitate imprimat. Quapropter statim patienti oleum calidum in potu propinare opus erit. quōd si oleum non reperiatur, dandum erit butirum cum aqua calida: aut secundū Dioscoridem decoctio maluę, aut feminis lini, aut tragi, aut vrticę, aut fenugreci. Hęc.n. medicamenta non solum relaxando, sed etiam nauseam mouendo, vomitum ciunt, & aluum quoque per inferiora solvunt, ita ut ipsum exonerent, & purgent; & cum huiusmodi operationibus acrimoniam, & vim veneni obrundunt. Inquit etiam Celsus, quōd ita facilliter non possumus cognoscere, aut remediū præstare venenis in potu, vel in cibo sumptis, sicut illis, qui partes exteriores lædunt: hoc autem euenit, quia interius sumpta quandoque non ita celeriter cognoscuntur, sicut illa, quę ā moribus animalium proficiuntur; & ob id illis conuenientia remedia statim exhiberi non possunt. Sunt quoque venena epota, multo periculo siora: quia noxia in cute non est, sed in partibus interioribus: quapropter remedium aptissimū est, quā primum vomitum mouere, multum olei calidi sorbendo. Testatur Dioscorides, & quamplurimi alij, qui post ipsum fuerunt, quōd pro forti vomitu faciendū multum confect aqua multa cum modico nitri quā subtiliter triti, vel iusculum pinguisimum gallinę, aut cum butiro, aut pinguedine paratum. Galenus lac vaccinum, aut asinum pinguisimum probat. & Auicenna asserit, quōd si patiens aliquam in ventre cōmotionem senserit, nullo pacto lac dimittat; & cum (teste Dioscoride) vomitus fuerit diligenter promotus, ne in ventre aliquid suspicionem asserens remaneat, quod intell. inis noxiam asserre possit, opus est acuto clystere uti, & illius præsidio huiusmodi materiam ad euacuationē per inferiora deducere.

Diosc. in pre-  
m. 6. lib.  
Celsus 5. cap.  
27.  
Gal. 2. de ant. d.  
Actius 5. lib.  
Paul. lib. 5. c. 29.  
Auic. d. 6. tract.  
1. cap. 4.  
Ras. lib. Di. lib.  
cap. 141.

deducere. Inquit Celsus, quòd cum præcordia inflammantur, hoc est signa, quæ in veneno infectis conspiciuntur, apparere incipiunt, tunc antidotum aliquod sumere oportet. Quòd si fortè non reperiat, tunc vinum purum, & generosum bibendum est. Dicebat quoq; Galenus in primo libro de antidotis, circa principium, quòd remedia illa, antidota nuncupantur, quæ affectiones non naturales prauæ conditionis corrigunt, & sanant, non ea quæ foris applicantur, sed quæ in potu, aut in cibo sumuntur. Quorum tria reperiuntur genera: nam quædam venenis mortiferis in potu sumptis aduersantur: quædam venenosorum animalium moribus obstitunt: quædam verò eas ægritudines tollunt, quæ à pessimo victus regimine ortum trahunt. Quæ autem sint hæc antidota, docet Dioscorides in præmio festi libri, ubi multa simplicia medicamenta enumerat, nempe terram lemmiam, quæ etiam ligillaria appellatur, agaricum, abrotanum, iridem, calamintham, nardum gallicum, quod vulgo spica nardi appellatur, castoreum, semen pastinacæ, radix eryngij, modulla ferule virentia, succus marubij, laserpitium, qui est succus cirenaicus, lagapenum, aristolochia longa, semen rutæ syluestris, betonica, & quàm plurima alia ab eodem in suis Commentarijs descripta, sicuti est dictatum, hypericon, chamaleon, quæ alio nouissime carlina dicitur, bistorta, scordeum, zedoaria, gentiana, & similia, quarum quælibet in necessitate vrgenti theriacæ æquiualeat. Veteres enim Medici aliquo horum simplicium, aut multis eorum vti consueuerant, cum adhuc theriacæ, aut mitridatis cognitione non haberent. Dioscorides autem alicuius horum in puluerem redactorum drachmam vnā cum vino exhibebat. Post hos autem fuit Mitridates rex, qui, vt Galenus recitat, multum in dignoscenda simplicium natura diligens fuit, & eorum contra venena operationem inquirens, multorum simplicium mixturam composuit, contra multorum venenorum profectio efficacissima, & mirabilem, quæ Mitridatis antidotum à proprio Regis, & compositionis nomine appellata fuit. & Galenus vnā cum Paulo testantur, quòd ita Mitridates hoc antidotum in vsu habebat, vt cum à Romanis captus esset, & mortem per multorum venenorum operatione operaret, virtute huius antidoti semper præseruatus fuit, ita vt spe omni destitutus se ipsum gladio interire cit. Andromachus postea, Neronis Imperatoris Medicus, huius antidoti compositionem inspicies ab illo quædam extraxit: quædam verò appoluit, sicuti trociscos de Thiro, vnde antidotum theriacam appellauit, quæ aduersus Thyri morsum valde efficax est: quæ verò venena necantia diuersa sunt, opus est Medico ante omnia, cuius sint generis, dignoscere: an scilicet corrosiua, & incisua sint, aut stupefacientia, aut ex ijs, quæ a tota eorum substantia noxia sunt, nam si acuta fuerint, tunc medicamentis epotis curanda erunt, quæ eorum acuitatē retundant, & remittant, sicuti est lac copiosum, aut butyrum crudum. Quòd si venenum fuerit ex calidis, & inflamentibus, tunc accensionem talem remittere opus erit, cum camphora, aqua coriandrorum, rosacea, & similibus, cordi, & cæteris membris epithemata applicando, & super illa sæpius frigida medicamenta reiterando. Auicenna inquit, quòd si phlebotomia necessaria erit, nullo pacto dimittatur. & si venenum in suo genere fuerit ex frigidis, & stupefacientibus, tunc medicamentis calefacientibus curandum erit, cuiusmodi sunt theriaca, assa fetida, & vinum purum, ac generosum, & similia. Cùm verò venenum à tota eius substantia operatur, aut à forma specifica, tunc antidoto theriacali curandum est, aut mitridato, aut diamosco, aut terra sigillata, aut alio huiusmodi venenum foras impellente. Nam omnes Philosophi, & Medici affirmant, quòd ab antidotis, aut medicamentis bezoarticis epotis aliquod horum præsidiorum expectandum est, aut acuitatis veneni obtulio, & retractio, aut eius substantiæ consumptio, & resolutio, aut eiusdem per aliquam regionem, aut partem convenientem expulsio, & euacuatio, aut aduersus eius naturam obstaculum, & oppositio, sicuti præstat allium aduersus scorpionis ictum. Cùm igitur Medici generalem veneni cognitionem habuerit, tunc species eorum distinguere, & notas habere tepetur, illisq; particularibus, & opportunitis prædijs ob stare, & resistere. Et nos hoc loco breuiter aliqua illorum, iuxta veterum sententiam, recensimus.

FINIS TERTII LIBRI



IOANNIS ANDREAE  
A CRUCE MEDICI  
VENETI.

Officina Chirurgica.

In qua instrumenta Chirurgus conuenientia  
delineata videri possunt.

Addita etiam sunt scamna, glossocomia, ac alia eiusdem functionis ma-  
chinamenta, quae apud veteres Medicos in continuo  
vfu obseruabantur.



AD LECTOREM.



D Chirurgus, quod ex vi nominis colligitur, solum illi morbi pertinere vi-  
dentur, qui manus operam requirunt: idcirco ea praedia, quae manu dume-  
xat adhibentur, non nisi quorundam instrumentorum auxilio celebrantur,  
quorum aliqua antiquitus, principum auctoritate, ac aere publico in magnis  
ciuitatibus extructa conferuabantur: quare cum ego quamplurima horum ap-  
prime necessaria, & quae in quotidianum vsum veniunt, delineauerim, ea qui-  
dem tibi vir clarissime donare decreui, cui quantum ars medica debeat, quan-  
tumque praestiterit, & quid de te in posterum sperandum sit, velim equidem  
omnes candidos naturalium rerum studiosos, cunctosque huius artis cultores,

ex re ipsa potius, quam mea praedicatione agnoscerent. Accipe igitur Medice celeberrime munuscu-  
lum hoc, vbi varia instrumenta, eorum utilitates, ac operandi modos, quibus veteres Medici in passio-  
nibus carnis, ac ossium fracturis, & luxationibus opportune vrebantur: & si infinita apud eos literis ta-  
tom tradita reperiuntur, quae praesentim ad ossium curationem pertinere videntur, sicuti ferramenta va-  
ria, cauteria, excisoria, cultellos, scalpria, rasoria, limas, specilla, terebrarum genera, modiolos, for-  
fices, vossellas, phacotas, meningophylacas, cyclichas, ferre, & similia: ligneaque, vt scalas, scamna, tri-  
pasta, plinthis, repagula, vestes, canales, glossocomia, sphaeria, statthmia, trochiscos, penas, canalicu-  
los, ac huiusmodi: linteaue, ac mollia, linteola, fascias, hypodermidas, splenia, apodermos, regulas,  
ferulas, spatulas, habernas, laqueos, mitellas, puluinos, nodos, acus, acies, & alia quamplurima, quo-  
rum aliqua impresentiarum vsum seruauerunt: multa vero quia antiquata, & recentiores magis accom-  
modata, nec tam operoso egent labore, inuenire non videntur, quae omnia tamen oculis subiecisse  
volui, vt quae commodiora videbantur, in vsum conuerti possint. Vale igitur, animique mei propen-  
sionem accipe.

INSTRUMENTA, QVAE A CHIRVRGO CONTINVE  
CIRCUNFERRI DEBENT.



EDICERE, qui a manu operationibus Chirurgus vocatur, varijs in forma, & materia,  
ac diuersis in numero, & magnitudine eget instrumentis, quorum aliqua in quotidianum  
vsum illi veniunt, & semper ab eo circumferri debent. Porro haec sex sunt, & primi for-  
tex dicitur, cuius utilitas in humano corpore est ad diuidendum, quod continuum est, vt  
in laceratis vlcibus excidendum, quod super additum reperitur, vt in morbo, quod Graeci sarcoma,  
& thi-

& thimum, & Arabes althae vocant, & remouendum extranea, & quod non naturale esse videtur: cō-  
muni ter verò ad pilos, siue dupillos denudandos, sed eius propria operatio est ad forandum penicil-  
lia, lichinia, siue turundas, quas Græci tamoni vocant, & vulgares tentas appellant; est insuper accom-  
modatum instrumentum ad lineas prius incidendas, aut simile aliud negotium, quod Chirurgis neces-  
sarium fuerit, peragendum; foricx, aut forficula dicitur, cuius effigies talis esse debet.

## I T FQRFEX.



Aliud instrumentum Chirurgi prime necessarium illud est, quod ad multa facit, nempe cō depressa, & latiori eius parte periosios, siue pericranion, aut vt Arabes dicunt almocatū, in caluaria fracta  
ab ipsa diuellit, sæpe etiam fracta ossa, aut depressa, & ellenas, & commodè medicamenta catendis, ac  
corp opposita, & duplicata parte, frustula ossium, aut vt Arabes dicunt faragiz, pilosue, ac minima hu-  
iuscemodi à vulneribus, & cauernis eripit. communiter tamen lichinia, & turundas à plagis extrahit:  
vocatur aut antiquis vossella, aut vulsella, à Neotericis pincetta, aut pinciarola; Venetijs verò moleti-  
na, forma hæc est.





Hipp. lib. de me-  
dico.  
Cels. lib. 7. c. 18.  
Et 30.  
Gal. comm. 1.  
lib. Hipp. de  
med. mil.  
Paul. lib. 6. c. 4. p. 4.  
Alph. lib. 1. c. 4.

Instrumentum, quod tertio loco Chirurgus summe conuenit, teres rectū, ac longitudinis vnus quar-  
ta esse debet, & eius materia, aut aurea, aut argentea, aut ex auralco, dum firmum, ac valens deside-  
ratur; valet quippe ad vulnere cruentorum vias inquirendas, occultas ossium, caries, siue teredines  
inuestigandas: caluarie fracturas, depressiones, rimas, & squamas manifestandas, ac vulnere recon-  
ditorum penetrationes dignoscendas: vnde ab aliquibus explorator dicitur quasi occulorum asseclū  
manifestatur. Hoc neq; cradium, neq; nimis tenue esse debet, sed mediocre; eius adhuc utilitas satis, ac  
commodata est, dū aliqua aur lane, aut xili, siue bōbacis portiumcula: in eius extremitate apposita sit ca-  
ua vlcera, aut sordida, aut cōtinui solutiones abstergeamus, aut ab omni alia re non naturali denudamus.  
Veteres Medici cum specillum, radium, & radiolum vocant; recentiores verò stilum testoniarum.  
expertorem, exploratorem, siue exploratorium nominant; Veneti autem stilum. Interdum verò, vt  
flexibile sit, aut depressioni idoneum, ex plumbo fabricatur, ad fistulas quas Græci siringas vocant,  
aut sinus diuersos perquirendos: interdum acus formam imitatur, ad vlcera diuersorum anfractuum,  
aut antiquas fistulas pedicis præcipue laqueandas. Horum omnium imago varis delineatur.

Hip. lib. de calu.  
curs.  
lib. 1. de me-  
dico.  
lib. 2. de medico  
Cels. lib. 6. c. 4.  
Gal. comm. 2.  
de acc.  
Paul. lib. 6. c. 77.  
Aur. 4. 1. c. 57.  
3. 4. 1. 1. 1. 1. 1.  
3. 4. 1. 1. 1. 1. 1.  
Alph. lib. 1. c. 4.  
Aur. c. de fra. c.  
curs. lib. 3. 4. 1.


## RAD. COLVS.





Hipp. de fistu.  
Pm. lib. 4. cap. 7.  
§ 77.

30 Vt partes, quæ istu scde sunt, vnitati restituantur, quod caræ opus est. Quare quantum instrumen-  
tum non sine ratione, ac multæ utilitatis à Chirurgo circumferri debet, quamvis minus hoc nature p-  
prium sit. attamen quia non ita concinæ, & delicatè id agere solita sit: sicuti Medicus auxilio acus sedo  
instrumentum necessarium est, eius forma triplex reperitur, ob diuersas actiones: nam in duris, & affa-  
ticitatis corporibus veluti rusticorum, militum, & nauigantium, aut in membris naturaliter, vel ex labo-  
re duris, vt pars illa infimi ventris, à Græcis epigastrum, à Arabibus mirach, & à Latinis abdomen  
vocitata; acus hæc ad faciliorem penetrationem triangulata esse debet: in facie verò, aut membris in  
propatulo existentibus, vel in membris mollibus, ac effeminatis. acus illa fit rotunda, subtilis, æqualis.  
& acuta; in partibus verò absconsis, aut angulosis, acus ex tenui ferro ut flecti, ac recuruari possit, mul-  
tum conuenit: sunt interdum ex plumbo ob supradictas utilitates. acus nominatur, & hæc est.



Celsus. 7. c. 16.  
Gal. 6. meth. 4.  
Pm. lib. 4. c. 7.  
Ari. 4. cap. 7.  
Albuc. lib. 1. c. 16.  
§ 17.


40 Non solum Chirurgus prædicta instrumenta apud se continere debet, sed quamplurima alia;  
vt pote ad pilos deradendos cutis, & carnis dilationem, vt in callosa fracta, & angustis vulneribus;  
ad profundas scarificationes, efcrefcentias remouendas, ad ditamenta demenda, emortuas particulas  
rescandas, & corrupta membra amputanda: hoc instrumentum ab antiquis nouacula, & culter exci-  
sorius vocatur, communiter verò rasorius dicitur, & secundum hos modos fabricatur.

## NOVACULA.



Hipp. lib. de me-  
dica.

50 Inter opportuna instrumenta, quæ quotidie Chirurgis occurrunt, ea porro sunt, quæ primo in san-  
guinis missione operantur: sunt adhuc accommodata. in sectione abscessuum locorum carnosorum nõ  
60 profunditatis: cum ea etiam sunt leues scarificationes, à præfatis Medicis gladiolus, scalprum,  
scalpulum Chirurgum scabothomum, & lanceola vocatur, à multis fugitellæ, & à Venetis lancetta di-  
citur. horum alterum, quia in latitudine folij mirri assimilatur, à Medicis scabothomi mirrhini vocatur,  
eo vtuntur Chirurgi sanguinem crassum à vena emanare cupientes; aliud verò quia acutum est, & folio  
rum oliuæ formam præfere, scabothomi oliuæ nuncupatur, hoc pari modo vtuntur Chirurgi subti-  
liorem sanguinem à vena effundere volentes, hoc hebetis illud acutè aciei est. ecce quomodo facta sunt.



Hipp. lib. de me-  
dica.  
Celsus. 7. c. 16.  
Gal. 6. meth. 4.  
Ari. 4. cap. 7.  
Albuc. lib. 1. c. 16.  
Pm. lib. 4. c. 7.



Aliud ferè eiusdem operationis instrumentum, apud Chirugos in coxarum venit usum, non tamè eiusdem figuræ. potissima tamen eius utilitas est aperire magnos, ac profundos abscessus; præsertim in membris duris, & angulosis, aut aliacatis corporibus. valet etiam ad removenda additamenta; verù quia curvum est, ac fenilurarem formam imitatur, à Græcis scolopomachion, ab Arabibus gamedici, & à Latinis spatium curvum, & accula vocatur; ab aliquibus ob falcis similitudinem talcula, & à Vectis gamai nuncupatur.

Gal. 14. meth.  
cap. 17  
q. de aggr. sub.  
mor.  
Art. li. 19. c. 86.  
Paul. lib. 4. c. 3.  
R. 74.  
An. 1. 4. ma. 3.  
cap. 5.  
Alph. li. 3. c. 80.

## SCOLOPOMACHION



Alterum non multum dissimile à suprascripto, necessariò à Chirurgo circumferretur, quod ex eo, quia in fingarum, siue hitularum sectione opportunum est, à Græcis fingaromon, ab Arabibus embula, & cauda, & à Latinis manubriolà, siue spatium spinosum vocatur; fabricata sunt hæc huiusmodi.


## BYRNQOTOMVM



Hipp. li. de fist.  
Celib. 7. c. 19.  
Gal. medic. 4.  
Paul. lib. 4. c. 13.  
Ausc. 4. c. 7.  
Alph. li. 3. c. 80.  
R. 77.

Quia sæpius hominum calvaria frangitur, aut deprimitur, & Chirurgus cogit instrumentis, quæ ad ossis fracti, aut depressi elevationem opportunum est: idèò apud prædicta, secum continuo illud habere debet. Tale est diversarum formarum; vile quidem ad diversas operationes, & quamvis locandum esset inter ea, quæ craneo fracto conveniunt. nihilominus ob prædictam rationem, cum affectus talis inducias non expectet, hæc cum locavimus: simile instrumentum habent nostri Chirurgi continè paratum, & cum eo attollunt ossa, quæ ferè tota excisa sunt, & iam labent, ac cerebri membranam custodiunt; est enim lamina ferrea, angustior ab ea parte, qua os tangit, aut aspera, aut conuexa ab altera, levis, non recta, sed media, duobus extremitatibus recurvata, cuiusque depressa sunt cranei ossa, aut fracta, nec manibus evelli, aut sublevari possunt. valde vile hoc instrumentum est; à Græcis ostlagran, à Latinis vectis, communiter elevatorium, & à Venetis lema nuncupatur: eius forma talis est.

## VECTES.



Hipp. lib. 3. de  
fract.  
Qui. 4. meth.  
cap. vicin.

Hæc sunt ea instrumenta, quæ à Chirurgo continuo circumferri debent; ac vnicuique membro communiter accommodantur: nunc restat, ut de ea, quæ singulo quoque membro appropriantur, imagines, ac operationes singularem describamus.

## INSTRUMENTA FRACTO CRANEO OPPORTUNA

Males, ac diversarum formarum ferrea instrumenta ea sunt, quæ passionibus partium capitis acro- modantur; ea tamen prius delineare decreui, quæ craneo fracto opulentur: quippe simplices rimæ, quæ ad diploidem, siue vitream, aut, ut isti dicunt, secundum tabellam perueniunt, aliquibus angustis scalpellis remouentur: de his ergo in præsentiarum sermo habetur. Sapientes antiqui, ut rimæ aut scissuræ huiusmodi, stræque deleantur, nonnulla scalptra reperire, quæ à malleo, plumbeo percussilla, ossa sic affecta effodiebant. rectum, aut curvum instrumentum est, ac ima parte, qua acies continetur, in canaliculi speciem utriusque à lateribus sinuatum, sic enim, & cauum est, & ad circuli figuram accedit; huiusmodi scalptra credo ligna à fabris lignarijs excavari: verum cum caput multum concutiant, quod

# Officina Chirurgica.

10 quod potius quietem desiderat præcipue ex malleoli percussione. à Gal. non approbantur. & quia tale in seruant formam, à Græcis cyclischâ dicuntur, à Latinis scalpra excisoria causa, & quia literæ C. affimulantur, à Celso scalpra lunara nuncupantur, communiter scalpra causa dicuntur, egent omnino malleolo; ideo eorum delineationes hæc esse creduntur.

## CYCLISCHA.

20



Hipp. lib. de cal. et. cura.  
Cel. lib. 8. ca. 4.  
Gal. de meth. ca. vltimo.  
Pan. lib. 6. ca. 90.


30

Non desunt alia scalpra, quæ apud antiquos vsitabantur: cunq; igitur aliqui illorum cranium perforare cupiebant, diuersis foraminibus angustis, fracturâ circumdabant id verò quod de fano inter foramina remanebat, aliquibus scalpellis, & malleolo diuidebant: plana sunt huiusmodi scalpra, ideo sua planitie ossa abraderet possunt. interdum etiam propria acie ea scindunt, & separant: nam eorum utilitas propria est ossa adinuicem diuidere, aut os magnum in plures partes disgiungere, ac separare. scalpra, seu scalpella plana vocantur, & sub duplici forma fabricantur.

## SCALPER CONVEXVS.

## SCALPER RECTVS.

40



Scalpra hæc omnia superius delineata, nullius ferè momenti sunt, citra malleoli operam: nam moventur plerumq; malleolo adacto: malleoli materia duplex est, aut lignea, aut plumbea.

## MALLEVS PLVMBEVS.

50



Gal.  
Cel.  
Ant.

60


Opinantur nonnulli, quod cyclischus, cuius imago superius impressa est, illud instrumentum sit, quo recentiores Medici in calvarie curatione crebro vtuntur, & falso imaginantur, nam illud à multis reprobatur; hoc verò securè, commodè, ac citò operatur, nec eget malleolo: porro hoc instrumenti illud est, quod ab Hipp. ratorius scalper dicitur, & mirum inmodum in cranei perforat. commendat, à Paulo scalper arcuatus vocatur, à Latinis scalper adunghus, & scalper angustus nuncupatur, apud certas nationes caractèria, communis sermone ragnolæ, & à Venetis eo quia rasando, & fricando olisium rimas delere solent raspatoria, & tricatoria denominantur, sicuti variantur in forma, ita diuersa esse debent in numero, & magnitudine, & latiore, & angustiora, recta sunt, ac ferè vnus palmi magnitudinem implent, in uno reclinantur, sic vt paruum sinum in orbem ostendant. ore autem, quæ à latere sunt sunt aciem acutam præferunt: nonnulli hoc solo tetramenti genere, caluariam perforando contenti sunt, ne scalpro malleolo adacto cerebrum concutiant, nec recedat mucrone membranam, quæ sub calvaria cerebri tegit laxant, complura enim harum formarum parata esse debent, in operatione verò à latiori initium capiatur, & ab angustiori eorum opus perficiatur.

Io. Andr. à Cr. Offic.

2 3

SCAL.


## SCALPRA LVNATA.



Et si antiqui varia scalpra conscribere, Medici tamen huius ætatis aliquibus vtuntur, quæ commodissima, ac secuta esse creduntur: seruant quadruplicem formam, & nomina trahunt ab eorum forma: nempe acuta ab acutis, plana à planitie, spherica ab rotunditate, amygdalina ab amygdalæ effigie: scalp. pra ratoria dicuntur: videatis formarum diuersitatem.

## SCALPRA RASORIA.

*Scalp. sphaerica, Albugi. Scalp. plana, Celsi. Scalp. acuta, Auzi. Scalp. amygdalina, Rafi.*



Inter scalp.ros, aliqui in suo manubrio ita firmiter inserti videntur, qd nullo modo inde dinoueri possunt; alij verò, & si plures sunt, vno tantum manubrio ægent, nam eorū eadē torcularē procedunt: sunt quippe vnius formæ, & magnitudinis: in fundo pariter manubrij, torculum quoddam emarginatum locatur, quod apertissima instrumenta recipit. Tale etiam manubrium interdum sub canuli formā fabricatur, in imo cuius torculus adest, reliquum verò inus omnia terebrā recipit, & conseruat. hæc omnia sunt ad commodum operantis, & proprijs nominibus vocentur, ne tempus in operatione conteratur.

## 10 MANUBRIUM PLENUM.



## KANBRIT DE VACUUM.



## LOCUS TORC/LATYS.

## 30 CAVUM CUI CANALIS INTERVENITUR. CAVUS TORC/LATYS.

Soliti erant primarij Medici rimas, aut longas scissuras, quae oblique procedunt, aliquibus ferrullis removere, dum tamen alicui parti adherent; accommodatum pariter instrumentum est, ad aequanda latera ossis fracti: variae sunt harum ferrularum imagines, & ferre, aut ferrullae nominantur.

## SERRAE.


Serra limata. Serra duplicata. Serra arcuata. Serrula. Serra plana.



Hipp. lib. de co-  
nac. curat.  
Anic. de fract.  
crani.

Reliquum scalpri genus, quod in imo lenticulae speciem habet, atq; hanc hebetem, in longitudinem vero aciem acutam, apud Chirurgos antiquos commendatur, quo utuntur nostrates, in osse crani val de comminuto, aut arte pluribus in locis terebrato, sed non ubiq; separato: cum lata lenticula parte membranam attingit protegitq; aget malleolo, cum excidendo praere debet, quam excidendi ratione Gal. praeter ceteras approbavit, utq; celerime effectum praestet, idq; sine ulla membrana cerebri noxa. Hoc instrumentum Graeci phacotum vocant, à Lapidis lenticularum, & communiter lenticulare, & lenticinium, & à Venetis, quia lenticulam praefert, lenticula nuncupatur.

## PHACOTVS.



Phil. & meth.  
exp. vltimo.

Io. Andr. à Cr. Offic.

2 4

Qui

Qui Gal. præcelsere, in chirurgia præstantissimi, vt cerebri membrana ab angulo scalpri, ac omni nõ. 18  
 xa tuerentur, instrumentum eius custodem imaginantur, illudq; operando sub calvaria demittebant:  
 lamina ænea, aut argentea est firmã, paulum resuma ab exteriori parte leuis, quæ demittitur, sic, vt ex-  
 terior pars eius cerebro proprii sit, subinde autem ei subijciunt, quod scalpro discutiendum est, ac si  
 excipit eius angulum vltro transire non patitur; eoq; & audacius, & tutius scalprum malleolo subinde  
 Medicus ferit, donec excisum, vndiq; o. eadem lamina leuetur, tollique sine vlla noxa cerebri potest:  
 quapropter à Græcis meningophilacas, à Latinis spatomelis, & communiter custos membranz vocita-  
 tur. imago huius, hæc est.

## MENINGOPHILACAS.



Cri. lib. 8. c. 3.  
 Gal. com. vltimo.  
 1. de off. mo. &  
 4. de loc. aff. c. 2.  
 Pim. lib. 4. c. 17.  
 & 50.  
 Avic. 4. 4. 172. 4.  
 cap. 12. & 3. 4.  
 vlt. 3. cap. 2.

Cunq; calvariaz ossa depressa, fracta, aut comminuta dignoscuntur, & manibus euelli, aut subleuari  
 nequeunt, aliquo vri instrumento opus est, & quamuis simile descriptimus superius. eiusue operatione  
 narrauimus, effigiem delineauimus, & multa, quæ ad eum spectant diximus; nihilominus quia locus  
 eorum hic est, nonnulla huiusmodi accommodata instrumenta, pingere hoc in loco decreuimus.

## OSTAGRAM.


Reform. Latum. Reflexum. Curuatum.



Gal. de mor. c. 6

Poterant plura alia de scalpri adduci, sed his contenti esse volumus, quæ ad hanc rem maximè per-  
 tinebant, restat modo, vt de terebris aliqua enarremus. Terebri autem proprium est perforare, cum  
 acutum mucronem habeat: eius duo genera sunt, alterũ simile ei, quo fabri vtuntur, ac à Celfo in pri-  
 mo loco descriptum videtur: cum eo foramen fit in ipso sine vitiis ossis, atq; integri; deinde alterum 66  
 nõ ita longè; tertiumq; donec totus hic locus, qui excidendus est his causis cinctus sit, sic excisorius scal-  
 per ab altero foramine, ad alterum malleolo adactus, id quod inter vtumq; medium est excidit, sitque  
 ambitus similis ei, qui in angustiorẽ orbem modiolò imprimitur: aptatur proprie cum ossa plurimũ  
 firma sunt: sed metuendum est, ne dum agitur, mucrone cerebri membrana violati, quæ de causa Hipp.  
 imperauit, vt in ipso vsu caueamus, ne nimis altè descendat. scire adhuc licet vsum eius alienum esse,  
 vbi ossa vehementer sunt perforata, aut vbi per se imbecilla sunt.


TEREBRVM, QVO FABRI VTUNTVR.



Hipp. li. de cat.  
cervi in fine.  
Cel. lib. 1. ca. 3.  
Gal. 6. meth. ca.  
vicina.

Quia terebrum primo loco delineatum, dum circumagitur, periculum imminet, ne cerebri membra-  
ne violentur, ideo nonnulli, inquit Gal. ut quominus viquam aberrant, & hoc periculi genus evitent,  
cuiusmodi terebras excogitarunt, quæ mergi non possunt, quas ob id abaptista Græcè dicuntur: circum-  
currit enim parum supra terebræ acutam cuspidem circulus quidam parum extans: sanè expedire com-  
pures id genus paratas habere, quæ omnes usui in crassitudine sufficunt: nam crassiori earum contentioni,  
quæ inter extantem circulum, & mucronem longius spatium habent. Tenuiori contra, quæ breuius  
Huc etiam pertinere videntur terebræ secundo loco à Celso delinæte, capituli longioris, quod ab acu-  
to mucrone incipit, dein subito latius fit, atque iterum ab altero principio paulo minus, quæ æqualiter  
40 sursum procedit, prohibet enim capitulum, quod super mucronem subito latescit, ne terebra alius de-  
scendat: terebra hæc habena ducuntur, cum in transversarium inferuntur, quod medium perforatum est,  
ita ut facile sursum, ac deorsum per ipsam feratur, dum habena per ipsam obvolvitur, & circumagitur,  
ac impetu per se in contrariam partem convertitur.

ABAPTISTI.



Gal. 6. meth. c.  
6.  
Paul. lib. 1. ca. 3.  
Aet. 1. 4. trad.  
1. c. primo.  
Abul. lib. 4. c. 3.


Tripli habetur modo cerebri circumducuntur, vna per transversarium, & duplici habena, alio per  
simplicem, mediæ terebræ arææ alligatam, ac sapius circa ipsam obvolvitur, & circumagitur, ac impetu  
per se in contrariam partem convertitur.



admoetur, sic vt corda semel circa cerebrum voluatur; quæ autem terebra per simplicem habentur. 10  
aut arcum circumagitur, pilam mobilem in summo continent, & vt dignificatur horum potentia, videat  
tis imagines.


FILA MORTIS

FILA VITALIS



Fila, que  
fuita feruntur  
conuenitur.

Inter nautas imaginati sunt nonnulli Chirurghi. credo instrumentorum penuria, quibusdam terebris  
ossa cranei perforare, quæ vna tantum manu auoluantur, & in summo pilam firmam, aut transuerlarij  
continent: in imo verò valde acuta sunt, quare non approbantur: possent fortassis à viro perito com-  
mode vti: videatis eorum formas.



Magnus ille Arabs Chirurgus Albucasis, in calvarie perforatione quoddam commendat cerebrum,  
quod duntaxat digitis tantum auoluitur: id equidem eam perforationem operatur, quam supradicti re-  
bri facere soliti sunt, & quia digitis circumfertur admodum tenuis esse credo: porro à principe etiam  
aliqua terebra memorantur, quæ magnis acubus triangulatis affimulantur. his præcipue, quæ ad sub-  
afectia, aut seismo restitueranda accommodantur: verumtamen quia facillime ad membranas descendit,  
non multum in vñ ostenditur.

Acuti

## TEREBELLA TRIANGULARIA SIMILIA AQV.



Alb. 1.1. c. 46.  
 & lib. 3. c. 30.  
 Am. 3. 4. tra 2.  
 3. cap. primo.

Acuti terebri multas, & angustas perforationes circa fracturas circulariter causare soliti sunt, quæ porro longissimo tempore, ac magno timore celebrantur, idè ad rem esse non videntur: attamen, vt sensatè dignoscatis processum huius actionis, videatis hæc duo capita, quorum cranium fractum, aut depressum apparet: & puncta nigra circa fracturas, terebratas perforationes manifestant, quod verò integrum inter orificia residet, phacæq; siue strigularæ, aut alio scalp. malleolo adactis, secare expedit.

## CAPVT TEREPRO PERFORATVM.



Excursus quæ ad terebram acutam pertinebant, restat vt ad alatum transcamus, quibus ossa radiæ excavari possunt: aciem hinc inde acutam habent, & imam partem ovalem, aut semicircularem: hæc in suo vertibulo, aut manubriolo posita, ac conuersa os excidunt, neq; a cerebri membranâ descendunt; quum ale, quæ prominent cæteras partes penetrare non permittunt: huius autem generis complura habenda sunt latiora, & angustiora. primò quidem larius admouendum est, deinde angustius, sic vt quum os dimidium excisum est, maxime angustum adhibearur: ac commodatissimum instrumentum est in terebræ, & cariosis ossibus, non autem rimis, & folis scissuris: tardè tamè operantur, ac magno rumore, & diuersimodè fabricantur nêpe duarum, aut quatuor, aut plurium alarum, vt hic videri possunt.

## TEREBRA DVABVS ALIS MVNITA.



## TEREBRA QUATVOR ALIS CIRCVDATA



## TEREBRA PLVRIMIS ALIS AVOLVTA.



TEREBRA

IMACINATA



TEREBRA IMACINATA

Diuerſa alia inſtrumenta, ad varios capitis affectus opportuna, veluti cauteria, ſectania, forpices, terna-  
culae, & ſimilia delineaviſcem, ſed quia alijs etiam diſpoſitionibus communia ſunt, ideo ea loco ſibi pro-  
prio deſcribam: ne mireris Lector ſi adeo pauca de horum inſtrumentorum vtilitate, ac operatione enar-  
raverim, cum in tractatu de calvariae curatione ad plenum omnia ſint explicata, reſtat tamen, vt qua-  
ratione caudata terebra circumagantur, apud Chirurſos, dicamus: porro quia eorum plurima cauda-  
ta ſunt, nec per ſe ſola, niſi vertibuli, aut manubrioli amilijs verti poſſunt, hac de re vertibulorum, aut  
manubrioli imagines, ſub ſenſata cognitione, reddamus.

Hoc inſtrumentum ferreum eſt, ima parte quadratum, vbi caugum habet, cui terebri cauda inferitur.  
in medio ſecetur, & in ſummo annexa mobilis pila eſt: oſſi aſſixo terebro, altera manu pila continetur; ſi-  
ſtula altera circumagitur. ſic enim os perforatur, terebro acuto: aut in orbe praecinditur modiolus;  
vertibulum nuncupatur.


Quia

## VERTIBVLVM COMMVNE.



Quia longissimo experimento novi, vertibulum superius delineatum, dum auoluitur, sinistra super  
 pilam adapta, ac dextera id in girum vertendo, opus laboriosum esse, ac multo egere tempore, nec tus  
 tum ab omni noxa fore, cum satis altè operatur, aliud ferè similis operationis fabricauit: hoc argen-  
 teum, aut aeneum, aut ligneum esse debet, formæ oualis totum perforatum, per quod medium transi-  
 t manicus ferreus mobilis, qui superius in girum auoluitur in imo cauitas, ubi cerebri cauda inferius, in  
 summo reflexus, ut dextera conduci possit: cuius verò in sinistra super caput infirmum firmiter accom-  
 modata, immobiliter teneri debet, & hoc pacto cerebro in cauo aliquo cranium perforatur: manubrio-  
 us oualis vocatur.

## MANVBRIOLVS OVALIS.



Superius varia delineauimus cerebra, ac qua ratione auolueretur explicauimus: restat modo, ut de  
 modioliis, non secus à serra, sermo habendus sit: modioliis (inquit Celsus) ferramentum concavi teres  
 est, imis oris ferratum, per quod medium clauus ipse quoque, interiori orbe cinctus demittitur, ut eo in-  
 sistente modioliis delabi non possit, ac ubi iam iter modiolulo pressum est modius clauus educitur, & ille  
 per se agitur. Hoc instrumentum serra teres est, qua utebatur Hipp. dum caluarie os secaret, cum eius

circum considerari iussit: antiquissimum quippe est, & à Græcis chynicida, aut charition vocatur: à Latinis modiolus, & à Principe voce corrupta anichades: apud nos est in continuo usu: apud multos verò reprobatur. veruntamen si circumspecte ossi adhibeatur, eaq; feruentur, quæ Hipp. voluit in ossis usu feruari, proficit omnino: eius forma talis est.

## CHYNICIDA.

Hipp. li. de cat.  
curat.  
lib. de locis  
in homine.  
Cels. lib. 8. cap. 3.  
Galen. meth. ca.  
vltimo.  
Pam. lib. 6. c. 90.



Novam modiolis formam, Medici huius ætatis inuenere, hæc duabus alijs circumdatur, quæ modiolis mergi nequeunt, satis tuta instrumenta sunt, & ubiq; obseruantur, alij quidem operando latiorem orificiam reddunt, ita quòd quantà penetratio, apertissime dignoscitur.


Iacobus Saracenus  
Corydis  
Vides Vides  
Fœntum.  
Leonardo Bot-  
tato Adm.



## MODIOLI DVABVS ALIS VNITA

Alij recentiores, ac huius sæculi Chirurghi, vt ceteris magis aperta, & velocior fiat horum modiolis-  
rum operatio, quatuor alijs eos circumuoluerunt, ad horum similitudinem.

## MODIOLI QVATVOR ALIS CIRCVDATI



Et si prædicti modiolis ubiq; ferè in continuo usu feruentur, attamen mihi videtur aliqua contingere incommoda, vnde nomen securitatis omnino non merentur, quemadmodum multis sic eos appellare placuit: nam instrumenta securitatis, quæ eo quia mergi non possunt, abscissa vocantur circulo, & nō alijs muniantur: hæc de re nonnulli diligentiores, circulos modiolos fabricarunt. circuli verò parum extantes, ac gradatim circumcurrentes à cuspidē acuta, suo ceteris ferra, distent; vt crassitudinē ossis crani adaptari possint: Porro hæc instrumenta verè sancta, secura, incomparabilia, & abscissa vocari merentur: Nos autem instrumenta secura nuncupamus: hæc similia in forma, sed diuersa in distantia circuli, à ferra, esse debent, videatis imagines.

# Officina Chirurgica.

192

15

## INSTRUMENTA SECVRITATIS.

10



VENE (115)

Galli modiolorum numerum, ac varietatem evitantes, modiolum cannulatum, teres, ferratum sine ala, aut circulo, sed pluribus in locis gradatim perforatum construxere: & ne mergi valeat, transuerfarum, siue defenlaculi quoddam parū extans. in eis cauiis locant, qui ad cranei crassitie permurari ascendēdo possit: sic n. solo vno modio, oibus craneis accōmodato ossa perforant: videatis quāso similitudinē.

### MODIOLI PLVRIBVS IN LOCIS PERFORATI.

30



LVETIAS.

Itali admodum diligentes in manu operationibus (circa caluarie curationem) novos quosdam invenire modiolos cannulatos, ferratos, & torcularos, quibus exterius succedit aliter cannulus brevis: interius torcularis, qui paulatine ascendendo prohibet. ne vi modiolus descendat, distat verò modiolus torcular à cuspidē ferre, pollicis grossitudine, ut ferri perforando descendere valeat: videatis adharrentiam horum cannulorum.

### MODIOLI TORCVLATI.

50



ROMAE.

60



Nec desunt præter hos alij modiolus, apud Teutonicos ad cranei perforationem de novo reperti, veluti hic conferuntur duæ ferre verobiq; in manubriolo ligneo recto, cavitatibus quāmplurimis, ordinatē insertis, recto: cui exterius cannulus quidam applicatur, qui cum profundari nequit: à cannulo verò duæ æquales oriuntur auriculæ longitudinis medietatis vnius digiti, cum duobus parvis transverfarum, à media fere eorum regione transmissis, qui cavitates manubrioli ingrediendo, ac cannulum firmiter tenendo, modiolum violenter mergi prohibent: exterior verò cannulus, ad libitum operantis extolli, ac deprimitur: eius exemplum hoc est.

Io. And. à Cr. Offic.

b 2

In-



## MODIOLVS CANNVLATVS.



CANNVLVS.



Inter modiolos cannulatos, ac ferratos, quoddam instrumentum non sine artificio ex duplici canno  
lo contextum reponitur: quorum primus est simplex, teres, ferratus, semivacuus in immo, ac longitu-  
dinis medietatis digiti, à quo duæ resultant alæ eiusdem dimensionis: in quarum medietate duo parui  
transversarii exterijs eminent: in summo verò orificium quoddam impressum est, vbi vertibuli torcu-  
lata acuties inferitur: alterum teres latior, ac primò breuior, & sine ferra construatur, duabus alis pa-  
riter munitus, interius multis cavitatibus plenus, in quibus primi cannuli transversarii ingrediuntur. sic  
enim ferratus modiolus descendendo tuto omnē cranei crassitiem perforare potest: auoluitur modio-  
lus iste, cuiusdam vertibuli munere: sed quomodo fiat talis compositio, videatis.

Cannulus interior.

Cannulus exterior.

Cannulus integer.




VERTIBVLVS.



Quendam modiolū Noribergensem vidi magno quippe magisterio constructum, manubrium est  
superioribus ferè simile, cui tres formæ modiolorum cannulatae; teretes, ac ferrate inseri possunt: hi  
quidè latitudine variant, nā alter, altero, latior videtur: in ima verò vertibuli parte, septē rami oriūtur,  
medius verò clarius est, in alijs autem angustioribus, angustior modiolus locatur, in latioribus magis la-  
tus, in amplioribus latissimus applicatur: aspiciatis quælo huius instrumenti pulchritudinē, ac vtilitatē.

Nunc




Nunc vobis duo ostendam veribula, vna cum suis modiolis, quibus in cranei perforatione vsi solentur; veribulum vnum est in medio reflexum, ac in ima parte cauum quoddam quadratum continet, in quo modiolus teres cannullatus, ferratus, ac quatuor alis munitus, vel terebrum multis alis circumdatus inferitur; alterum verò torculatū videtis, in cuius extremo duo pariter modioli interius torculati, inferi possunt: quorū vnus ferram adeo breuem continet, quod vix vestigium ferraturæ imprimit; alter verò ferram teretem habet, ab alijs non dissimilem prius foramina, secundus malleus vocatur.



Ut autem ossa crani ex toto usque ad membranam perforentur, instrumento simili Veneti con-  
tuso utuntur: altitudo recta est longitudinis palmi, quæ inter duas manus ducitur: hinc inde verò medio-  
lum teretem, planum ferratum, ac concavum retinet, quorum unus aculeum continet, alter verò for-  
mina est, hoc cum circulariter avolvitur ossa crani mirabiliter penetrat: à Græcis chænition, à Lati-  
nis modiolus planus vocitatur: est quippe subtilis ferra Hipp. hæc eius vera effigies.

## CHÆNITION.



## MODIOLVS PLANVS.



Velox admodum est, horum modiolorum operatio, veruntamen non ab omni noxa liberatur: hæc  
de re nonnunquam timetur eorum operatio, cum facillimè emerguntur: & ea magis laudantur, quæ à  
modiolo nespulato refultat: porro, nec ab omnibus hæc laudatur, cum tarde, nec sine aliquo strepitu,  
ac rumore agat: modiolus est pluribus aliis circumdatus, quæ in operatione latius officium reddunt  
manifesta est horum modiolorum forma, in inferius delineatis.

## MODIOLI NESPVLATI.



Non desistam aliquos modiolos delineare, qui apud naves præsertim Hispanos exercentur, apud  
Italos verò quia tardè operantur, dum una tantum manu avolvuntur raro reperiuntur: videatis tamen  
imagines, & operationes eorum.


## MODIOLI, QUI VNA TANTVM MANV DVCVNTVR.



Non.

10 Nonnulli Chirurgi diligentia pleni, modiolum quandam habent canularum ferratum, formae quasi ovalis, quia ad medicamentum vique, semper ampliando procedit, quare ad meningas de facili non descendit: eius exterior pars aspera est, ideo dum avolvitur omnes terebrati ossis fatagias, ac asperitates adqueat: continuo etiam operando amplius orificium reddit: formatur modiolus alper, hoc modo.

## MODIOLI ASPERI.



Ve pariter aequentur asperitates ossis perforati, aliqua inserta sunt instrumenta sine cannulo, & ferra, sed aspera, & limata: in quorum immo lenticula quaedam inserta est, non multum deficiens à modio in latitudine: qua membrana noxa tuetur, & quia eorum operatio est aquare, ideo aequatoria dicuntur.

## MODIOLI AEQVATORES.



30 Multa de terebris, ac modiolis hactenus explicavimus, qui crebro, cum cranium perforaverint os in orbem terebratum, in sede propria residet: qua de re eo uti opus est instrumento, quod elevatorium vocatur, quod absque aliqua noxa non indicatur, nam elevando os in una parte, id deprimitur in alia, & periculum imminet, ne eius aliqua particula sua acutie membranas offendat: quare cannulatam quidam tenaculam fabricavimus, aequaliter secundum eius longitudinem dipartitam, aliquoties per modiolum angustiore, eiusdem formae, & sine ferra, ut terebratam diploidem, aequaliter, ac firmiter amplectatur, ac tunc extrahat, nullam interius squilam, aut fatagiam relinquendo: eius fractura talis esse debet. sed varia in latitudine, ut modiolum sequatur.

## TENACULA CANNULATA.



40 In quodam codice Albucasis, nonnulla vidi instrumenta ad elevanda ossa depressa, quae ex eo quia  
Io. Andr. à Cr. Offic. 6 4 quo-

quodam artificio fuit fabricata, non tamen secuta ea delineare decreui: effect quippe longissimus sermo, si quis eorum narrationes assignare decreverit: quare sit est, ut videatis quo modo picta fuit.

Vide caput summa  
corundem et, hinc  
funda, aut depreffa  
videntur.



Vide caput in li-  
scribis com-  
muni, ossa fracta,  
aut depreffa vi-  
denda.

Operatores, quamprimum calvaria fracta dignoscant, os totum dubitatum in propagulo tradunt, ut fra-  
ctura modum, quantitatemque, intelligant: quare appone est necessaria, carnis, ac pericrani ab ipso  
craneo cœtuentis separatio: quæ tripliciter celebratur, ut in his tribus capitibus aperte videre poteritis.

Linealis, siue recta.


Trigona, siue orthogonalis.

Tetragona, siue crucialis.




Multa de terebris, modiolis, & his similibus instrumentis vique adhuc enarrauimus, opportuna  
quidem in calvaria curatione, & perforatione: quorum opus leue, ac quietum esse debet: nunc recitat,  
ut nonnulla fortissime operationis delineamus: cogitur scilicet Chirurgus aliquam ossium partem disrum-  
pere, ut membrana à noxa liberetur, id magis cum in plures partes dilecta sunt, nec dignis, aut debi-  
li quodam instrumento dimoueri possunt: ut in ea fractura, quæ thlasma, aut engisoma vocatur, videri  
potest: valent insuper mordendo ossis duri parietes absumere, aut os diuidere, ipsumque facilius  
extrahendi reddere, ac lacius orificium causare, ut commode humiditas expurgari valeant: fortiori  
propria nominis ab eorum forma: ab antiquis scalpæ eccliforia opposita vocantur, communiter for-  
cipes, & vulgari sermone mordenti: vtilissima quippe apud expertos instrumenta creduntur, & conti-  
nuo vni seruantur: videlicet eorum varias effigies, & fabricas.

SCALPER ECCISORIVS OPPÖSITVS.



Gal. 8. de vi  
par. ad collas  
incidendas.  
Aut e. de ira. 2.  
ca.

FORCEPS ECCISORIA.



Par. 1. 6. c. 11.

MORDENS.




SERPENTINA.



GRVINVM.



OSSI FRANGENS.










# INSTRUMENTA OCULORVM PASSIONIBVS ACCOMMODATA.



**P**AUCAE admodum sunt oculorum passiones, quae ferreis egent instrumentis, ideo non multa ab antiquis descripta reperiuntur: verumtamen affectus ille quæm Graeci hypochimia, Arabes cataractis, Latini suffusionem, & Vulgares aquam appellant, cum humor glaciæ modo concretus, inter corneam, & cristalloidem circa pupillam, quo visus eatenus saltem impeditur, vt non possis discretas rerum species, & colores apprehendere, non nisi medica manu, & instrumento remouetur, cuius materia aut aurea, aut argentea, aut anea esse debet: forma verò acuta, more acus, præcipue in tenui coniunctura: quare sub duplici forma fabricatur, ac diuersimode vocitatur.

## ALMAGDA.



Si autem non obedit tibi almagda ad introitum in oculo, propter eius duritiem, nam ex hominibus est, cuius oculus valde durus percipitur: tunc quippe oportet vt utaris alberid, donec perforetur conjunctura tantum, & fiat locus ad almagda: est enim acutius alberid triangulata.

## ALBERID.



Act. Cat. lib. 7.  
c. 7. lib. 13.  
Act. scilicet Gal.  
de usu com. 1.  
Sicut punctura  
Pon. lib. 6.  
cap. 11.  
Harnedich Is.  
lib. 1. tradit.  
cap. 68.  
Murdess.  
Act. 4. 1. tradit.  
c. 11.  
Almagda Alba.  
lib. 1. cap. 11.  
Deposito aq.  
Modicorum.

Aliqui de regione Alayrach Arabie diuersas vias imaginati sunt, in aquae extractione, & imano cor-  
pae partem perforant, inde canulum quendam argenteum, minimum quidem, in orificio imponunt, de  
nec ad aquam peruenerit, quo labijs proprijs eam suggere possint: porro via haec noua est, nec pre-  
morte: nam si aqua crassa fuerit, vna secus albugineus humor exiret: magdaham vocatur canulus ille,  
cuius haec est imago.

## MAGDAHAM, ET MAGDAM.

Anic. 3. 3. ar. 11.  
4. cap. 10. in fin.  
Alud. 1. 1. 1. 1.



## IN ANGLVLS DOMESTICIS OCVLORVM.

In internis oculorum angulis, loca Graece enchantis, Arabice almachen, seu almeini, Latine angu-  
li oculorum nominata, aliqui parui abscessus, à Graecis anchilopa, ab Arabibus hachili, & bachili, &  
Latinis lachrymales tuberculi vocati nascuntur: qui disrupti, ac sine methodo curati, in eam transfe-  
runt dispositionem, quam Graeci agilopas, Arabes garab, & algarab vocant, à nonnullis aristati, &  
Latinis lachrymales fistulae nuncupantur: cumq; diu protrahuntur, terebrant in oculo gignunt, nec vnqua-  
remora terebrine cicatricem contrahunt: remouetur autem caries ipsa, aut longo tempore virtute me-  
dicamentum efficantium, aut breuiter opere aliquorum terebrorum, aut igne: terebra verò duobus mo-  
dis fabricatur, aut duabus alis circumdata, aut spherica, & limata: potentia terebrorum non solum ope-  
ratur cariem ossis abradingo, sed interdum totum os vsq; ad narium cavitates perforando: talia sunt  
haec terebra.


## TEREBRVM ASPERI CAPITIS.

ALVC.

## TEREBRVM ALATVM.

CELIV.

Celiv. 7. ca. 7.  
Celiv. 7. de capo.  
medic. fac. loc.  
cap. 11. 1. 1.  
Anic. 3. ca. 11.  
Pau. 1. 3. ca. 11.  
de 1. 1. 1. 1. 1.  
Anic. 3. 3. ar. 11.  
s. cap. 14.  
Alud. 1. 1. 1. 1.



Cumq; tali remedio caries ex toto non remouetur, ut succi ad narium cavitates facillime defluant, &  
expurgentur perforare os necesse est, & eo tutiori modo quo potest: quare terebra acuta, triangulata  
inuenta sunt: quae opus hoc tuto, cito, & sine dolore peragunt: horum effigies talis est.



Quia extremis morbis extrema exquisitaq; remedia optima sunt, hac de re interdum cogimur caute-  
rio actuali, id est ignito, vi: & ne oculus laedatur, aut vaginam, aut canulum, ipsi fistulae adaptamus,  
aut coactorem ipsi oculo applicamus: quare experti Chirurgi canulos construxerunt, per quos ignis  
radij ad os affectum percurrere possint: canuli ad hoc opus accommodati sic facti sunt.

10

CAMAHAM. ALBV.

VAGINA. AVIC.



CAVTERIVM.

RADIVS.

30

## IN NARIVM MEATIBVS.

In narium cavitatibus, aliquę carnose excreſcentię oriuntur, à Græcis ſarcomata, & polypi, ab Ara-  
bibus alarnabet, & alarbiām, à Latinis tubercula carnoſa, & hemorrhoides narium vocitatę: nomen  
aſſumunt à piſce illo maritimo, qui polypodus vocatur, ratione ſubſtantię, ac tenacitatę. pluralit ate pe-  
dum, quibus membrum amplectitur: horum alter durus, ac malignus eſt: alter verò mitis, & benignus  
iudicatur ille curari nequit: hic ſanatur ſola manu operatione, auxilio tamen alicuius inſtrumenti cur-  
ui, ac ſemilunaris, & diuerſarū formarū, ſæpeue actuali cauterio: formę verò inſtrumentorū hæc ſunt.

ſtepp. lib. 2. de  
morbu.  
Celſ. lib. 6. ca. 7.  
& 8. ca. 10.  
Gal. 3. meym.  
cap. 30.  
Aet. lib. 6. c. 90.  
Paul. h. 6. c. 5. f.  
Raiſ. lib. 6. diſc.  
cap. 34.  
Aur. 3. 3. tract.  
5. cap. 16.  
Alou. c. 12. c. 24.  
& 27.

30

LYNARE. AVIC.


CAIADA. ALBV.

Spatumen curvum commune.

SPATA ACVTA. CEL.

SPATVLA ACVTA. PAUL.

Spatumen rectum. Albuc.




Si polypus oculus fuerit, ac in ima parte immerſus, vt tutius apprehēdatur, & radicibus extigetur,  
aliqui vncini, ſive hamuli fabricantur: quorum emigies tales videntur.

40

VNCVS. CELSI.

CIATHISCVS. PAUL.



HAMVLVS. PAUL.



Interdum cogitur operator polypum incidere, ac vna eius radices adurere, ne denuo concreſcat, &  
augeatur: quare duo præparentur inſtrumenta, alterum ad ſecandum, & vrendum; reliquum verò tā-  
tum cauterium ſit.

50

CVLTELLVS, QVI IGNIRI DEBET. CAVTERIVM LINGVALE.



## IN MEATV AUDITORIO.

In auribus pauci admodum ſunt aſſectus, qui manuum opere egeant: ideo non multa inſtrumenta à  
veteribus delineata vidētur: ſolent tamē euenire, vel à prima natali die, vel protinus facta exulceratio-  
ne, ac inducta cicatrice, vt nullam remaneat in aure foramen, quare audiendi vſu priuatur: quod vbi  
accidit. ſi alta, & tenuis cicatrix eſt, acuto medicamento, aut ſcalpro accommodato diuidatur.

60

CVLTELLVS ALNESIL.

SPATA TENVIS.



Celſ. lib. 7. c. 1.  
Gal. 3. de corp.  
med ſecundum  
loco.  
Aet.  
Paul. h. 6. c. 3. f.  
& 24.  
Aur. 4. p. 1. f.  
Alou. c. 10. 27.

Facta sectione, coijcienda in vulnere pinna est, illita medicamento cicatricem inducente, ut cutis circa pinnam sanescat, quo fit. ut ea remota, postea facultas audiendi, remaneat. 10

## PINNA AVIS.

## CANNA ARGENTEA.


## CANNVLVS.



Solent etiam in aurem incidere non modo calculus, sed & faba, & siliquarum semina, & similia, quae extrahi debent specillo, lana, aut xilo in summo avoluto, ac in resina, aut tali glutinante medicamento demisso, eoq; in meatum auditorium leniter coniecto, donec adhaereat rei ingressis, eamq; extrahat: sin ista nihil proficiunt: arundineum cunulum, aut galli, vel aquilae, aut alterius magnae avis pinnam accipere oportet: & cera arundinis, aut argentei cannuli, aut pinnae ambitum, quo auri inijcitur obturare, ne necubi spirare possit, ac in auditu orium meatum imponere, inde ore fortiter exuentes, ea quae inciderunt extrahimus, aut saltem ad orificium euocamus. 20

## CANNA RECTA. ALBV.

## EMBVBA. AVIC.




Si haec non iuvant expedit vel hamulo, vel vncino ceco, aut gesti, aut rostro Arcadis haec apprehendere, & paulatim euellere: horum instrumentorum effigies similes sunt. 30

## HAMVLVS.


## VNCINVS CECVS.

Paul. F. s. c. d.  
Alb. s. c. d.



## GESTI.

## ARCHADINVM.




## IN PASSIONIBVS ORIS, ET GVTTVRIS.

Gutturis intima adenes, quas Graeci antiadas, Arabes algodad, & Latini tonsillas vocant, inflammationum expertes, aut supra modum auctae: ac cibi, potusq; & spiritus iter impediunt: ante completam suppurationem interdum seccari debent: porro caute instrumentum admovere oportet, quod Graeci agchilotomon, Arabes spatumil, & Latini scalpelum lunatum appellant: ad has similitudines facta sunt. 40

## AGCHILOTOMON.

Call. lib. 7. c. 11.  
Gal. 7. de clp.  
med. incut. lo-  
con.  
Paul. lib. 6. c. 30.  
Auc. 9. 3. c. 17.  
Alb. lib. 6. c. 36.



Cunq;

16 Cumq; in ore, aut gutture tumorem fecare volueris, lingua inferiori a xillę apprimere decet, quare illud est accommodatum instrumentum, quod Græci glossocatochon, Arabes spatam, & Latini speculum oris vocant.


GLOSSOCATOCHON.



Paul. lib. 6. c. 10.



SPATA.



Deuorantur interdum edendo spine, officula, & similia, quę gutturi ita infiguntur, ut uix euelli possunt: ea uero quę in conspectu veniunt, eo extrahuntur instrumento, quod Græci acanthobolon, Arabes gressi, & Latini volfellam dicunt.

ACANTHOBOLON.



Paul. lib. 6. c. 10.  
Abulc. lib. 5. cap. 6. & 31.

Sunt qui dicunt maiores moles deuorandas esse, exempli gratia caulem, lactucarum, aut bucellas panis biscocti, alij spongiam puram, molemq; exigua magnitudinis lino alligatam deglutire iubent, apprehensioq; lino retrahi. idq; frequenter efficere: quidam vaccinae carnis portunculum non plene coctum, filo annodant, ac eam deglutire præcipiunt, inde eam extrahunt, simulq; & spinam.

IN DENTIBVS MALE AFFECTIS.

Eximuntur dentes in pueris, cum hi qui subnascentur, alios comouent: comoti uero aut sponte cadunt, aut facilius digitis euelluntur: in adultis uero aut quia crudeliter dolent, aut carie affecti, alios inficiunt, aut anhelitui, ac ori prauum præstant odorem: aut exulceratę linguae sanationem prohibent: vel fistulam maxillarem procreant, aliquibus ferreis instrumentis extirpari debent: verumtamen, ut debiles reddantur, ante operationem a gingiuis aliquantisper separentur: quare in hunc usum similia præparentur instrumenta.

Cd lib. 7. c. 19.  
Gal. 7. de os.  
med. secundum  
locum.  
Ar. lib. 5. c. 34.  
Paul. lib. 6. c. 10.  
Ant. 7. 3. c. 17.



Cel lib. 9. c. 11.  
Gal. 9. de clip.  
med. secund.  
dam Inco.  
Ant. lib. 5. c. 34.  
Paul. lib. 6. c. 11.  
Astruc. 7. 34. 17.  
Albuc. lib. 3. cap.  
20. & 21.

Cum à gingivis dentes diuissi fuerint, ac à propria fede aliquantisper moti, in eos forcipes magnos locare oportet, porro locatione bona, ne apprehensi fugiant, aut frangantur: ob hoc igitur forcipes istius figuræ operatores inuenerunt, & communiter ab eis cagnoli vocitantur.

## CAGNOLI.

FORCEPS EVULSORIA.  
Paul.

ATRACTORIA FORCEPS.  
Cel.



Si verò non dens aliquis, sed eius radix prauum aliquod lymthoma produxerit, omnino sed tutò, ac citò eximenda est, quare hæc instrumenta satis idonea esse creduntur: pellicani vocantur.

## PELICANI.


ALGEBSTL. ALB.

RIZAN. CEL.




Non desunt alia instrumenta ad dentium radices eximendas, fortissimæ operationis, ut sub his formis videri possunt.

## RAMIFICATA. ALB.




## PALANCA. ALB.



Accedit interdum Chirurgia ex actuali cauterio in dente, aut ferrato, aut carie affecto, aut tristi sensu prædito; porro præsentaneum remedium est, & diuersimode aduritur, sed quod magis expedit, sunt cauteria spherica ignita, vna cum cannulo, aut sine eo: fabricantur in hunc modum.

## CAUTERIA.



Albu. lib.  
3. cap. 30.

10 Si vermis, aut humor aliquis acutus dolorē dentibus præstiterit, ore aperto, altera semine, ignitis carbonibus alpero, dentes atēcos sūtere oportet: interdum enim quasi vermiculi quidam eijciuntur, & vi dentes vaporem recipiant: hoc instrumentum accommodatum est, à Gal. & Pau. infundibulum, à Principe trajectorium, & ab Albu. canulum nuncupatur.

## INFUNDIBVLVM.

Gal. & de med.  
cōp. secundum  
locos d'egit. pē.

10



30

Occurrit sæpe, ut linguae alter latus exulceretur, & sit vlcus difficilis consol. d'ationis, quare videntū est, num contra dens aliquis acutior sit, qui vlcus eo in loco sanare nequit: quapropter eū limare expedit: interdum etiam dentium inæquales excessus apparent, qui pariter limaturam requirunt.

Hipp. lib. 3. p. p.  
d'actonē  
Cel. lib. 8. c. 12.  
Auc. 1. 13. c. 190.  
Paul. lib. 6. c. 18.  
Auc. 9. c. 230.  
Albu. li. 1. c. 340.


## RHINARIVM. PA. V.

40



Quandoq; aggregantur in dentium superficie, interius, ac exterius, cortices asperi. rupest. & mali odoris, qui dentes nigricant, corrumpunt, & tēdos faciunt, vnde eos ruderē necesse est. & d. hoc via raspatoria parantur.

50




## IN COLUMELLA.

Sæpe gargilio, aut columella, siue vasa, catarro repletur, tumetue, ac elongatur, quare quod fluxum est ducere, & quod fuit inhibere expedit: facit adhuc interdum piper, mirrhū, & rosa, in puluerē minutissimum redacta: applicatur hic pulvis cum eo instrumento, quod Græci staphileparton, Arabes frenum, & Latini spatulam vocant: aliqui canulo utebantur, quos Gil. reprehendit, quippe pulueres per fistulam applicari, in asperam arteriam, aut stomachum delabi possunt, quare prostat interdum in co clearium coniecta medicamenta, columellæ applicare.

### STAPHILEPARTON.

### COCLEAR.



Gil. de comp.  
med. sic. lib.  
Paul. 1. c. 16.  
Auc. 9. c. 14.  
Albu. li. 1. c. 37.

10. Andr. à Cr. Offic.

c 3


Vt

## IN OCCIPITIO.

10

Vt fucci diuersi à capite, præsertim ad oculos fluentes, reuelantur; periti Chirurghi in occipite, seu occipitio, quod Græci opisthocranion vocant, diuerticulos, aut funtanelas, siue sedanios, quos Arabes sectorios dicunt, facere soliti sunt: vlcus quippe est, quo diu seruari, fluxiones ad id reuellitur, tria simul concurrunt instrumenta, nempe tenacula perforata, quam isti sedancum, aut sectorium vocant: perforatorium, siue punctorius stilus, & fons sicca opportuna.

Perforat. ca. 1.  
Alm. h. c.  
R. c. l. h. d. c. a.  
e. c. p. a.



## IN COLLO.


40

In collo, siue gula, aliquæ adenos crasso, ac viscido humore repleti solent, quare indurantur, & ad naturam scirrhæ conuertuntur, à Græcis cherades, ab Arabibus altheceitil, & à Latinis strumæ, & communiter scrophulæ vocantur; proprio folliculo, aut velamento, quod Græci chistim vocant conseruantur; curantur interdum totali extirpatione cum sua tunica: pari modo abscessus illi magni, qui in collo nascuntur, à Græcis broncoceles, ab Arabibus hernia gutturis, & à Latinis botium vocitari; manu opere curari solent: porro si inuolueri totius extirpatione, vnde interdum, aliquorum hamulorum, aut vncinorum occurrit necessitas: sic equidem facti sunt.

Andr. 3. c. 17. d.  
S. c. 17. d.  
Alm. h. c. 4. d.

## HAMVLVS SIMPLEX.

30

INSTRVMENTA, QVAE PASSIONIBVS MEDII VENTRIS  
OPITVLANTVR.


60

## IN THORACE.

In vulnere cassali, quod vt plurimum penetrans est, pectoris, siue thoracis cauitas, sæpe aut sanguine, aut sanie, aut alia catarrali humiditate repletur, quare vt talis succus delabi possit: Chirurghi canulâ quendam semilunarem inuestigant, à Græcis piulca, ab Arabibus clapsedra, & à Latinis sanici eductor nominatur, quo in medicationibus variarum humiditatum copia expurgari a clibano pectoris valet, forma talis est.

Vt


10



Gal. 1. me-  
th. ca. 8.  
3. ad talia.  
Paul. 1. 3.  
cap. 17.

## PIVLCA.

¶ Ut verò, non solum tempore medelæ, sed ut continue desistant succi extruuntur, qui febres, tussis, ac anhelitus difficultates, dum in pectore persistunt, producere solent: ca. utrum rectius n. teres, pluribus  
30 in locis perforatum inuenire, cumq; semper in vulnere conseruare: variae sunt eorum effigies.



Portò cum sanguis conglobatus, aut aliqua materia crassa, aut quævis alia humiditas in thorace cõ-  
tenta eximi debet, aut si qua ablutio opportuna fuerit, aut si saniem in imo delaptam, bis terue in die  
30 extrahere volueris: simile paratum sit tibi instrumentum: multisq; alijs passionibus accommodatum, fa-  
bricatur ex argento, aut auriscalco, & diuersimode vocatur.

## COTENCHITAS.



Chil. oriculus  
Chil. 1. cap. de  
filula.

lib. 6. c. 17.  
de oculis mor-  
bi.  
lib. 7. ca. 10.  
8. 17.

Gal. 1. meth. ca.  
7. 1. 1. 1.  
Act. 1. 1. ca. 16.  
Paul. 1. 1. ca. 19.  
Paul. 1. 1. ca. 19.


Paul. 1. 1. ca. 19.  
Chyl. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.

Rat. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.

Rat. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.

Rat. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.  
Rat. 1. 1. ca. 19.

## METRECHITAS.



30

Sæpe etiam cum clapsydra affuerit, & injicere aliquod medicamentum desideramus, vesica bubula,  
aut suilla, canulo, aut cornu alligata vitumur, præsertim in passionibus ani, aut sinuosis viceribus.

## VESICA CANULO ALLIGATA.



Hipp. 1. de fil.  
1. 1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1. 1.  
1. 1. 1. 1. 1. 1.

INSTRUMENTA, QVAE MORBIS INFIMI VENTRIS  
CONVENIUNT.

IN SYMINE.

Meggs.  
Leonidas.  
Aurora.

Aquam his, qui hydrofici sunt, emitti oportere manifestum est: quare quidam sub umbilico fere quatuor interpoliis digitis, à sinistra, aut dextera parte perforare consuevere: optimum quippe in crassius abdominibus illud instrumentum est, cuius fere tertiam digiti partem latitudinis mucronis impleat, ex dimidio spatam refert: eius imago talis esse debet.

## BEZEL


*Mammillaria*.  
Cul. 1.7. cap. 1.7  
ft. 1.9.  
Culm. hydroc.  
beas  
Paul. lib. 6. c. 63.  
B. xli g. adu. 6.  
Aug. 13. 1. 1246.  
1. cap. 6.  
Succulent. lark.  
Alto. 1.2. 1. 64.



Quia facillime bezel intestina attingere posset, securiorem instrumentum recentiores excogitarunt: aciem vtrinque habet; acutum longitudinis medietatis digiti: in quo eminet breve quoddam deiclisaculi, quod mergi non sinit: fit sub hac forma, & valet in tenui mirach.


## SPATVMEN SPINOSVM.

Spanned across.  
Along the side of the



Cum anam extrahere volueris, eo tum perfora abdomen, plumbeo, aut argenteo, aut aenea fistula coeclenda est, vel recuraris in efferiorem partem labris, vel in media circumferuntur quadam nota, ne tota inus delabi possit, hinc ea pars quae intra, paulo longior esse debet, quam quae extra vii a vultore inter membrana proceda: per hanc effundendus humor est, atque ubi maior pars eius evocata est, cludenda demisso laticulo fistula est, ac in vulnere relin-quenda: amaranth fistularum similitudines haec sunt.

## Cellulose 685



*Altera fistula ad hoc opportuna reperitur; hæc non semper, sed solum tempore medicatur in vulnere imponenda est, sit ex argenteo lenis, & rectum, teres in extremo vno tantum orificio perforata, & in lateribus diuersis, vt facillime aqua delabi possit: interdum ex magna auis penna fabricatur.*

## PINNA AVIS

Occurrunt in hac parte affectus varij, veluti solutiones continui, abcessus, vlcera, & aliz passioner, euz instrumentorum varietate egent, aramen, quia talia alijs locis male affectis opitulantur, commu-  
niter de eis vno in loco historia enarrata est.

IN TESTIBVS.


Interdum testes, cum male affecti sunt, egent Chirurgia, repote cū seroso humore replentur, à Graecis hydroceles, ab Arabibus hernia aquosa, & à Latinis ramex aquosa vocatur: fit interdum ex praepo-  
 loci temperamento, nonnunquam ex iccore male affecto, ut in aschite, & reliquis aequè inter cutem ge-  
 neribus: evacuatur hic humor potissimum apertione: quare illud opportunum est instrumentum, quod  
 à tali operatione hydroceleum Graece vocatur.

CVLTER HYDROCELICVS.

Cell. 11. p. c. 18.  
Cap. 1. de m. m.  
cap. 18.  
Act. 17. 14. 18. 1  
Par. 1. de c. 18.  
Act. 18. 1. 18. 1  
1 cap. 18.  
Act. 18. 1. 18. 1



FLOROTHOMVM MITHINVM



Anri

- 10 Antiquissimi Medicorum ignitis cauterijs, has celebrabant sectiones, argumento sumpto à forma instrumentorum: nulli tamen adhuc in eis villitatem percipere potui: videatis tñ aliquorum delineationes.

Hipp. lib. de locis in homine.  
Meges.  
Leonidas.  
Ambros.

CUTELLARE COMMUNE.


CAUTERIUM PAV.

CAUTERIUM ALBV.



- 30 Caro quoq; inter tunicas, quas Græci oftheon, Arabes barichem, & Latini scrotum vocant concrefcit, unde oritur durities quædam carnofa, à Græcis farcocalem, ab Arabibus burum, & à Latinis hernia carnofa dicta. ex toto præter naturam eft, quare æger ablatione: verum fi didimo, aut annexa, aut auoluta fuerit fiat castratio, ad quod opus quatuor requiruntur instrumenta, castrator, nouacula, filus, & cauteria.

CASTRATOR.




- 40 Cum reddendi vrinam difficultas apparet, aut quia fenectute inter collapsum eft, aut quia calculus, vel concretum aliquid ex fanguine, aut puris, aut carnis, ætus fe oppoluerit, aut mediocris inflammatio eam prohibet, aut exterior caufa obturauerit, aut præputium aliqua ex re coierit, manus operâ molimur, idq; non in viris tantummodo, fed in fœminis quoq; interdum neceffarium eft, quod opus Græce catheterismus vocatur: vt ergo lotiū reddatur, Chirurgus instrumenta diuerfarum materierū quantarum, ac formarum penes fe continuo parata habere tenetur. Hæc apud vetuftiores Medicos ex pifcium corio, aut pelle quorundam auium formabantur: Nunc verò ex auro, aut argento, aut auricalco, pro viris fabricantur: pro mulieribus interdum ex plumbo, nec nimis plena, nec nimis tenuia, fed lenia, leuia, rotunda, æqualia, inania, groffitiei ficut penna auis, & aliquantifper curva effe debent, fed magis in viris, quam fœmelis: ad mares tria, ad fœminas duo, Medico habenda funt: ex virilibus maxima decem, & quinq; eft digitorum, media duodecim, tulinima nouem: ex mulieribus maior nouem, minor ſex: funt pluribus in locis perforata, ne à conglobato fanguine, aut crasso pituita, vel arenibus, aut calculo obturentur, diuerfimode nominantur: communiter tamè à Græcis catheter, ab Arabibus cathatir, à Latinis fiftula veficaria, & Vulgari ſermone ſiringa. hæc funt eorum lineamenta.

Aenes Gifala.  
Cel. lib. 7. c. 26.  
Catheter.  
Gal. 5. meth. ca.

Art. lib. 1. c. 7.  
Argula.  
Gal. 6. anar. c. 3.  
Rectus fiphon.  
Gal. 5. meth. c.

7. 2. 11.  
Paul. 2.  
6. c. 19.  
Fiftula.  
ſciana.  
Ant. lib.  
16. c. 78.  
Alcat.  
ur.  
Anticop.  
3. 1. 1. 1.  
1. c. 1.  
1. c. 1.  
1. c. 1.  
1. c. 1.  
1. c. 1.  
1. c. 1.

CATHETER.



Medi-




Medicamentorum genera, quæ ad vesicam, vterum, intestina, & pulmonem idonea sunt, ab ipsa cu-  
randarum partium substantia desumi debent, quæ cum in occulto existit, extimato prius afflicto, cor-  
vendi modum, tum à forma, tum à situ contemplare oportet: hinc namq; excogitati sunt antiqui, &  
vteri clisteres, quos metrenchitas, & oricularij clisteres, quos cotenchitas, & recti siphones, quibus in  
vesica aliquid infunditur, quos catheteras Græci dicunt: ob hoc igitur cum femina brevius meatu vri-  
næ similiter, & rectius iter habet, breviori, ac rectiori catheteri auxilio eget; forma catheteri mulierum.

Gal. p. meth.  
cap. 11.



20

Interdum non calculus, nec archula, sed crassus, ac viscidus humor, liberum loci exitum prohibet  
vnde admodum sæpe sola ceræ candellulæ impositione vrina expurgatur, sic ex cera alba, vt firmior  
sit, & diuersæ longitudinis, ad commodum coli vesicæ penetrationes: suffragantur pariter summope-  
re ad carunculas, quæ ceruicem infestant, acri medicamento remouendas: huiusmodi facti sunt.



30

In urinaria fistula multotiens calculus sic infigitur, vt inde nullo modo euelli potest, aut manibus, aut  
vi alicuius medicamenti: quare aliquo instrumento eum extrahere tentare decet, & illud opportunum  
est, quod à sui forma curuatum rostrum vocitatur: ab aliquibus ob id, quod rostro auis Arcadiæ affini  
larur, Arcadinum dicitur, Ac. angustam vofsciam, & Albu. traiectorii vocant: sic facta est eius forma.

#### ARCADINVM.




40

Si verò arcadicum inuamentum non præstat, facta sub calculo laqueatione, ne ad vesicam redeat, ex  
ferro alferico, aut indo, specillum palmi longitudinis habere expedit, cuius extremitas, aut triangu-  
la, aut terebri more, quo lignarij fabri utuntur, esse debet: cum eo quippe calculus, aut perforatur,  
aut frangitur, aut extrahitur.

50

Cal. lib. 7. cap.  
de signis calen-  
torum.  
Arc. lib. 11. cap. 5.  
Et 14.  
Alu. lib. 1. cap. 1.



60

Nonnunquam etiam prolapsus in fistulam calculus, nō longe ab exitu inhaerescit, eum si fieri potest  
euellere oportet, si verò non, cutis extrema quamplurimum attrahenda, & condita glande lino vicienda  
est: deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus excimendus est: tum cutis remittenda:  
sic enim fit, vt incisam colem integra pars cutis contegat, & vrina naturaliter profluat: vtilis est infra-  
scriptus cucullus.

Calcu-

## AD CALCULOS EX VESICA EVELLENDOS.

Calculi ubiq; in homine generantur, sæpè verò in renibus, & vesica, in tunica hepatis reperti sunt: ab intestinis proiecti, tussicula expulsi, ac in pellicula felis visi, & à me bis in pàniculo plèura ex anarome in uenti. Nicolao Massa Veneto omni literarum genere clarissimo assistente: porrò cum in vesica reperti, & sub morbo in numero est, ac res omnino præter naturã ablatione eget, quod fieri solet à perito Chirurgo, varietate instrumentorum: & quod primo occurrit nouaculum est, sub hac imagine factum.

Gal.  
Gall. de not.  
Luc. a. 168.  
Gall. de dei c.  
cap. 1.  
Gall. de loc.  
186. cap. 8.  
Gall. de loc.  
186. cap. 8.  
Gall. de loc.  
186. cap. 8.


## CVLTER RASORIVS.



Cell. 7. cap. 6.  
Gal. organica.  
34.  
Art. 1. ca.  
Pam. 1. 6. c. 60.  
Hinc 19. p. tract.  
1. cap. 7. d. 7.  
Alibi 1. 1. 1. 1.

Cum superiori instrumento, locus qui à Græcis perineen, ab Arabibus fiterim, & à Latinis fœm en dicitur, primò à pilis denudatur: deinde tota ceruix aperitur, donec calculus in conspectu venit: dimul so prius cæthere cum suo aperto canaliculo, à media regione scire vsq; ad inum: in quo secãdo acies nouaculæ ingredi possit: est eius exemplar simile, & communiter itinerarium nuncupatur.

## ITINERARIVM.



Quamprimum in vulnere calculus se obiecerit, si exiguus est, digitis ab altera parte propelli, ab altera protrahi potest, si minus vullella, aut tenacula huic operationi accommodata eximetur.

## TENACVLA.



Si magnus calculus est teres, & lenis, à superiori eius parte vocis iniiciendus est, eius rei causa factus, idest ad extremum tenuis in semicirculi specie, retusa latitudinis ab exteriori parte leuis, qua corpori iungitur, ab interiori asper, qua calculum attingit: tale est hoc instrumentum.

## VNCVS CEL

## BROCVS COMMVNIS.




Solet interdum calculus adeo magnus esse, quod per angustū calē exire nequit, sed latissima eget aperture, quę periculo non vacat; quare tunc melius est quiescere, quā cum errore vterius procedere, quippe aut moritur patiens, aut continuo fistulam patitur, quam Græci coriadam vocant, quod magis verendum est, si calculi forma, aut inæqualis, aut aspera, aut spinosa fuerit, ob hoc igitur, vt calculus appareat, ac vulnus ampliatur, instrumentum quoddā ad hoc idoneum fabricatur: porro specilli duo sunt solidiores, crassioresque communi exploratorio, teretes, lenes, ac in imo per duos digitos aliquā- tisper reflexi, longitudinis palmi, adinvicem, vt infra vniti, hi cum vesicā introierint, viam aperienti insinuant, eamq; aliis instrumentis præparant: quare ductores communiter appellantur.

## DVCTORES.



Ductorum solidiora capita in vesicę cavitatem locantur leuiter quidem: opposita verò aliquatiter, & moderate stringuntur. sic enim vulnus dilatatur, & inter ingreſſos specillos, tenaculæ, forciper, frā- gentes aliudvè opportunum instrumentum tuto interponi potest: at si robustiori ingenio fuerit opus, quo æqualiter partes amplectitur, ac ampliare conseruentur, vt lapis amplecti possit, hoc vtaris instru- mento, quod ab eius operatione aperiens denominatur.

## APERIENS.



Ampliato vulnere sat est, si vncō calculum extraheris, si verò non, forcipe amplexo cum perdecas: amplexus autem talis sit ne fugiat, nam ex longa inquisitione læditur vesicā, & inflammationes mortifi- cere citantur, sit forciper, aut tenacula, rostro anserino similis, vt hæc.

FORCEPS DVPLICATA.




FORCEPS ANSERINA.



Recusat interdum calculi forma, aut magnitudo, dilatationem, aut novam sectionem, vt integer extrahatur. præfertim cum ductores, aut dilatores injici minime possunt; quare debet, vt frangere instrumento apprehendatur, & minutim dissipetur, ac quod fractum est assumatur, ne aliquid in vesica residcat: nam denuo vnietur, & magnificabitur: forme instrumentorum frangentium similes sunt.

FRANGENS MAGNVM.



Si conteritur calculus id satis est, si minus scalpello, & malleolo diuidatur, & ne fugiat, firmissime in secundo frangente fixetur: scalpelli verò sic esse debent.

Io. Andr. à Cr. O. Æ.

d

Fracto

## SCALPER ACIATVS.



Fracto lapide fragmenta abducere oportet, ne vesica iterū ledatur, ne ve intus aliquæ dissipatæ reliquæ residuant: quicquid igitur remanserit, aut arenule, aut calculi, aut concretus sanguis simili co-  
clearis, quod sibi Chirurgus præparauerat, à vesicæ cavitare denudet: coclearis imitatio talis est.

## COCLEAR.




Solent diligentes operatores lapillo à vesicâ emulso, accuratè eius cauum inuestigare, si quid absconsi remanserit, ac superflua omnia ad vulneris orificia vertere: quare eo vniuntur instrumento, quod à ver-  
tendo, verticulum nominare soliti sunt: vulgo buclon dicitur.

## VERTICVLVS.



Quoddam instrumentum magisterio fabricatum, quod forcipis officio fungitur, alijs vidi, ideo et  
delicere decreui, quamuis egregij huius ætatis operatores, nec eo, nec ductoribus, nec aperientibus,  
nec frangentibus uti soliti sunt, sed aut digitis, aut solo anseris rostro adhibita opportuna sectione:  
omnes prædictas operationes celebrant.




## IN AFFECTIBVS VTERI.

Vteri passiones, quia in absconso residet, non de facili sensibus dignoscuntur: egent porro interdum  
alicuius instrumenti auxilio, & quod ad varias huius loci dispositiones dignoscendas conducit, illud in  
vsum habetur, quod à Græcis dioptra, & à Latinis speculum matricis vocatur.

DIOPTAERA.

Dioptra.  
An. h. 17. c. 16.  
& 18.  
Pm. lib. 3. c. 66.  
Speculum.  
An. 11. 3. 182.  
c. 107. 3.  
Verum.  
Abu. 1. c. 77.



SPECVLVM VTERINVM.







Cellib. 7. c. 28.

Act. h. n. c. 97.

Paul. lib. 1. c. 71.

lib. 1. c. 71.

c. 71.

Am. 1. 1. 3. c. 100.

c. 100.

Albu. h. 1. c. 75.

Merbi quidā maribus, & foeminis cōmunes esse possunt; quidā verō propriē ad foeminas pertineat, ut in primis, quod earum naturalia, nonnunquam inter se glutinatis oris concubitus non admittant, idq; interdum euenit protinus in vtero matris, interdum exulceratione in his partibus facta, & per malam curationem his oris sanescendo iunctis: si ex vtero est, membrana ori vuluæ opposita est: si ex vtero caro id repleuit: oportet autem membranam duabus lineis inter se transuersis incidere: magna cura habita ne vrinae iter violetur, hæc passio à Græcis phimus, ab Arabibus alratia, & à Latinis clausura vocatur: commune instrumentum ad talem sectionem illud est, quod ex dimidio spatam refert, à Principe alcabid nominatur: talis est eius forma.

## ALCABID.



## IN MORTVI FOETVS EXTRACTIONE.

Hipp. lib. de fo-

etis extractione.

Cel. lib. 7. c. 19.

Act. h. 1. c. 101.

Paul. lib. 1. c. 71.

Am. 1. 1. 3. c. 100.


c. 100.

Albu. h. 1. c. 75.

c. 77.

Si iam prope maturum partum, intus foetus emortuus est, neque excidere per se potest, adhibenda curatio est, quæ numerari inter difficillimas debet. Nam & summam prudentiam, moderationemq; desiderat, & maximum periculum asfert: igitur mortuo foetu cum cetera ingenia nihil proficisci videantur, à violenta manuum opera curatio expectanda est: porro cum partum mortuum esse certus fueris, diligenter quære an in caput, an in pedes, an in transversum iaceat, ut scias ubi vincum quo foetus extrahi possit, deungi conueniat.

Extrahi-



Extrahitur foetus emortuus adaperto vteri ore, sed magis eius collo, quod fit dioptraris auxilio, at-  
tamen quoddam instrumentum ab Albuc. describitur, non dissimile ab æquatore, quo libri æquantur,  
ab eo vertigo vocitatur: fortassis non ab re, cum longa, difficilis, laboriosa, & non sine periculo sit  
talis operatio: Notate quæso huius vertiginis effigiem.

VERTIGO ALBVC.



Adaperta vulua, Medici proposuimus est, vt puerulum manu dirigat, vel in caput, vel in pedes, si for-  
te aliter compositus sit: quare si nihil obstat, manus vel pes apprehensus, corpus rectius reddatur, si nõ  
autem, ramificato instrumento, quod implens dicitur conuertatur,

IMPELENS.



Si manus, aut pes tantum egreditur, aut caput solum appareat, nec eius datur remeatio, eo meliori modo quo potest tale membrum abscindatur: aut spatumili Albue. aut cultello Auic. quo nasi hæmorrhoides secantur, aut vng. Cel. in interiorem partem tantum per totam aciem excuto.


## CVLTER LVNATVS.



Caput interdum aqua repletur, & ea sit passio, qui hydrocephalica dicitur, aut corpus tanto humore distenditur, aut nimia flatus copia tumescit, quod egredi nequit: quare aut digito, aut cultello, aut extenuetur perforare expedit: ne autem vterus lædatur cultellus acutus non sit.


Si autem foetus adeo magnus fuerit, aut caput Nicomachi, aut ossa per transversum steterint, aut bini fuerint gemelli, aut corpus sic dispositum, quod machina exire non potest: cranium scindatur, aut ossa frangantur, aut gemelli separentur: porro ad ossa frangenda, almisdac Albui. opportunum est.

## ALMISDAC PARVVM.



Ossa verò in propatulo posita, aut in intimis absconsa, almisdac magno facillime franguntur.

## ALMISDAC MAGNVM.




10 IN MORBIS, QUI ANO CONTINGUNT

Affectus varij rectum intestinum à Græcis longanum dictum infestare solent, nec videri possunt, nisi auxilio illius instrumenti, quod Hipp. catopter, & leonidas, ac Paul. dioptrion vocant, Latini verò ani speculum nominant: tales sunt eorum imagines.

CATOPTER.

DIOPTRION.



Hip. li. de fistu-  
li. 2.  
lib. de  
hæmorrhoidibus.  
Cel. lib.  
7. ca. 4.  
& 30.  
Aet. lib.  
14. c. 23.  
Paul. lib.  
6. c. 23.  
& 78.  
Aet. 17.  
3. c. 19.  
Alb. li. 2. c. 80.


10 Ani plura vitia sunt, quæ ubi medicamentis non vincuntur, manus auxilium desiderant: fistulæ præsertim, quæ à Græcis siringæ nuncupantur: hæc dum antiquantur, callum contrahunt, & nisi secutur non sanescunt, quippe aliqui ad usque intestini corpus penetrant, multæ illud perforant, & aliæ varios, ac diversos anfractus procreant: quæ verò usque ad intestinum perveniunt, scolopomacherio aperiri solent: eo autem quæ illud perforant, falcicula huius formæ diuiduntur.




Siringotoma.  
Hipp. lib. de fistu-  
li. 2.  
Cel. lib. 7. c. 19.  
Gal. 6. meth. cap. 4.  
Paul. 1. c. 23.  
Aet. lib. 14. c. 23.  
Cal. lib. 6. c. 23.  
Paul. lib. 6. c. 23.  
Scolopomacherio.  
Alb. li. 2. c. 80.  
Falcicula.

Ne autem aut intestinum, aut operantis digitum lædatur, fabricantur *falsiculae* cum radij extrema acutè spherulata: eorum effigies sic patent.

## FALSICULA.



Solent nimirum prope anum, & in extremitate recti intestini, nonnullæ carnosæ excrescentiæ oriri, quæ à Græcis *thimi*, ab Arabibus *alhalce*, à Latinis *morum*, & Vulgari sermone *porrofico* vocitantur, alibiq; etiam in membris raris nascuntur: additamenta sunt præter naturam mollia, rubicunda, ac spò-giosæ substantiæ, quare ablatione egent, aut simplici sectione, aut ignito cauterio, sed ut firmiter teneantur, ac vt ceteræ partes à noxa immunes permaneant: varia instrumenta à diligenti Chirurgo parata tenentur.




## AD SAGITTAS DE CORPORE EXTRAHENDAS.

Vt sagittas in corpus defixas secundum rationem, & ex arte eximere possis, inueniendum tibi primum est quo instrumento id efficere queas: modus autem inueniendi instrumenta habetur ex contemplatione naturæ, ac diuersitatis tum læsarum particularum, tum rerum defixarum, ex quo postea sequitur, modus eas euellendi, qui varius, ac multiplex est. cum differentiæ telorum, ac rerum in corpus defixarum inhærent: sicut differunt nempe materia, figura, magnitudine, numero, habitu, & viribus: materia quidem quatenus hastilia, aut lignea sunt, aut arundinea: ipsa verò tela, aut ferrea sunt, aut ærea, aut stannea, aut plumbea, aut cornea, aut vitrea, aut ossæ: figura quatenus alia rotunda, alia lata, alia angulosa, alia triangulari, alia falcata, alia trifurcata, alia spiculata, & ex spicularis. hæc posteriora spectantibus spiculis muniuntur, vt dum extrahuntur contra defigantur, illa in ateriora vergentia habent spicula, vt propullata idem faciant, hoc est infigantur, & lanien aliæ utroq; modo. Magnitudine quatenus alia magna, alia parua sunt: numero quatenus vna, aut plures, aut simplex, aut conposita, id est ex duplici parte fabricata: habitu quatenus a suo assili separatur, aut firmiter infigitur, nec villo modo dimouetur: viribus quatenus vno quædam sunt obliæ, alia verò non: Hæc quidem sunt telorum differe.

10 differentia, que vt sensate intelligantur, videatis eorum imagines : deinde instrumenta extractioni accommodata delineabo.

## FERRVM SAGITTAE ROTVNDVM.



30

### LATVM.



### ACVTVM.



30

### TRIANGVLATVM.



### SPICVLATVM.

### BARBVLATVM.

40



### CVSPIDATVM ANTERIVS.




50

### CVSPIDATVM POSTERIVS.




### CVSPIDATVM VTROQVE MODO.

60



### DVPLICATVM.

### TORCVLATVM.



12

FAL.



## FALCATVM.



## ANGVLOSVM.




## SAGITTA ASTILI MVNITA.



Hipp. lib. de ca-  
lorum extra-  
dione  
Cat. lib. 7. ca. 7.  
Paul. lib. 6. c. 58.  
Ruf. 9. ad Al. m.  
Cic. 1. 5.  
Auc. 4. 4. 28. 5  
cap. 10.  
Albu. lib. 3. c. 96.

Omne telum extrahitur, aut ab ea parte qua venit, aut ab ea in qua tendit, extrahitur autem aut vi quadam, aut quiete, aut longo tempore, & instrumentorum auxilio ab ea parte in qua tendit, dum alia infigitur, aut spiculis, vel inuertis alis cingitur: quare si ferrum astili prius, & concavum fuerit, eo instrumento propellatur, qui a sagitta astili non variat, aut saltem propria sagitta ieretur, & acutum est, ut ferri cauum infigi possit, donec in oppositam propellatur partem: unde propulsorium mas appellatur, ab aliquibus lurdus impelleris dicitur, & ab Auic. impellens acutum nominatur: eius cingit hae c.


## PROPVLSORIVM MAS. ZVGI CANNVLATVM AVL



7. Guidonis in-  
strumentum.

Aliud simile instrumentum, sic cauum vsitatur, & ob hoc propulsorium foemina vocatur, ab aliquibus cauum impellens, & ab Auic. impellens canaliculatum dicitur: cum hisigitur tela caudata propelluntur, donec ab altera parte apprehendi, ac extrahi possint: huius secundi instrumenti imago haec est.


## ZVGI CAVDATVM AVL. PROPVLSORIVM FOEMINA.



Cum vero ab ea parte, qua venit sagitta ferrum illud euelli potest, queratur id manibus efficere, si vero non eo vtamini instrumento, quod Albu. attractorium torcularum, & magnus Guido terebrum inuertum vocant: sub duplici forma haec instrumenta fabricantur, quorum vnum integer est, alterum vero diuisum: ecce eorum delineatio.



TEREBRVM TORCVLATVM INTEGR.



4. Gul-  
donis 1-  
strum 6-  
m.

TEREBRVM TORCVLATVM DIVISVM.




Si sagitta firmiter in ossis, aut alibi compacta extiterit, & opus ter ebis perfici poterit, ad alia in-  
strumenta devenire non decet: si vero non, ad fortiora confugiendum est: inter quæ rostra varia enu-  
merentur, veluti corvinum, gruvinum, & anserinum, quibus sagittæ ferrum apprehenditur: quare eo-  
rum effigies sic delineare decreui.

CORVINVM.



Albo. II. c. 19.  
2. Guldonis in-  
strumentum.

GRVINVM.




Albo. II. 11.  
c. 19.

ANSERINVM.




Quia per se tela spiculata, aut barbata, aut akerius figuræ existunt, ideo prædicta instrumenta accommodata non iudicantur: unde ad tenaculas cannulatas, aut dentatas confugere oportet: quæ porro fortissimæ, ac tutissimæ operationis reperiuntur: formantur hoc modo.

## TENACULA DENTATA.



## TENACULA CANNULATA.



Solent nimis sagittæ ob eorum varietatum magni negotium Medico facessere antiqui tamē quodam instrumentū obseruabant, quod à sagittarum extractione belucū Græcæ, & Diocleum Latine, à Diocle eius inuatore vocatur: cuius descriptio obscurissimè à Cornelio Celso legitur: ecce imago.

## DIOCLEVM.


Hoc vnum ex tot Chirurgicorum ferramentis, cum nunquam capere potuerim, delineare datum nō fuit, quemadmodum etiam in secundo libro testati sumus: quare si quis elingiem organi istius in lucem aliquando protulerit, ab omnibus medicinarum studiosis summo semper in honore habebitur. Loco autē Dioclei instrumenti ego vti soleo hoc altero.

## BELVLCVM.



Occurrit sæpe, quod ex vulneris angustia prædicta instrumenta ingredi nequeunt, quare expedit vulnus interdum vique ad imum dilatare, & hæc duo instrumenta satis opportuna sūt: primum vocatur forceps deceptoria: secundum cultellus simplex.


10 **FORCEPS ECCISORIA AD VULNERA IN CARNE AMPLIANDA.**



Ypoiden. Col.

6. Guid. instr.

**CUTELLVS SIMPLEX.**



**DE GLOBVLOS, SIVE PLUMBEAS GLANDES, AVT SPHERVLAS EVEHENDAS.**

Notam antiqui de sclopetorum, siue archibulorum vulneribus notitiâ habere, igitur ullum quidem verbum ab eis habetur. Cellus tamen in tertio telorum genere plumbeam glandem assignat, quam moderni Chirurgi clarissimi globulum, pillam, & spherulam plumbeam vocant: telum est quod perrupta cute, & carne integrum intus infedit, quare & integrum edelli debet: euellitur autem aut ab ea parte qua venit, aut ab opposita disrumpit cute si tenuis fuerit: & quia varia sunt, quæ à tormentis bellicis in corpore iniiciuntur, ea quippe imprimis delineare decreui.

Alphonso Per-  
ro. Napolit.  
Bibliothecam  
Magg. Bonon.  
Leonardus Bo-  
tus Almus.

Pilla integra. Pilla dimisa. Cathena. Sacculus squammarum plenum. Partes lorice.




60 **Tela omnia, quæ sensui obijciuntur, sæpe manibus extrahuntur: quæ verò in absconso delitescunt, parte angustiori, tereti, & recta, specilli inquirenda sunt: utpote dum dignoscuntur illius lateri, & cura euelluntur.**

**SPECILLVM ANGVSTI, ET LATI CAPITIS.**



Cumq; specillum lati capitis nihil egerit, aliud in medium adducatur, anulare dictum: cuius operatio laudatur, si pilla in sinu aliquo, aut magna cavitate perijerit: cius eligies talis est.

Globulus. Anulus. **SPECILLVM ANVLLARE.**



lupa

Io. And. à Cr. Ofic.

e

Si


Si verò firmiter globulas alicui parti adhaerent, illud instrumentum opportunum est, quod hamuli pi-  
scatorij effigiem praefert: quod hercle non mihi multū placet: attamen sub duplici forma videri solet.

## HAMULI.



Et si hamuli interdum opportune in cathenæ, aut diuise pillæ, aut partis lorice extractione opere-  
tur, nihilominus tutiorem operationem à cicognino mco, aut à celebre illo anserino instrumento ad  
pillas euellendas expectare oportet: & quod verum sit, instrumenti effigies hoc declaratur.


## CICOGNINVM.



## ANSERINVM.




## GRVINVM ORBICVLATVM.




Non desunt quamplurima alia instrumenta ad hoc opus maxime accommodata, veluti alphonsinum,  
inuentore Alphonso Ferro Neapolitano, instrumentum est tribus alis, ab vno trunco ortis munitionum,  
quæ anulo quodam mobili aperiantur, & clauduntur: quare apprehensis pillæ firmiter ea retinent, anulo  
recurrente adiutore, si cuspidem versus trahas aperitur si contra: hoc enim pacto figuratur.

## ALPHONSVM CLAVSV.



## ALPHONSVM APERTVM.




# Officina Chirurgica.

ALPHONSIUM CVM PILLA.

ANVLVS

210  
9b

10



Apud Teutones ad pillas euellendas aliqua satis accommodata instrumenta absque anulo in vsu obferuantur, quae mihi à magno Matthiolo donata fuere, ea certe habeo, conferuo, & cordi teneo: coru effigies haec est.


30

CANNA FERREA.



ASTA FERREA QVATVOR ALIS MVNITA.

30



ASTA CVM SVA CANNA.



ATTRACTOR SIMPLEX.

40



50

ATTRACTOR CANNVLATVM, SINE TEREPRO.

60



60





ATTRACTOR CANULATVM CVM TEREBO.



Si telum ossi adeo impactum fuerit, quod inde prædictis instrumentis euelli nequit, decet quippe al-  
tero infrascriptorū vi, quæ porro apud Chirugos castra, classisq; sequentes continuo circumferri de-  
bent: fabricatur instrumentum cannulatum teres diuisum, per quod medium terebrum, itue torculum  
rectum percute recto tramite pertransit. cumque igitur canulum pillæ firmiter apodiatur, & terebrū  
auoluitur pillæ perforat cuspide torculata terebri, ac illi inferitur: canulum verò carnis lacera tuetur,  
nos illis noxam inferre permittit, & sic pillæ secure extrahitur: hæc est huius primi terebri forma.

CANNVLVS ACVTVS CVM TEREBO.



Alterum simile fabricatur, præterquam in eius extremitate, quæ exterius torculatam videre poterit.  
tis. facit hoc instrumentum ad duo, nempe quidem ad ferrum sagittæ euellendum, & ad pillam extra-  
hendam: diuisum est visque ad medium, sicut primum, sed non acutum: ecce eius propria delineatio.

CANNVLVS TORCVLATVS CVM TEREBO.



10 Non multum dissimile instrumentum teretem ad hunc finem fabricatum, sed integrum, & absq; tor-  
culo reperitur, per cuius cannulâ transit torculum acutû, eius forma his tribus instrumentis manifestat.

CANNVLVS SIMPLEX.



TEREBRV.

CANNVLVS SIMPLEX  
CVM TEREBRO.



50 Haecenus de instrumentis cõmunibus, ac aliquibus membris appropriatis, nonnulla diximus, eaq;  
delineauimus, quæ porro vsque ad huc videre potuimus: nunc restat, vt caeteriorum, quæ igniti pos-  
sunt, vnde actualis vocantur, imagines describamus.





CAUTERIA ACTUALIA.

Veteres Medici in cauteriorum administratione, audaciores, ac diligentiores his, qui hac tempe-  
 60 re à manuum operatione Chirurgi vocitantur, semper fuisse, ac præsidium hoc eundem alijs præposue-  
 re: & quia huius actionis finis varius, ac diversus est, tum ratione affectus, cum ratione loci affecti igitur hæc instrumenta, quæ cauteria, siue clauilia vocantur, diversarum formarum, ac materiarum fabri-  
 cari debent: nempe quidam ex auro, quod magis laudatur, aut ex ferro, quod magis valet: interdum  
 ex ære, aut plumbo, aut auricalco fiunt: interdum ex ferventi oleo, aut xillo acenso, aut cucurbita  
 adusta, aut carta avoluta, & ignita, aut similibus rebus administrantur: sortuntur eorum nomina ab ef-  
 figie, aut forma, ut ad vnguem infra videre poteritis.

Hip. 2. par. aph.  
 in fine. & 7. de  
 mor. popu.  
 Celib. 2. c. 2.  
 Diosc. l. 7. c. 3.  
 Gal. lib. 12. par.  
 m. cap. 96. & l. 12.  
 de diffusib. m.  
 Aer. l. 12. c. 5. p.  
 Diosc. 2. c. 2. p.  
 Auz. 4. l. 1. c. 3. p.  
 Ratio h. de cau-  
 terijs.  
 Albu. lib. 1. per  
 totum.



20



30

Alte. H. 1. 1. 2. 7  
R. 10.



40



50

## LVNARIA.



Alte. H. 1. 1. 2. 7  
R. 10.



60

5CV.


SCVTALIA.



● 2010年10月1日起实施




MALLEARIA



A300,000,000



**SPHERICA:**



1990



ALJAVOMI




Adm. Jb. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

TRIAN.




Io. Andr. à Cruce.  
TRIANGVLATA.

Alb. E. 1. 247.




10



20

QVADRATA.




30

Alb. E. 1. 248.




OLIVARIA.




40

Alb. E. 1. 249.  
R. 16.




50

LINGVALIA



60

Alb. E. 1. 250.




RAD'IO.

10

RADIOLATA.

30

50



Alb. Tab. 18.

CANNVLATA.

Sæpe periti Chirurgi ne latera, aut partes carnosæ sensibiles ab igneo cauterio lædantur defenfaculo, quædam aut ænea, aut ferrea, aut alterius modi præparare solent: hæc quippe formas varias seruant: nam sub canouli recti, aut obliqui effigie multa sunt: alia verò plana, quadrata, aut rotunda fabricantur, ut ignicum clauilium recipiant: hæc porro clarè infra videre poteritis.

40

CANNVLVM OBLIQVVM.

CANNVLVM RECTVM.




Alb. Tab. 18.

CANAHAM AVIC.



IN




### IN MORBIS EXTREMIS.

Hipp. 2. aph. 6.  
 8. aph. in 6a.  
 9. op. semant.  
 Ce lib. 7. ca. de  
 cura gangren.  
 Gal 7. de signa.  
 22. et.  
 Pan. lib. 6. ca. 24.  
 Alb. lib. 2. ca. 29.  
 Avic. 3. 1. Doct.  
 5. cap. 15.  
 4. 1. cap. 17.  
 3. 4. cap. 16.  
 4. 4. lib. 4. c. 13.

Sæpe quidem sphacellantur, aut corrumpuntur membra, interdum veneno affliguntur, ac multoties ossa terredine, siue carne vexantur, quod nec medicamentis, nec igne suffragantur, quare unicum, sed miserum remedium restat, ut corporis ceteræ partes à noxa liberentur. membrum putridum, aut quod paulatim emoritur amputare: quòd opus adeo crudele infra scriptis instrumentis fieri solet.


CVLTER EXCISORIVS.

CAVTERIVM CVLTELLARE.



10

SERRVLA.



20

SERRA.

30



SERRA MAGNA.

40



50

60

INSTVMENTA ANATOMICIS ADMINISTRA-  
TIONIBVS OPPORTVNA.

In superioribus figuris aliquorum instrumentorum delineationes, quæ in male affectis corporibus viventibus apprimè spectant, finimus: nunc verò de aliquibus, quæ in cadaveribus, & anatome opem ferunt, imagines describere expedit; ab his porro, quæ magis communia sunt, incipiendo: animalia vèrò anatome opportuna hæc sunt. Homo, cebus, idest Simia caudata, Simia sine cauda, canicipes, idest cinocephalus, vrsus, lues, & canes, cæteraq; animalia dentibus ferratis prædita.

## DIVERSAE NOVACVLARVM FORMAE.

*Cul. y de aggr. 200.* Primum instrumentum super quod locantur corpora anotomiz parata, est asser. Secundò præparandi sunt cultri, quibus tonfores in abradendis pilis vtuntur, & quos vulgo novaculas dicimus: harum quædam acuta esse debent: quædam verò retusiores: aliqua in manubriolo firmiter locantur: multæ mobilis sunt, vt sequi quaque occasione in membranis, aut tendinibus, ligamentisq; findendis aptari possint.

## ASSER.



## NOVACVLVM RETVSVM. A. NOVACVLVM ACVTVM.



*Cul. 8 de aggr. 200.*

Prædictis instrumentis cultellos, quibus calami adaptamus addere expedit, quorum aliqui orbiculato cuspidè multi recto, acutoq; esse conveniunt: sint porò ex ferro indo, vt commodè arteriæ, venæ, nervi, ac cætera similia membra inter se, & à pelliculis separentur.

## CVLTELLI, QVIBVS CALAMI ADAPTANTVR.

VALDE ACVTVS.



MIRTVS CVRVATA.



## NEQVE ACVTVS, NEQVE OBTVSVS.



Non ab re adsunt interdum duo cultri, quibus mensa paratur, quorum vnus altero maior, ac firmior esse debet, ad varia ossa separanda, aut artus diuidendos: horum imago hæc est.

CVLTELLI MAGNI.



Conuenit adhuc quantifurimos hamulos, siue vinctos paratos habere, ad sustentandam, aut apprehendendum, quod minimum est, ne sinistrae manus umbra sectionem obteat.

HAMULI, SIVE VNCINI.



Gal. I. 1. pagg.  
mac.

Insuper stilos, siue specillos longos, breues, crassos, tenues, ex filo argenteo, aut aeneo parare oportet, potissimum verò plumbeo, ad varios vsus praefertim, ad obliquorum ductuum, foraminumq; progressum, ac alicuius partis naturam inuestigandam: ortumq; explorandum.

SPECILLI VARII.



Ord. I. 1. pagg.  
mac.

Inuenit quoque syphones habere, vt per penem iter in vesicam agnoscas, & in lorij per eum canalcm extractione exercitatio reddaris: vario modo fabricantur, vt supra vidisti.


SYPHONES, AUT CATETERAS, SIVE SIRINGAE.






Opportune etiam ex arundinibus, oblongi, ac teres parantur calami, quibus minister aliquis, hoc il-  
ludue corpus concavum commodius, quam tolle infiare possit: 30

## CALAMI ARVNDINEI.



Gal. 4. de aggr.  
1833.



Ve plicatura illa mirabilis, quam rectem mirabilem isti vocant, in media cerebri regione firmam re-  
peritur: pariter vt nervorum paria sex, qui ab eius substantia originem trahunt manifestentur, maxi-  
mam cerebri portionem elezare oportet: quare cultri valde tenues ex buxo parati summe conveniunt  
quorum forma talis esse debet. 30

## SPATVLAE BYXBÆ.



Quia arundines in duris, aut exsiccatis pulmonibus, aut vesicis interdum idoneæ minime sunt: igitur  
tolle, siue flabello vi decet, vt similia membra tumida reddantur. 30

## FLABELLVM.



Serra verò, quam interdum operi adhibemus, ea conducet, qua sphacelo, aut eiusdem generis affe-  
ctibus corrupta membra præscindimus: altera verò semicirculum præferens ad crani divisionem  
accommodata esse creditur. 30

## SERRA.



Forciculæ pro abscindendis post ligationes funiculis opportunam, ac rescandis aliquibus oculis,  
& profundis membranis: longioribus manubriis fabricare oportet. 30

# Officina Chirurgica.

## FORFICVLA.

212  
65



Malleus ligneus ad grandioreni cultrum impellendum, ac profundandum, cum brutorum caluaria aliuduc os magnum eirangere desideramus paratus sit.

MALLEVS.




Acus quasdam habere conuenit, obliquatas, ac rectas, conduxerit quoque has magnas, paruas, vt filum gracilem, crassumq; transmittant: prater acutas retusiori cuspide etiam parentur: tales quoque ad manus sint, quibus in confluentia vulneribus vtiuntur.

ACVVM VARIETAS.

ACVS RECTA.

ACVS OBLIQA.

ACVS TRIANGVLATA.



Chel. de aggre.  
ment.

Filum quo literarum fasciculos colligamus, ad varia vasa laqueanda accommodatissimum est.

FILVM GLOMERATVM.

ASNEYM.

LINEVM.

CANAPIVM.



Spongiae etiam quamplurimae ad detergendum, & exsugandas humiditates conueniunt.

SPONGIAE.

MAGNAE.


MEDIOCRE.

PARVAE.



Hactenus aliqua delineauimus instrumenta, quæ ad diuidenda cadauera maximè conducunt: nunc restat, vt aliqua describamus, quæ ad skeleton cōnectendum necessaria sunt, & quod primò occurrit, terebrum illud est, quo fabri vtuntur ad ossa perforanda: cuius imago hæc est.

TEREBRVM QVO FABRI VTUNTVR  
TEREBRVM QVOD HABENA AVOLVITVR. TEREBRVM, QVOD ARCV DVCITVR.



CAVVM IN QVO SVBVLAE IMPOVNTVR.

Ex se tantum terebrum nihil agit, nisi auxilio quarundam subularum, quæ diuersimode parantur potissimum ex ferro indo, vt sub his formis videre poteritis.

SVBVLAE DIVERSAE.




Ossa secundum opportunitatem perforata, aeneo filo insimul coarctantur, quod opus non nisi ab expertissimo, ac diligentissimo Anatomiista fieri solet: filum verò aeneum omnibus notum est: eumq; supra finxiui.

Forpex ad intorquendum filum aeneū, huic operi summo opere conuenit, pari modo & tenacula ex-cisoria ad ipsum filum amputandum: quorum imagines delineatae videntur.

TENACVLA.

FORPEX.



Col. 1. de vlt  
part.  
Pon. h. d. c. 88.

Adhuc

10 Adhuc vasa quædam terrea formanda sunt, in quibus particule, quæ à cadaveribus in anatomæ quodtidie separantur locari possint: postremò capsam, in qua ossa, cæteraq; diuisa, ad matrem antiquam descenduntur singamus.



ANATOMES.

AD OSSA LVXATA, AVT FRACTA.

30 Ossa aut luxata, aut fracta in suam sedem tribus modis generalibus collocantur, & reponuntur, quibus alij sere omnes continentur. Vnus **PALESTRICVS** vocatur, ad quem tantum solas manus ad mouemus, atque hic vtpote imbecillis apratur ad mollia corpora, muliebria nimirum, & puerilia modo recens virum fuerit. Alter **METHODICVS** dicitur, ad quem instrumenta adhibemus, quorum vsus in coenitium vita est, hic omnibus artibus, ac sensibus idoneus est, ac morbis, qui iam vertuti sunt. Tertijs per **ORGANA** hic, & maius momentum habet. valet enim ad corpora athletarum, & ad prolapsa, quæ sub methodico modo curari nequeunt, ac vbi malum diutius trahitur.

Hippocrates.  
Hærodotus.  
Pythides.  
Archimed.  
Nymphodorus.  
Nicom.  
Asclepius.  
Orbanus.  
Faber.  
Ruffus.  
Acrus.  
Pavus.  
Auerroes.  
Albucasis.

40 **PALESTRICVM** modum, quia satis communis est, imprimis delineare expedit, & quia à Medico tantum exercetur: pauca quippe exempla de eo in humero, ac talo luxato adducamus, sed quia tres sunt modi reponendi, secundum hunc modum humerum luxatū: quorū primus per digitos, aut agroti, aut Medici fieri solet: secundus verò per calcem experti Medici: & tertius per summum humerum ministri infirmo altioris: ideò primum modum, hac simplici figura singamus.

**HVMERV M LVXATVM, PER DIGITOS  
RESTITVENDI IMAGO.**

50 Est, & alius reponendi modus, quo super summum humerum alterius hominis humerum collocant, maior autem esse necessariò debet, super quem collocatur infirmus: hic aurem apprehenso brachio laborantis summum humerum suum excitatum alæ homini subiiciat: vt in hac operatione appareat.


**HVMERI EXTRALOCATI, PER HVMERV M  
REPOSITIO.**

60 Qui per calcem articulum reponere nititur, hominem humi resupinare debet, & in sinum alæ, aut pilam ex corio, aut aliquid aliud rotundum demittat: nam nisi tale aliquid indatur non potest calx ad humeri caput peruenire. Alter verò minister ab altera parte lato laqueo pillam contineat, ac pede spatulam repellat: exprimit enim figura hæc, negotium hoc.

**HVMERV M DISLOCATVM, PER CALCEM  
RECONDITVM.**

Modus qui per organa celebrantur, antiquissimus quippe est, & organorum ternas continet differen-  
tias: nam alia sunt tractoria, alia machinamenta, & alia quæ erecta, aut plana collocantur. Tractoria  
dumtaxat extendi facultatem habent: hæc ut suo munere fungantur, aduenientia quædam postulant, ut  
scamnum, lectum, aut scalam, eo quod per se visui esse minime possunt. Machinamenta sunt organa  
tractoris ampliora, quæ non modo attractionem, sed impulsionem quoque pollicentur, ac præcipue quo  
rundam membrorum gratia componuntur. Erecta, aut plana organa humilis structuræ sunt, & consistit  
ex his, quæ & extendendi, & impellendi vim habent. Plana præcipue, ut homine illis insidente recedat,  
aut restaurari, quod elapsum, aut fractum est possit, quale est scamnum Hippocratis, aut polipastion  
Archimedis

## SCAMNUM HIPPOCRATIS.




Hæc  
Etiæ in  
uenerunt  
fuit Pa-  
fiorum  
Cras  
hoc fuit  
ut Hip.  
lib. 4. de  
articul.  
& lib. 5.  
de fra-  
cturis.  
Ortha-  
tis ex  
Hæc lib.  
de ma-  
ch. in-  
uentis.


10. Quoniam tractoria organa imperfecta sunt, nec prestare quidquam per se possunt, sed alterius operam requirunt, puta scalæ, lecti, aut scamni, quæ ubi non sunt eorum vicem exhibent pavimenta, fenestras, columnas, & similia loca: quare cum scalæ satis per se idoneæ sunt, eas delineare oportet.

PLINTHIVM NILEL


SCALA SIMPLEX.



PLINTHIVM HERODOTI.









PLINTHIV M ORIBASIL

# Officina Chirurgica.

270  
71 F. 108



FINIS.

Figures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



FINIS.



